

تأثیر پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران دچار انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل ۱۳۷۹-۸۰

عفت مظاہری^۱، دکتر سید هاشم سزاوار^۲، دکتر عدالت حسینیان^۳، نسرین فولادی^۴

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با تغییر سیستم ارایه مراقبت‌های بهداشتی، بیشتر بیماران مراقبت‌های حرфه‌ای و تخصصی لازم را پس از ترجیح از بیمارستان در منزل دریافت می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران دچار انفارکتوس قلبی بود.

روش کار: این پژوهش تجربی بر روی ۶۰ بیمار دچار انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی بوعلی اردبیل در سال ۱۳۷۹-۸۰ انجام شد. نمونه‌های مورد بررسی بصورت مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه ۳۰ نفری شاهد و آزمون قرار گرفتند. سپس برای گروه آزمون برنامه بازدید منزل تدوین گردید و لی برای گروه شاهد مداخله‌ای صورت نگرفت. یک هفته پس از اجرای کامل برنامه بازدید منزل، وضعیت سلامت جسمی و روحی نمونه‌های مورد بررسی در هر دو گروه توسط چک لیست نهایی و تست اسپیلبرگروبک مورد بررسی و نتایج با آزمون χ^2 در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: آزمون χ^2 بین ضربان قلب زمان استراحت در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نشان داد ($P < 0.05$) ولی این تفاوت بین فشار خون سیستولیک، دیاستولیک، وزن، اضطراب و افسردگی در دو گروه معنی دار نبود.

نتیجه‌گیری: با توجه به آنکه پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران موثر است بنابرین پرستاران می‌توانند با فعال کردن سیستم مراقبت در منزل و برنامه‌های بازتوانی همراه با حمایت‌های اجتماعی بعد از انفارکتوس قلبی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران شوند.

واژه‌های کلیدی: پیگیری بیمار، انفارکتوس قلبی، وضعیت سلامت جسمی و روحی

۱- مؤلف مسئول: مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۲- استادیار گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۳- مربی آموزش بهداشت دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ترخیص به انفارکتوس دوم مبتلا شده و حدود ۱۰-۵ درصد آنان فوت می‌کنند [۱].

عوارض ناشی از انفارکتوس قلبی مواردی از قبیل مشکلات جسمی و روحی (اضطراب و افسردگی) می‌باشد. بررسی انجام شده در ۸۷۷ بیمار دچار انفارکتوس قلبی نشان می‌دهد که پس از ۷ روز ۳۲٪ بیماران دچار افسردگی خفیف و متوسط بوده‌اند و افسردگی یک عامل پیش‌گویی کننده مرگ و میر بمدت یکسال بعد از بیماری است و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش اضطراب می‌شود و ارتباط مستقیمی بین حمایت‌های اجتماعی و افسردگی بعد از بیماری وجود دارد [۴].

بررسی انجام شده در ۳۸ بیمار دچار انفارکتوس قلبی حاد که بمدت ۳ هفته بعد از ترخیص از بیمارستان پیگیری شده بودند نشان داد که این بیماران در این مدت اضطراب و افسردگی و ترس از عود بیماری را تجربه می‌کنند که باعث بدتر شدن وضعیت سلامت جسمی آنان می‌شود [۵]. بنابراین بیمار و خانواده‌اش به آموزش و مشاوره نیاز دارند و از آنجایی که بازتوانی فرآیند پویا و آگاهانه بهداشتی است که به فرد بیمار جهت دستیابی به حداقل توانایی جسمی و روحی کمک می‌کند، بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی نیز که از عوارض جسمی و روحی ناشی از بیماری متأثر می‌شوند به بازتوانی جسمی و روحی و پیگیری نیاز دارند [۱].

بررسی انجام شده توسط Chen و همکاران نشان داد که آموزش اعضای خانواده و بیمار جهت کاهش این عوارض اهمیت داشته و باید توسط پرستاران انجام شود [۶]. نتایج تحقیقات انجام شده در مورد بیماران قلبی که در منزل تحت مراقبت قرار گرفته‌اند نشان داده است که ۹۵٪ آنان در وضعیت خوب تا عالی قرار داشته‌اند [۱]. بررسی انجام شده توسط رحمانیان و همکاران نشان داده است که مراقبت در منزل بر وضعیت سلامت بیماران تحت درمان با همودیالیز مؤثر

مقدمه

امروزه با تغییر سیستم ارایه مراقبت‌های بهداشتی، بیشتر بیماران مراقبت‌های حرفه‌ای و تخصصی لازم را پس از ترخیص از بیمارستان در منزل دریافت می‌کنند و دو اصل مهم ارایه مراقبت‌های بهداشتی درمانی در محیط زندگی مددجویان و لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشتی درمانی سر لوحه سیاست‌های بهداشتی قرن بیست و یکم قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها و تجارب بهداشتی سالیان اخیر حاکی از آن است که ارایه مراقبت‌های بهداشتی مدبرانه در منازل به عنوان یکی از امکان اقامت در جامعه، علاوه بر کاهش دوره بستری در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی، گام بزرگی در جهت استقلال مددجو و نهایتاً ارتقای سطح سلامت جامعه و صرفه‌جویی اقتصادی خواهد بود [۱]. همچنین وجود تعداد زیاد مددجویان در سطح جامعه که نیازمند دریافت انواع مختلفی از خدمات بهداشتی درمانی هستند و با تغییر رویکرد ارایه مراقبت‌های بهداشتی در سطح جامعه و نه فقط در مراکز بهداشتی درمانی تأکید بر افزایش استقلال مددجویان و کاهش اثرات بیماری و ناتوانی از طریق تقویت و تحصیل خود مراقبتی، لزوم اهمیت ارایه خدمات مراقبتی به مددجویان در منزل در میان خانواده و نزدیکان آنان را آشکار می‌سازد [۱]. انفارکتوس قلبی یکی از شایع‌ترین بیماریها در بین بیماران بستری در بیمارستان درکشورهای صنعتی می‌باشد و حدود ۵/۱ میلیون مورد در سال گزارش شده است که حدود ششصد هزار مورد آن به مرگ ختم می‌شود [۲]. انجمن قلب آمریکا گزارش می‌دهد که سالانه ۵۰۰ هزار نفر بدلیل حملات قلبی از بین می‌رونند [۳].

بیماری‌های عروق کرونر سیر صعودی داشته و بیشترین میزان مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. براساس تحقیقات انجام شده حدود ۱۵-۲۰ درصد بیماران پس از انفارکتوس میوکارد طی ماه اول پس از

جلسات بازدید منزل که بمدت یک و نیم الی دو ساعت به طول می‌انجامید ابتدا بیماران معاينه فیزیکی می‌شدند و در صورت وجود مشکلات جسمی و روحی اقدامات مراقبتی مناسب بعمل می‌آمد. همچنین در بازدید اول حدود ۴۵ دقیقه در ارتباط با بیماری، داروهای مصرفی، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی طبق دفترچه آموزشی که در این راستا تنظیم و در اختیار بیماران تحت مراقبت قرار گرفته بود آموزش‌های لازم داده می‌شد. در جلسات بعدی از آموزش‌های داده شده امتحان شفاهی بعمل می‌آمد و در خاتمه وضعیت جسمی - روحی و آموزشی بیماران در دفترچه گزارش ثبت می‌گردید و بعنوان اطلاعات پایه در بازدید های بعدی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعد از دو ماه و اتمام برنامه مراقبتی و بازدید منزل وضعیت سلامت جسمی و روحی افراد مورد بررسی در هر دو گروه براساس چک لیست تنظیم شده که شامل مشخصات دموگرافیک، فشار خون، وزن و تعداد ضربان قلب در زمان استراحت بود، بررسی می‌شد. همچنین جهت بررسی وضعیت روحی بیماران در هر دو گروه تست اسپیلبرگر که شامل ۴۰ سئوال در ارتباط با اضطراب پنهان و آشکار بود (اضطراب خفیف ۵۳-۰، متوسط ۱۰۷ و اضطراب شدید ۱۶۵-۱۰۸) استفاده شد. جهت بررسی میزان افسردگی نمونه ها تست بک که شامل ۲۱ سئوال بود (افسردگی خفیف ۲۱-۰، متوسط ۲۲-۲۴ و افسردگی شدید ۶۳-۴۲) بکار گرفته شد و در نهایت بعد از جمع آوری داده ها از جداول توزیع فراوانی و آزمون χ^2 جهت بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با اضطراب و افسردگی در دو گروه استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که ۹۰٪ افراد در هر دو گروه مذکور و ۱۰٪ مؤنث بودند. ۷/۳۶٪ گروه شاهد و ۳/۳۳٪

بوده است [۷]. همچنین بررسی انجام شده در ۸۳ بیمار دچار انفارکتوس قلبی نشان می‌دهد که برنامه های بازتوانی قلبی انجام شده در منزل از طریق افزایش قدرت تحمل فعالیت های هوایی بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنان می‌شود [۸].

پرستاران بزرگترین گروه حرفه ای سیستم مراقبت های بهداشتی می‌باشند و با تشریک مساعی با بیماران و خانواده های آنان می‌توانند در پیگیری و کاهش دوره بستره مؤثر باشند [۹] و مطالعات نشان می‌دهد که ۸۴٪ پزشکان و ۹۰٪ پرستاران موافق ارایه مراقبت در محل سکونت مددجویان می‌باشند و آنرا ضروری می‌دانند [۱]. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران دچار انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل در سال ۱۳۷۹-۸۰ انجام شده است.

مواد و روش ها

در این بررسی بیماران دچار انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل که ساکن شهر اردبیل بودند بطور تصادفی ساده به تعداد ۶۰ نفر انتخاب شدند و در دو گروه ۳۰ نفری شاهد و آزمون قرار گرفتند. نمونه گیری و مراقبت در منزل از مهر ماه ۱۳۷۹ تا دی ماه ۱۳۸۰ بطول انجامید. هر دو گروه بعد از بستره تحت مراقبت های معمول در بیمارستان قرار گرفتند. ولی افراد مورد بررسی در گروه آزمون قبل از ترخیص از بیمارستان ابتدا توسط ابزار بررسی وضعیت سلامت گوردون تحت بررسی و آموزش در ارتباط با مراقبت در منزل قرار می گرفتند و اطلاعات بدست آمده بعنوان اطلاعات پایه در طی مراقبت در منزل بکار گرفته می شد. برنامه بازدید مدون شامل چهار بازدید بود و دو هفته، یک ماه، یک و نیم ماه و دوماه بعد از ترخیص انجام می گرفت. طی

جدول شماره ۲. جدول توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب فشار خون دیاستولیک (میلی متر جیوه)

آزمون		شاهد		واحدهای مورد پژوهش		فشار خون دیاستولیک	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۳۶/۷	۱۱	۱۶/۷	۵	۷۰	۵۱-۶۰	۷۱-۸۰	۱۰٪
۴۰	۱۲	۵۳/۳	۱۶	۷۱-۸۰	۱۳/۳٪	۸۱-۹۰	۱۳/۳٪
۲۳/۳	۷	۳۰	۹	۸۱	۵۳٪	۹۱-۱۰۰	۱۳/۴٪
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع			

 $X^2=3.07$

df=2

P=0.21

جدول شماره ۳. جدول توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب ضربان قلب زمان استراحت

آزمون		شاهد		واحدهای مورد پژوهش		ضریبان قلب در دقیقه	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۳۳/۴	۱۰	۲۶/۷	۸	۷۰	۵۱-۶۰	۷۱-۸۰	۱۰٪
۶۰	۱۸	۴۰	۱۲	۷۱-۸۰	۱۳/۳٪	۸۱-۹۰	۱۳/۴٪
۶/۶	۲	۳۳/۳	۱۰	۸۱	۵۳٪	۹۱-۱۰۰	۱۳/۴٪
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع			

 $X^2=6.76$

df =2

P=0.034

۵۳٪ گروه شاهد و ۳۶/۷٪ گروه آزمون دارای وزن ۷۱-۸۰ کیلوگرم و ۲۰٪ گروه شاهد دارای وزن ۸۱ کیلوگرم و بالاتر و ۳۰٪ گروه آزمون دارای وزن زیر ۷۰ کیلوگرم بودند که تفاوت وزن بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود (جدول شماره ۴).

جدول شماره ۴. جدول توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وزن (کیلوگرم)

آزمون		شاهد		واحدهای مورد پژوهش		وزن	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۳۰	۹	۲۶/۷	۸	۷۰	۵۱-۶۰	۷۱-۸۰	۱۰٪
۳۶/۷	۱۱	۵۳/۳	۱۶	۷۱-۸۰	۱۳/۳٪	۸۱-۹۰	۱۳/۴٪
۲۳/۳	۱۰	۲۰	۶	۸۱	۵۳٪	۹۱-۱۰۰	۱۳/۴٪
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع			

 $X^2=1.98$

df=2

P=0.37

۷۳/۳٪ گروه شاهد و ۸۶/۷٪ گروه آزمون اضطراب متوسط به پایین و ۲۶/۷٪ گروه شاهد و ۱۳/۳٪ گروه آزمون اضطراب متوسط به بالا داشتند مقایسه میانگین

گروه آزمون در گروه سنی ۵۱-۶۰ و ۱۰٪ گروه شاهد و ۱۳/۳٪ گروه آزمون در گروه سنی ۷۱ و بالاتر بودند. مقایسه میانگین سنی با استفاده از آزمون T تفاوت آماری معنی دار را بین دو گروه نشان نداد. ۵۳٪ گروه شاهد و ۶۰٪ گروه آزمون دچار انفارکتوس تحتانی و در گروه شاهد ۱۳/۴٪ در گروه آزمون ۱۳/۳٪ انفارکتوس قدامی وسیع داشتند.

جدول شماره ۱. جدول توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب فشار خون سیستولیک (میلی متر جیوه)

آزمون		شاهد		واحدهای مورد پژوهش		فشار خون سیستولیک	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۶۰	۱۸	۳۰	۹	۷۰	۱۲۰	۱۲۱-۱۴۰	۱۰٪
۲۰	۹	۵۰	۱۵	۷۱-۸۰	۱۲۱-۱۴۰	۱۴۱	۱۰٪
۱۰	۲	۲۰	۶	۸۱	۱۴۱	۱۴۱	۱۰٪
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع			

 $X^2=5.5$

df=2

P= 0.06

جدول شماره ۱ بیانگر آن است که ۵۰٪ گروه شاهد دارای فشار خون سیستولیک ۱۲۱-۱۴۰ میلی متر جیوه و در گروه آزمون ۶۰٪ فشار خون سیستولیک زیر ۱۲۰ میلی متر جیوه داشتند و ۲۰٪ گروه آزمون و ۱۰٪ گروه شاهد دارای فشار خون ۱۴۱ و بالاتر بودند. آزمون X^2 تفاوت آماری معنی داری بین فشار خون سیستولیک در دو گروه نشان نداد. ۴۰٪ گروه آزمون و ۵۳٪ گروه شاهد دارای فشار خون دیاستولیک ۷۱-۸۰ میلی متر جیوه و ۱۶/۷٪ گروه شاهد دارای فشار خون سیستولیک زیر ۷۰ میلی متر جیوه بودند. همچنین مقایسه میانگین فشار خون دیاستولیک بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (جدول شماره ۳).

۴۰٪ گروه شاهد و ۶۰٪ گروه آزمون دارای ضربان قلب ۷۱-۸۰ و ۲۶/۷٪ گروه شاهد دارای ضربان قلب زیر ۷۰ و ۶/۶٪ گروه آزمون دارای ضربان قلب ۸۱ و بالاتر بودند و انجام آزمون X^2 تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه نشان داد (جدول شماره ۳).

بودند. در گروه آزمون ۶۶/۷٪ گروه سنی زیر ۶۰ سال و ۳۳/۳٪ گروه سنی ۷۱ و بالاتر دارای افسردگی خفیف بودند. آزمون کای دو ارتباط معنی‌داری بین سن و افسردگی در دو گروه نشان نداد.

در گروه شاهد ۹۴/۷٪ افراد مذکر دارای اضطراب خفیف و در گروه آزمون ۹۱/۷٪ افراد مذکر و ۸/۳٪ افراد مؤنث دارای اضطراب خفیف بودند و انجام آزمون فیشر ارتباط معنی‌داری بین اضطراب و جنس در دو گروه نشان نداد.

بحث

امروزه با تغییر سیستم ارایه مراقبت‌های بهداشتی، بیشتر بیماران مراقبت‌های حرفه‌ای و تخصصی لازم را پس از ترخیص از بیمارستان در منزل دریافت می‌کنند. مراقبت‌های ارایه شده توسط پرستاران در منزل می‌تواند منجر به پیشگیری و کاهش دوره بستری بیماران و بستری شدن مجدد آنان و در نتیجه کاهش هزینه‌های بیمارستانی شود [۱].

در این پژوهش برنامه‌آموزشی - مراقبتی از طریق بازدید منزل طی چهار نوبت (دو هفته - یکماه و ۱/۵ ماه و دو ماه بعد از ترخیص از بیمارستان) اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که پس از اجرای برنامه بازدید منزل در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد میزان فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب زمان استراحت کمتر شده است.

پژوهش انجام یافته توسط رحمانیان و همکاران نشان داد که برنامه بازدید منزل مقادیر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک را در گروه آزمون کاهش داده است که از نظر آماری معنی‌دار بوده است. ولی میانگین نبض در دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان نداده است که این مطالعه با پژوهش حاضر همخوانی دارد [۷].

اضطراب در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد. ۵۶/۷٪ گروه شاهد و ۶۰٪ گروه آزمون دارای افسردگی خفیف بودند و ۴۳/۴٪ گروه شاهد و ۴۰٪ گروه آزمون دارای افسردگی متوسط و شدید بودند که آزمون X^2 تفاوت معنی‌دار آماری بین میانگین افسردگی در دو گروه نشان نداد (جدول شماره ۵).

جدول شماره ۵. جدول توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب میزان افسردگی

میزان افسردگی	آزمون		شاهد		واحدهای مورد پژوهش
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
خفیف (۰-۲۱)	۱۸	۵۶/۷	۱۷	۴۰	
متوسط و شدید (۲۲-۶۳)	۱۲	۴۳/۴	۱۳	۳۰	
جمع	۳۰	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	

$$X^2=0.07 \quad df=1 \quad P>0.05$$

در گروه شاهد ۵۶٪ واحدها که دچار انفارکتوس قدامی و وسیع بودند دارای اضطراب خفیف و متوسط بودند در گروه آزمون ۴۷/۶٪ افراد مبتلا به انفارکتوس تحتانی دارای اضطراب خفیف و متوسط بودند انجام آزمون فیشر در دو گروه بین اضطراب و نوع انفارکتوس قلبی تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد. ۶۱/۵٪ گروه شاهد که انفارکتوس قدامی و وسیع داشتند دارای افسردگی شدید بودند و در گروه آزمون ۷۵٪ آنان که مبتلا به انفارکتوس تحتانی بودند دارای افسردگی شدید بودند. انجام آزمون کای دو و فیشر در دو گروه ارتباط معنی‌داری را بین افسردگی و نوع انفارکتوس قلبی نشان نداد.

در گروه شاهد ۶۰٪ آنان که در گروه سنی ۷۱-۶۱ سال بودند دارای اضطراب شدید و در گروه آزمون ۷۳/۹٪ افراد زیر ۶۰ سال دارای اضطراب خفیف و متوسط بودند انجام آزمون فیشر ارتباط آماری معنی‌داری بین سن و اضطراب نشان نداد.

۵۳٪ گروه شاهد در گروه سنی زیر ۶۰ سال و ۴۷٪ آنان در گروه سنی ۷۱ و بالاتر دارای افسردگی خفیف

کوتاه مدت بودن زمان پیگیری و تعداد جلسات مراقبت در منزل بوده است که نتوانسته بر وزن و افسرده‌گی بیماران در گروه آزمون مؤثر باشد. نتایج پژوهش زارع در شهر نیشابور نیز نشان داد که می‌توان بازدید منزل را به عنوان یک روش مناسب برای افزایش آپکار خانواده‌های دارای کودک معلوم ذهنی بکاربرد^[۱۲]. با عنایت به اینکه برنامه بازدید منزل توانسته است بعضی از عوامل جسمی و روحی را بهبود بخشد فرضیه مبنی بر مؤثر بودن پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی تایید می‌شود.

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می‌شود برنامه بازدید منزل به عنوان یک روش مهم و اساسی در مراقبت‌های بهداشتی درمانی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی بکار گرفته شود.

منابع

- عظیمیان جلیل. مراقبت در منزل از بیماران مبتلا به هیپرتانسیون و بیماری‌های عروق کرونر، خلاصه مقاله سمینار سراسری مراقبت در منزل، آبان ماه ۱۳۷۹.
- 2- Fife A, Farr E. Acute myocardial infarction. Nurs Stand. 1998 Mar; 12(26): 49-54.
- 3- Mitchell R, Muggli M, Sato A. Cardiac rehabilitation: participating in an exercise program in a quest to survive. Rehabil Nurse. 1999 Nov-Dec; 24(6): 236-9.
- 4- Frasure-Smith N, Lesprance F, Gravel G, Masson A, Juneau M, Talajic M, et al. Social support, depression, and mortality during the first year after myocardial infarction. Circulation. 2000 Apr; 101(16): 1919-24.
- 5- Scalvini S, Zanelli E, Domenighini D, Massarelli G, Zampini P, Giordano A, et al. Telecardiology community: a new approach to take care of cardiac patient. Boario Home-Care Investigators. Cardiologia. 1999 Oct; 44(10): 921-4.

بررسی انجام شده توسط Mitu و همکاران در ۱۳۲ بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی مزمن که مدت ۳۶ ماه پیگیری شده بودند نشان داد که ضربان قلب زمان استراحت، فشار خون سیستولیک،^۱ TPI^۲ و MET در مرحله (استراحت، فعالیت و تست ورزشی) کاهش داشته است که نتایج فوق با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی دارد^[۹].

همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان افسرده‌گی در گروه آزمون پس از اجرای برنامه بازدید منزل نسبت به گروه شاهد کمتر شده است هرچند این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود.

بررسی انجام شده در ۸۸۷۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی نشان می‌دهد که انجام پیگیری بمدت یکسال همراه با حمایت‌های اجتماعی بعد از انفارکتوس قلبی یک عامل عمدۀ پیش‌گویی‌کننده مرگ و میر یکسال بعد از بیماری بوده و ارتباط مستقیمی با کاهش افسرده‌گی بیماران دارد^[۴] که تا حدودی مشابه نتیجه حاصل از پژوهش حاضر می‌باشد. همچنین بررسی روی ۸۳ بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی نشان می‌دهد که پیگیری بیماران و اجرای برنامه‌های بازتوانی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌شود^[۸].

بررسی Halm و همکاران تأثیر برنامه بازتوانی افراد مبتلا به بیماری‌های عروق کرونری را جهت پیشگیری از حوادث حاد قلبی مخصوصاً در زنان را نشان داد^[۱۰].

بررسی انجام شده توسط Karoff نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های بازتوانی قلبی باعث افزایش بازگشت به کار و کاهش میزان اضطراب بعد از انفارکتوس قلبی می‌شود^[۱۱]. نتایج بیانگر آن بود که میانگین وزن در گروه آزمون کمتر شده است ولی از نظر آماری این تفاوت معنی‌دار نبوده است همچنین میزان افسرده‌گی بین دو گروه یکسان بوده است و شاید این نتایج بدليل

- 9- Mitu F, Mitu M, Pandele GI. The role of physical training in left ventricular performance and exercise tolerance in patients with chronic myocardial infarct. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1997 Jan-Jun; 101(1-2): 75-81.
- 10- Halm M, Penque S, Doll N, Beahrs M. Women and cardiac rehabilitation: referral and compliance patterns. J Cardiovasc Nurs. 1999 Apr; 113 (3): 83-92.
- 11- Karoff M. Individual outcome - oriented cardiologic rehabilitation treatment. MMW Fortschr Med. 2000 Jan; 142 (3 Suppl): 179-82.
- ۱۲- زارع مسعود. بررسی تأثیر برنامه‌های بازدید منزل بر آپکار خانواده‌های دارای کودک معلول ذهنی شهرستان نیشابور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۷۶، صفحه ۳۵.
- 6- Chen WH, Yao JP. An investigation on the family support of discharged acute myocardial infarction patients. Zhonghua Hu Li Za - Zhi. 1997 Dec; 32(12): 683-6.
- ۷- رحمانیان قاسم، مظلوم سید رضا، امامی مقدم زهرا، ثاقبی سید احمد. تأثیر برنامه بازدید بر وضعیت سلامت بیماران تحت درمان با همودیالیز، مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی مشهد، سال اول، شماره دوم، زمستان ۷۸، صفحات ۱۶-۷۸.
- 8- Ades PA, Pashkow FJ, Fletcher G, Pina IL, Zohman LR, Nestor JR. A Controlled trial of cardiac rehabilitation in the home setting using electrocardiographic and voice transtelephonic monitoring. Am Heart J. 2000 Mar; 139(3): 543-8.

