

## گزارش یک مورد موکوسل سینوس ماقزیلاری

دکتر مسعود نادرپور<sup>۱</sup>، دکتر لیلی فریبور<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>نویسنده مسئول: استادیار گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
<sup>۲</sup>دستیار گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

### چکیده

با وجود شیوع نسبی موکوسل سینوس های پارانازال، بروز آن در سینوس ماقزیلاری نادر است. در صورت درگیری سینوس ماقزیلاری با موکوسل، عالیم به صورت تخریب دیواره های سینوس و برجستگی گونه، برجستگی سولکوس ژنژیوبوکال با گسترش به دیواره تحتانی اوریت و در نهایت عالیم چشمی تظاهر می کند. در این مقاله گزارش یک مورد جالب و نادر موکوسل سینوس ماقزیلاری معرفی می شود که در ابتدا بیمار با توجه به عالیم سی تی اسکن با تشخیص احتمالی تومور سینوس ماقزیلاری (احتمال Adenocell Carcinoma یا سایر تومورهای بد خیم سینوس) مورد عمل جراحی قرار گرفت.

در حین عمل ماهیت موکوسل سینوس ماقزیلاری مشخص شد.  
واژه های کلیدی: موکوسل، سینوس ماقزیلار، بد خیمی سینوس

دریافت: ۸۲/۱۲/۱۶ درخواست اصلاحات نهایی: ۸۳/۶/۲۵ پذیرش: ۸۴/۲/۱۷


هدف از این گزارش، معرفی یک مورد نادر موکوسل سینوس ماقزیلاری جهت توجه بیشتر همکاران به موارد گزارش شده در سی تی اسکن به عنوان بد خیمی ماقزیلاری است تا موکوسل نیز به عنوان یک تشخیص افتراقی نادر در نظر قرار گیرد.

### گزارش مورد

بیمار پسر ۱۲ ساله ای است که با شکایت تورم در شیار ژنژیوبوکال در سمت چپ صورت که به تدریج بزرگ شده و در نهایت منجر به برجستگی گونه و محو شدن چین نازولابیال به صورت نسبی شده است به مرکز درمانی امام خمینی تبریز مراجعه کرده است، در محل تورم در شیار ژنژیوبوکال درد و ترشح وجود نداشت در معاینه بالینی بیمار تورم در سولکوس ژنژیوبوکال از محدوده دندان کائین تا مولار اول وجود داشت.

### مقدمه

موکوسل یک توده خوش خیم سینوس های پارانازال است که معمولاً با یک اپی تیلوم مطبق کاذب یا اپی تیلوم استوانه ای کوتاه پوشیده می شود این ضایعات خیلی به آهستگی بزرگ می شوند و اکنرا سینوس فرونتال یا اتموئیدال را تحت تأثیر قرار می دهند [۱]. موکوسل های تهاجمی می توانند دیواره های اطراف سینوس را تخریب کنند لذا در تشخیص افتراقی کارسینوما قرار می گیرند. موکوسل سینوس ماقزیلاری که منجر به تخریب دیواره ها گردد و بیمار از قبل سابقه جراحی بینی یا سینوس را نداشته باشد بسیار نادر است. علت ایجاد موکوسل در بسیاری از موارد بسته شدن دهانه سینوس با علی همچون انسداد مکانیکی و یا دستکاری ناشی از عمل جراحی قبلی است [۱]. بهترین روش تشخیص این بیماری CT اسکن است درمان به صورت عمل جراحی است که از روش جراحی باز سینوس به صورت راهبرد کالدول لوک یا به روش جراحی آندوسکوپی سینوس صورت می گیرد [۲].



شکل ۱. اسکن بیمار در مقاطع کرونال سینوس های پارانازال

دهانه سینوس ماگزیلاری باز شد و در نهایت یک آنترورینوستومی تحتانی از زیر شاک تحتنی جهت تخلیه بهتر انجام شد و محل برش به صورت اولیه دوخته شد.

تورم روی گونه که موجب محو شدن چین نازولایمال شده بود به طور نسبی مشهود بود و حساسیت روی سینوس ماگزیلاری وجود نداشت. در معاینه داخل بینی بر جستگی دیواره لترال بینی مشاهده می شد و معاینات چشمی بیمار طبیعی بود.

### بحث

موکوسن یک سینوس اتساع یافته پر از موکوسن است که با غشای مخاطی پوشیده شده است. موکوسن در نتیجه انسداد مزمن دهانه سینوس به همراه بزرگ شدن دیواره استخوانی ایجاد می شود که این موارد خود به خود به وسیله ترشحات موکوسی که حفره سینوس را پر کرده اند ایجاد می شوند. شایع ترین علت موکوسن انسداد التایپی دهانه سینوس است که الینه ثانویه به ترومما و تومورها یا دستکاری حین جراحی نیز ایجاد می شود. ۶۶٪ موکوسن ها در سینوس فروناتال و ۲۵٪ در سینوس اتموئید و ۱۰٪ در سینوس ماگزیلاری رخ می دهند<sup>[۱]</sup>. در یک بررسی انجام شده توسط ناتویگ<sup>۱</sup> و همکاران در میان ۱۱۲ بیمار مبتلا به موکوسن فقط سه مورد (۰.۲٪) موکوسن سینوس ماگزیلاری گزارش گردید<sup>[۳]</sup>. در گزارش دیگری

در CT اسکن به عمل آمده از بیمار در مقاطع کرونال سینوس های پارانازال توده نسج نرمی که باعث گسترش در سینوس ماگزیلاری چپ شده بود مشاهده شد که با خوردگی ناشی از اثرات فشاری توده همراه بود و در گزارش CT اسکن بیمار تشخیص های افتراقی شامل فیبرومای غیر استخوانی شونده، گرانولومای سلول بزرگ و بدخیمی های سینوس مطرح شده بود (شکل ۱).

بیمار در تاریخ ۸۱/۱۰/۲۲ تحت عمل جراحی باز سینوس با راهبرد کالدول لوک قرار گرفت که برشی در فضای ژنژیوبوکال از حفره کانین تا دومین دندان مولار داده شده و بعد از بلند کردن پریوست مشاهده شد که دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری بسیار قابل ارجاع و نازک شده است لذا دیواره قدامی با بیستوری باز شد و موسین فراوان از داخل سینوس تخلیه شد. مخاط فضای داخل سینوس و تمام دیواره ها طبیعی بود.

<sup>1</sup> Natvig

مدنظر قرار گیرد. البته پیگیری طولانی مدت بیماران از لحاظ رد عود بیماری حایز اهمیت است.

### منابع

- 1- Cummings CW, John MF, Lee AH, Charles JK, Mark AR, David Charles JK. Head and Neck Surgery, 3<sup>rd</sup> ed. USA: Mosby, 1998, 1115.
- 2- Lund VJ. Endoscopic management of paranasal mucoceles. J Laryngol Otol. 1998 Jan; 112 (1): 36-40.
- 3- Natvig K, Larsen TE. Mucocele of the paranasal sinuses. A retrospective clinical and histological study. J Laryngol Otol. 1987 Dec; 92(12): 1075-82.
- 4- Jayaraj SM, Patel SK, Ghufoor K, Frosh AC. Mucoceles of the maxillary sinus. Int J Clin Pract. 1999 Jul; 53(5): 391-3.
- 5- Kennedy TL. Endoscopic surgery for frontal and ethmoid sinus mucoceles. Am J Rhinol. 1994 ; 8(2): 107-12.
- 6- Marks SC, Latoni JD, Mathog RH. Mucocele of the Maxillary Sinus. Otolaryngol Head and Neck Surg. 1997 Jul; 117 (1): 18-21.

توسط لوند<sup>۱</sup> فقط یک درصد درگیری سینوس ماگزیلاری در بین ۱۱۸ بیمار با موكوسل دیده شد [۲]. عالیم موكوسل های سینوس ماگزیلاری به صورت درد صورت و تورم و بی حسی گونه، دوینی و مشکلات دندانی است. بیماران معمولاً سابقه عمل جراحی سینوس را ذکر می کنند.

اسکن با ارزش ترین روش تشخیصی است که در موكوسل سینوس ماگزیلاری به صورت توده یکنواخت با لبه های صاف و مشخص تظاهر می کند و بعد از تزریق کنتراست هیچ گونه افزایش برداشتی دیده نمی شود. لبه های صاف کیست برای تشخیص افتراقی از بدخیمی لازم است. نوروپیروم، کیست درموئید، پاپیلوم معکوس و سینلدروما باید در تشخیص افتراقی این تومور قرار گیرند [۴].

عمل جراحی با راهبرد کالدول لوک و آنترورینوستومی تحتانی و با استفاده از آندوسکوپی سینوس روش های درمان در موكوسل سینوس ماگزیلاری هستند [۵]. البته روش درمان آندوسکوپیک معمولاً برای موكوسل هایی استفاده می شود که از محدوده سینوس ماگزیلاری خارج نشده است [۶] موكوسلی که ایجاد اروزیون استخوانی می کند و به بافت نرم گونه تهاجم پیدا می کند بعد از تخلیه کلپس ایجاد می شود که این مسئله در مورد بیمار گزارش شده نیز صادق بود. با توجه به گسترش موكوسل به گونه در بیمار، ما راهبرد باز را برای این بیمار جهت درمان انتخاب کردیم و چنانچه گفته شد تورم روی گونه و محل سولکوس ژنژیوبوکال بود و در معاینه بیمار پس از یک ماه کاملاً برطرف شده بود.

### نتیجه گیری

با توجه به بحث فوق چنین می توان نتیجه گیری کرد که هر چند ابتلای سینوس ماگزیلاری به موكوسل نادر است ولی بایستی در تشخیص افتراقی ضایعات گسترش یابنده سینوس ماگزیلاری با تهاجم فشاری حتماً

<sup>۱</sup> Lund