

فراوانی پنومونی مایکوپلاسمایی در بیماران بستری شده با تشخیص

پنومونی اکتسابی از جامعه در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی اردبیل

دکتر/حمد قاسمی^۱/دکتر شهرام حبیب زاده^۲/پریا بخشپوری^۳

E-Mail: aghasemi72@yahoo.com^۱

دانشیار بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل^۲ دانشجوی پزشکی اردبیل^۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

زمینه و هدف: پنومونی یکی از کشنده‌ترین سندروم های عفونی است که اتیولوژی متفاوتی دارد. مایکوپلاسمها به دلیل عدم حساسیت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام مثل پنی سیلین ها از نظر درمانی نیازمند توجه ویژه ای هستند. با توجه به فقدان مطالعه جامع در ایران در مورد سهیم این باکتری در ایجاد پنومونی، مطالعه حاضر انجام شده است.

روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که در طی یک سال و بر روی ۸۰ بیمار که با تشخیص پنومونی کسب شده از جامعه در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی اردبیل بستری شدند، انجام گرفت. از کل بیماران، نمونه خون جهت سنجش IgG و IgM ضد مایکوپلاسما به روش الیزا گرفته شد.

یافته ها: از ۸۰ بیمار مورد بستری، ۴ بیمار مرد و ۴ بیمار زن بودند. متوسط سن بیماران ۵۹/۹۱ سال بود و ۷۶/۶٪ آن شهربی بودند. ۵ بیمار (۶/۳٪) IgM مثبت و ۲۰ بیمار (۲۵٪) IgG مثبت بودند. اتیولوژی پنومونی در ۶٪ از موارد بستری شده با تشخیص پنومونی کسب شده از جامعه مایکوپلاسما بود. یافته بالینی مشخصی که به افتراق این نوع از پنومونی با سایر علل کمک نماید بدست نیامد، تمامی افرادی که تیتر IgM مثبت داشته اند دارای تیتر آکلوبتیناسیون ۱/۱۶ و یا ۱/۳۲ مثبت بوده اند لذا در شرایطی که سنجش IgM در دسترس نباشد می توان از آن به عنوان روش جایگزین استفاده نمود.

نتیجه گیری: حدود ۶/۶٪ موارد پنومونی کسب شده از جامعه در بخش عفونی بزرگسالان بیمارستان امام خمینی مربوط به مایکوپلاسما بود.

کلمات کلیدی: پنومونی کسب شده از جامعه، مایکوپلاسما، IgM ضد مایکوپلاسما، IgG ضد مایکوپلاسما

دریافت: ۸۷/۱۲/۲۰ پذیرش: ۸۸/۱۱/۲۸

میکروارگانیسم های مهم در پنومونی کسب شده از جامعه مایکوپلاسما پنومونیه می باشد. این ارگانیسم به همراه کلامیدیا از علل ایجاد کننده پنومونی آتیپیک هستند که اغلب موارد عفونتهای تنفسی آن بصورت منفرد یا همراه با همه گیری های فامیلی دیده می شود. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که در جمعیت های متراکم مثل سر باز خانه ها ممکن است ۲۵ تا ۷۵٪ پنومونی ها ناشی از مایکوپلاسمها

مقدمه

پنومونی به عنوان ششمین علت مرگ و شایع ترین سندروم عفونی همراه با مرگ شناخته شده است [۱]. در حال حاضر کاربردی ترین تقسیم بندی برای پنومونی، به صورت اکتسابی از جامعه در مقابل کسب شده از بیمارستان می باشد زیرا بر طبق تجربیات بالینی، اتیولوژی، نحوه برخورده ارزیابی و درمان این دو نوع پنومونی کاملاً متفاوت است [۲]. یکی از

* این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم پریا بخشپوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.

دسترس (با تایید رادیولوژیست که یک سال از زمان تصویب طرح در بیمارستان امام خمینی (ره) بستری شده بودند) می‌باشد. متغیرهای مورد استفاده در مطالعه، در جدول ۱ ذکر شده است. میزان حجم نمونه ۱۰ مورد بیمار بستری شده می‌باشد. در روش الیزا نوع کیت مصرفی Medac با حساسیت ۹۸٪ و اختصاصیت ۹۹٪ نسبت به آنتی‌بادی‌های فیکس کننده مکمل و نوع دستگاه Anthos2020 ساخت آلمان بود. نمونه‌ها روزانه از سرم بیماران جدا شدند و در دمای 60°C - به مدت ۶ ماه جمع آوری و نگهداری شد. پس از ختم نمونه گیری تمام نمونه‌ها از فریز خارج و تحت آزمایش قرار گرفتند. در مورد IgM مقادیر به روش نیمه کمی و بدون واحد محاسبه شده و مقادیر بالاتر از ۱/۱ مثبت، مقادیر کمتر از ۹/۰ منفی و مقادیر ۱/۱ الی ۹/۰ منطقه مشکوک در نظر گرفته شد. در مورد IgG مقادیر بالای ۱۱ Iu/ml مثبت، مقادیر کمتر از ۹ منفی و مقادیر ۹ الی ۱۱ Iu/ml مشکوک در نظر گرفته شد. تست آگلوتیناسیون سرد هر روز بصورت دستی و به روش لوله‌ای با تیتراسیون سوسپانسیون گلوبولی از گروه خونی O^+ شسته شده انجام گرفت، به این ترتیب که سرم بیمار با رقت‌های مختلف صفر، ۱/۲، ۱/۴، ۱/۸ در لوله‌ها ریخته شده و مقدار مشخص از سوسپانسیون گلوبولی داخل همه لوله‌ها به صورت یکسان اضافه شد سپس لوله‌ها ۲۴ ساعت داخل یخچال در دمای (3°C الی 8°C) نگهداری شدند و پس از ۲۴ ساعت تک تک لوله‌ها کنترل شدند و لوله‌هایی که آگلوتیناسیون در آنها ایجاد شده بود تعیین گردیدند. آگلوتیناسیون در تیترهای بالای ۱/۱۶ مثبت در نظر گرفته شد. اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش‌های آماری تست دقیق فیشر و کای دو بدست آمد.

باشند [۳]. بیماری در سراسر دنیا دیده می‌شود و بطور مثال در ایالات متحده از هر هزار نفر در هر سال یک نفر به عفونت تنفسی با این باکتری آلوده می‌شوند ولی بروز پنومونی مایکوپلاسمایی ممکن است ۱۰ تا ۲۰ برابر این مقدار باشد. گرچه بیشترین میزان حمله در سنین ۵ تا ۲۰ سال روی می‌دهد اما پنومونی در هرسنی محتمل بوده و خصوصاً در نوزادان ممکن است شدیدتر باشد [۴].

از آنجا که اطلاعی از میزان بروز این عفونت در مبتلایان به پنومونی در اردبیل وجود نداشت و با توجه به اینکه مایکوپلاسماهای به برخی درمانهای رایج مثل ترکیب بتالاکتام‌ها مقاومند، مطالعه حاضر طراحی گردید تا با سنجش آنتی‌بادی‌های اختصاصی مایکوپلاسمایی سیم این باکتری را در پنومونی کسب شده از جامعه که نیاز به بستری دارد تعیین نماید تا بدین وسیله راهنمایی برای استفاده از ترکیبات موثر بر علیه مایکوپلاسما در درمان تجربی بددست آید.

روش کار

کلیه بیماران بستری شده در بخش عفونی در طی یک سال از اول خرداد ۸۶ تا اول خرداد ۸۷ که پس از بررسی‌های اولیه، تشخیص پنومونی در آنان تایید شد وارد مطالعه شدند. تشخیص پنومونی بر مبنای وجود هر سه معیار علامت‌های بالینی، نشانه‌های معاینه و گرافی سینه تأیید گردید. بیماران مبتلا به کانسر ریه، بیماری‌های شغلی ریه، COPD شناخته شده یا آسم و سل از مطالعه حذف شدند. این بررسی یک مطالعه توصیفی بوده که از تمامی بیمارانی که تشخیص پنومونی آنان با گزارش رادیولوژیست تایید شد، پس از گذشت حداقل یک هفتۀ از شروع علائم بالینی، نمونه خون جهت انجام آگلوتیناسیون سرد و سنجش IgG، IgM به روش الیزا اخذ و همه نمونه‌ها در آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی اردبیل تحت آزمایش قرار گرفت. روش نمونه‌گیری از نوع ساده می‌باشد و نمونه‌های در

۳۱/۳٪ در سمت راست و در ۲۷/۵٪ در سمت چپ و در ۴۱/۲٪ موارد دو طرفه بوده است. در بیماران IgM مثبت دو بیمار (۰.۴٪) درگیری انترستیشیل و ۳ بیمار (۰.۶٪) درگیری لوبر داشتند.

جدول ۱. مقایسه برخی مشخصات بالینی و آزمایشگاهی در دو گروه

| | | IgM مثبت و IgM منفی | |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | افراد- IgM+ (۵ نفر) | افراد- IgM- (۷۵ نفر) | متغیر |
| سن | ۴۸/۶۰±۲۶/۸۲۹ | ۶۰/۶۷±۱۸/۱۹ | (میانگین±انحراف معیار) |
| تعداد گلوبولهای سفید | ۱۱۰۰/۰۰±۸۲۹۰/۷۷۸ | ۱۰۵۳/۳۳±۵۲۴۲/۵۸۴ | (میانگین±انحراف معیار) |
| ESR | ۸۳/۲۰±۳۰/۲۷۷ | (۳۵/۴۴±۲۷/۲۱۴) | (میانگین±انحراف معیار) |
| سرفه (درصد افراد) | ۱۰۰ | ۹۶ | سرفه (درصد افراد) |
| خلط (درصد افراد) | ۶۰ | ۶۹/۳ | خلط (درصد افراد) |
| تب (درصد افراد) | ۸۰ | ۵۸/۷ | تب (درصد افراد) |
| درد پلورتیک | ۴۰ | ۸۵/۳ | درد پلورتیک (درصد افراد) |
| لرز (درصد افراد) | ۴۰ | ۴۱/۳ | لرز (درصد افراد) |
| میالژی (درصد افراد) | ۸۰ | ۴۹/۳ | میالژی (درصد افراد) |
| برادری کاردي نسبی | ۲۰ | ۱۰/۷ | برادری کاردي نسبی (درصد افراد) |

جدول ۲ ارتباط بین کلاس IgG و IgM و آگلوتینین سرد

| آگلوتینین سرد | | IgG کلاس | Mثبت منفی |
|---------------|---|----------|-----------|
| ۱ | ۳ | IgM | ۱/۱۶ |
| ۲ | . | IgM | ۱/۳۲ |
| ۱ | ۱ | IgM | ۱/۶۴ |
| . | ۱ | IgM | ۱/۱۲۸ |
| . | ۱ | IgM | ۱/۲۵۶ |
| . | ۱ | IgM | ۱/۵۱۲ |
| . | ۱ | IgM | ۱/۱۰۲۴ |
| . | ۱ | IgM | ۱/۲۰۴۸ |

جدول ۳. توزیع فراوانی نوع درگیری ریه در بیماران مبتلا به پنومونی

| درصد | تعداد | نوع درگیری |
|------|-------|---------------|
| ۴۳/۸ | ۳۵ | اینترستیشیل |
| ۴۱/۲ | ۳۳ | لوبر |
| ۱۱/۲ | ۹ | مولتی لوبر |
| ۳/۸ | ۳ | پلورال افیوژن |
| ۱۰۰ | ۸۰ | جمع |

یافته ها

از کل بیماران بررسی شده ۸۰ بیمار شامل ۴۰ مرد و ۴ زن واجد شرایط ورود به مطالعه شدند.

میانگین سنی بیماران $۵۹/۹۱ \pm ۱۸/۸۴$ سال (۰.۹۶/۳٪) سرفه، ۵۵ بیمار (۰.۶۸/۸٪) خلط، ۴۸ بیمار (۰.۶۰٪) تب، ۶۶ بیمار (۰.۸۲/۵٪) درد پلورتیک، ۳۳ بیمار (۰.۴۱/۳٪) لرز، ۴۱ بیمار (۰.۵۱/۳٪) میالژی، ۹ بیمار (۰.۱۱/۳٪) برادیکاردی نسبی داشتند.

از کل بیماران ۵ نفر یعنی ۰.۶/۳٪ دارای تیتر IgM مثبت و ۲۰ بیمار یعنی ۰.۲۵٪ دارای تیتر IgG مثبت بودند.

۳ نفر از افراد IgM مثبت (معادل ۰.۶٪)، IgG مثبت نیز داشتند. در افراد IgM منفی، ۱۷ نفر یعنی ۰.۲۲٪ دارای IgG بودند. با احتساب موارد مثبت از نظر IgG با IgM ۲۲ نفر از ۸۰ نفر معادل ۰.۲۷/۵٪؛ شواهد عفونت مایکوپلاسمایی حاد یا مزمن داشتند. با توجه به اهمیت IgM در این مطالعه، وجود این آنتی بادی به عنوان شاهد عفونت حاد شناخته شد و لذا میزان پنومونی مایکوپلاسمایی در بیماران نیازمند بستره پنومونی در (جدول ۱) نشان داده شده است. گرچه تفاوت های مورد مشاهده از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان نداده اند ولی مقایسه آنها خصوصا در مورد سن، میالژی و فقدان درد پلورتیک قابل توجه است.

آزمایش آگلوتیناسیون لوله ای کلا در ۱۱ نفر از بیماران معادل ۰.۱۳٪ آنان مثبت بود. از ۱۱ نفر مورد اشاره در ۳ نفر (۰.۲۷/۳٪) IgM و IgG هر دو مثبت)، در ۲ نفر (۰.۱۸٪) فقط IgM مثبت، در ۱ نفر (۰.۹٪) فقط IgG مثبت بوده است و در ۵ بیمار هیچکدام از دو آنتی بادی مثبت نشده است (جدول ۲).

نحوه ای درگیری ریوی در کل بیماران در جدول شماره ای ۳ نمایش داده شده است. درگیری در

کمپلمان بالا رفته و در مقایسه با آن دارای ویژگی IgG ۹۹٪ و حساسیت ۹۸٪ می‌باشدند. استفاده از IgG همزمان در فاز حاد و نقاوت از آن لحاظ مفید است که در بالغین مبتلا به عفونت مایکوپلاسمایی ممکن است فقط IgG بالا رود [۸].

در مطالعه حاضر به دلیل محدودیت‌های خاص تنها از یک نوبت سنجش IgM در یک هفته بعد از شروع علیم استفاده شده است و سنجش در دوره نقاوت انجام نگرفته است لذا ممکن است مواردی از عفونتهای مایکوپلاسمایی تشخیص داده نشده باشند. با این حال مطالعه آقای اشمیت^۱ و همکاران نشان داده است که سنجش آنتی بادی مایکوپلاسما پنومونیه جهت تشخیص پنومونی‌های اکتسابی از جامعه ناشی از مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران بستری شده در بیمارستان که بیشتر از ۱۲ روز علامتدار بوده اند، مناسب است و در ۹۰٪ از بیمارانی که تیتر آنتی بادی بالای ۱/۱۶۰ بوده است، PCR هم مثبت بوده است [۹].

در مطالعه‌ی چند مرکزی چارلز^۲ و همکاران بر روی ۸۸۵ بیمار بستری شده با تشخیص پنومونی، تمام روشهای مولکولی، سرولوژیک و کشت برای تشخیص اتیولوژی CAP^۳ انجام گردید و در ۴۵/۶٪ از بیماران اتیولوژی مشخص گردید. در این مطالعه استرپتوکک پنومونیه با ۱۴٪ و مایکوپلاسما پنومونیه با ۹٪ و ویروسهای تنفسی با ۱۵٪، مهمترین عوامل شناخته شده بودند [۱۰].

در مطالعه بیبهانی و همکاران بر روی ۱۲۴ بیمار با میانگین سنی ۴۱ سال که با تشخیص CAP در ۳ بیمارستان در کویت بستری شده بودند در ۴ بیمار (۳۵٪) اتیولوژی بیماری پیدا شد و مایکوپلاسما پنومونیه با ۱۱٪ (۱۴ بیمار) شایعترین پاتوژن بود و بدنبال آن لژیونلا با ۸٪ و کلامیدیا پنومونیه ۶٪ و هموفیلوس آنفولانزا ۳٪، پنوموکک ۶٪، استافیلوکوک

بحث

پنومونی‌های آتبیک معمولاً شروع تدریجی داشته و با تب و سرفه و علائم سیستمیک غیر اختصاصی مشخص می‌شوند. بصورت کلاسیک پنومونی مایکوپلاسمایی با علائم غیر اختصاصی سرشی، آغاز و با پیشرفت علائم مجاری تنفسی فوکانی به تحتانی مشخص می‌شود. تب، آبریزش از بینی و سردرد و سرفه شایع‌اند در حالیکه درد پلورتیک سینه و دیسترس تنفسی معمولاً وجود ندارد. رالهای کربیتان در سمع ریه به همراه خلط ممکن است وجود داشته باشد [۶]. در گیری ریوی مورد مشاهده در گرافی سینه معمولاً شدیدتر از آن چیزی است که از معاینه بدست می‌آید و پیشرفت تصاویر گرافی ریه علیرغم ثبوت علایم بالینی ممکن است دیده شود. شایعترین یافته در گرافی سینه انفیلتراسیونهای تکه‌ای یک با دو طرفه است که معمولاً در لوب تحتانی دیده می‌شوند. در گیری لوب فوقانی و مایع جنبی نادرند. سیر بالینی بیماری عموماً خوش خیم است و علائم سرشی عموماً در عرض دو هفته ببود می‌باید هرچند که سرفه و تغییرات گرافی سینه ممکن است هفته‌ها باقی بمانند. تظاهرات خارج ریوی مثل در گیری سیستم اعصاب مرکزی، پوست، خون و کلیه در موارد متعددی دیده شده‌اند ولی پنومونی شدید که بیمار را محتاج به ICU کند ناشایع است [۷].

از نظر تشخیصی در پنومونی مایکوپلاسمایی در صورت تهیه اسمیر و رنگ‌آمیزی خلط، میکروارگانیسم رنگ نمی‌گیرد و به همین دلیل ارجانیسم غالباً پیدا نمی‌شود. سایر روشهای تشخیص پنومونی مایکوپلاسمایی عبارتند از انجام تست PCR، Bed side agglutination test ریوی و سوایپ گلو و کشت از ترشحات که یک روش زمان بر محسوب می‌شود. مفیدترین تست برای تشخیص پنومونی حاد مایکوپلاسمایی استفاده از آنتی‌بادی IgG و IgM به روش الیزا است این آنتی‌بادی‌ها سریعتر از آنتی‌بادی‌های فیکس کننده

1 Schmidt

2 Charles

3 Community Acquired Pneumonia

شده با تشخیص پنومونی کسب شده از جامعه در ۱۶٪ موارد مایکوپلاسما عامل پنومونی بود. از مشخصات قابل ذکر پنومونی مایکوپلاسمایی در این مطالعه میانگین سنی نسبتاً پایین (۴/۳۱ سال) شدت بالینی خفیف تا متوسط در ۹۵٪ موارد با شیوع بیشتر میالزی و سردرد و دوره‌ی کوتاه‌تر بستره و پاک شدن سریعتر گرافی سینه بوده است [۱۵].

در مطالعه‌ی حاضر فراوانی عفونت مایکوپلاسمایی بر اساس مثبت بودن تیتر IgM در حدود ۶٪ بوده است. در مقایسه با مطالعات مشابه این رقم مورد انتظار است. همچنین در ۳ نفر از افراد IgM مثبت، IgG نیز مثبت بوده است. در افراد IgM منفی، ۱۷ نفر یعنی ۲۲٪ دارای IgG بودند. با احتساب موارد مثبت از نظر IgM یا IgG ۲۲ نفر از ۸۰ نفر معادل ۲۷٪، عفونت مایکوپلاسمایی حاد یا مزمن داشته اند. با وجود آنکه تست آگلوتیناسیون سرد، تستی غیر اخصاصی بوده و در مونوکلئوز عفونی و عفونت با سایتومگالوویروس و لنفووم هم می‌تواند مثبت شود [۱۶/۱۷]. ولی در مطالعه حاضر تمامی افرادی که تیتر IgM مثبت داشته اند دارای تیتر آگلوتیناسیون ۱/۱۶ و یا ۱/۳۲ مثبت بوده اند لذا در شرایطی که سنجش IgM در دسترس نباشد می‌توان از آن به عنوان جایگزین استفاده نمود.

در مطالعه ناگالینگام^۱ و همکاران بر روی ۱۳۲ بیمار بزرگسال بستره شده با تشخیص پنومونی در ۴ بیمارستان، سرولوژی بر علیه مایکوپلاسما پنومونیه انجام شد و نشان داده شده است که ۶۶٪/۷ از بیماران از نظر IgM/IgG مثبت بوده اند [۱۸].

مطالعات انجام شده در گروه سنی کودکان عموماً بر نقش بارزتر این میکروارگانیسم در ایجاد پنومونی کسب شده از جامعه در کودکان تأکید دارد. در مطالعه‌ای که بر اساس تست‌های سرولوژیک آگلوتیناسیون و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم، ۲۷٪/۴ بیماران در گروه سنی کودکان دارای

اورئوس ۲٪، ویروس آنفولانزای B با ۶٪، ویروس آنفولانزای A با ۴٪، گرم منفی‌ها با ۴٪، موراکسلا کاتارالیس با ۲٪ و سایر ویروشها در ۳٪ قرار داشتند که حکایت از ترتیب کاملاً غیرمنتظره در اتیولوژی پنومونی در این ناحیه دارد [۱۱].

در بررسی بوزونی^۲ و همکاران که بر روی ۱۷۷ بیمار بزرگسال و بستره شده با تشخیص پنومونی کسب شده از جامعه در بخش داخلی با انجام رنگ آمیزی گرم و کشت از خلط و تست سرولوژیک انجام گردید، در ۶/۸٪ موارد، عامل پنومونی مایکوپلاسما پنومونیه بود [۱۲].

در مطالعه‌ی ملونی^۳ که بر روی ۱۱۵ بیمار بزرگسال بستره شده در بخش به دلیل آسم، بیماری انسدادی مزمن ریه و پنومونی کسب شده از جامعه انجام شده است، پنومونی مایکوپلاسمایی در ۱۷/۵٪ بیماران با پنومونی کسب شده از جامعه و در ۶/۷٪ موارد افراد با COPD تشدید شده و در این مطالعه علاوه بر روش‌های سرولوژیک از روش‌های مولکولار هم استفاده شده است که می‌تواند توجیه کننده پیدا شدن موارد بیشتری از مایکوپلاسما بوده باشد [۱۳].

از طرفی در مطالعه فیکین^۴ برای بررسی علل همه ۵۸۶ گیری پنومونی در آکادمی آموژشی که بر روی ۴۲ دانشجو انجام شد، در ۵۷٪ از آنان مایکوپلاسما گرفته است که در ۲۴ نفر (۵٪) آدنوفیروس و در ۴ نفر (۰/۵٪) هر دو عامل بروز پنومونی بوده اند و داشتن هم اتفاقی بیمار فاکتور خطر برای موارد ثانویه بوده است [۱۴].

در مطالعه چمبرز^۵ و همکاران بر روی ۲۵۵ بیمار بستره شده با پنومونی اتیولوژی بیماری با استفاده از تمامی روش‌های مولکولی، کشت و سرولوژی بررسی شد. در این مطالعه از ۴/۵ بیمار بررسی

4 Bozzoni

5 Meloni

6 Feikin

7 Chambers

حدود ۷/۶٪ موارد پنومونی کسب شده از جامعه در بخش عفونی بزرگسالان بیمارستان امام خمینی مربوط به مایکوپلاسمما بود لذا بعلت محدودیت های موجود در انجام PCR و سنجش تیتر آنتی بادی، استفاده از آنتی بیوتیک های موثر بر مایکوپلاسمما در درمان پنومونی کسب شده از جامعه ضروری است. مطالعه حاضر مفید بودن تست آگلوتیناسیون سرد را به عنوان یک روش جایگزین در مواردی که سنجش در دسترس نباشد نشان می دهد.

محدودیت و پیشنهادات

در این مطالعه سرولوژی در دوره نقاوت اخذ نشده و افزایش تیتر نشان داده نشده است. همچنین برای افزایش حساسیت و ویژگی روشهای تشخیصی روشهای مولکولی بکار نرفته است لذا انجام مطالعات بعدی با بکار گیری روشهای فوق و نیز بررسی سایر علل ایجاد کننده پنومونی به صورت چند مرکزی پیشنهاد می شود.

تشکر و قدردانی

این طرح با مساعدت مالی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام یافته است لذا از معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی به دلیل همکاری صمیمانه و از پرسنل محترم آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی خصوصا آقای دکتر جعفرزاده کمال تشکر را داریم.

شواهدی به نفع مایکوپلاسمما پنومونیه بودند، در حالی که فقط ۴ بیمار (۴/۶٪) برای کلامیدیا پنومونیه سرولوژی مثبت داشتند [۱۹]. مطالعه بوسنک با استفاده از اندازه گیری IgG مایکوپلاسمما در کودکان بیشترین میزان موارد مثبت سرولوژی در ۱۰ سالگی (۶/۶٪) و کمترین آن در ۲ سالگی (صفر درصد) می باشد. مقدار کلی موارد مثبت IgG سرولوژی ۲۷٪ بود. حدس زده می شود که شیوع پایین مایکوپلاسمما در سن ۲ سالگی به علت رسک پایین انتشار ارگانیسم از جامعه به این افراد باشد. در این مطالعه مشخص شده است که شیوع ابتلا به مایکوپلاسمما پنومونیه در سنین ۶-۷ سالگی یعنی سنین ورود به مدرسه افزایش ناگهانی می یابد که بیانگر انتقال این ارگانیسم در تماس های اجتماعی می باشد [۲۰]. در مطالعه ای که بر روی ۱۰۷۴ بیمار ۲-۱۴ ساله، ۱۷/۸٪ افراد از نظر آنتی بادی IgM و ۳۱/۸٪ دارای هر دو آنتی بادی IgM و IgG بودند [۲۱].

در مطالعه‌ی دیگری که بر روی ۱۴۰ نفر کودک دو ماهه تا ۱۵ ساله بستری شده با پنومونی کسب شده از جامعه با اندازه گیری آنتی بادی های فاز حاد و دوره نقاوت IgM و IgG، مایکوپلاسمما پنومونیه به روش ELISA مشخص شد که مایکوپلاسمما در ۳۸ مورد (۲۷٪) عامل پنومونی بوده است [۲۲].

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حکایت از فراوانی مایکوپلاسمما پنومونیه در پنومونی های اکتسابی از جامعه در بالغین است.

References

- 1- National Center for Health Statistics. Advanced Report of Final Mortality Statistics, v 42. Hyattsville Md. 1992.
- 2- Farr BM, Kaiser DL, Harrison BDW. Prediction of microbial aetiology at admission to hospital for pneumonia from the presenting clinical features. Thorax. 1989; 44:1031-1035.
- 3- Mogabgab WJ. Mycoplasma pneumoniae and adenovirus respiratory illness in military and university personnel, 1959-1966. Am Rev Respir Dis. 1968; 97:345.
- 4- American Society for Microbiology. Manual of Clinical Microbiology. Kenny GE, Balows A, ed. 1991; 478.

- 5-Mycoplasma pneumoniae-IgG-ELISA medac. Available from: URL: http://www.medacshop.de/catalog/index.php?cPath=10_1008_100850&osCsid=1752712f21f2fd2eaed58d1cec005673
- 6- Goerge RB, Ziskind MM, Rasch JR. Mycoplasma and adenovirus pneumonias—comparison with other atypical pneumonias in a military population. *Ann Intern Med.* 1966; 65:931–942.
- 7- The British Thoracic Society Research Committee and the Public Health Laboratory Service. The aetiology, management and outcome of severe community-acquired pneumonia on the intensive care unit. *Respir Med.* 1992; 86:7–13.
- 8- Uldum SA, Jensen JS, Søndergaard-Anderson J. Enzyme immunoassay for detection of immunoglobulin M (IgM) and IgG antibodies to Mycoplasma pneumoniae. *J Clin Microbiol.* 1992; 30:1198
- 9- Schmidt-Ioanas M, Bender M, Roth A. Serologic early diagnosis of pneumonia caused by mycoplasma pneumonia. *Dtsch Med Wochenschr.* 2006; 131(12):613-617.
- 10- Charles PG, Whitby M, Fuller AJ, Stirling R, Wright AA. The etiology of community-acquired pneumonia in Australia: why penicillin plus doxycycline or a macrolide is the most appropriate therapy. *Clin Infect Dis.* 2008 May 15; 46(10):1522-4.
- 11- Behbehani N, Mahmood A, Mokaddas EM, Bittar Z, Jayakrishnan B, Khadadah M, et al. Significance of atypical pathogens among community-acquired pneumonia adult patients admitted to hospital in Kuwait. *Med Princ Pract.* 2005 Jul-Aug; 14(4):235-40.
- 12- Bozzoni M, Radice L, Frosi A. Prevalence of pneumonia due to Legionella pneumophila and Mycoplasma pneumonia in a population admitted to a department of internal medicine. *Respiration.* 1995; 62(6):331-335.
- 13- Meloni F, Paschetto E, Mangiarotti P. Acute chlamydia pneumonia and Mycoplasma pneumonia infections in Community-acquired pneumonia and exacerbations of COPD or asthma: therapeutic considerations. *J chemother.* 2004; 16(1):70-76.
- 14- Feikin DR, Moroney JF, Talkington DF. An outbreak of acute respiratory disease caused by Mycoplasma pneumonia and adenovirus at a federal service training academy: new applications from an old scenario. *Clin Infect Dis.* 1999; 29(6):1545-1550.
- 15- Chambers ST, Town GI, Neill AM. Legionella, Chlamydia pneumonia and Mycoplasma infection in patients admitted to Christchurch Hospital With pneumonia. *N Z Med J.* 1999; 112(10):222-224.
- 16- Lind K, Spencer ES, Anderson HK. Cold agglutinin production and cytomegalovirus infection. *Scand J Infect Dis.* 1974; 6:109.
- 17- Rosenfield RE, Schmidt PJ, Calvo RC. Anti-i, a frequent cold agglutinin in infectious mononucleosis. *Vox Sang.* 1965; 10:631.
- 18- Nagalingam NA, Adesiyun AA, Swanston wH. Prevalence of Mycoplasma pneumonia and Chlamydia pneumonia in pneumonia patients in four major hospitals in Trinidad . *New Microbio.* 2004; 27(4):345-351.
- 19- Chaudhry R, Nazima N, Dhawan B. Prevalence of Mycoplasma pneumonia and Chlamydia pneumonia in children with community acquired pneumonia. *Indian J pediatr.* 1998; 65 (5):717-21.
- 20- Bosnak M, Dikici B, Bosnak V. Prevalence of Mycoplasma pneumonia in children in Diyarbakir, the south – east of Turkey . *Pediatr Inter.* 2002; 44(5):510.
- 21- Varzakakos I, Tapaki G, Papavasileiou H. The prevalence of Mycoplasma pneumonia in hospitalized children with lower respiratory infections. 15th European congress of clinical Microbiology and infectious disease, European Society of clinical Microbiology and infectious disease. 2005 April 2-5, Copenhagen, Denmark: 1134.
- 22- Somer A, Salman N, Yalcin I. Role of Mycoplasma pneumonia and Chlamydia pneumonia in children with community – acquired pneumonia in Istambul, Turkey. *J Trop pediatr.* 2006; 52(3): 173-178.

Frequency of Mycoplasmal Pneumonia in Hospitalized patients with (diagnosis of) Community Acquired Pneumonia in Infectious Diseases Ward of Imam Khomeini Hospital, Ardebil, Iran

Ghasemi A, MD¹; Habibzadeh S, MD²; Bakhshpoori P³

1-Corresponding author, Assistant Professor of Infectious Diseases, Ardebil University of Medical Sciences, Ardebil, Iran. E-mail: aghasemi72@yahoo.com

2- Assistant Professor of Infectious Diseases, Ardebil University of Medical Sciences, Ardebil, Iran

3-Medical Student

ABSTRACT

Background & Objectives: Pneumonia is one of the most fatal infectious syndromes with various etiologies. Mycoplasmas require special therapeutic approach as they are not sensitive to betalactams such as penicillin.

Regarding lack of comprehensive studies relating to mycoplasmas' part in pneumonia in Iran, the current study was conducted.

Methods: This is a descriptive study performed on 80 patients diagnosed with community acquired pneumonia and hospitalized in infectious diseases ward of Imam Khomeini Hospital (Ardebil, Iran) in over a one year time span.

Blood samples for titration of anti-mycoplasma IgGs and IgMs were taken from all patients.

Results: Out of 80 hospitalized patients 40 were men and 40 were women. Mean age of the studied group was 59.91 years and 76.6% of patients lived in urban areas. We observed positive IgM in 5 patients (6.3%) and positive IgG in 20 patients (25%). Etiologic cause of 6 % of hospitalized patients with community acquired pneumonia was mycoplasmal. We could not specify any particular clinical finding assisting to differentiate mycoplasmal pneumonias from other types of pneumonia. All the patients with positive IgM titrations had positive agglutination titers of 1/16 or 1/32, therefore under any circumstances that performing of IgM titration is not possible, agglutination test can be used as an alternative.

Conclusion: Approximately 6.7 % of community acquired pneumonias in adults' infectious diseases ward of Imam Khomeini Hospital, were etiologically related to mycoplasmas. Therefore, regarding limitations for PCR analysis and antibody titration, administration of antibiotics with antimycoplasma properties is necessary.

Key words: Community Acquired Pneumonia, Mycoplasma, Antimycoplasma IgM, Antimycoplasma IgG