

## **Prevalence of SHV-1 Type Extended- Spectrum $\beta$ -Lactamases in *Enterobacteriaceae* Isolated from Urinary Samples in Ardabil, Iran**

Farid S<sup>1</sup>, Peeri Dogaheh H<sup>2\*</sup>, Ghiami Rad M<sup>1</sup>

1. Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Ahar branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran  
2. Department of Microbiology, school of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

\* Corresponding author. Tel:+984533522391 Fax: +984533522086 E-mail:h.Peeridogaheh@ arums.ac.ir

Received: Jan 15, 2015 Accepted: Jun 29, 2015

### **ABSTRACT**

**Background & objectives:** Drug resistance is one of the most problems in controlling microbial infections which assumes to be ever-increasing problem all through the world. Production of extended-spectrum  $\beta$ -lactamases enzyme (ESBLs) can cause a resistance to antibiotics of gram negative bacteria. The main purpose of this study was to determine antibiotic sensitivity patterns and SHV-1 genes frequency in collected urinary samples from hospitalized patients in Ardebil.

**Methods:** 400 isolated *Enterobacteriaceae* from urinary samples were recognized using an ordinary biochemical method. Antibiotic sensitivity test was conducted by Kirby and Bauer. The combined disk method was also utilized as a confirmatory test. The results were compared to clinical and laboratory standards institute (CLSI) standards. Finally, ESBL positive isolates were investigated by PCR method regarding the SHV-1 gene.

**Results:** From the total of 400 urinary isolates Enterobacteriaseae resistance to Ampicillin, Nalidixic acid, Co-trimoxazole, Cefotaxime, Ceftazidime, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Ceftizoxime, Cefixime, Gentamycin, Imipenem were 82.5, 62.3, 67, 36, 49.5, 50.3, 52, 36, 41, 24.8 and 7.7 percents, respectively. 150 isolates (37.5%) were positive ESBL, and among all, 28 isolates (18.7%) contained SHV-1 gene.

**Conclusion:** According to obtained results from the study, regarding high percentage of resistance to antibiotics and high reduction of ESBLs in bacteria from who suffered from urinary infections, taking some logical steps for prevention seems to be essential.

**Keywords:** *Enterobacteriaceae*; Extended-Spectrum  $\beta$ -Lactamases (ESBLs); SHV-1

# بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف نوع SHV-1 در انتروباکتریاسه‌های جدا شده از نمونه‌های ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر اردبیل

سمیه فرید<sup>۱</sup>، هادی پیری دوگاهه<sup>۲\*</sup>، مهدی قیامی راد<sup>۱</sup>

۱. گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

۲. گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

\* نویسنده مسئول. تلفن: ۰۵۳۵۲۲۳۹۱ - فاکس: ۰۵۳۵۲۰۸۸. پست الکترونیک: h.peeridogaheh@arums.ac.ir

## چکیده

**زمینه و هدف:** یکی از مشکلات کنترل عفونت‌های میکروبی، بروز مقاومت دارویی است که یک مشکل رو به رشد در سراسر جهان می‌باشد. تولید آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف (ESBLs) می‌تواند سبب ایجاد مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌های گرم منفی گردد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن SHV-1 در نمونه‌های ادرار جمع‌آوری شده از بیماران بسترهای و سرپایی بیمارستان‌های شهر اردبیل بود.

**روش کار:** تعداد ۴۰۰ سویه انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه‌های ادراری وارد مطالعه شدند. همه نمونه‌ها با روش معمول بیوشیمیابی مورد شناسایی قرار گرفتند. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی با روش کربی - بائر انجام شد. از روش دیسک ترکیبی جهت انجام تست تأییدی استفاده شد. نتایج با استانداردهای CLSI مقایسه شد. در نهایت ایزووله‌های ESBL مثبت، توسط روش PCR از نظر ژن SHV-1 بررسی شدند.

**یافته‌ها:** از تعداد ۴۰۰ ایزووله ادراری انتروباکتریاسه، مقاومت به آمپیسیلین، نالیدیکسیک اسید، کوتزی موکسازول، سفووتاکسیم، سفتازیدیم، سفتراکسون، سپروفلوکسازین، سفتیز و کسیم، سفکسیم، جنتامایسین، ایمپنام به ترتیب برابر ۸۲/۵، ۶۷/۶، ۴۹/۳، ۳۶/۵، ۴۱/۳، ۵۲/۵، ۲۴/۸، ۲۷/۷ درصد بودند. ۱۵۰ ایزووله (۳۷/۵٪) ESBL مثبت بودند و از بین آنها ۲۸ ایزووله (۱۸/۷٪) حاوی ژن SHV-1 بودند.

**نتیجه گیری:** بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، با توجه به درصد بالای مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین به علت بالا بودن تولید آنزیم بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در باکتری‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری، اتخاذ تدابیر لازم در منطقه ضروری می‌باشد.

**کلمات کلیدی:** انتروباکتریاسه، بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف، ژن SHV-1

پذیرش: ۱۳۹۴/۴/۸

دربافت: ۱۳۹۳/۱/۲۵

یک اتصال آسیل کووالانت را از طریق گروه کربوکسیل حلقه بتالاکتام به وجود می‌آورند که حاصل آن بازشدن حلقه بتالاکتام و غیرفعال شدن دارو می‌باشد [۲]. با مصرف گستردۀ روز افزون آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله سفالوسپورین‌ها، دسته دیگری از بتالاکتامازها به وجود می‌آیند که در مقایسه با بتالاکتامازهای اولیه طیف فعالیت گستردۀ‌تری دارند. این آنزیم‌ها به نام بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف

## مقدمه

میزان مقاومت به عوامل ضد میکروبی به طور گستردۀ و جهانی در حال افزایش می‌باشد. یکی از مشکل‌سازترین مکانیسم‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در رابطه با بتالاکتامازها می‌باشد. این آنزیم‌ها مهمترین و وسیع‌ترین آنزیم‌های تخریب‌کننده‌ای هستند که توانایی هیدرولیز آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام را دارند [۱]. بتالاکتامازها در

## روش کار

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد ۴۰۰ سویه انترباکتریاسه جدا شده از نمونه‌های ادرار از بیماران بستری و سرپایی بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری از بیمارستان‌های اردبیل در یک دوره شش ماهه به صورت تصادفی جمع‌آوری شدند. نمونه‌های ادراری تبیه شده از بیماران، بر روی دو محیط کشت بلادآگار و آگار کشت داده شده و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. کلی‌هایی که روی هر دو محیط کشت رشد کرده بودند، به عنوان باکتری گرم منفی مورد توجه قرار گرفتند. ایزوله‌ها با انجام تست‌های بیوشیمیایی استاندارد، تعیین هویت شدند [۱]. تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی به وسیله روش انتشار دیسک<sup>۴</sup> (کربی بائئر)<sup>۵</sup> انجام شد [۱۲]. از سوسپانسیون باکتریایی ۵/۰ مک فارلند به کمک سوآپ استریل بر روی محیط کشت مولر هیلتون آگار کشت داده شد. سپس دیسک‌های آنتی‌بیوتیک مورد نظر به کمک پنس استریل روی محیط کشت مولر هیلتون قرار داده شده و بعد در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. بعد از انکوباسیون هاله عدم رشد هر کدام از دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی بکمک خط کش، بر حسب میلی‌متر (mm) اندازه‌گیری شدند و نتایج این آزمایش به کمک قطر هاله عدم رشد مشخص شده توسط CLSI<sup>۶</sup> تفسیر شد.

دیسک‌های مورد استفاده شامل؛ سفوتاکسیم ( $\mu\text{g}$ )<sup>۳</sup>، سفتازیدیم ( $\mu\text{g}$ )<sup>۳۰</sup>، ایمی پنم ( $\mu\text{g}$ )<sup>۱۰</sup>، آمپی‌سیلین ( $\mu\text{g}$ )<sup>۱۰</sup>، نالیدیکس<sup>۷</sup> یک اسید ( $\mu\text{g}$ )<sup>۳</sup>، کوتربی‌موکسازول ( $\mu\text{g}$ )<sup>۳۵</sup>، سفکسیم ( $\mu\text{g}$ )<sup>۵</sup>، جنتامایسین ( $\mu\text{g}$ )<sup>۱۰</sup>، سپروفلوکسازین ( $\mu\text{g}$ )<sup>۵</sup>،

(ESBLs)<sup>۱</sup> نامگذاری می‌شوند [۳]. اولین ایزوله تولیدکننده ESBL در سال ۱۹۸۳ در آلمان گزارش گردید [۵.۴]. ESBL‌ها شامل تعدادی آنزیم‌های موتاسیون یافته هستند که اجازه هیدرولیز آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام وسیع‌الطیف نسل سفالوسپورین‌ها (سافتازیدیم، سفوتاکسیم) و مونوباکتمها (آزترئونام) را می‌دهند. این آنزیم‌ها جزء کلاس A از بتا لاکتامازها طبقه‌بندی می‌شوند [۶]. ESBL‌ها به طور عمده در گونه‌های کلبسیلا پنومونیه و اشريشیا کلی یافت می‌شوند، ولی در گونه‌های دیگر انترباکتریاسه نیز وجود دارند. بتالاکتاماز SHV-1 از تیپ‌های ژن SHV و شایع‌ترین فرم بتالاکتاماز در ایزوله‌های بالینی انترباکتریاسه‌ها به خصوص کلبسیلا پنومونیه می‌باشد که برای نخستین بار توسط شخصی به نام پیتون<sup>۸</sup> در سال ۱۹۷۲ کشف شد و PIT نام گرفت. این آنزیم با توجه به طبقه‌بندی بوش و جاکوبی<sup>۹</sup> جزء کلاس A، گروه 2b بتالاکتامازها طبقه‌بندی می‌شود [۹.۸.۷.۶]. امروزه پاتوژن‌های تولیدکننده ESBL عامل اصلی عفونت‌های بیمارستانی همانند عفونت ادراری، عفونت‌های وابسته به کاترها، منثربیت نوزادی، عفونت‌های دستگاه تنفسی و سپسیس بوده و به سرعت در حال افزایش هستند [۱۰].

با توجه به اینکه الگوی مناسبی از مقاومت سویه‌های باکتریایی مولد عفونت‌های ادراری با مکانیسم ESBLs در شهر اردبیل در دسترس نبود، بنابراین در این مطالعه محققین بر آن شدند تا فراوانی ژن بتالاکتاماز SHV-1 در انترباکتریاسه‌های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در شهر اردبیل را مورد بررسی قرار دهند.

<sup>4</sup> Disk Diffusion

<sup>5</sup> Kirby & Bauer

<sup>6</sup> Clinical and Laboratory standards Institute

<sup>1</sup> Extended Spectrum Beta-Lactamases

<sup>2</sup> Piton


<sup>3</sup> Bush & Jacoby

واکنش PCR برای ژن SHV-1 در حجم نهایی ۱۱۵ µl شامل: ۰.۰۰۰ µl MgCl<sub>2</sub>, ۰.۰۵ µl DNTP, ۰.۰۵ µl H<sub>2</sub>O17µl Forward پرایمر ۰.۰۵ µl Reverse Polymerase Tag DNA, ۰.۰۵ µl (سیناژن: ایران) و ۰.۰۵ µl استخراج شده، تهیه و تحت شرایط دمایی و زمانی زیر انجام شد. دمای دناتوراسیون اولیه ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ دقیقه، ۳۵ سیکل حرارتی شامل دمای دناتوراسیون ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه، دمای اتصال پرایمر ۵۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه، دمای تکثیر ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه و در پایان دمای تکثیر نهایی ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه انجام شد. محصولات PCR از نظر حضور ژن مورد نظر با انجام الکتروفورز به روی ژل آگارز DNA Safe Stain بررسی شدند. در این آزمون از سویه استاندارد *Klebsiella pneumonia* ATCC 700603 پاستور ایران) به عنوان سویه کنترل مثبت و از آب مقطر به عنوان کنترل منفی استفاده شد. الکتروفورز محصولات PCR در ژل آگارز ۱٪ در ولتاژ ۱۰۰ انجام گرفت و سپس نتایج توسط دستگاه ژل داکیومنت با نور UV مشاهده شدند [۱۶].

### یافته‌ها

از تعداد کل ۴۰۰ باکتری شایع‌ترین نوع، اشريشیا کلی با ۲۷۷ مورد (۶۹٪) و در رتبه بعدی کلیسیلا با ۶۰ مورد (۱۵٪) و کمترین میزان متعلق به سریشیا مارسنسس با ۳ مورد (۰٪) بود. در جدول ۲ تعداد و درصد تمام عوامل باکتریایی جداسازی شده آورده شده است. در توزیع الگوی مقاومتی، بیشترین میزان متعلق به آمپی سیلین با ۳۳۰ مورد (۸۲٪) و بیشترین حساسیت با ۲۹۸ مورد (۷۴٪) مربوط به ایمی پنم بود. از کل نمونه‌های جمع‌آوری شده ۳۱۵ نفر (۷۸٪) زن و ۸۵ نفر (۲۱٪) مرد بودند. در توزیع سنی بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی

سفتریاکسون (۳۰ µg)، سفتیز و کسیم (۳۰ µg) بودند. همه دیسک‌ها ساخت شرکت Himedia بودند. برای شناسایی ایزوله‌های تولید کننده ESBL از تست تأییدی (دیسک ترکیبی<sup>۱</sup>) طبق معیار CLSI استفاده شد [۱۳]. دیسک‌های مورد آزمایش سفتازیدیم (CAZ: ۳۰ µg) و سفوتابکسیم (CTX: ۳۰ µg) به همراه سفتازیدیم / کلاؤلانیک اسید (CAC: ۳۰ / ۱۰ µg) و سفوتابکسیم کلاؤلانیک اسید (CEC: ۳۰ / ۱۰ µg) ساخت شرکت Himedia بودند. از سوسپانسیون باکتریایی ۵٪ مک فارلند به کمک سوآپ استریل بر روی محیط کشت مولر هینتون آکار کشت داده شد. دیسک‌ها با فاصله ۲۰ mm مرکز به مرکز قرار داده شدند. بعد از انکوباسیون به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷°C، تولید سویه‌های ESBL طبق شکل ۱، از طریق افزایش قطره‌اله به اندازه ۵ mm یا بیشتر در اطراف دیسک سفتازیدیم / کلاؤلانیک اسید و یا سفوتابکسیم / کلاؤلانیک اسید مشخص شدند.



شکل ۱. نتایج تست تأییدی بر روی محیط مولرهینتون آکار

برای استخراج DNA پلاسمیدی از کیت استخراج پلاسمید (سیناژن: ایران) استفاده شد [۱۴]. در ایزولهایی که از نظر تست تأییدی، ESBL مثبت شدند، با استفاده از پرایمر اختصاصی (سیناژن: ایران) طبق جدول ۱، از نظر حضور ژن SHV-1 مورد بررسی قرار گرفتند.

<sup>۱</sup> Combined Disk

۱۱۴ نفر (۰.۲۸٪) بود. از کل مراجعین، ۱۵۰ نفر (۰.۳۷٪) بیماران بستری و ۲۵ نفر (۰.۶۲٪) بیماران سرپایی بودند.

۳۰-۶۰ با ۱۵۱ نفر (۰.۳۷٪) و در رتبه بعدی گروه سنی ۳۰-۰ سال با ۱۳۵ نفر (۰.۳۳٪) قرار داشت و کمترین درصد مربوط به گروه سنی بالای ۶۰ سال با

جدول ۱. پرایمر استفاده شده

منبع	اندازه قطعه تکثیر شده	توالی پرایمر	پرایمر
15	865bP	5' TGGTTATCGCGTTATTCGCC3' 5' GGTTAGCGTTGCCAGTGCT3'	BlaSHV

PCR حاصل از تکثیر قطعه مورد نظر از ژن SHV-1 به طول ۸۶۵ جفت باز مشخص شده است. توزیع فراوانی نوع باکتری بر حسب وجود یا عدم وجود ژن SHV-1 در نمونه‌های ESBL مثبت طبق جدول ۴ به دست آمد.

در توزیع فراوانی ژن SHV-1 مثبت در گروه‌های سنی، گروه سنی زیر ۳۰ سال (۱۸٪)، بین ۳۰-۶۰ سال (۰.۳۲٪) و بالای ۶۰ سال (۵۰٪) بودند.

جدول ۲. توزیع فراوانی نوع باکتری در نمونه‌های مورد مطالعه

نوع باکتری	تعداد	درصد
/شرشیا کلی	۲۷۷	۶۹/۳
کلبسیلا	۶۰	۱۵/۱
انتروباکتر	۴۳	۱۰/۸
پروٹوس	۱۰	۲/۵
مورگانلا	۷	۱/۸
سرشیا	۳	۰/۸
جمع	۴۰۰	۱۰۰

از تعداد ۴۰۰ ایزووله انتروباکتریاسه، در نتیجه آزمایش فنوتیپ تأییدی ۱۵۰ ایزووله (۰.۳۷٪) به عنوان سویه‌های مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف (ESBL) مثبت تأیید گردیدند. فراوانی باکتری‌ها در سویه‌های ESBL مثبت، به این صورت بود که: بیشترین نوع باکتری متعلق به /شرشیا کلی با ۱۱۶ مورد (۰.۷۷٪) و بقیه عوامل طبق جدول ۳ به دست آمد. در توزیع سنی ۳۶ نفر (۰.۲۴٪) زیر ۳۰ سال، ۵۸ نفر (۰.۳۷٪) در گروه سنی ۳۰-۶۰ سال و ۵۶ نفر (۰.۳۷٪) بالای ۶۰ سال بودند. از کل ۱۵۰ ایزووله فنوتیپ مثبت ۵۳ نفر (۰.۳۵٪) مرد و ۹۷ نفر (۰.۶۴٪) زن بودند. توزیع نوع مراجعه در ایزووله‌های فنوتیپ مثبت به این صورت بود که ۶۷ نفر (۰.۴۴٪) بیماران بستری و ۸۳ نفر (۰.۵۵٪) بیماران سرپایی بودند.

نتایج به دست آمده از آزمایش PCR برای حضور ژن SHV-1 در ایزووله‌های ESBL مثبت نشان داد که از بین ۱۵۰ ایزووله مولد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف، ۲۸ مورد (۰.۱۸٪) حاوی ژن SHV-1 بودند و طبق شکل ۲ نتیجه الکتروفورز محصول

جدول ۳. توزیع فراوانی نوع باکتری در نمونه‌های ESBL مثبت


نوع باکتری	تعداد	درصد	درصد
/شرشیا کلی	۱۱۶	۷۷/۳	۱۱۶/۳
کلبسیلا پنومونیه	۱۷	۱۱/۳	۱۷/۳
کلبسیلا/اکسی توکا	۵	۳/۳	۵/۳
انتروباکتر کلوآکه	۳	۲	۳/۲
انتروباکتر آنروژنر	۵	۳/۳	۵/۳
پروٹوس میرابیلیس	۳	۲	۲/۲
سرشیا مارسنس	۱	۰/۷	۰/۷
جمع	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰

جدول ۴. توزیع فراوانی ژن SHV-1 به تفکیک نوع باکتری در نمونه‌های ESBL مثبت

باکتری	تعداد	درصد	درصد	SHV-1(+)	SHV-1(-)
/شرشیا کلی	۱۰۷	۸۷/۷	۸۷/۷	۹	۳۲/۱
کلبسیلا پنومونیه	۵	۴/۱	۴/۱	۱۲	۴۲/۹
کلبسیلا/اکسی توکا	۲	۱/۶	۱/۶	۳	۱۰/۷
انتروباکتر کلوآکه	۱	۰/۸	۰/۸	۲	۷/۱
انتروباکتر آنروژنر	۴	۳/۳	۳/۳	۱	۳/۶
پروٹوس میرابیلیس	۲	۱/۶	۱/۶	۱	۳/۶
سرشیا مارسنس	۱	۰/۸	۰/۸	.	.

(۵/۳٪) بود و بیشترین مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌های آمپی سیلین (۵/۸٪)، کوتیریموکسازول (۷/۶٪) و نالیدیک سیک اسید (۳/۶٪) بوده و بیشترین حساسیت در برابر آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین (۸/۲۴٪) و ایمی پنم (۷/۷٪) بود. در مطالعاتی که در ایران و سراسر دنیا با روش مشابه صورت گرفته، نتایج متفاوتی از نظر میزان تولید ESBL و میزان مقاومت در انتروباکتریاسه‌ها نشان داده شده است.

مطالعه‌ای توسط نخعی مقدم و همکاران در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸ در مشهد بر روی ۱۰۹ ایزوله اشريشيا کلى از نمونه‌های ادراری انجام گرفت و ۳۵ ایزوله (۱۱/۳٪) مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطيف بودند و بیشترین میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک کوتیریموکسازول و بیشترین حساسیت به ایمی پنم بود [۱۰]. گودرزی و همکاران در شهر دلفان در بررسی فروانی بتالاکتامازهای طیف گستردۀ روی ۱۰۰ ایزوله اشريشيا کلى، به ۸۰ درصد ایزوله ESBL مثبت دست یافتند. همچنانی بیشترین مقاومت مربوط به آمپی سیلین با ۸۵ درصد بود و ایزوله‌ها نسبت به ایمی پنم هیچ مقاومتی نداشتند، [۱۷]. در مطالعه کالاسکار<sup>۱</sup> و همکاران در سال ۲۰۱۲، ۹۴ ایزوله ESBL مثبت بودند و همه باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک ایمی پن کاملاً حساس بودند و نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های آمپی سیلین، آزنترئونام و کوآموکسی کلاو ۱۰۰ درصد مقاوم بودند [۱۸]. یک مطالعه توسط سریسنکاو<sup>۲</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۴ در تایلند، ۱۸۲ ایزوله مولد ESBL بودند. در این مطالعه میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سفتراکسون، سفوتاکسیم و سفتازیدیم به ترتیب برابر ۲۵/۲۵، ۹۷/۹۷ و ۷۴/۱۸ درصد بود که نشان‌دهنده وجود مقاومت بالا به سفالوسپورین‌های نسل سوم در بیمارستان‌های تایلند می‌باشد [۱۹].



شکل ۲. نتیجه الکتروفورز محصول PCR حاصل از قطعه مورد نظر از ژن SHV-1 به طول ۸۶۵bp: شماره: ۸۶۵bp؛ سویه کنترل مثبت Klebsiella pneumoniae ATCC 700603، شماره‌های ۳، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰ نمونه‌های فنوتیپ مثبت حاوی ژن SHV-1، شماره‌های ۲، ۵ نمونه‌های فنوتیپ مثبت فاقد ژن SHV-1، شماره ۱، کنترل منفی (آب مقطر)، شماره ۵ Ladder.

## بحث

بیماری‌های عفونی و درمان آنها، مشکلی اساسی در زندگی بشر به شمار می‌روند. اغلب بیماران بسترهای در بیمارستان دارای ضعف در سیستم ایمنی و بیماری زمینه‌ای می‌باشند و سالانه درصدی از بیماران بسترهای شده در بیمارستان دچار عفونت می‌شوند. ۳۵ درصد از همه عفونت‌های بیمارستانی در مجرای ادراری ایجاد می‌شود. در سال‌های اخیر مقاومت باکتری‌های گرم منفی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها در حال افزایش بوده و این امر ضمن احتلال در روند درمان، باعث افزایش مدت بسترهای شدن و بالارفتن هزینه‌های درمانی نیز شده است. لذا بررسی پیوسته و مداوم وضعیت مقاومت این باکتری‌ها نسبت به داروهای رایج امری ضروری می‌باشد. در مطالعه حاضر میزان تولید ESBL از ۰۰۴ ایزوله انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه‌های ادراری افراد مبتلا به عفونت ادراری، ۱۵۰ ایزوله

<sup>1</sup> Kalaskar

<sup>2</sup> Srisangkaw

مقایسه این نتایج با نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که به دلیل مصرف غیرصحیح و بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها، میزان شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی با ژن SHV-1 در منطقه مورد مطالعه بالاتر از ترکیه می‌باشد [۲۶].

### نتیجه گیری

بیشترین مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌های آمپسیلین (۸۲/۵٪)، کوتربیوکسازول (۶۷٪) و نالیدیک سیک اسید (۶۲/۳٪) بوده و بیشترین حساسیت در برابر آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین (۲۴/۸٪) و ایمی پنم (۷/۷٪) بود. بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف شیوع روزافزون دارند و نتایج مطالعه حاضر هم نشان از مقاومت بیشتر ایزوله‌ها علیه سفالوسپورین‌ها دارد. یافته‌های چنین مطالعاتی به ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی در مورد تجویز منطقی داروها، ضرورت تجهیز آزمایشگاه‌ها به روش‌های تشخیصی (فنوتیین، تکنیک‌های مولکولی و...)، جهت شناسایی و تعیین نوع مقاومت ژنتیکی، برآورد میزان شیوع سویه‌های مقاوم باکتری‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت درمان بیماران و کنترل مقاومت در باکتری‌ها تأکید دارد.

### تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل قدردانی بعمل می‌آید. این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد.

در این مطالعه میزان نمونه‌های ESBL مثبت حاوی ژن SHV-1 درصد به دست آمد. در یک مطالعه توصیفی، توسط خورشیدی و همکاران در شهر کاشان، از ۳۲ نمونه حاوی بتالاکتامازهای SHV-1، ایزوله (۵۰٪) حاوی ژن SHV-1 ایزوله (۲۰٪) در مطالعه خسروی و همکاران در شهر اهواز، از ۲۶ مورد (۴۷/۲٪) ESBL مثبت، ۱۲ مورد اهواز، از ۴۶ (۱۵٪) حاوی ژن SHV-1 بودند. این مطالعه در مقایسه با مطالعه حاضر از شیوع ژن بتالاکتامازی بالایی برخوردار می‌باشد [۲۱]. طی پژوهشی توسط شاهی<sup>۱</sup> و همکاران در هندستان، از میان ۱۲ نمونه ESBL مثبت ۸ نمونه حاوی ژن SHV-1 بودند. ایزوله‌های مولد ژن‌های بتالاکتامازی در مطالعه شاهی از شیوع بالایی نسبت به مطالعه حاضر برخوردار بودند [۲۲]. مطالعه جین<sup>۲</sup> و همکاران نیز نشان داد که در بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی بتالاکتامازهای SHV بر روی ۱۳۰ ایزوله کلبسیلا، از ۶۴ ایزوله تولید کننده ESBL ایزوله (۲۰/۳٪) سویه‌ها دارای ژن تولید کننده مقاومت بتالاکتامازی بودند [۲۳]. دانگ<sup>۳</sup> و همکاران در شانگهای چین نشان دادند از ۱۶ آلل مختلف ژن bla(SHV) مشخص شده در ۶۲ ایزوله کلبسیلا حاوی ژن bla(SHV) نوع SHV-1 با فرارانی ۳۲/۲۶ درصد، نوع شایع بود [۲۴]. مندونچا<sup>۴</sup> و همکاران، در آلمان طی مطالعه‌ای در بررسی تنوع ژن‌های SHV در نمونه‌های کلبسیلا پرمونیه، از میان ۲۱۲ ایزوله باکتری، ۵۴ ایزوله (۲۶٪) حاوی ژن SHV-1 پافتند [۲۵]. مطالعه‌ای توسط کاپور چیچک<sup>۵</sup> و همکاران روی ۴۰ نمونه بالینی مختلف /شریشیا کلی/ جمع‌آوری شده از ۱۰ بیمارستان مختلف ترکیه نشان داد که از آن تعداد ایزوله، ۸ مورد (۱/۸٪) SHV-1 به دست آمد.

<sup>1</sup> Shahi

<sup>2</sup> Jain

<sup>3</sup> Dong

<sup>4</sup> Mendoncha

<sup>5</sup> Copurcicek

**References**

- 1- Apertiniti MT, Benot C, Berardi L, Berroune Y, Boisivon A. Surveillance of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (M RSA) and Enterobacteriace producing extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) in Northern France. A five year multi- center incidences study. *J Hosp Infect.* 2002 Mar; 52:107-13.
- 2- Brooks GF, Butel JS, More SA. Medical Microbiology.22<sup>nd</sup>ed.united states, Mc-Graw Hill. 2000:1454.
- 3- Jacoby AG, Medeiros AA. More extended-spectrum b-lactamases. *Antimicrob Agents Chemother.* 2000 Sep; 35(9):1697-1704.
- 4- Al- Jasser AM. Extended-Spectrum betalactamase(ESBL): a global problem. *Kuwait Med J.* 2006 Jun; 38(3):171-185.
- 5- Corkill JE, Cuevas LE, Gurgel RQ, Greensill J, Hart A. SHV-27, a novel cefotaxime-hydrolysing beta-lactamase, identified in *Klebsiella pneumonia* isolate from a Brazilian hospital. *J Antimicrob Chemother.* 2001 Apr; 47(4):463-465.
- 6- Livermore DM. Beta- lactamase in laboratory and clinical resistance. *CLIN microbial Rev.* 1995 Oct; 8(4):557-584.
- 7- Chaves J, Margarret GL, Amparo C, Roser R, Coral A. SHV-1  $\beta$ -lactamase is mainly a chromosomally encoded species-specific Enzyme in *Klebsiella pneumoniae*. *Antimicrob Agents Chemother.* 2001 Oct ; 45(10): 2856-2861.
- 8- Shahid M, Malok A. Plasmid mediated amikacin resistance in clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa*. *Indian J Med Microbiol.* 2004 Jul-Sept; 22(3):182-184.
- 9- Ford PJ, Avison MB. Evolutionary mapping of the SHV beta lactamase and evidence for two separate IS 26-dependent belaSHV mobilization events from the *Klebsiella pneumonia* chromosome. *J Antimicrob Chemother.* 2004 Jul; 54(1):69-75.
- 10- Nakhaee-Moghadam M, Moshrefi S. Determining the antibiotic resistance pattern of urinary isolates of *Escherichia coli* and prevalence of extended spectrum beta lactamase among them. *J Sabzevar Uni Med sci.* 2010 Des; 16(4):228-233. (Full text in Persian).
- 11- Koneman EW, Allen S, Janda WM, editors. Color atlas and text book of diagnostic microbiology. 5<sup>th</sup> ed. Philadelphia: Lippincott, 1997: 171-241.
- 12- Beuer AW, Kirby WMM, Sherris JC, Turck M. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk metod. *Am J Clin pathol.* 2005 Apr; 45(4):493-496.
- 13- Del Carmen Rodriguez M, Vera DE, Ramirez-Ronda CH, Saavedra S. Phenotypic confirmation of extended-spectrum B-lactamases (ESBL) in clinical isolates of *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumonia* at the San Juan Veterans Affairs Medical Center. *PR Health Sci J.* 2004 Sep; 23(3):207-215.
- 14- Kado CI, Liu ST. Rapid Procedure for detection and isolation of large and small plasmids. *J Bacteriol.* 2000 Mar; 145(3):1365-1373.
- 15- Jiang X, Ni Y, Jiang Y, Li M, Lu Y, Zhou D . Outberek of infection caused by *Enterobacter cloacae* producing the novel VEB-3 beta-lactamase in China. *J Clin Microbiol.* 2005 Nov; 43(2): 826-831.
- 16- Gudarzi GH, Momeni S, Shakib P. The prevalence of ESBL among *Escherichia coli* isolates Sina Hospital Dolfan city of Lorestan. *J lorestan Uni Med sci.* 2014 Mar; 16(2):78-84 (Full text in Persian).
- 17- Akbari-Nakhjavani F, Mirsalehian A. Antimicrobial susceptibility testing of *Escherichia coli* strains isolated from urinary tract infection to fluorquinolones and detection of gyrA mutations in resistant strain. *DARU.* 2007 Jun; 15(3):97-99 (Full text in Persian).
- 18- Kalaskar A, Venkataramana K. Determination of Antimicrobial Resistance pattern and production of extended spectrum beta lactamases amongst *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumonia* from clinical Isolates. *J Med Bacterial.* 2012 Nov; 1(2): 17-24.
- 19- Srisangkaw S, Vorachit M. The optimum agent for screening and confirmatory tests for extended spectrum beta lactamases in *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumonia* in Ramathibodi Hospital Thailand. *J Infect Dis Antimicrob Agents.* 2004 Jan- Apr; 21(1):1-5.

- 20- Khorshidi A, Moazen Z, Rohani M, Moniri R, Shajari GH, Mousavi GH. The prevalence of TEM-1 and SHV-1 genes in extended spectrum beta lactamase producing *Klebsiella pneumonia*. Jundishapur J Microbiol. 2009 May; 11(3):149-153 (Full text in Persian).
- 21- Khosravi AD, Hoveizavi H, Mehdinejad M. Prevalence of *Klebsiella pneumonia* encoding genes for CTX-M-1, TEM-1 AND SHV-1 Extended-spectrum beta lactamases Enzymes in clinical specimens. Jundishapur J Microbiol. 2013 Des; 6(10):765-785.
- 22- Shahi SK, Singh VK, Kuma A. Detection of *Escherichia coli* and associated  $\beta$ -Lactamases genes from diabetic foot ulcers by multiplex PCR and molecular modeling and docking of SHV-1, TEM-1, and OXE-1  $\beta$ -lactamases with clindamycin and piperacillin-tazobactam. PLOS one. 2013 Jul; 8(7):78-86.
- 23- Amita J, Mondal A. TEM, SHV genes in extended spectrum  $\beta$ -lactamase producing *Klebsiella* species & their antimicrobial resistance pattern. Indian J Med Res. 2008 Dec; 128(3):759-764.
- 24- Dong Y, Sheng H, Zeng X, Yan J, Li H, Xiao H, et al. Investigation of genetic diversity of the bla(SHV) gene and development of an oligonucleotide microarray to detect mutations in the bla (SHV) gene. Microb Drug Resist. 2012 Dec; 18(6):539-545.
- 25- Mendonca N, Caniga M. Evolution of bla genus from SHV family. ESCMID J. 2007 Oct; 7(5):459-469.
26. Copur cicek A, Saral AO, Duzgun A, Yasar E, Cizmeci Z, Ozlem balci P, et al. Nationwide study of *Escherichia coli* producing extended-spectrum beta lactamases TEM, SHV and CTX-M in Turkey. J Antibiot. 2013 Sep; 66(11):647-650.