

اثر سیر خام بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در افراد با چربی و قندخون بالا

دکتر مهدی محمودی^۱ محمد رضا حاجیزاده^۲ دکتر کبری حسینی سادات^۳ سید حبیب‌الله حسینی^۴ دکتر غلام رضا اسدی کرم^۵

دکتر محمد خاکساری^۶ عباس صادقی^۷

^۱ دانشیار گروه بیوشیمی بالینی، ^۲ کارشناس ارشد بیوشیمی پزشکی، ^۳ پژوهشک عمومی، ^۴ مریبی گروه پرستاری، ^۵ دانشیار گروه فیزیولوژی، ^۶ کارشناس آزمایشگاه، ^۷ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مجله پزشکی هرمزگان سال یازدهم شماره دوم تابستان ۸۶ صفحات ۱۲۷-۱۳۱

چکیده

مقدمه: بو عامل خطر مهم بیماری اترواسکلروز، دیابت شیرین و افزایش چربیهای خون می‌باشد. سیر از زمانهای قدیم مورد استفاده بوده و مطالعات مختلفی در مورد اثرات سیر بر کاهش قند و چربی خون صورت گرفته که بعضی از آنها این موضوع را اثبات و برخی رد کرده‌اند. هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر مصرف سیر خام (Allium sativum) بر روی تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون در افراد با قند و چربی بالا می‌باشد.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی ۲۵ نفر افراد واحد شرایط و با میزان قندخون بالای ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و کلسترول تمام خون بیش از ۲۴۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر انجام گرفت. هر داوطلب ۵ گرم سیر خام را دو بار در روز به مدت ۲۴ روز مصرف کرد و سپس ۴۲ روز اصلًا سیر مصرف نکرد. سه مرحله خونگیری بصورت ناشتا جهت اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و $P < 0.05$ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

نتایج: میزان متوسط قندخون ناشتا ($10.0 \text{ mg/dL} > P$) و کلسترول تمام ($140 \text{ mg/dL} > P$) پس از ۴۲ روز مصرف سیر خام به صورت معنی‌داری کاهش یافت. اما بعد از قطع مصرف سیر مجداً افزایش پیدا کرد. HDL-C به صورت معنی‌داری افزایش و $HbA1C$ کاهش یافت ($5.0 \text{ mg/dL} < P$). مصرف سیر خام بر اوره کراتینین اسید اوریک تست‌های عملکرد کبدی کلسترول با دانسیتیه پایین تأثیر معنی‌داری نشان نداد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق اخیر، می‌توان به این نتیجه رسید که مصرف سیر می‌تواند کلسترول تمام خون، FBS و $HbA1C$ را کاهش و HDL-C را افزایش دهد. بنابراین سیر می‌تواند در موارد خفیف دیابت شیرین و هیپرلیپیدمی به خصوص در کسانی که توانند داروهای شیمیایی را تحمل کنند، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها: هیپرلیپیدمی - افزایش قندخون - سیر

نویسنده مسئول:
دکتر مهدی محمودی
گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رفسنجان - ایران
تلفن: +۹۸۳۶۱ ۸۲۷۶۴۱
پست الکترونیکی:
mahmoodies@yahoo.com

دریافت مقاله: ۸۴/۷/۱۸ اصلاح نهایی: ۸۵/۳/۳۱ پذیرش مقاله: ۸۵/۱۲/۲۳

مقدمه: و میزان وقوع جهانی آن در دهه‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته که علاوه بر ایجاد اترواسکلروز عوارض مزمن دیگری نیز دارد که عبارتنداز: رتینوپاتی، نفروباتی و عوارض غیر عروقی (۱). در اکثر کشورها، سالانه هزینه‌های گزارفی صرف درمان دیابت و هیپرلیپیدمی می‌شود. استفاده از داروهای گیاهی با توجه به قدمت طب گیاهی در ایران،

تصلب شریانها یا اترواسکلروز مربوط به لایه داخلی (انتیما) عروق خونی است که عوامل مختلفی در ایجاد و پیشرفت آن نقش دارند. دو عدد از این عوامل عبارتند از: دیابت شیرین و هیپرلیپیدمی که با درمان آنها می‌توان از بسیاری از عوارض آترواسکلروز پیشگیری کرد. بیماری دیابت یکی از قدیمی‌ترین بیماریهای است که شناخته شده

- ۵- نداشتن رژیم غذایی خاص
- ۶- عدم ابتلا به بیماری خاص
- ۷- تمایل به همکاری تا پایان طرح
- ۸- عدم مصرف سیر حداقل در ۶ هفته گذشته.

با توجه به اینکه تنها از سیر خام برای تحقیق استفاده شد که مصرف آن در جامعه رایج است، بنابراین از جهت مادهٔ مصرفی هیچ مشکل اخلاقی وجود نداشت. به هر یک از داوطلبین در مورد طرح و نحوه انجام تحقیق توضیحات لازم داده شد و در صورت موافقت، پرسشنامهٔ تنظیم شده، تکمیل شد.

قبل از مصرف سیر، در حالت ناشتا نمونهٔ خون تهیه و فاکتورهای قندخون، کلسترول تام، LDL-C، HDL-C، تری‌گلیسیرید، اوره، کراتینین، اسید اوریک، الالین فسفاتاز، ALT و AST به روش آنزیمی و بیلی‌روبین توتال و مستقیم با روش دیازو توسط کیت‌های شرکت پارس آزمون و هموگلوبین گلیکوزیله به روش شیمیایی با کیت مهسا یاران اندازه‌گیری شدند. قد و وزن و فشارخون افراد نیز اندازه‌گیری و در پرسشنامه ثبت گردید.

داوطلبین به مدت ۴۲ روز هر روز دو وعده (به همراه ناهار و شام)، هر وعده ۵ گرم سیر خام بسته‌بندی شده را مصرف کردند. بعد از ۴۲ روز مصرف سیر، برای بار دوم خونگیری در حالت ناشتا انجام شد و همچنین قد و وزن و فشارخون مجدداً اندازه‌گیری شد. بعد از این مرحله افراد مورد مطالعه به مدت ۴۲ روز اصلًا سیر مصرف نکردند و سپس برای بار سوم آزمایش‌های ذکر شده در حالت ناشتا تکرار شد و قد، وزن و فشار خون نیز اندازه‌گیری و ثبت گردید.

بعد از انجام آزمایشات و به دست آوردن نتایج، داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه فاکتورهای خونی در سه مرحله خونگیری از آزمون ANOVA استفاده شد و در صورتی که اختلاف بین میانگین‌ها معنی‌دار بود از آزمون نوجی توکی-کرامر جهت مقایسه گروه‌ها استفاده گردید و $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد.

کم هزینه بودن تهیه آن نسبت به داروهای شیمیایی و همچنین عوارض بسیار کم ناشی از مصرف آنها در برابر داروهای شیمیایی رو به افزایش است.

سیر از هزاران سال قبل به منظورهای مختلف (غذایی و دارویی) مورد استفاده قرار می‌گرفته است که از مهمترین خواص درمانی آن می‌توان به کاهش فشار خون، ضد سرطان، بودن التیام‌دهندهٔ رخمهای، کاهش قندخون اشاره کرد (۲).

تحقیقات زیادی نیز دربارهٔ اثرات کاهنده‌گی چربی خون و بیماریهای قلبی - عروقی در اثر مصرف سیر انجام شده است (۳). در این مطالعات گاهی نتایج متناقض بوده است (۴، ۵).

اثرات سیر بر روی چربیهای خون را به مهار آنزیمهای کبدی مسئول سنتز کلسترول نسبت می‌دهند (۶) و اثر کاهندهٔ قندخون را ناشی از افزایش ترشح انسولین از پانکراس می‌دانند (۷).

از آنجایی که بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی حیوانات بوده و در هیچ یک از آنها از سیر خام برای تحقیق استفاده نشده است، به همین علت در تحقیق حاضر اثر مصرف سیر خام در کاهش قند، کلسترول و دیگر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در افراد دارای قند و کلسترول خون بالا بررسی شده است.

روش کار:

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد ۲۵ نفر (۱۸ نفر زن و ۷ نفر مرد) افرادی که جهت آزمایش‌های درخواست شده از طریق پزشکان سطح شهر رفسنجان به آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی دانشکده پزشکی رفسنجان مراجعه و دارای شرایط زیر بودند، جهت انجام مطالعه انتخاب شدند.

۱- قند خون ناشتا بیش از ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر

۲- کلسترول تام بیش از ۲۴۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر

۳- سن کمتر از ۶۰ سال با میانگین (46.9 ± 2.14)

۴- عدم مصرف هر گونه داروی مؤثر بر قند و چربی خون

صرف سیر کاهش داشت ($P < 0.001$). میزان HDL-C در طول مدت مطالعه افزایش یافت به طوری که در پایان ۸۴ روز نسبت به شروع مطالعه افزایش معنی‌داری داشت ($P < 0.05$). HbA_{1C} پس از ۸۴ روز از شروع مطالعه کاهش پیدا کرد ($P < 0.05$) (جدول شماره ۱).

سایر فاکتورهای بیوشیمیایی خون، در اثر مصرف سیر خام، تغییر معنی‌داری پیدا نکردند (جدول شماره ۲).

نتایج:

در این مطالعه تعداد ۲۵ نفر که دارای کلسترول تام بیش از ۲۴۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و قندخون ناشتا بالاتر از ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. مصرف سیر خام توسط این افراد باعث کاهش قندخون ناشتا در مدت ۴۲ روز با ($P < 0.01$) شد، که در پایان مطالعه و با عدم مصرف سیر مجدد افزایش یافت. همچنین میزان کلسترول تام در پایان مدت ۴۲ روز

جدول شماره ۱- مقایسه میانگین به همراه خطای انحراف معیار در مدت سه مرحله مطالعه و مقادیر طبیعی فاکتورها

حدوده طبیعی	مرحله سوم	مرحله دوم	مرحله اول	فاکتور بیوشیمیایی
۷۰ - ۱۲۰	۱۷۲/۳۶±۱۱/۶	۱۶۳/۲۸±۱۰/۵ ^{**}	۱۸۱/۴۶±۱۲/۵	قندخون ناشتا (mg/dl)
۱۰۰ - ۲۵۰	۲۶۰/۰۲±۶/۷	۲۰۱/۰۲±۶/۳ ^{***}	۲۷۲/۰۸±۶/۳	کلسترول تام (mg/dl)
۳۵ - ۰۰	۴۴/۶۴±۰/۸ [*]	۴۳/۸±۰/۸	۴۲/۵۲±۰/۹۱	کلسترول با دانسیته بالا (mg/dl)
۴/۰ - ۶/۳	۷/۷±۰/۳ [*]	۷/۸±۰/۲۴	۸/۱±۰/۳۷	هموکلوبین کلیکوزیله (درصد هموکلوبین)

مرحله اول، شروع مطالعه مرحله دوم، بعد از ۴۲ روز مصرف سیر مرحله سوم، بعد از ۴۲ روز قطع مصرف سیر
 $P < 0.05$ * $P < 0.01$ ** $P < 0.001$ ***

جدول شماره ۲- مقایسه میانگین به همراه خطای انحراف معیار فاکتورهای بیوشیمیایی خون به همراه مقادیر طبیعی

حدوده طبیعی	مرحله سوم	مرحله دوم	مرحله اول	فاکتور بیوشیمیایی
۴۰ - ۲۰۰	۱۹۵/۸۴±۱۲/۷	۲۲۰/۲۱±۰/۶	۲۱۱/۸۴±۱۶/۷	تری‌کلیسرید (mg/dl)
۱۰۰ >	۱۲۷/۴۸±۴/۰	۱۲۲/۶۸±۴/۸	۱۲۶/۰۸±۵/۰	کلسترول با دانسیته پائین (mg/dl)
۱۰ - ۰۰	۲۸/۹۶±۱/۴	۲۹/۵۲±۱/۷۹	۲۹/۱۶±۱۰/۳۶	اوره (mg/dl)
۳ - ۶	۴/۴±۰/۱۶	۴/۴±۰/۲۲	۴/۲±۰/۱۹	اسید اوریک (mg/dl)
۰/۲ - ۱/۲	۰/۹۲±۰/۰۱۷	۰/۸۹±۰/۰۲۱	۰/۸±۰/۰۱۸	بیلی‌روبین توتال (mg/dl)
> ۰/۲۰	۰/۲۲±۰/۰۱	۰/۲۰±۰/۰۰۴	۰/۲±۰/۰۱	بیلی‌روبین مستقیم (mg/dl)
۵ - ۴۰	۲۲/۴۴±۱/۲	۲۴/۱۶±۱/۱	۲۴/۶±۱/۳	آسپارتات آمینوترافسفراز (واحد بین‌المللی)
۵ - ۴۰	۲۲/۲۴±۱/۲	۲۳/۴±۱/۱	۲۲/۶±۱/۱	آلانین آمینوترافسفراز (واحد بین‌المللی)
۶۴ - ۳۰۶	۲۲۲±۹/۰	۲۲۴/۳±۹	۲۲۴±۸/۹	الکالین فسفاتاز (واحد بین‌المللی)
۰/۴ - ۱/۵	۰/۷۲±۰/۰۲۶	۰/۷۴±۰/۰۲۶	۰/۷۱±۰/۰۲۵	کراتینین (mg/dl)

همچنین میزان LDL-C با توجه به کاهش بعد از ۴۲ روز مصرف سیر اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در مطالعه دکتر رحمانی، با تجویز پودر سیر به مدت ۱۲ هفته، سطح کلسترول و LDL-C کاهش پیدا کرد (۸). تحقیق آقای کانار و همکارانش نیز بعد از ۱۲ هفته مصرف سیر، کاهش کلسترول، کاهش LDL-C و نیز کاهش HDL-C را نشان داد (۹). در پژوهشی که توسط مورکوس صورت گرفت، مصرف مکمل غذایی سیر و روغن ماهی به مدت یکماه باعث کاهش

بحث و نتیجه‌گیری:

در مطالعه حاضر ملاحظه شد که مصرف سیر خام به مدت ۴۲ روز تأثیرات زیر را بر لیپیدهای سرم می‌گذارد. سطح کلسترول تام بعد از ۴۲ روز مصرف روزانه ۱۰ گرم سیر خام با سطح معنی‌داری ($P < 0.001$) کاهش یافت. میزان HDL-C در پایان مطالعه پس از ۸۴ روز افزایش نشان داد ($P < 0.05$). در مورد تری‌کلیسرید بعد از ۸۴ روز هر چند کاهش مشاهده شد اما از نظر آماری معنی‌دار نبود.

کاهش قند خون در اثر مصرف سیر به همراه زنجبیل بعد از ۴ هفته در موش‌های آزمایشگاهی را نشا داد (۱۲).

سایر فاکتورهای بیوشیمیایی:

در مطالعه حاضر تأثیر مصرف سیر خام بر روی سایر فاکتورهای بیوشیمیایی معنی‌دار نبود. اما مطالعه آقای انور که علاوه بر قند خون و لیپیدها میزان آنزیم‌های سرم مانند الکالین فسفاتاز، اسید فسفاتاز، لاکتات دهیدروژنانز و آنزیم کبدی گلوكز ۶ فسفاتاز را اندازه‌گیری کرد، به طور معنی‌داری کاهش داشتند (۶). مطالعه احمد نیز کاهش میزان الکالین فسفاتاز را نشان داد. مغایرت این نتایج با تحقیق حاضر به نظر می‌رسد به نوع مطالعه بر می‌گردد زیرا نتایج مطالعات فوق در حیوانات بدست آمده در حالی که مطالعه ما بر روی انسان می‌باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر می‌توان عنوان کرد سیر باعث کاهش قند و لیپیدهای سرم می‌شود. اگر چه کاهشی که نقش درمانی داشته باشد مستلزم به کارگیری روش‌های درمانی دیگر است. مسلماً فواید مشخصی در استفاده از داروهای استاندارد شده برای دیابت و هیپرلیپیدمی وجود دارد اما عوارض جانبی این داروها، استفاده از آنها را در بعضی افراد محدود کرده است. بنابراین بیمارانی که دچار افزایش خفیف چربی و قند خون هستند و عدم تحمل داروهای شیمیایی را دارند، سیر می‌تواند روش این و مؤثری باشد.

سپاسگزاری:

لازم است از کلیه بیماران و همکارانی که در این طرح ما را یاری کردند، سپاسگزاری نمائیم.

کلسترول، تری گلیسرید، LDL-C و افزایش HDL-C شد (۱۰). مطابق مطالعه برتولد و همکاران مصرف روغن سیر به مدت ۴ هفته تأثیری بر میزان لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها نداشت (۴). همچنین در مطالعه سوپرکونیز مصرف پودر سیر به LDL-C و HDL-C مدت ۳ ماه تأثیری بر لیپو پروتئین‌های اسلونینگ و همکاران بر روی مشاهده نگردید (۵). در مطالعه اسلونینگ و همکاران بر روی موش‌های تحت رژیم غذایی کم کلسترول مصرف سیر باعث کاهش کلسترول LDL-C شد (۱۱).

با توجه به پژوهش‌های فوق و مقایسه آنها با نتایج این طرح، می‌توان عنوان کرد که نتایج اکثر آنها مشابه مطالعه ما هستند و اختلاف در مورد چند تحقیق را می‌توان به نوع و مدت زمان مطالعه ارتباط داد. چون در این تحقیق برخلاف مطالعات قبلی از سیر تازه استفاده در حالی که طرح‌های قبلی از پودر با عصاره آبی یا روغنی استفاده شده است.

در این مطالعه سیر خام باعث کاهش قند خون ناشتاپی افراد دیابتی بعد از ۴۲ روز مصرف شد ($P < 0.01$) و همچنین کاهش هموگلوبین گلیکوزیله بعد از مصرف دیده شد که در پایان ۸۴ روز مدت مطالعه سطح معنی‌داری $P < 0.05$ مشاهده شد. در مطالعات قبلی بر روی انسان‌های دیابتی پژوهشی مشاهده نگردید اما بر روی حیوانات دیابتی تحقیقات وجود دارد که در مطالعه شیلا و همکاران در هند بر روی موش‌های دیابتی، مصرف یکی از اجزاء اصلی سیر به نام S-آلیل سیستئین باعث کاهش قند خون شد (۶). همچنین در تحقیق انور در سال ۲۰۰۳ تجویز روغن سیر به مدت ۱۵ روز در موش‌های تحت مطالعه کاهش قند خون را به دنبال داشت (۱۲) و نیز مطالعه احمد و همکاران نیز

References

1. Fauci AS. Harrison's principle of internal medicine. 16th ed. New York: Mc Grow-Hill; 2005.
2. زرگری، علی. گیاهان دارویی. چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲، ص ۶۲۳-۶۱۸.
3. Yeh YY and Liu L. Cholesterol – lowering effect of garlic extracts and organosulfur compounds: Hamand and animal studies. *Journal of Nutrition*. 2001;131:989-993.

منابع

4. Berthold HK, Sudhop T, Vonbergmann K. Effect of garlic oil preparation on serum lipoproteins and cholesterol metabolism. Arando mized controlledtrial. *JAMA*. 1998;279(23):
5. Superko HR, Krauss RM. Garlic powder, effect of plasma lipids, postprandial lipemia, Low-density lipoprotein particle size, high – density lipoprotein subclass distribution and lipoprotein. *J Am Coll Cardiol*. 2000;35(2):321-326.
6. Sheela CG, Augusti KT. Antidiabetic effects of S-allyl cysteine Sulfoxide isolated from garlic Allium staivum linn. *Indian J EXP Biol*. 1992;30(6):523-526.
7. Patumraj S, Tewit S, Amatyakul S, Jariyapongskul A, Maneesri S, Kasantikul V, et al. Comparative effects of garlic and aspirin on diabetic cardiovascular complications. *Drug Deliv*. 2000;7(2):91-96.
8. Rahmani M. Effect of dried garlic supplementation on blood lipids in mild and moderate hypercholesterolemic patients. *Original Article*. 1998;21-25.
9. Kannar D, Wattanapenpaiboon N, Saving GS, Wahliquist ML. Hypocholesterolemic effect on enterix-coated gfarlic Supplement. *J Am Coll Nutr*. 2001;20(3):225-231.
10. Morcos NC. Modulation of lipid profile by fish oil and garlic Combination. *J Nut L Med Assoc*. 1997;89(10):673-678.
11. Slowing K, Ganado P, Sanz M, Ruiz E, Tetrina T. Study of garlic extracts and fractions and cholesterol plasma level and vascular reactivity in cholesterol fed rats. *J Nutr*. 2001;131:994-999.
12. Anwar MM, Mek AR. Oxidative stress in streptozocin induced rats effect of garlic oil and melatonin. *Biochem Physiol*. 2003;135(4):539-547.
13. Ahmed RS, Sharma SB. Biochemical stidies on combined effects of garlic and ginger in albino rats. *Indian JEXP Biol*. 1997;35(8):841-843.