

مجله‌ی علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۶۵، زمستان ۱۳۸۷، صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۶

گزارش یک مورد توده‌ی شکمی ناشی از تریکوبزوار در یک دختر چهارده ساله

دکتر مرتضی نظریان^۱، دکتر جمشید وفایی‌منش^۲، دکتر فلور فکور^۳

نویسنده‌ی مسئول: زنجان، مرکز آموزشی، درمانی ویژه (عج)، گروه داخلی Morteza.Nazarian@gmail.com

پذیرش: ۸۷/۳/۲۵ دریافت: ۸۷/۱۱/۶

چکیده

بزوار به اجسام خارجی گفته می‌شود که به تدریج در دستگاه گوارش و به خصوص در معده تجمع می‌یابند و در کمتر از نیم درصد آندوسکوپی‌های دستگاه گوارش فوقانی دیده می‌شود. بزوارها بر اساس ماده‌ی تشکیل دهنده طبقه‌بندی می‌شوند. سه شکل عمده آن‌ها شامل فیتوبزوار، تریکوبزوار و فارماکوبزوار می‌باشد.

به ندرت تریکوبزوارها به صورت انسداد خروجی معده، انسداد روده کوچک، خونریزی گوارشی، سوراخ شدگی دیواره‌ی دستگاه گوارش، انسداد صفرایی و آنمی هیپوکروم، کمبود ویتامین B_12 توده‌ی شکمی و یا پانکراتیک نکروزان تظاهر می‌کنند. در این مورد تریکوبزوار به صورت توده‌ی شکمی و آنمی هیپوکروم تظاهر کرده بود.

واژگان کلیدی: تریکوبزوار، توده‌ی شکمی

مقدمه

عبارتنداز فیتوبزوار، تریکوبزوار و فارماکوبزوار. فیتوبزوارها از مواد گیاهی تشکیل شده‌اند و شایع‌ترین نوع بزوار می‌باشند. فارماکوبزوار از داروهای خورده شده تشکیل می‌شوند و به طور عمده از داروهایی نظیر: آسپرین (Enteric coated) سوکرالفات، تئوفیلین و نیفیدیپین تشکیل می‌شود. انواع دیگری از بزوار که از مواد دیگری مانند کشک، دستمال کاغذی، لک ناخن و دستکش‌های لاستیکی تشکیل شده‌اند نیز گزارش شده‌اند. عقیده براین است که مواد خورده شده


بزوار به اجسام خارجی گفته می‌شود که به تدریج در دستگاه گوارش و به خصوص در معده تجمع می‌یابند و شیوع کلی آن در یک مطالعه حدود کمتر از نیم درصد آندوسکوپی‌های دستگاه گوارش فوقانی ذکر شده است (۱). ولی بر اساس تجربیات ما تنها ۲ مورد بزوار بزرگ نیازمند جراحی در بیش از ده هزار آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی انجام شده، دیده شده است. بزوارها بر اساس ماده‌ی تشکیل دهنده طبقه‌بندی می‌شوند. سه شکل عمده آنها

۱- فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲- دستیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۳- متخصص جراحی عمومی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آندوسکوپ از کنار آن عبور داده شد و امتداد توده‌ی فوق تا ناحیه‌ی پیلور دیده شد. به دلیل وجود مو امکان عبور آندوسکوپ به پیلور وجود نداشت. با توجه به بزرگی توده امکان خارج کردن یا قطعه قطعه کردن آن در معده نبود. بیمار با تشخیص تریکوبزوار تحت عمل گاستروتونی قرار گرفت و توده‌ی مو که اکثر حجم معده تا قسمت اول دئونوم را اشغال کرده بود، خارج شد (اشکال ۳ تا ۵). در ابتدا بیمار خوردن مو را انکار می‌کرد و هیچ‌گونه محل ریزش مو در معاینات دیده نشد. (طی مصاحبه‌ی روانپرشنگی دوره‌هایی از ریزش مو و آلوپسی توسط بیمار گزارش شد). هیچ‌گونه اختلال عمدی روانپرشنگی در بیمار تشخیص داده نشد و علت خوردن مو استرس‌هایی در گذشته ذکر شد.




شکل ۱: نمای CT SCAN با ماده حاجب توده‌ی بزرگی را در شکم در محل معده نشان می‌دهد.


نظیر مو و الیاف گیاهی توسط موکوس‌پکتین و پروتئین‌ها به هم تنیده شده و بزوار را تشکیل می‌دهند. تشکیل بزوار در یک فرد سالم نادر است و به طور معمول دو عامل درجاتی از اختلال حرکتی معده و خصوصیت مواد خورده شده در ایجاد آن دخالت دارند (۲). تریکوبزوار به طور معمول در زنان جوان که اختلال روانپرشنگی دارند دیده می‌شود. به طور معمول تریکوبزوار در کسانی که تریکوتیلومانیا دارند به وجود می‌آید. در تعداد کمی از این بیماران تریکوبزوار از معده تا سکوم امتداد دارد که به این حالت سندروم راپونزل (Rapunzel Syndrome) گفته می‌شود و در دختران جوان دیده می‌شود (۳).

گزارش مورد

دختر ۱۴ ساله‌ای به دلیل احساس توده‌ای در ناحیه‌ی اپی گاستر در بخش داخلی بیمارستان ولی‌عصر زنجان بستری شد. طبق شرح حال بیمار از دو ماه قبل توده را احساس کرده بود. هیچ‌گونه شکایتی از کاهش وزن، درد شکم، تهوع، اسهال و استفراغ وجود نداشت. در معاینات اولیه، ملتحمه مختصراً رنگ پریده بود و سایر معاینات طبیعی بودند. لنفادنوفاتی و ارگانومگالی نیز یافت نشد. توده‌ای به ابعاد ۱۰ در ۱۵ سانتی‌متر از ربع فوقانی چپ به سمت ربع تحتانی راست امتداد پیدا کرده بود. قوام آن سفت بوده و چسبندگی نداشت. با توجه به شرح حال و معاینات در مرحله‌ی اول احتمال توده‌های خوش‌خیم برای بیمار مطرح شد. سونوگرافی و رادیوگرافی ساده‌ی شکم هیچ کمکی به تشخیص نکردند، بنابراین سی‌تی اسکن شکم با ماده‌ی حاجب انجام شد (شکل‌های ۱ و ۲). با توجه به نمای سی‌تی اسکن شکم و شرح حال بیمار احتمال بزوار داخل معده مطرح شد و آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش انجام شد. پس از عبور آندوسکوپ از اسفنگ‌تر تھتانی مری توده‌ی مو از ابتدای معده رویت شد. توده تمام حجم معده را اشغال کرده بود از این رو



شکل ۳: بعد از برش جدار شکم، معده نشان داده شده است.



شکل ۲: CT SCAN با ماده حاجب توده‌ی داخل معده را نشان میدهد که اطراف آن را ماده حاجب احاطه کرده است ولی به داخل آن نفوذ نکرده است.



شکل ۵: توده‌ی بزرگ مو بعد از خارج کردن از معده.



شکل ۴: بعد از برش جدار معده، توده‌ی مو مشخص است.

و نشانه‌های این بیماری به تدریج به وجود می‌آید. شکایت‌های شایع این بیماران در حین مراجعت، عبارت از درد شکم، تهوع و استفراغ، سیری زودرس، بی‌اشتهاای و کاهش وزن می‌باشد. به ندرت تریکوبزوارها به صورت انسداد خروجی معده، انسداد روده‌ی کوچک، خونریزی گوارشی، سوراخ شدن

بحث

اکثر تریکوبزوارها در دختران جوان و در دهه‌ی دوم زندگی دیده می‌شود (۳) و معمولاً به طور اتفاقی به دنبال شکایت‌های غیر اختصاصی گوارشی در آندوسکوپی کشف می‌شوند (۴). این بیماران سال‌ها بدون علامت زندگی می‌کنند

ناحیه‌ی اپی‌گاستر مراجعه نموده بود و در وی نیز تریکوبیزوار با اندازه‌ای نظیر بیمار این گزارش کشف گردید، معرفی نمود (۶).

نتیجه‌گیری

به علت نادر بودن تومورهای دستگاه گوارش فوکانی در کودکان و نوجوانان، در صورت برخورد با توده‌های شکمی در بیماران جوان معمولاً آندوسکوپی فوکانی انجام نمی‌شود. در این موارد احتمال بروار باید در نظر گرفته شود و با شرح حال دقیق و انجام آندوسکوپی تشخیص را قطعی کرد.

منابع

- 1- Kadian RS, Rose JF, Mann NS. Gastric bezoars- spontaneous resolution. *Am J Gastroenterol.* 1978; 70: 79-82.
- 2- Krausz MM, Moriel EZ, Ayalon A, Pode D, Durst AL. Surgical aspects of gastrointestinal phytobezoar treatment. *Am J Surg.* 1986; 152: 526-30.
- 3- Singla SL, Rattan KN, Kaushik N, Pandit SK. Rapunzel syndrome case report. *Am J Gastroenterol.* 1999; 94: 1970-1.

دیواره‌ی دستگاه گوارش، انسداد صفراء، آنمی هیپوکروم، کمبود ویتامین B₁₂، توده‌ی شکمی یا پانکراتیک نکروزان ظاهر می‌کند. در این مورد تریکوبیزوار به صورت توده‌ی شکمی و کم خونی هیپوکروم تظاهر کرده بود. بسته به نوع مواد تشکیل دهنده‌ی بروار و فرآیند آسیب شناسی زمینه‌ای درمان‌های متفاوتی از جمله خارج کردن با آندوسکوپی یا جراحی وجود دارد که مورد این گزارش از طریق جراحی خارج گردید. البته روش‌های دیگری در درمان آندوسکوپی نظیر استفاده از لیزر و تزریق حلال آنزیمی نیز ارائه شده‌است (۵). در مطالعه‌ی لی وی (۶) مورد مشابه دیگری را که دختر ۱۸ ساله‌ای بود و با شکایت درد و توده‌ی شکمی در

- 4- McCracken S, Jongeward S, Silver TM, Jafri SZ. Gastric trichobezoar: sonographic findings. *Radiology.* 1986; 161: 123-4.
- 5- Naveau S, Poynard T, Zourabichvili O, Poitrine A, Chaput JC. Gastric phytobezoar destruction by Nd: YAG laser therapy. *Gastrointest Endosc.* 1986; 32: 430-1.
- 6- Levy MD, Komanduri S. Images in clinical medicine. Trichobezoar. *N Eng J Med.* 2007; 22: e23.

An Abdominal Mass due to Trichobezoare in A 14- Year Old Girl

Nazarian M¹, Vafaeemanesh J², Fakor F³

¹Dept. of Internal Medicine, Valiasr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

²Dept. of Internal Medicine, Valiasr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

³Dept. of Surgery, Valiasr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Corresponding Author: Nazarian M, Dept of Internal Medicine, Valiasr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.

Email: Morteza.Nazarian@gmail.com

Received: 14 Jun 2008 **Accepted:** 25 Jan 2009

Gastric bezoars results from the accumulation of foreign ingested materials in the form of masses or concretions. Bezoars are rare and being found in less than 0.5 percent of patients undergoing upper gastrointestinal endoscopies. Bezoars are classified according to their composition. The major types of bezoars are phytobezoars, trichobezoars and pharmacobezoars. Trichobezoars are typically seen in the women in their 20s. Patients with bezoar remain asymptomatic for many years and develop symptoms insidiously. Common complaints include abdominal pain, nausea, vomiting, early satiety, anorexia and weight loss. Bezoars have rarely been associated with other gastrointestinal complications such as gastric outlet obstruction (GOO), intestinal obstruction, gastrointestinal bleeding, gastrointestinal perforation, necrotizing pancreatitis, obstructive jaundice, hypochromic anemia, B12 deficiency and abdominal mass. In our case thrichobezoare manifested with an abdominal mass and hypochromic anemia.

Key word: *Abdominal mass, Trichobezoare, Hypochromic anemia*