

تشخیص سریع مایکروباکتریوم‌های آتیپیک در بیماران با علائم سل ریوی: ارزیابی لوکوس VNTR 3232 (590bp) با روش

فضه حیدری^۱، دکتر پریسا فرنیا^۲، دکتر جمیله نوروزی^۳، دکتر احمد مجده^۴، الهه تاج الدین^۵، دکتر محمد رضا مسجدی^۶
دکتر علی اکبر ولاطی^۷

fzheidari@yahoo.com

نویسنده‌ی مسئول: تهران، بیمارستان مسیح دانشوری، مرکز تحقیقات مایکروباکتریولوژی

دریافت: ۸۷/۹/۱۳ پذیرش: ۸۷/۹/۲۲

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به انتشار جهانی مایکروباکتریوم‌های آتیپیک، شناسایی و تشخیص این نوع از مایکروباکتریوم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخیراً مطالعات مولکولی انجام شده با استفاده از روش‌های انگشت‌نگاری ژنتیکی که پر هزینه و وقت‌گیر است، لوکوس‌های اختصاصی مربوط به مایکروباکتریوم‌ها را شناسایی کرده است. در این مطالعه علاوه بر روش *hsp65 PCR-RFLP*، لوکوس (590bp) با *QUB3232* استفاده از روش توالی‌های تکراری پشت سرهم (*VNTR*) برای تمایز مایکروباکتریوم‌های آتیپیک از مایکروباکتریوم تویرکلوزیس کمپلکس مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهشی: این بررسی بر روی ۳۷۱ نمونه‌ی ریوی و خارج ریوی انجام شد. بعد از جدا سازی و کشت این نمونه‌ها با استفاده از محیط *LJ* تست‌های افتراقی شامل احیای نیترات، آزمایش فعالیت کاتالاز، آزمایش نیاسین، سرعت رشد و تولید پیگمان انجام شد. سپس حساسیت دارویی با روش نسبتی صورت گرفت. *DNA* به روش فنل-کلروفرم استخراج و قطعه‌ی *hsp65* توسط *PCR* تکثیر یافت. قطعات تکثیر یافته توسط آنزیم‌های *HphI*, *AvaII*, *HpaII* هضم و الگوی بدست آمده، ریوی اگارز ۳ درصد الکتروفورز شد. همچنین لوکوس (590bp) *QuB3232* با استفاده از روش *VNTR* در نمونه‌های مایکروباکتریوم‌های آتیپیک و تویرکلوزیس کمپلکس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: از مجموع ۳۷۱ نمونه، ۳۲ نمونه (۱/۶ درصد) مقاوم به دارو (*MDR*)، ۱۸۴ نمونه (۴۹/۵ درصد) حساس و ۱۵۵ نمونه (۴۱ درصد) غیر *MDR* گزارش شدند که ۱۵ درصد از نمونه‌های *MDR* و ۲۲ درصد از نمونه‌های غیر *MDR* مربوط به مایکروباکتریوم‌های آتیپیک بودند. از مجموع ۴۳ نمونه‌ی آتیپیک، ۱۲ نمونه، سریع الرشد (۲۷/۹ درصد) و بقیه، کند رشد (۷۲/۱ درصد) بودند. از میان کند رشد، ۵۱ درصد مایکروباکتریوم سیمیه و ۱۹ درصد مایکروباکتریوم کانزاسی جدا گردید. لوکوس *QuB3232* با حساسیتی برابر ۱۰ درصد توانست مایکروباکتریوم‌های آتیپیک و تویرکلوزیس کمپلکس را از یکدیگر تمایز دهد.

نتیجه‌گیری: لوکوس *QuB3232* دارای قدرت افتراق بالایی بین مایکروباکتریوم‌های آتیپیک و تیپیک می‌باشد. بنابراین می‌توان به جای *PCR-RFLP* لوکوس *QuB3232* را با استفاده از روش *VNTR* برای تمایز این دو دسته مورد استفاده قرار داد.

وازگان کلیدی: مایکروباکتریوم‌های آتیپیک، لوکوس *QuB3232*, *VNTR*

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

۲- دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات مایکروباکتریولوژی

۳- دکترای تخصصی میکروب شناسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران

۴- دکترای تخصصی بیولوژی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی

۵- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

۶- فوق تخصص ریه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷- فوق تخصص عفونی اطفال، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی

مقدمه

این روش‌ها می‌توان به اسپولیگوتایپینگ و IS6110-RFLP اشاره کرد (۷ و ۸). اگر چه این روش‌ها قادر به تمایز مایکوباکتریوم‌های آتیپیک از توبرکلوزیس کمپلکس می‌باشند، اما معمولاً وقت‌گیر و پرهزینه بوده، در مایکوباکتریوم‌های آتیپیک از حساسیت کمی برخوردار می‌باشند. به همین علت امروزه از روش توالی‌های تکراری [Variable Number Tandem Repe at(VNTR)] پشت سرهم که نوعی روش انگشت نگاری ژنتیکی بر پایهٔ PCR می‌باشد، استفاده می‌شود (۹). این روش ابزار قدرتمندی برای بررسی الگوی ژنتیکی (ژنوتیپ) مایکوباکتریوم‌های آتیپیک به حساب می‌آید، زیرا آنالیز آن، بر اساس لوکوس‌های اختصاصی و اندک صورت می‌گیرد که در مقایسه با روش‌های استاندارد مولکولی دیگر (۱۰). آنالیز توالی‌های ژنومی در گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم با استفاده از روش VNTR، لوکوس‌های متعددی را شناسایی کرده که دارای پلی مرفیسم طولی به علت وجود الحاق (insertion) و یا حذف (Deletion) توالی‌های تکرار شونده‌ی پشت سرهم می‌باشند، که از این میان می‌توان به لوکوس‌های ETR (Exact Tandem Repeat) و MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units) QUB (Major Polymorphic Tandem Repeat) MPTR اشاره کرد (۱۱ و ۱۲). مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر نشان داده است که لوکوس QUB از حساسیت و دقیقت بالایی برای افتراق و تمایز گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم برخوردار است (۱۳ و ۱۴). hsp65 PCR-RFLP در این مطالعه، علاوه بر روش VNTR QUB3232 با استفاده از روش VNTR برای تمایز مایکوباکتریوم‌های آتیپیک از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس مورد بررسی قرار گرفت.

به جز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس و مایکوباکتریوم لپرا که در گروه پاتوژن‌های اصلی انسانی و حیوانی به حساب می‌آیند، گونه‌های دیگر مایکوباکتریوم [Mycobacterium Other Than Tuberculosis (MOTT)] یا [Non Tuberculosis Mycobacterium (NTM)] پاتوژن‌های فرصت طلب شناخته می‌شوند (۱). اما اخیراً مدارکی وجود دارد که این دسته از مایکوباکتریوم‌ها قادرند انواع مختلفی از بیماری‌های انسانی را در ریه، پوست، کلیه و سایر نقاط بدن ایجاد کنند (۲). اگر چه تاکنون انتقال فرد به فرد بیماری گزارش نشده است، اما مقاوم بودن این دسته به اکثر داروهای ضد سلی (مانند ایزوپینازید، ریفارپین، استرپتومایسین، اتامبیول و پیرازینامید)، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است (۳). بررسی‌های پژوهشگران در چند دههٔ اخیر نشان می‌دهد که این باسیل‌های اسید فاست در طبیعت به مقدار فراوان یافت می‌شوند (۱)، بنابراین با توجه به الگوی مقاومت دارویی و انتشار جهانی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک، شناسایی و تشخیص این باسیل‌ها یکی از مباحث اساسی مایکوباکتریولوژی در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. یکی از روش‌های پر کاربرد مولکولی برای تشخیص گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم، روش PCR-RFLP می‌باشد. در این روش قطعه‌ی خاصی از DNA پس از تکثیر، توسط آنزیم‌های برش دهندهٔ ویژه‌ای، برش خورده و قطعات DNA حاصل روی ژل آگارز به طریق چشمی آنالیز می‌گردد (۴). ژنهای خاصی از DNA برای تکثیر در این روش پیشنهاد شده است که از این میان، ژن کد پروتئین شوک حرارتی که نوعی پروتئین (hsp65) 65KDa می‌باشد، حساس‌تر و دقیق‌تر از بقیه گزارش شده است (۴-۶). اخیراً مطالعات مولکولی انجام شده با استفاده از روش‌های انگشت نگاری ژنتیکی، لوکوس‌های اختصاصی مربوط به مایکوباکتریوم‌ها را شناسایی کرده که از

مورد استفاده در PCR برای لوکوس QUB3232 شامل مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و سپس ۳۳ دور شامل ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه و ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه و ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه و در پایان به مدت ۸ دقیقه در ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد بود. محصولات PCR بدست آمده روی ژل ۲ درصد الکتروفورز گردید. تعداد دقیق توالی تکرارشونده پشت سرهم برای هرسویه به وسیله‌ی اندازه‌ی محصول PCR بر روی ژل تعیین و با استفاده از دستورالعمل استاندارد آنالیز گردید.

تعیین نمای VNTR: در این بررسی، علاوه بر نمونه‌های جدا شده از بیماران، سوش استاندارد H37RV و سوش استاندارد هر کدام از گونه‌های آتیپیک مورد مطالعه (ATCC) نیز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌ی محصول 590bp PCR در لوکوس QUB3232 در سویه‌ی استاندارد H37RV در نظر گرفته شد که دارای ۳ کپی 56bp پشت سرهم (توالی آخر 50bp بیشتر داشت) بود. در سویه‌های مورد مطالعه، اگر اندازه‌ی محصول PCR بیشتر یا کم تراز bp 56 بود (590 ± 56)، تعداد کپی‌ها به صورت 3 ± 1 گزارش شد.

تعیین حساسیت لوکوس QUB3232: برای تعیین حساسیت لوکوس QUB3232 در گونه‌های مورد مطالعه تعداد موارد مثبت حقیقی به مجموع تعداد مثبت حقیقی و منفی کاذب تقسیم شد.

یافته‌ها

گروه مورد مطالعه از نظر سن، جنس، ملیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی شدند. از ۳۷۱ نمونه مورد بررسی، ۲۵۷ نفر (۶۹/۳ درصد) ملیت ایرانی که ۱۱۱ نفر (۴۳ درصد) زن و ۱۴۶ نفر (۵۶ درصد) مرد و ۱۱۴ نفر (۳۰/۷ درصد) ملیت افغانی که ۶۸ نفر (۵۹/۶ درصد) زن و ۴۶ نفر

روش بررسی

این بررسی، بر روی ۳۷۱ نمونه‌ی مایکروبکتریوم جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی پژوهشی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری از اردیبهشت ۸۶ تا مرداد ۸۷ صورت گرفت. پس از جداسازی و کشت این نمونه‌ها با استفاده از محیط جنسون [Lowenstein Jensen (LJ)], تست‌های افتراقی شامل احیای نیترات، آزمایش فعالیت کاتالاز، آزمایش نیاسین، سرعت رشد و تولید پیگمان انجام شد (۱۵)، سپس حساسیت دارویی در برابر ایزوپنیازید، ریفارمپین، استرپتومایسین، اتابوپتول و پیرازینامید به روش نسبتی (Proportional Method) انجام و سویه‌های با به سه گروه [Multidrug-Resistance (MDR)] حساس، مقاوم به دارو [DNA MDR] تقسیم بندی شدند. استخراج DNA نیز به روش فنل-کلروفرم انجام شد. در روش PCR-RFLP Hsp65 برای تکثیر قطعه‌ی ۶۴۴ جفت بازی ژن کدکننده‌ی (Heat Shock Protein) hsp65 از دو پرایمر HSPR4 (5'-AAG GTG CCG CGG ATC TTG TT-3')، HSPF3 (5'-ATC GCC AAG GAG ATC GAG CT-3') و استفاده شد. دور PCR مورد استفاده به صورت ۳۰ دور شامل ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۶۰ ثانیه و ۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه و ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۹۰ ثانیه و در پایان به مدت ۵ دقیقه در ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد بود. پس از تکثیر موفقیت آمیز این قطعه (مشاهده‌ی قطعه‌ی ۶۴۴ جفت بازی)، محصولات PCR توسط سه آنزیم *HphI*, *AvaII* و *HpaII* به طور جداگانه بر ش خوردن (۵)، سپس الگوی به دست آمده روی آگاراز ۳ درصد الکتروفورز شد. در روش VNTR-PCR، برای انجام PCR از لوکوس QUB3232 با ترتیب توالی پرایمر CAGACCCGGCGTCATCAAC و CCAAGGGCGGCATTGTGTT استفاده شد. دور

۱۴ تا ۸۵ سال و بیماران افغانی ۱۵ تا ۷۵ سال بود (جدول ۱).

۴۰/۴ درصد) مرد بودند. رنج سنی برای بیماران ایرانی بین

جدول ۱: مشخصات دموگرافی بیماران مورد مطالعه

ملیت					
اغانی			ایرانی		
تعداد کل	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۴۸/۲	۱۷۹	۵۹/۶	۶۸	۴۳	۱۱۱
۵۱/۷	۱۹۲	۴۰/۴	۴۶	۵۶	۱۴۶
۵۸/۲	۲۱۶	۵۵/۲	۶۳	۵۹/۵	۱۵۳
۴۱/۷	۱۵۵	۴۴/۷	۵۱	۴۰/۴	۱۰۴

جنسیت	سن
مرد	بالای ۴۰ سال
	زیر ۳۵ سال

حساس و ۱۵۵ نمونه (۴۱ درصد) غیر MDR گزارش شدند. ۱۵ درصد از نمونه‌های MDR و ۲۲ درصد از نمونه‌های غیر MDR مربوط به مایکوباکتریوم‌های آتیپیک بودند (جدول ۲).

از ۳۷۱ نمونه مورد مطالعه، ۳۸ نمونه خارج ریوی، مربوط به ادرار و خون بود و ۳۳۳ نمونه ریوی مربوط به خلط و بافت ریه بود. از مجموع ۳۷۱ نمونه مورد مطالعه، ۳۲ نمونه (۸/۶ درصد) MDR ۱۸۴ نمونه (۴۹/۵ درصد)

جدول ۲: الگوی آنتی‌بیوگرام نمونه‌های جدا شده از بیماران با عالیم سل ریوی در این بررسی

نمونه‌های مورد مطالعه					
MDR	غیر	مقاوم به چند دارو	حساس	درصد	تعداد
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
۷۸	۱۲۱	۸۴/۳	۲۷	۹۷/۸	۱۸۰
۲۱/۹	۳۴	۱۵	۵	۲/۱	۴
۴۱	۱۵۵	۴۴/۷	۳۲	۴۹/۵	۱۸۴
تعداد کل					

تشخیص گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم با استفاده از روش hsp65 PCR-RFLP: با استفاده از روش hsp65 PCR-RFLP به عنوان مایکوباکتریوم‌های غیرسلی و بقیه به عنوان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس شناسایی شدند. از مجموع ۴۳ نمونه مایکوباکتریوم غیر سلی شدن. از این ۴۳ نمونه ۱۱/۵ (۲۷/۹ درصد) سریع الرشد که شامل ۳ نمونه مایکوباکتریوم

نتایج به دست آمده از تست‌های افتراقی با نتایج روش hsp65PCR-RFLP مطابقت داشته و ۴۳ نمونه به عنوان مایکوباکتریوم‌های آتیپیک شناسایی شدند، که از این میان ۱۲ نمونه سریع الرشد، ۲۲ نمونه فوتوکروموزن (Photochromogen)، ۵ نمونه اسکاتوکروموزن (Scotochromogen) و ۴ نمونه غیر کروموزن (Nonchromogen) گزارش شد.

از میان کند رشد ها ۵۸ درصد مایکوباکتریوم سیمیه (*Mycobacterium simiae*) و ۱۹ درصد (*Mycobacterium kansasii*) مایکوباکتریوم کانزاسی جدا گردید (جدول ۳).


کلونی زیر گونه کلونی (*M. cheloneae subsp. Cheloneae*) ۳ نمونه مایکوباکتریوم فورچوئیتوم (*M. furtuitum*)، ۶ نمونه مایکوباکتریوم کلونی (*M. cheloneae subsp. abcessus*) و سایر نمونه ها (۷۲ درصد) کند رشد بودند.

جدول ۳: تشخیص گونه های مختلف مایکوباکتریوم بر اساس نتایج به دست آمده از روش PCR-RFLP

مایکوباکتریوم تuberکلوزیس کمپلکس	مایکوباکتریوم های آتیپیک
تعداد گونه	گونه
۳	مایکوباکتریوم کلونی زیر گونه کلونی
۳	مایکوباکتریوم فورچوئیتوم سریع الرشد
۶	مایکوباکتریوم کلونی زیر گونه آبسسوس
۱۷	مایکوباکتریوم سیمیه
۶	مایکوباکتریوم کانزاسی
۱	مایکوباکتریوم گوردونی کند رشد
۳	مایکوباکتریوم اسکروفولاستوم
۲	مایکوباکتریوم مالموئنس
۲	مایکوباکتریوم ایتراسلو لار
۳۲۸	تعداد کل
۴۳	

دارای پلی مرفیسم بود و تعداد کپی های آنها بین ۲ تا ۵ کپی (دارای چهار نمایی ۲، ۳، ۴ و ۵ بود) گزارش شد (شکل ۱). بر خلاف سویه هی استاندارد H37RV در سویه های استاندارد مایکوباکتریوم های آتیپیک، محصول PCR به دست نیامد. از طرفی در نمونه های آتیپیک جدا شده از بیماران نیز محصول PCR مشاهده نشد (شکل ۲).

تمایز مایکوباکتریوم های آتیپیک از مایکوباکتریوم تuberکلوزیس کمپلکس با استفاده از روش VNTR: اندازه هی محصول PCR ۵۹۰bp و تعداد کپی های واحد تکرار شونده در لوکوس QUB3232 برای سویه هی استاندارد H37RV ۳ کپی گزارش شد. این لوکوس در ۲۷۸ نمونه (۸۵ درصد) از گونه های مایکوباکتریوم تuberکلوزیس کمپلکس مورد مطالعه،



شکل ۱: لوکوس QUB3232 در مایکروبیاکتریوم توبیرکلوزیس کمپلکس (خط ۱: سویه‌ی استاندارد *H37RV* خط ۲-۱۰: گونه‌های توبیرکلوزیس کمپلکس جدا شده از بیماران با عالیم سل ریوی)



شکل ۲: عدم حضور لوکوس QUB3232 در مایکروبیاکتریوم‌های آتیپیک (خط ۱: سویه‌ی استاندارد *H37RV* خط ۲: سویه‌ی استاندارد مایکروبیاکتریوم سیمیه (*M. simiae*) (ATCC)، خط ۳: سویه‌ی استاندارد مایکروبیاکتریوم کانزالی (*M. Kansasii*) (ATCC)، خط ۴ تا ۶: گونه‌های آتیپیک جدا شده از بیماران با عالیم سل ریوی (ATCC: American Type Culture Collection)

توبیرکلوزیس کمپلکس را با حساسیتی برابر ۸۰ درصد، تمایز دهد.

بحث

لوکوس QUB3232 به عنوان لوکوس افتراق دهنده بین مایکروبیاکتریوم‌های آتیپیک و مایکروبیاکتریوم توبیرکلوزیس

این نتایج نشان دهنده عدم وجود لوکوس QUB3232 در مایکروبیاکتریوم‌های آتیپیک بود.

بنابراین لوکوس QUB3232 دارای قدرت تمایز بالایی بین مایکروبیاکتریوم‌های آتیپیک و مایکروبیاکتریوم توبیرکلوزیس کمپلکس می‌باشد، به عبارت دیگر، این لوکوس می‌تواند مایکروبیاکتریوم‌های آتیپیک و مایکروبیاکتریوم

این روش شناسایی شد، اگرچه حساسیت آنزیم‌های مورد استفاده، متفاوت بود اما به طور کلی نتایج به دست آمده با به کارگیری هر سه آنزیم، قابل قبول بوده، با دستاوردهای مطالعات فوق هم خوانی داشته است. یکی از روش‌های انگشت‌نگاری ژنتیکی که بر اساس PCR می‌باشد، VNTR نام دارد که بیشتر برای بررسی تنوع ژنتیکی سویه‌های مایکوباکتریوم توپرکلوزیس بکار می‌رود. این روش سریع و آسان بوده، آنالیز آن بصورت چشمی صورت می‌گیرد و بسیار پایدار است (۹). آنالیز توالی‌های ژنومی در گونه‌های مایکوباکتریوم با استفاده از روش VNTR، لوکوس‌های متعددی را شناسایی کرده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به لوکوس‌های TR, MIRU, QUB اشاره کرد (۱۱، ۱۲ و ۲۰). در مطالعه‌ای که توسط کونل و فوتینگام صورت گرفت، روش VNTR به عنوان روشی جدید برای بررسی تنوع ژنتیکی (ژنوتیپ) مایکوباکتریوم توپرکلوزیس کمپلکس معرفی شد. در این مطالعه، ۱۱ لوکوس VNTR در ژنوم H37RV شناسایی شد که شامل ۵ MPTR-D, MPTR-B, MPTR-A (MPTR-C) و ۶ لوکوس ETR (MPTR-F, MPTR-E, MPTR-C (ETR-E, ETR-D, ETR-C, ETR-B, ETR-F, ETR-A) بود. یکی از ۵ لوکوس MPTR و ۶ لوکوس ETR دارای پلی‌مرفیسم طولی به علت وجود الحاق و یا حذف توالی‌های تکرار شونده‌ی پشت سرهم بودند که از این لوکوس‌ها برای ژنوتیپ و مطالعات اپیدمیولوژیکی ۲۵ گونه‌ی مایکوباکتریوم توپرکلوزیس کمپلکس و ۲۳ زیر گونه‌ی مایکوباکتریوم بوویس زیر گونه‌ی BCG استفاده شد که در پایان ۲۲ نمای عددی برای گونه‌های مایکوباکتریوم توپرکلوزیس کمپلکس و ۵ نمای عددی برای زیر گونه‌های مایکوباکتریوم بوویس ب.ث.ژ. شناسایی شد (۹). مطالعه‌ای در مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی در ایران از روش VNTR بر پایه‌ی لوکوس‌های ETR و MPTR برای متمایز کردن الگوی ژنتیکی سویه‌های مایکوباکتریوم

کمپلکس شناسایی شد. با وجود این که گونه‌های مایکوباکتریوم توپرکلوزیس کمپلکس به عنوان عامل اصلی بیماری‌های ریوی در انسان شناخته شده‌اند، اما امروزه بسیاری از محققین، قدرت بیماری‌زایی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک را کمتر از این دسته نمی‌دانند. مطالعات انجام شده در دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که بیش از یک سوم مایکوباکتریوم‌های آتیپیک قادر به ایجاد بیماری‌های مختلف اعم از ریوی و غیرریوی در انسان می‌باشند (۱). این دسته به عنوان عوامل ایجادکننده‌ی بیماری که اکثرًا مقاوم به داروهای ضدسلی می‌باشند (۲) و به فراوانی در طبیعت یافت می‌شوند (۱، ۱۶)، دلیل نگرانی‌های بزرگی هستند که توجه بسیاری از باکتری‌شناسان را به خود جلب کرده است. با توجه به انتشار جهانی و الگوی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک، تشخیص سریع این دسته می‌تواند گام بزرگی در حل مسائل مطرح شده به حساب آید. روش‌های مولکولی متعددی برای تشخیص دقیق گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم پیشنهاد شده است، که از این میان روش PCR-RFLP از مزیت‌هایی همچون سریع و آسان بودن برخوردار است (۱۷) و (۱۸). هونگ کیم و همکارانش روش hsp65 جدیدی بر اساس تکثیر قطعه‌ی ۶۴۴ جفت بازی ژن hsp65 ارایه دادند. در این مطالعه، کلیدی ۲۵۱ نمونه با استفاده از این روش با موفقیت شناسایی شد (۵). چیمارا و همکارانش، مراحل تشخیصی برای hsp65 PCR-RFLP مطرح کردند و توانستند ۳۳۳ گونه مورد مطالعه را با استفاده از این روش در سطح گونه‌ای و زیر گونه‌ای مورد شناسایی قرار دهند (۴). از آنجا که این ژن به صورت حفاظت شده در گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم وجود دارد و از تنوع کافی برای تمایز این گونه‌ها برخوردار می‌باشد، گزینه‌ی مناسبی برای تکثیر در روش PCR-RFLP در مقایسه با گزینه‌های قبلی محسوب می‌شود (۱۷، ۱۹). در مطالعه‌ی حاضر، ۳۷۱ نمونه مورد بررسی به طور دقیق با استفاده از

مایکروبکتریوم اولسرانس و ۲۷ گونه مایکروبکتریوم مارینوم استفاده کردند و با بررسی ۱۵ لوكوس MIRU، در نهایت ۷ لوكوس مورد شناسایی قرار گرفت که برای این دو گونه دارای پلی مرفیسم بوده، قادر به تعیین الگوی ژنتیکی ۷ زیر گونه‌ی مایکروبکتریوم اولسرانس و ۵ زیر گونه‌ی مایکروبکتریوم مارینوم شد (۱۱). همان طور که در جدول شماره ۳ مشخص شده است، مایکروبکتریوم‌های اولسرانس، مارینوم و آویوم کمپلکس از گونه‌های آتیپیک مورد مطالعه ماند، نتایج به دست آمده از کاربرد لوكوس‌های MIRU به علت اختصاصی بودن آنها در گونه‌های نام برد، قابل تعمیم به بررسی انجام شده در این مطالعه نمی‌باشد.

مطالعات دیگری با استفاده از روش VNTR بر روی مایکروبکتریوم‌های اولسرانس صورت گرفته است. آبلوردی و همکارانش از روش VNTR برای تعیین الگوی ژنتیکی مایکروبکتریوم اولسرانس استفاده کردند. در این مطالعه، از ۱۹ لوكوس مورد بررسی، ۹ لوكوس دارای پلی مرفیسم در این گونه شناسایی شد در مطالعات اپیدمیولوژیکی مایکروبکتریوم‌های اولسرانس از اهمیت به سزاوی برخوردار می‌باشد (۲۴). در مطالعه‌ی دیگری که توسط هیلتی صورت گرفت لوكوس جدیدی در ژنوم مایکروبکتریوم اولسرانس برای استفاده در روش VNTR شناسایی شد. در این مطالعه، ۳۴ لوكوس از نظر پلی مرفیسم مورد ارزیابی قرار گرفت که در بسیاری از نمونه‌های مورد مطالعه، لوكوس‌هایی با ۱ یا ۲ تکرار (کپی) مشاهده شدند و فقط یک لوكوس دارای Agy99 پلی مرفیسم قابل قبولی در مایکروبکتریوم اولسرانس گزارش شد (۱۰). با وجود کارآمد بودن این مطالعات برای ژنوتیپ مایکروبکتریوم اولسرانس، عدم حضور این گونه در نمونه‌های آتیپیک مورد مطالعه‌ی استفاده از لوكوس‌های پلی مرفیک شناسایی شده را در مطالعه‌ی حاضر محدود ساخت، ضمن این که لوكوس‌های شناسایی شده در این باکتری اختصاصی می‌باشد. در مطالعات بسیاری، لوكوس

توبرکلوزیس ایرانی و افغانی استفاده کرد که در پایان لوكوس ETR-A به عنوان لوكوس بسیار افتراق دهنده در سویه‌های مورد نظر شناسایی شد (۲۱). با وجود این که در مطالعات نام برد از لوكوس‌های ETR و MPTR برای بررسی نوع گونه‌های مایکروبکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس به طور موققیت‌آمیزی استفاده شده است، اما آنالیز توالی‌های ژنومی در مایکروبکتریوم‌های آتیپیک نشان داده است که لوكوس‌های فوق در ژنوم این دسته دارای پلی مرفیسم نبوده و برای مطالعات اپیدمیولوژیکی مایکروبکتریوم‌های آتیپیک قابل استفاده نیستند (۱۱). بنابراین در بررسی حاضر، علاوه بر گونه‌های مایکروبکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس، ۴۳ گونه‌ی مایکروبکتریوم آتیپیک نیز وجود داشت و استفاده از لوكوس‌های ETR و MPTR در روش VNTR امکان پذیر نبود. در مطالعه‌ی دیگری مازار از لوكوس‌های MIRU در روش VNTR استفاده کرد. ۱۲ لوكوس (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units) MIRU برای ژنوتیپ مایکروبکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس شناسایی IS6110-RFLP شد که حساسیت آن بیشتر از روش MIRU-VNTR گزارش شد (۲۲). در بررسی فوق از روش MIRU-VNTR برای مطالعات اپیدمیولوژیکی گونه‌های مایکروبکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس استفاده شده است، اما در این بررسی‌ها مایکروبکتریوم‌های آتیپیک حضور نداشته و نتایج به دست آمده قابل مقایسه با بررسی ما که با حضور مایکروبکتریوم‌های آتیپیک انجام شده، نیست. در مطالعه‌ی دیگری که توسط علی صورت گرفت، روش MIRU-VNTR برای شناسایی ژنوتیپ شایع CASI در بین سویه‌های مایکروبکتریوم آویوم کمپلکس استفاده شد. در این مطالعه، ۱۲ لوكوس مورد بررسی قرار گرفت که همه‌ی آنها به عنوان لوكوس‌های بسیار متنوع برای تمایز سویه‌های مایکروبکتریوم آویوم کمپلکس معرفی شدند (۲۳). پرتال و همکارانش از روش MIRU-VNTR برای تعیین الگوی ژنتیکی ۳۹ گونه‌ی

مايكوباكتريوم‌های آتیپیک صورت نگرفته است. در مطالعه‌ی حاضر، لوکوس QUB3232 برای تیپینگ مايكوباكتريوم توبرکلوزیس کمپلکس معرفی شده است. کام، از لوکوس‌های QUB و ETR برای تمایز سویه‌های بیچینگ (شایع‌ترین سویه‌ی مايكوباكتريوم توبرکلوزیس) و غيربیچینگ استفاده کرد، که در پایان ۸۵ درصد از گونه‌های مايكوباكتريوم توبرکلوزیس کمپلکس مورد مطالعه، در این لوکوس دارای پلی‌مرفیسم بوده که با نتایج مطالعات قبلی همخوانی داشته است در حالی که وجود این لوکوس در گونه‌های آتیپیک مورد مطالعه، تأیید نشد.

نتیجه‌گیری

حضور لوکوس QUB3232 در مايكوباكتريوم توبرکلوزیس کمپلکس و عدم حضور آن در مايكوباكتريوم‌های آتیپیک، این لوکوس را به عنوان ابزار قدرتمندی برای تمایز این دو دسته مطرح ساخت که قادر بود گونه‌های آتیپیک را با حساسیتی برابر ۸۰ درصد از گونه‌های مايكوباكتريوم توبرکلوزیس کمپلکس تمایز دهد. بنابراین می‌توان بجای PCR-RFLP، لوکوس QUB3232 برای استفاده از روش VNTR برای تمایز، مايكوباكتريوم‌های آتیپیک از تیپیک مورد استفاده قرار داد.

منابع

- 1- Katoch VM: Infection due to non-tuberculous mycobacteria (NTM). *Indian J Med Res.* 2004; 20: 290-304.
- 2- Lee ES, Lee MY, Han SH, and Ka JO: Occurrence and molecular differentiation of environmental mycobacteria in surface waters. *J Microbiol Biotechnol.* 2008; 18: 1207-15.
- 3- AL-Mahruqi SH, Van-Ingen J, AL-Busaidy S, et al. Clinical relevance of non tuberculous

مايكوباكتريوم‌های آتیپیک به عنوان لوکوس بسیار پلی‌مرفیک و افتراق دهنده در گونه‌های مايكوباكتريوم توبرکلوزیس کمپلکس معرفی شده است. کام، از لوکوس‌های QUB و ETR برای تمایز سویه‌های بیچینگ (شایع‌ترین سویه‌ی مايكوباكتريوم توبرکلوزیس) و غيربیچینگ استفاده کرد، که در پایان ۲۴۳ گونه‌ی QUB3232 و ETR-A به عنوان افتراق دهنده‌ترین لوکوس‌ها برای ردیابی سویه‌های بیچینگ گزارش شدند (۱۲). در مطالعه‌ی دیگری وادا، ۲۴۳ گونه‌ی VNTR مايكوباكتريوم توبرکلوزیس را با استفاده از روش PIS6110-RFL با نتایج روش VNTR مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه نتایج به دست آمده از آنالیز ۱۶ لوکوس VNTR با نتایج روش PIS6110-RFL همخوانی داشته و گونه‌ها در ۵۷ دسته طبقه‌بندی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از لوکوس‌های QUB (QUB18, QUB3232, QUB11b) گونه‌های مورد مطالعه را تا ۰/۹ (HGI<۰/۹) افزایش داده، طبقه‌بندی دقیق‌تری برای این گونه‌ها فراهم کرده است (۱۴). اگر چه لوکوس QUB3232 در گونه‌های مايكوباكتريوم توبرکلوزیس کمپلکس دارای قدرت افتراق بالایی است، اما هنوز مطالعه‌ای مبنی بر پلی‌مرفیسم بودن این لوکوس در

mycobacteria, Oman. *Emery Infect Dis.* 2009; 15: 292-4.

- 4- Chimara E, Ferrazoli L, Ueky SY, et al. Reliable identification of mycobacterial species by PCR-restriction enzyme analysis (PRA)-hsp65 in a reference laboratory and elaboration of a sequence-based extended algorithm of PRA-hsp65 patterns. *BMC Microbiol.* 2008; 8: 48.
- 5- Kim H, Kim SH, Shim TS, et al. PCR restriction fragment length polymorphism analysis (PRA)-

- algorithm targeting 644 bp Heat Shock Protein 65(hsp65) gene for differentiation of *Mycobacterium* spp. *J Microbiol Methods.* 2005; 62: 199-209.
- 6- WU X, Zhang J, Liang J, et al. Comparison of three methods for rapid identification of mycobacterial clinical isolates to the species level. *J Clin Microbiol.* 2007; 45: 1898-903.
- 7- Farnia P, Masjedi MR, Varahram M, et al. The recent transmission of *Mycobacterium tuberculosis* Strains among Iranian and Afghan relapse cases: a DNA-fingerprinting using RFLP and spoligotyping. *BMC Infect Dis.* 2008; 8: 109.
- 8- Nasiri B, Farnia P, Nowroozi J, Karegar M. Study of genetical pattern of *Mycobacterium tuberculosis* by fingerprinting method. *J Artesh University.* 2008; 6: 59-64.
- 9- Frothingham R, Meeker-O'Connell WA. Genetic diversity in the *Mycobacterium tuberculosis* complex based on variable numbers of tandem DNA Repeats. *Microbiology.* 1998; 144: 1189-96.
- 10- Hilty M, Kaser M, Zinsstag J, Stinear T, Pluschke G. Analysis of the *Mycobacterium ulcerans* genome sequence reveals new loci for variable number tandem repeats (VNTR) typing. *Microbiol.* 2007; 153: 1483-7.
- 11- Stragier P, Ablordey A, Meyers WM, Portaels F. Genotyping *Mycobacterium ulcerans* and *Mycobacterium marinum* by using mycobacterial interspersed repetitive units. *J Bacteriol.* 2005; 187: 1639-47.
- 12- Kam K, Yip CW, Tse W, et al. Optimization of variable tandem repeat typing set for differentiating *Mycobacterium tuberculosis* strains in the Beijing family. *FEMS Microbiol Lett.* 2006; 256: 258-65.
- 13- Savine E, Warren RM, Van der Spuy GD, et al. Stability of variable-number tandem repeats, of mycobacterial interspersed repetitive units from 12 loci in serial isolates of *Mycobacterium tuberculosis*. *J Clin microbiol.* 2002; 40: 4561-6.
- 14- Wada T, Maeda Sh, Hase A, Kobayashi K Evaluation of variable number of tandem repeat as molecular epidemiological markers of *Mycobacterium tuberculosis* in Japan. *J Med Microbiol.* 2007; 56: 1052-7.
- 15- Kent PT, Kubica GP. Public health mycobacteriology. Public Heath Services, U.S. Department of Health and Human Services: Atlanta; 1985.
- 16- Hartmans S, Debont JAM, Stackebrandt E The genus *Mycobacterium*-nonmedical . *prokaryotes.* 2006; 3: 889-918.
- 17- Alcaide F, Richter I, Bernascoin C, et al. Heterogeneity and clonality among isolates of *Mycobacterium kansasii*: implications for epidemiological and pathogenicity studies. *J Clin Microbiol.* 1997; 35: 1959-64.
- 18- Devallois A, Goh KS, Rastogi N. Rapid identification of mycobacteria to species level by PCR-restriction fragment length polymorphism analysis of the hsp65 gene and proposition of an algorithm to differentiate 34 mycobacterial species. *J Clin Microbiol.* 1997; 35: 2969-73.
- 19- Hafner B, Haag H, Geiss HK, Nolte O. Different molecular methods for the identification of rarely isolated non-tuberculous mycobacteria

- and description of new hsp65 fragment length polymorphism patterns. *Mol Cell Probes.* 2004; 18: 59-65.
- 20- Skuce RA, McCorry TP, McCarroll JF, et al. Discrimination of *Mycobacterium tuberculosis* complex bacteria using novel VNTR-PCR targets. *Microbiology.* 2002; 148, 519-28.
- 21- Tageddin E, Farnia P, Karegar M, et al. Evaluation of genetical pattern of mycobacterium tuberculosis separated of Iranian and Afghan TB patients: using the VNTR typing method. *J Kurdistan University.* 2008; 31: 53-61.
- 22- Mazars E, Lesjean S, Banuls AL, et al. High-resolution minisatellite-based typing as a portable approach to global analysis of *Mycobacterium tuberculosis* molecular epidemiology. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2001; 98: 1901-6.
- 23- Ali A, Hasan Z, Tanveer M, et al. Characterization of *Mycobacterium tuberculosis* central asian strain 1 using mycobacterial interspersed repetitive unite genotyping. *BMC Microbiol.* 2007; 7: 76.
- 24- Ablordey A, Swings J, Hubans C, et al. Multilocus variable -number tandem repeat typing of *Mycobacterium ulcerans*. *J Clin microbial.* 2005; 43: 1546-51.

The Rapid Identification of Atypical Mycobacterium in Pulmonary Tuberculosis (PTB)

Patients: Evaluation of QUB3232 Locus Using the VNTR Method

Heidari F¹, Farnia P², Noroozi J³, Majd A⁴, Tajedin E⁵, Masjedi M⁶, Velayati A⁶

¹Azad University of Tehran, Tehran, Iran

²Mycobacteriology Research Center (MRC), National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

³Dept. of Microbiology, Azad University of Tehran, Iran

⁴Dept. of Biology, Azad University of Tehran, Iran

⁵Dept. of Microbiology, Azad University of Jahrom, Jahrom, Iran

⁶National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Corresponding Author: Heidari F, Mycobacteriology Research Center, Reference Laboratory of Tuberculosis, Masih Daneshvari Hospital, Tehran, Iran.

E-mail: fzheidari@yahoo.com

Received: 3 Dec 2008 **Accepted:** 13 Jul 2009

Background and Objective: Identification of *atypical mycobacterium* (*Non tuberculosis Mycobacterium*; NTM) is important because of the worldwide propagation of these organisms. Recently, molecular studies have identified the specific loci for mycobacterium species by DNA - finger printing methods, but these methods are time-consuming and expensive. In this study, in addition to *hsp65* PCR-RFLP method, QUB3232 locus was evaluated for differentiation of atypical mycobacterium from mycobacterium tuberculosis complex.

Materials and Methods: This study was performed on 371 pulmonary and non pulmonary specimens separated from patients with the symptoms of pulmonary tuberculosis (PTB). After the isolation and culturing of mycobacterium strains using the Lowenstein Jensen media, biochemical tests including production of Niacin, Catalase activity, Nitrate reduction, pigment production and growth rate were performed. Drug susceptibility testing was performed by proportional method. DNA extraction was performed by phenol-chloroform method. *hsp65* gene was amplified by PCR. Subsequently the amplicons were digested with three restriction enzymes namely *AvaII*, *HphI* and *HpaII* and electrophoresed on 3% agarose gel. QUB3232 locus was also evaluated for differentiation of atypical mycobacterium and mycobacterium tuberculosis complex.

Results: Out of 371 isolates, 32 (8.6%) were multi-drug resistant TB (MDR-TB), 184 (49.5%) were susceptible and 155 (42.5%) were non MDR (combined resistance) that 15% of MDR cases and 25% of non MDR cases were non tuberculosis mycobacterium. Out of 31 slow growing isolates, 58% were *M. simiae* and 19% were *M. kansasii*. The sensitivity of QUB3232 locus for differentiation of the atypical mycobacterium from mycobacterium tuberculosis complex was 80%.

From the total of 43 NTM samples, 12 (27.9%) were rapid growing and 72% were slow growing.

Conclusion: QUB3232 locus has the high discriminative power for differentiation of atypical mycobacterium from the mycobacterium tuberculosis complex, therefore, it can be used as a substitute for PCR-RFLP method.

Key words: *Atypical mycobacterium, VNTR, QUB3232 locus*