

مجله‌ی علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دوره‌ی ۱۹، شماره‌ی ۷۶، پاییز ۱۳۹۰، صفحات ۸۴ تا ۹۲

بررسی تولد نوزادان کم وزن در مادران باردار آلوده به تریکوموناس واژینالیس

دکتر عباسعلی نوریان^۱، نوشین شعبانی^۲، دکتر سید نورالدین موسوی‌نسب^۳، دکتر هالة رحمانپور^۴

nusha51978@yahoo.com

نویسنده‌ی مسئول: زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده‌ی پزشکی

دریافت: ۸۹/۶/۱۵ پذیرش: ۸۹/۱۲/۲۳

چکیده

زمینه و هدف: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که زنان باردار آلوده به تریکوموناس واژینالیس بیشتر در معرض خطر تولد نوزاد کم وزن و نارس قرار دارند. در این مطالعه ارتباط بین عفونت تریکوموناس واژینالیس با خطر تولد نوزاد کم وزن تعیین گردید.

روش بررسی: در این مطالعه هم‌گروهی (کوهروت) گلسته‌نگر، ۱۰۰۰ زن باردار با سن بارداری ۲۱ هفته یا بیشتر، در دو بیمارستان شهر زنجان، در زمان وضع حمل از نظر عفونت تریکومونیازیس به دو روش کشت و میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی زنان آلوده (۳۳ نفر) و ۱۰۷ غیرآلوده که به روش نمونه‌گیری هدفدار از نوع سهمیه‌ای انتخاب شده بودند، با یکدیگر مقایسه شدند. مشخصات دموگرافیک و پارامترهای زنان و زایمان با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس وزن تولد نوزادان از پرونده مادران استخراج و درج گردید.

یافته‌ها: میزان شیوع عفونت تریکوموناس واژینالیس ۳۳ درصد (۳۳ مورد) بود. میانگین سن بارداری زنان آلوده در زمان وضع حمل به طور معناداری کمتر از زنان غیرآلوده بود ($4/5 \pm 36/5$ هفته در مقابل $1/9 \pm 39$ هفته، $P=0.009$). پاریته بالاتر و شهربنشینی با افزایش معنادار خطر تریکومونیازیس واژینال همراه بود ($P<0.005$). هیچ ارتباط آماری معناداری بین عفونت تریکوموناس واژینالیس با سطح تحصیلات، روش زایمان، میزان درآمد خانوار و فراوانی موارد وزن کم هنگام تولد (*LBW*) مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: عفونت تریکوموناس واژینالیس با سن کم بارداری در زمان وضع حمل و پاریته بالاتر مرتبط است و هیچ رابطه‌ای بین تریکومونیازیس مادران باردار و کم وزنی نوزادان آن‌هادر سه ماهه اخر بارداری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: تریکوموناس واژینالیس، زنان باردار، وزن کم هنگام تولد (*LBW*)

مقدمه

در مردان ساکن می‌شود و ایجاد واژینیت در زنان و اورتیریت در مردان می‌کند (۱). ۵۰ تا ۷۵ درصد زنان آلوده، بدون علامت هستند (۲). اما، حدود ۳۰ درصد آن‌ها در صورت پی‌گیری به مدت شش ماه ممکن است علامت دار شوند (۳).

تریکومونیازیس یکی از شایع‌ترین عفونت‌های منتقله از راه جنسی (STI) است که توسط تریکوموناس واژینالیس ایجاد می‌شود (۴). این تک یاخته در واژن، مخصوصاً قسم سروویکس در زنان و مجرای اورتی، پرپوس و پروستات

۱- دکترای تخصصی انگل‌شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۳- دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۴- متخصص زنان و زایمان، فلوشیب نازایی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

وجود رابطه به طور یقین و نیز عدم انجام چنین مطالعه‌ای در ایران در رابطه با این انگل، بر آن شدیم که مطالعه‌ای در جهت شناسایی خانم‌های باردار آلووده در سه ماهه‌ی آخر بارداری و میزان تولد نوزادان کم وزن آن‌ها طراحی نماییم و وجود یا عدم وجود رابطه معنی‌دار را بررسی نماییم.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه‌ی مشاهده‌ای تحلیلی از نوع همگروهی بود. در این مطالعه نمونه‌گیری به صورت غیراحتمالی از ۱۰۰۰ نفر خانم باردار که جهت وضع حمل به زایشگاه‌های بیمارستان‌های آیتا... موسوی و امام حسین (ع) شهر زنجان از ابتدای تیر ۸۸ تا آخر خرداد ۸۹ مراجعته نمودند، صورت گرفت و به روش مستقیم (با حساسیت ۵۸ تا ۸۲ درصد) و کشت (۹۵ درصد) مورد بررسی قرار گرفتند (۲۱). بدین صورت که ابتدا ضمن هماهنگی و اخذ رضایتمندی مادران بعد از پر کردن پرسشنامه که شامل متغیرهای سن، وزن، قد، میزان تحصیلات، محل سکونت، شغل، سطح درآمد، نوع و تعداد زایمان و سن حاملگی می‌شد، روی تخت معاینه قرار گرفته سپس با استفاده از ۲ سواب پنبه‌ای استریل به صورت واژینال نمونه‌برداری شد. یکی از سواب‌ها را داخل لوله حاوی ۱ سی سی سرم فیزیولوژی قرار داده، بعد از تهیه‌ی لام زیر میکروسکوپ نوری بررسی کردیم. سواب دیگر در محیط کشت دورسه و سپس داخل انکوباتور ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده، در فواصل زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت از نظر رشد تک یاخته پیگیری شد. لازم به ذکر است که افراد با داشتن خونریزی بیش از حد Spotting و سابقه‌ی چند قلوبی زایی و بیماری‌های زمینه‌ای و سقطهای مکرر و مصرف آنتی‌بیوتیک در ۱ ماه اخیر و BMI کمتر از ۱۸/۵ و بیشتر از ۳۵ کیلوگرم بر متر مربع از مطالعه خارج شدند. سپس زنان بارداری که نتیجه‌ی تست تریکوموناس آن‌ها مثبت بود به عنوان گروه

نشانه‌های تریکومونیازیس می‌تواند ترشحات واژینال خفیف تا شدید، کف‌آلود، بدبو، خارش، قرمزی، تورم، مقاومت دردناک، سوزش، تکرار ادرار، لکه بینی بعد مقاومت، قاعده‌گی دردناک و سرویکس ملتهب با نقاط قرمز یا زرد به نام سندرم توت‌فرنگی باشد (۶۵). البته نشانه‌های مشخص بالینی فقط در ۱۲ درصد از بیماران مبتلا دیده شده است (۷). زنان در سنین باروری، مخصوصاً ۲۰ تا ۴۶ سالگی، بیشترین میزان بروز را دارند (۴). مطالعات انجام شده، میزان بروز سالانه تریکومونیازیس را بیش از ۱۷۰ میلیون نفر در جهان تخمین زده است (۱). سالانه ۵ میلیون مورد جدید ابتلا در آمریکا گزارش می‌شود (۴). همچنین، ۲۰ درصد زنان باردار آمریکایی آلووده هستند (۸). در نقاط مختلف ایران، میزان شیوع بیماری از ۱ تا ۴۲ درصد متفاوت است (۹). در یک بررسی به عمل آمده در شهر زنجان، میزان شیوع ۶/۲۵ درصد گزارش شده است (۱۰). با توجه به برخی از مطالعات، از عوارض مرتبط با تریکومونیازیس، افزایش میزان تولد نوزادان کم وزن (Low Birth Weight) و زایمان‌های زودرس می‌باشد (۱۱-۱۴). تولد نوزادان کم وزن و نارس از عوارض اولیه‌ی بروز بسیاری از بیماری‌ها و افزایش میزان مرگ و میر نوزادان در سراسر دنیا می‌باشد (۱۵)، به طوری که ۷۰ درصد مرگ شیرخواران به این علت رخ می‌دهد (۱۶). از دیگر مشکلات این‌گونه نوزادان، اختلالات تنفسی، قلبی- عروقی، خونی، گوارشی، متابولیک و غدد، سیستم اعصاب مرکزی، کلیوی، عفونت‌ها (۱۷) و همچنین مشکلات روانی و اجتماعی، ناتوانی‌های جسمی، ناسازگاری‌ها و مشکلات رفتاری بروز یافته در سنین بالاتر می‌باشد (۱۸-۱۹). سالانه ۱۶ درصد کل تولددها را نوزادان کم وزن تشکیل می‌دهند (۲۰) و از آنجایی که بنا بر برخی از مطالعات زنان حامله آلووده به تریکومونیازیس، دارای ۳۰ درصد ریسک بیشتر برای به دنیا آوردن نوزادان کم وزن و زودرس می‌باشند (۱۱)، همچنین به دلیل کمبود مطالعات در این خصوص و مشخص نبودن

مادران باردار مورد مطالعه، از بین مادران باردار غیر آلوده، تعداد ۱۰۷ مادر که از نظر ویژگی‌های دموگرافیک با مادران غیرآلوده همخوانی بیشتری داشتند، انتخاب شدند و با توجه به اهداف مطالعه، مورد مقایسه قرار گرفتند. بر طبق نتایج ارزیابی صورت گرفته، اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین شاخص توده‌ی بدنی زنان باردار آلوده و غیرآلوده به تریکومونیازیس مشاهده نشد (به ترتیب: $3/5 \pm 28/2$ کیلوگرم بر متر مربع در مقابل $3/3 \pm 27/5$ کیلوگرم بر متر مربع، $P=0/286$). میانگین سن بارداری زنان آلوده به تریکومونیازیس در زمان وضع حمل، $4/5 \pm 36/5$ هفته و میانگین سن بارداری زنان غیرآلوده به تریکومونیازیس $39/1 \pm 1/9$ هفته بود. این اختلاف با استفاده از آزمون من ویتنی حاکی از پایین‌تر بودن معنی‌دار سن بارداری زنان آلوده به تریکومونیازیس در زمان وضع حمل بود ($P=0/009$). بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی اخیر، میانگین مرتبه‌ی بارداری (پاریته) قبلی زنان آلوده به تریکومونیازیس به طور معنی‌داری بالاتر از زنان غیرآلوده به تریکومونیازیس بود (به ترتیب: $1/3 \pm 1/3$ (میانه یک) در مقابل $0/9 \pm 0/7$ (میانه صفر)، $P=0/004$). میزان فراوانی موارد آلودگی به تریکومونیازیس در بین زنان باردار شهری به طور معنی‌داری بالاتر از زنان باردار روستایی بود ($P=0/04$). جدول ۱).

مورد در نظر گرفته شد. نمونه‌های گروه شاهد نیز از بین زنان حامله‌ای که از نظر سن و نوع زایمان با نمونه‌های گروه مورد مطابقت داشته، در عین حال تست تریکوموناس آن‌ها منفی بود، به طور تصادفی انتخاب شدند. ضمناً اطلاعات مربوط به وزن نوزاد متولد شده شرکت‌کنندگان در مطالعه، به صورت روزانه از پرونده‌ی مادران استخراج شده، در پرسشنامه مربوطه درج گردید. کلیه اطلاعات لازم با انجام آزمون تی‌مستقل Independent Sample T Test و من ویتنی Mann Whitney و آزمون کای دو Chi Square و آزمون Fisher's Exact مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقدار P-value کمتر از $0/05$ معنی‌دار تلقی گردید.

یافته‌ها

در این مطالعه تعداد ۱۰۰۰ زن باردار با حداقل سن حاملگی ۲۸ هفته که جهت وضع حمل به یکی از زایشگاه‌های دو بیمارستان آیت‌الله موسوی و امام حسین شهر زنجان مراجعه نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمون دید مستقیم و نیز کشت نمونه‌های تهیه شده از واژن زنان باردار مورد مطالعه حاکی از آلوده بودن $3/3$ درصد (۳۳ نفر) از نمونه‌های مورد مطالعه به تریکوموناس واژینالیس بود. با توجه به شیوع $3/3$ درصدی تریکومونیازیس در بین

جدول ۱: توزیع فراوانی آلودگی مادران باردار مورد مطالعه به تریکومونیازیس به تفکیک محل سکونت آن‌ها

مجموع	آلودگی به تریکومونیازیس		محل سکونت
	ندارد	دارد	
(۱۰۰) ۵۸۴	(۹۵/۷) ۵۵۹	* (۴۲/۳) ۲۵	شهر
(۱۰۰) ۴۱۶	(۹۸/۱) ۴۰۸	(۱/۹) ۸	روستا
(۱۰۰) ۱۴۰	(۹۶/۷) ۹۶۷	(۳/۳) ۳۳	مجموع
$P=0/04$		* اعداد داخل و خارج پرانتز به ترتیب بیانگر درصد و تعداد می‌باشند.	

به تریکومونیازیس در بین زنان باردار با سطح تحصیلات پایین‌تر بیشتر از زنان دارای سطح تحصیلات بالاتر بود، اما بر طبق نتایج آزمون دقیق فیشر این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود ($P = 0.059$) (جدول ۳).

۳/۴ درصد از زنان باردار خانه‌دار آلوود به تریکومونیازیس بودند. این در حالی بود که با توجه به کم بودن زنان باردار شاغل، هیچ موردی از آلوودگی در بین این زنان مشاهده نشد ($P = 0.288$). اگر چه میزان فراوانی موارد آلوودگی

جدول ۲: توزیع فراوانی آلوودگی مادران باردار مورد مطالعه به تریکومونیازیس به تفکیک شغل آن‌ها

مجموع	آلوودگی به تریکومونیازیس		شغل
	ندارد	دارد	
(100) 968	(96/8) 935	* (3/4) 23	خانه‌دار
(100) 32	(100) 32	0	شاغل
(100) 1000	(96/7) 967	(3/3) 33	مجموع
$P = 0.288$		* اعداد داخل و خارج پرانتز به ترتیب بیانگر درصد و تعداد می‌باشند.	

جدول ۳: توزیع فراوانی آلوودگی مادران باردار مورد مطالعه به تریکومونیازیس به تفکیک سطح تحصیلات آن‌ها.

مجموع	آلوودگی به تریکومونیازیس		سطح تحصیلات
	ندارد	دارد	
(100) 124	(94/4) 117	* (5/6) 7	بی‌سواد
(100) 597	(96/1) 574	(3/9) 23	سیکل
(100) 197	(98/5) 194	(1/5) 3	دیپلم
(100) 82	(100) 82	0	دانشگاهی
(100) 1000	(96/7) 967	(3/3) 33	مجموع
$P = 0.059$		* اعداد داخل و خارج پرانتز به ترتیب بیانگر درصد و تعداد می‌باشند.	

جدول ۴: توزیع فراوانی آلوودگی مادران باردار مورد مطالعه به تریکومونیازیس به تفکیک سطح درآمد خانوار آن‌ها

مجموع	آلوودگی به تریکومونیازیس		سطح درآمد خانوار (هزار تومان)
	ندارد	دارد	
(100) 506	(96/8) 490	* (3/2) 16	< 250
(100) 376	(96/5) 363	(3/5) 13	250-300
(100) 118	(96/6) 114	(3/4) 4	> 300
(100) 1000	(96/7) 967	(3/3) 33	مجموع
$P = 0.969$		* اعداد داخل و خارج پرانتز به ترتیب بیانگر درصد و تعداد می‌باشند.	

جدول ۵: مقایسه‌ی بین میانگین وزن هنگام تولد نوزادان مادران باردار مورد مطالعه به تکیک آلدگی آن‌ها به تریکومونیازیس.

P-Value	۹۵٪ CI	اختلاف میانگین	وزن نوزاد (گرم)		گروه‌بندی مادران انحراف معیار ± میانگین
			آلدود	غیر آلدود	
۰/۳۶۵	-۱۰۹/۹ تا ۱۹۰/۸	۱۵/۵	۳۱۴۸/۲ ± ۶۵۳/۷	۳۱۳۲/۷ ± ۳۵۹/۶	

نبود. به علاوه، اختلاف معناداری بین میانگین وزن هنگام تولد نوزادان مادران آلدود و غیرآلدود و نیز میزان فراوانی موارد وزن کم هنگام تولد (LBW) نوزادان دو گروه مشاهده نشد. تریکومونیازیس از شایع‌ترین عفونت‌های دستگاه ادراری- تناسلی انسان است. میزان شیوع این عفونت در نقاط مختلف دنیا و حتی نقاط مختلف کشورمان نیز بسیار متفاوت است. بدیهی است که صرف نظر از عوامل نژادی و فرهنگی، انتخاب بیماران از بین مراجعین به درمانگاه‌های بیماری‌های مقایبی و یا افراد دچار نقص سیستم ایمنی نیز در بالا بودن این ارقام تاثیرگذار هستند. همچنین می‌توان به تفاوت در نوع و ترکیب جمعیت مورد مطالعه (شامل سن نمونه، میزان تأهل، سن ازدواج، سطح تحصیلات، ...) عوامل فرهنگی نظری افزایش آگاهی مردم در مورد بیماری‌های متقله از راه تماس جنسی و نیز رواج استفاده از وسایل مختلف پیشگیری از بارداری نظری کاندوم نیز اشاره کرد. بر اساس یافته‌های مطالعه ما، میانگین دفعات بارداری (پاریته) زنان آلدود به این انگل به طور معنی‌داری بالاتر از زنان غیرآلدود مورد مطالعه بود. در مطالعه صورت گرفته در شهر یزد (۲۲) نیز ارتباط معنی‌داری بین شیوع ابتلا به تریکومونیازیس با تعداد دفعات زایمان به دست آمد. اما در مطالعه صورت گرفته در شهرستان رباط کریم (۲۳)، ارتباط معنی‌داری بین دفعات زایمان با آلدگی به تریکومونیازیس مشاهده نشد. بر خلاف مطالعه‌ی ما، در مطالعه‌ی اطمینان راد (۲۲) میزان آلدگی در بین زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود. اما، با وجود بالاتر بودن

بر طبق یافته‌های مطالعه‌ی ما، ارتباط آماری معنی‌داری بین فراوانی موارد آلدگی به تریکومونیازیس با سطح درآمد خانوار مادران باردار مورد مطالعه مشاهده نشد ($P=0/۹۶۹$). جدول ۴. نتایج حاصل از مقایسه‌ی وزن هنگام تولد نوزادان زنان باردار آلدود و غیرآلدود به تریکومونیازیس، اختلاف معنی‌داری را بین میانگین وزن نوزادان دو گروه نشان نداد ($P=0/۳۶۵$). جدول ۵.

بحث

یافته‌های مطالعه‌ی اخیر حاکی از شیوع ۳/۳ درصدی تریکومونیازیس، هم بر اساس شیوه‌ی تشخیصی گسترش مرطوب و هم بر اساس کشت در محیط دورسه، در بین زنان باردار با سن بارداری بیشتر از ۲۸ هفته که به علت شروع دردهای زایمانی به دو مرکز درمانی آیت‌الله موسوی و امام حسین شهر زنجان مراجعه نموده بودند، بود که نشانگر عدم وجود اختلاف بین دو روش گسترش مرطوب و کشت و اهمیت بالای روش مستقیم در صورت تشخیص سریع این انگل می‌باشد. بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی ما، میانگین دفعات بارداری (پاریته) زنان آلدود به این انگل به طور معناداری بالاتر از زنان غیرآلدود مورد مطالعه بود. همچنین، میزان آلدگی در بین زنان شهری به طور معناداری بالاتر از زنان روستایی بود. اگر چه میزان آلدگی در بین زنان دارای سطح تحصیلات پایین‌تر و نیز دارای درآمد خانوار بیشتر، در مقایسه با سایر زنان بالاتر بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنادار

مشاهده‌ی خطر افزایش یافته این عواقب، نیز مشاهده نشده است. انجام نمونه‌گیری در ماههای آخر بارداری و حین زایمان یکی از دلایل احتمالی عدم مشاهده این اختلاف ورد شدن فرضیه در این مطالعه می‌باشد. البته زمان ناکافی، فقدان نمونه‌های بیشتر و نیروی انسانی ناکافی، عدم استفاده از روش‌های دقیق تر به علت نیاز به بودجه بالاتر می‌توانند از دلایل احتمالی این یافته باشد.

نتیجه‌گیری

بر اساس یافته‌های این مطالعه، عفونت تریکوموناس واژینالیس با سن کم بارداری در زمان وضع حمل و پاریته بالاتر مرتبط است و نیز هیچ ارتباطی بین تریکوموناس واژینالیس مادران باردار و کم وزنی نوزادان آن‌ها در سه ماههای آخر بارداری مشاهده نشد.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مسئولین محترم بیمارستان‌های امام حسین (ع) و موسوی شهر زنجان به خصوص بخش‌های آزمایشگاه و مدارک پزشکی بیمارستان امام حسین (ع) صمیمانه سپاس‌گزاری می‌شود.

میزان آلدگی در بین زنان شهری و روستایی در مطالعه‌ی حبیبی‌پور (۲۴)، این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. اگر چه در مطالعه ما میزان آلدگی در بین زنان دارای سطح تحصیلات پایین‌تر و نیز دارای درآمد خانوار بیشتر، در مقایسه با سایر زنان بالاتر بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. برخلاف مطالعه‌ی ما، در مطالعه صورت گرفته در شهر همدان (۲۴)، میزان آلدگی مشاهده شده در بین زنانی که از نظر اقتصادی ضعیفتر بودند، بیشتر بود. البته، در این مطالعه نیز همچون مطالعه‌ی ما ارتباط معنی‌داری بین میزان آلدگی و سطح تحصیلات نمونه‌ها مشاهده نشد. در مطالعه‌ی صورت گرفته در شهرستان رباط کریم (۳۳) نیز ارتباطی بین سطح تحصیلات و میزان آلدگی به تریکومونیازیس مشاهده نشد. برخلاف فرضیه‌ی مطالعه، در این مطالعه هیچ‌گونه اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین وزن هنگام تولد نوزادان مادران آلدده و غیرآلدده و نیز میزان فراوانی موارد وزن کم هنگام تولد (LBW) نوزادان دو گروه مشاهده نشد. برخلاف مطالعه‌ی ما، یافته‌های مطالعه کچ و همکاران (۱۳) حاکی از آن بود که تریکوموناس واژینالیس با افزایش ۴۰ درصدی موارد وزن کم هنگام تولد (LBW) و افزایش ۳۰ درصدی وزن کم هنگام تولد و زایمان زودرس همراه بود. البته در برخی از مطالعات دیگر (۲۵) ارتباط معنادار بین عفونت‌های واژینال با پیامدهای ناگوار بارداری در ۳ ماههای آخر، علی‌رغم

References

- 1- Faro S. Vaginitis: differential diagnosis and management. New York: Parthenon Publishing Group; 2004.
- 2- Edrisian Q, Rezaian M, Qorbani M, Keshavarz H, Mohebali M. *Medical porotozoology*. Tehran: Tehran Uni Pub; 2006.
- 3- Sobel JD. What's new in bacterial vaginosis

- and trichomonas? *Infect Dis Clin N Am*. 2005; 19: 387-406.
- 4- Nelson AL, Woodward JA. Sexually transmitted diseases: A Practical Guide for Primary Care. New Jersey: Humana Press; 2006.
- 5- Saebi E. Parasitic diseases in Iran: protozoa. Tehran: Aijj Pub, 2005.

- 6- Petrin D, Delgaty K, Bhatt R, Garber G. Clinical and microbiological aspects of *Trichomonas vaginalis*. *Clin Microbiol Rev.* 1998; 11: 300-17.
- 7- Fouts AC, Kraus SJ. *Trichomonas vaginalis*: Reevaluation of its clinical presentation and laboratory diagnosis. *J Infect Dis.* 1980; 141: 137-43.
- 8- Carber GE. The laboratory diagnosis of trichomonas vaginalis. *Can J Infect Dis Med Microbiol.* 2005; 16: 35-8.
- 9- Valadkhani Z, Assmar M, Esfandiari B, et al. Trichomoniasis in Asymptomatic patients, *Iranian J Pub Health.* 2008; 37: 113-7.
- 10- Gharib Z. Prevalence of *Trichomonas vaginalis* in pregnant women referred to Vali-e-Asr hospital North-West of Iran, Zanjan. [Dissertation] 2004 .
- 11- Riggs MA, Klebanoff MA. Treatment of vaginal infections to prevent preterm birth: a meta-analysis. *Clin Obstet Gynecol.* 2004; 47: 796-807.
- 12- Hay P, Czeizel AE. Asymptomatic trichomonas and candida colonization and pregnancy outcome. *Clin Obstet Gynecol.* 2007; 21: 403-9.
- 13- Cotch MF, Pastorek JG 2nd, Nugent RP, et al. *Trichomonas vaginalis* associated with low birth weight and preterm delivery. The vaginal infections and prematurity study group. *Sex Transm Dis.* 1997; 24: 353-60.
- 14- Hillier SL, Nugent RP, Eschenbach MD, et al. Vaginal infections in pregnancy study group. Association between bacterial vaginosis and preterm delivery of a low birth weight infant. *N Engl J Med.* 1995; 333: 1737-42.
- 15- Zahed Pasha Y, Esmaiili Duki M, Hajji Ahmadi M. Effects of some risk factors in low-birth weight. *Sci J babol Med Uni.* 2004; 6: 18-24.
- 16- Nayyeri F, Amini E, Shariat M, Mansouri B. Life hope & outcome appearance in infants with low birth weight less than 1000 g. *Sci J Tehran Med Uni.* 2008; 66: 288-93.
- 17- Alexander GR, Wingate MS, Mor J, Boulet S. Birth outcomes of Asian-Indian-Americans. *Int J Gynaecol Obstet.* 2007; 97: 215-20.
- 18- Mansour E, Eissa AN, Nofal LM, Kharboush I, Reda AA. Morbidity and mortality of low-birth-weight infants in Egypt. *East Mediterr Health J.* 2005; 11: 723-31.
- 19- Mansell LW, Bradley RH, Casey PH, Fusell JS, Coners-Burrow NA. Do difficult temperament and family conflict increase the likelihood of behavioral maladjustment in children born low birth weight and preterm? *J Pediatr Psycol.* 2009; 34: 396-40.
- 20- Marandi SA, Soltanzadeh MJ. Newborns diseases. Tehran: Tehran Pub; 1997.
- 21- Karen A. Trichomoniasis: What's New? *Curr Infect Dis Rep.* 2003; 5: 129-34
- 22- Etminan Rad S, Bokaii M. Investigation of Trichomoniasis infection in women referred to clinic of gynaecology and hygienic centers of Yazd, 2006. *Sci J Health.* 2007; 2: 14-20.
- 23- Akhlaghi L, Falahati M, Jahani Abyaneh M, Urmazdi H, Amini M. Prevalence of *Trichomonas*

vaginalis and *Candida albicans* in women referred to Hygienic centers of Robat-e-Karim and comparative estimation of loffler and diluted carbol-Fushin dyes in their rapid daiagnosis. *Sci J Iran Med Uni.* 2005; 12: 7-12.

24- Habibipour R, Amirkhani A, Matin nya N. Rate of *Trichomonas vaginalis* infection in women referred to public security hospitals of

Hamedan, 2004. *J Tabib-e-Shargh.* 2006; 8: 245-51.

25- Riduan JM, Hillier SL, Utomo B, Wiknjosastro G, Linnan M, Kandun N. Bacterial vaginosis and prematurity in Indonesia: association in early and late pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 1993; 169: 175-8.

Association of *Trichomonas vaginalis* with Low Birth Weight

Nourian A¹, Shabani N¹, Mousavi nasab N², Rahmanpour H³

¹Dept. of Parazitology, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

²Dept. of Social Medicine, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

³Ayatollah Mousavi Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Corresponding Author: Shabani N, Dept. of Parazitology Zanjan University of Medical sciences, Zanjan, Iran.

E-mail: nusha51978@yahoo.com

Received: 6 Sep 2010 **Accepted:** 14 Mar 2011

Background and Objective: Available information suggests that pregnant women infected with *Trichomonas vaginalis* may be at increased risk of preterm delivery and low birth weight (LBW). This study evaluated the association between *T. vaginalis* infection and the risk of LBW.

Materials and Methods: In this cohort study, we evaluated 1000 pregnant women (gestational age ≥ 28 weeks) for trichomoniasis by using direct and culture methods at the time of delivery at two hospitals of Zanjan, Iran. All the infected women (33 cases) and non-infected women (107) who had been selected with purposive quota sampling were compared with each other. Questionnaires were used to collect demographic and obstetric parameters. Consequently, infants' weights were recorded using mothers' files.

Results: The prevalence of *T. vaginalis* infection was 3.3% (33 cases). Mean gestational age of the infected women at the time of delivery was significantly less than the non-infected (36.5 ± 4.5 weeks vs. 39 ± 1.9 weeks; $P = 0.009$). Higher parity, and living in city were significantly associated with the increased risk of vaginal trichomoniasis ($P < 0.05$). No significant association was found between the *T. vaginalis* infection and degree of education, type of delivery, family income, and frequency of LBW.

Conclusion: The results of this study suggest that, *T. vaginalis* infection may be associated with low gestational age and higher parity at the time of delivery. However, no significant association was found between the *T. vaginalis* infection and LBW in the third trimester of pregnancy.

Keywords: *Trichomonas vaginalis*, Pregnant women, Low birth weight (LBW)