

بررسی کارایی تکنیک تکثیر دایرہ‌ای چرخان برای تشخیص سریع قارچ کلادوفیالوفورا کاریونی و کلادوفیالوفورا یگرزوی

حسین حمزه‌بی^۱، دکتر حمید بدله^۲، دکتر مهدی رهنما^۳، محسن اجلی^۱

نویسنده‌ی مسؤول: زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان badalii@yahoo.com

دریافت: ۹۰/۸/۲۲ پذیرش: ۹۱/۱/۱۹

چکیده

زمینه و هدف: روند مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که نه تنها بیماری‌های قارچی به طور قابل چشم‌گیری به خصوص در بیماران با نقص سیستم ایمنی در حال افزایش است، بلکه کاهش حساسیت عوامل قارچی به داروهای ضد قارچی نیز در حال افزایش می‌باشد. بنابراین تشخیص سریع و زود هنگام در حاد گونه برای انتخاب داروی مناسب و مدریت بالینی ضروری است. با این وجود روش‌های استاندارد تشخیصی وقت‌گیر، هزینه برواز حساسیت کمی برخوردار می‌باشند لذا برای فایق آمدن بر هر کدام از مشکل‌های ذکر شده، ابزارهایی مبتنی بر PCR توسعه یافته‌اند. در این مطالعه از روشی که علی‌رغم سرعت بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده به نام تکنیک تکثیر دایرہ‌ای چرخان برای تشخیص دقیق‌تر و صحیح‌تر دو گونه قارچی کلادوفیالوفورا کاریونی و کلادوفیالوفورا یگرزوی استفاده شد.

روش بررسی: در این بررسی به طور اختصاصی از ناحیه‌ی رونویسی ITS rDNA از مجموعه‌ی ژنی DNA های ریبوزومی جنس کلادوفیالوفورا که قبلا تعیین توالی شده بودن، استفاده گردید و پروب‌های اختصاصی بر اساس تفاوت تنها در یک نوکلئوتید از ناحیه‌ی ITS rDNA برای قارچ‌های کلادوفیالوفورا کاریونی و کلادوفیالوفورا یگرزوی طراحی گردید. پروب‌ها در اصل توالی مکمل هدف متنبی به جایگاه لینکر می‌باشد که پس از هیبریداسیون با DNA به شکل یک مولکول بسته در آمد، با اتصال به هدف و تکثیر در شرایط تک دمایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج این تحقیق یک تکنیک DNA کاملاً موفق را بدون نتایج مثبت و منفی کاذب و تشخیص در حد گونه نشان داد. محصول نتایج RCA در ژل آگارز ۱/۵ درصد به صورت نرdbانی نشان داده شد و واکنش مذکور در جهت تکثیر DNA هدف به طور اختصاصی در اتصال با پروب در کمترین زمان نسبت به روش‌های متداول تایید گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی قادرت و دقت این تکنیک در شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی در حد گونه با سرعت و اختصاصیت بسیار بالا در مقایسه با روش‌های شناسایی قدیمی می‌باشد و این تکنیک می‌تواند کاربرد فراوانی در کلیه‌ی آزمایشگاه‌های تشخیصی داشته باشد بنابراین RCA تفاوت بسیار چشم‌گیری را با دیگر تکنیک‌های وابسته به دما بر پایه‌ی DNA برخوردار می‌باشد.

واژگان کلیدی: تکثیر دایرہ‌ای چرخان، کلادوفیالوفورا کاریونی، کلادوفیالوفورا یگرزوی، کرومobilastomakozis

۱- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

۲- دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

۳- دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

و همکاران از کاکتوس جداسازی شد و بیماری زایی آن هنوز به اثبات نرسیده است (۷۰ و ۷۱). امروزه با افزایش کیفیت استانداردهای بهداشتی لزوم به پیشگیری و نهایتاً درمان سریع بیماری اجتناب‌پذیر می‌باشد. در این راستا یکی از ابزارهای مهم، تشخیص به موقع و دقیق می‌باشد که یکی از عوامل اصلی کنترل کیفی در کلیه‌ی زمینه‌های بهداشتی و درمانی است. با پیشرفت‌های انجام شده در علم ژنتیک راهکارهایی در پیش روی محققین قرار گرفته است که توسط آن توانسته‌اند قدم‌های بسیار بلندی در امر تسریع کنترل کیفی و تشخیص بیماری بردارند. یکی از تحولات عظیم در بحث ژنتیک و به تعیین آن تشخیص طبی، اختراع روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز می‌باشد (۷۲ و ۷۳). با این وجود به تکنیک PCR نیز اشکالاتی وارد است که از آن جمله می‌توان به لزوم وجود دستگاه گران قیمت ترمال سایکلر، وقت‌گیر بودن تکنیک، احتمال آلودگی و ایجاد واکنش‌های ناخواسته، عدم امکان اجرای تکنیک در شرایط آزمایشگاهی معمول، عدم تشخیص اختصاصی در حد گونه و پایین بودن حساسیت و همینطور پیچیدگی روش کار اشاره کرد که هر کدام محدودیت‌هایی را در پیش‌پایی متخصصین قرار داده است (۷۴-۷۵). خوشبختانه با ایجاد پایگاه داده‌های ژنی (Gene Bank) و پروتئینی محققین به روش‌هایی دست یافته‌اند که به کمک علم نوپایی بیوانفورماتیک می‌توان روش‌هایی بسیار دقیق‌تر، اختصاصی‌تر و سریع‌تر از تکنیک‌های متدالو مولکولی که بسیار گران قیمت و نیاز به متخصصین مجروب نیز دارد در علوم تشخیصی ارایه نمود (۷۶ و ۷۷). یکی از روش‌هایی که امروزه توسط محققین بسیار مورد توجه قرار گرفته است روش‌های ایزوترمال است در این روش بدون نیاز به اعمال تناوب دمایی تکثیر DNA امکان پذیر می‌گردد. یکی از این تکنیک‌ها RCA می‌باشد که به دلیل اختصاصیت فوق العاده بالا آن بسیار مورد توجه است؛ لذا از یک پرروب بسته برای شناسایی

مقدمه

کلادولیالوفورا از جنس قارچ‌های شبه مخممری سیاه متشكل از تعدادی گونه‌های کلینیکی مهم و سویه‌های محیطی قابل توجه تشکیل شده است. گونه‌های این قارچ اغلب باعث ایجاد عفونت در انسان می‌شود و باعث به وجود آمدن ضایعات پوستی خفیف تا آنسفالیت کشنده می‌گردد. گونه‌ی کاریونی از کلادولیالوفورا عامل کروموبلاستومایکوزیس پوستی و زیرجلدی و باعث بیماری سیتولوژیک توسط موری فورم سل‌ها (Muriform Cells) در بافت پوست می‌شود (۷۸-۷۹). این بیماری انتشار جهانی داشته ولی در نواحی گرم‌سیری و نیمه گرم‌سیری شایع‌تر می‌باشد و در مردان شایع‌تر از زنان است. تلقیح تروماتیک با عوامل بیماری‌زا مهم‌ترین عامل عفونت تلقی می‌شود. بررسی و تشخیص عامل این بیماری بر اساس تکنیک‌های معمول بسیار وقت گیر و تفکیک آن از سایر گونه‌ها مشکل است از آنجایی که در بررسی‌های میکروسکوپی عامل اتیولوژیک بیماری در حد جنس و گونه شناسایی نمی‌شود، نمونه‌ی اخذ شده از محل ضایعه در داخل محیط کشت سابورو دکستروز آگار تلقیح و در دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری می‌شود (۷۰ و ۷۱). محیط کشت حداقل به مدت ۴ هفته از نظر رشد قارچی تحت بررسی قرار می‌گیرد. در کشت انجام شده کلینیکی‌های کپکی به رنگ قهوه‌ای زیتونی تا سیاه مشاهده می‌شود. تشخیص جنس و گونه قارچ مشکل است زیرا این قارچ‌ها روش‌های مختلفی برای اسپورزایی از خود نشان می‌دهند (۷۱، ۷۲ و ۷۳). طی مطالعات مولکولی گسترده‌ای که توسط بدیلی و همکاران در تشخیص گونه‌های کلادولیالوفورا انجام گردید. شباهت ژنوتیپی گونه‌ی *C. yegresii* با *C. carrionii* به حدی زیاد بوده که به عنوان گونه‌ی خواهری از *C. carrionii* در طبقه بندی فیلوژنیکی گزارش شده است (۷۴ و ۷۵). کلادولیالوفورا یک‌گزی در سال ۲۰۰۷ توسط دی‌هوگ

برای تمام گونه‌های شناخته شده کلادوفیالوفورا از سایت <http://www.ncbi.nlm.nih.gov> که یکی از پایگاه‌های اطلاعات زنی و قابل استناد می‌باشد، جمع‌آوری و با فرمت FASTA بارگذاری گردید و پس از جمع‌آوری اطلاعات توسط نرم‌افزار CLUSTALX2 کلیه‌ی سکانس‌های نوکلئوتیدی منطقه‌ی ITS rDNA ترازبندی گردید و به ترتیب توالی‌های تراز بندی شده توسط نرم افزار نقطعه به نقطه بررسی و مناسب‌ترین توالی که بیشترین تفاوت را در جایگاه‌های مشابه سایر گونه‌ها دار بود تفکیک و یادداشت گردید (جدول ۱) (۱۳-۲۰). این مرحله حساس‌ترین مرحله‌ی تکنیک RCA می‌باشد چراکه در این مرحله با بررسی دقیق تفاوت در توالی نوکلئوتیدی بهترین ناحیه‌ی ژن از لحاظ تساوی موقعیتی با بالاترین تفاوت انتخاب می‌گردد.

منطقه‌ی خاصی از ژنوم موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد و چون یک قالب بسته در اتصال به DNA هدف ایجاد می‌کند امکان تکثیر توالی غیر اختصاصی را نزدیک به صفر می‌سازد (۱۴-۱۷). در این پروژه به بررسی تکنیک مولکولی RCA که به تازگی توسط محققین جهت رفع نواقص ذکر شده برای واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز ارایه شده پرداخته می‌شود. با انتخاب دو گونه از جنس کلادوفیالوفورا که هردو از لحاظ فنوتیپی بسیار مشابه هم بوده، از نظر فیلوزنی و تاکسونومی بسیار نزدیک به هم طبقه‌بندی گردیده استفاده شده است.

روش بررسی

این تحقیق به صورت کاربردی می‌باشد و پژوهش انجام گرفته به صورت بررسی تست است. ابتدا اطلاعات ژنی منطقه‌ی ITS که از جمله ژن‌های DNA ریبوزومی است را

جدول ۱: توالی نوکلئوتیدی ناحیه‌ی *ITS1* از DNA ریبوزومی و پروب طراحی شده برای گونه‌های قارچی کاریونی و یگرzi

قارچ کلادوفیالوفورا کاریونی

5'TTGGACGGTCTGGTCCAGTGT TCTCGACCCCTCCTAAAGAC3'

5'PACACTCGACCAAGACCGTCCAAgatcatgcitctcggtgccattacgaggtgcggatagtaccgcgcagacacgatagtc taGTCTTAGGAGGGGTCGAGA3'


قارچ کلادوفیالوفورا یگرzi

5'GGACCCGTCTCACGACCAGCCCGTGGGATGCCGTGAGGCCTC3'

5'PCGGGCGGTCGTGAGACGGGTCCgatcatgcitctcggtgccattacgaggtgcggatagtaccgcgcagacacgatagt ctaGACGCCTCACGGCGATCCCA3'

مکمل متصل می‌شود. لینکر دارای توالی است که محل اتصال پرایمرهای RCA1 و RCA2 می‌باشد (شکل ۱). پس از تکمیل طراحی پروب (جدول ۱) توالی‌ها به دست آمده به‌وسیله‌ی یکی از شرکت‌های به صورت مصنوعی تهیه گردید.

پس از تعیین توالی هدف اقدام به تهیه‌ی پروب بسته گردید در این مرحله توالی مکمل رشته‌ی هدف باز چینی شد و از منطقه‌ای که تفاوت نوکلئوتیدی حتی در یک نوکلئوتید وجود داشت یک شکست فرضی ایجاد می‌گردد و مطابق شکل (۱) یک لینکر ثابت به دو انتهای ۳' و ۵' توالی



شکل ۱: تصویر شماتیک از پروب طراحی شده برای کلادوفیالوفورا کاریونی به شماره‌ی کد 260.83.

جدول ۲: مقادیر لازم برای واکنش ۵۰ میکرولیتری PCR

مواد	نمونه
PCR buffer	۵ µl
MgCl ₂	۲.۵ µl
Primer ITS1	۱ µl
Primer ITS2	۱ µl
dNTP Mix	۲.۵ µl
Taq Polymerase	۱ µl
dH ₂ O	۳۵
Total volume	۴۸ µl

برای بررسی محصول PCR مقدار ۸ میکرولیتر از محصولات PCR را با ۲ میکرولیتر بافر نمونه‌گذاری کاملاً مخلوط کرده، سپس با دقت به هریک از چاهک‌های ژل که در محلول TBE غوطه‌ور بود، ریخته شد. در این قسمت اولین چاهک را مخصوص مارکر DNA و آخرین چاهک را برای کترل

کشت و استخراج DNA: برای بررسی تکنیک RCA ابتدا دو گونه‌ی کلادوفیالوفورا کاریونی به شماره‌ی ۱۱۴۴۰۵ CBS و کلادوفیالوفورا یگرزی به شماره‌ی ۲۶۰.۸۳ CBS به صورت لیوفریزه از مرکز CBS تهیه، پس از ریکاوری در محیط کشت پتیودکستروزبراث تلقیح سپس توسط کیت تجاری Mobio ((Mobio, Carlsbad, CA 92010, USA)) عملیات استخراج DNA انجام گرفت و توسط تکنیک اسپکتروفوتومتری خلوص DNA ارزیابی شد.

تکثیر DNA با استفاده از روش PCR: در تکثیر PCR از دو پرایمر ITS1 و ITS4 مناطق اختصاصی کلادوفیالوفورا استفاده گردید و مطابق جدول ۲ محلول واکنش با ۲ میکرولیتر از DNA نمونه در حجم ۵۰ میکرولیتر آماده گردید سپس مطابق سیکل دمایی موجود در جدول ۳ شرایط دمایی بهینه توسط دستگاه ترمال سایکلر ساخت Actec مدل PC818 برنامه ریزی و اجرا گردید.

انجام شد. سپس ژل از قالب برداشته شد و در داخل دستگاه Gel Documentation گذاشت، پس از تنظیم دستگاه عکس ژل مورد نظر گرفته شده، بدینوسیله نتیجه‌ی حاصل از PCR ثبت شد.

منفی قرار دادیم. تانک الکتروفورز را به منع جریان برق وصل کردیم از آنجایی که DNA بار منفی دارد و به طرف قطب مثبت حرکت می‌کند، بخش چاہکی در طرف قطب منفی قرارداده شد. الکتروفورز در ولتاژ ۱۰۰ به مدت یک ساعت

جدول ۳: برنامه‌ی مراحل مختلف PCR

زمان	دما	تعداد چرخه	مراحل	نام مراحل
۲ دقیقه	۹۵°C	۱ سیکل	۱	Pre Heat
۴۵ ثانیه	۹۲°C		۲	Denaturation
۰:۳۰ ثانیه	۵۲°C	۳۵ سیکل	۳	Annealing
۳۰ ثانیه	۷۲°C		۴	Extension
۷ دقیقه	۷۲°C	۱ سیکل	۵	Final Extension

پروب اولین رشته‌ی مکمل از پروب به دست می‌آید، سپس پرایمر RCA2 به جایگاه خود بر روی محصول متصل می‌گردد و عمل تکثیر توسط آنزیم ادامه می‌یابد، این واکنش‌ها به طور متوالی و پشت سر هم ادامه پیدا کرده تا یک ساختار گل کلم مانند ایجاد شود. ج: مرحله‌ی ظاهر سازی، از طریق کروماتوگرافی ژل الکتروفورز به بررسی باندهای ایجاد شده بر روی ژل پرداخته می‌شود که حضور باندهای نزدیکی متوالی در هر واکنش RCA برای گونه‌های کلادوفیالوفورا تایید گردید.

تکثیر DNA با استفاده از روش RCA: واکنش RCA در چهار مرحله انجام می‌گیرد، الف: مرحله‌ی هیبریدیزیشن که در این مرحله دو قسمت از توالی مکمل به DNA متعلق می‌گردد. ب: مرحله‌ی اتصال، در این مرحله آنزیم لیگاز با برداشت فسفات از انتهای ۵' آن را به انتهای ۳' متعلق می‌کند. در این صورت یک پروب بسته با یک توالی مکمل هدف به شکل حلقه ایجاد می‌گردد. پ: مرحله‌ی تکثیر، در این مرحله نیز با استفاده از آنزیم Bst DNA پلیمراز با اتصال پرایمر RCA1 به جایگاه خود بر روی

جدول ۴: مقادیر لازم برای ۱۰ میکرولیتر واکنش Ligation

نمونه	غلاستر اولیه	مواد Ligation Mix
۱ µl	۱۶	Ligation Buffer(10X)
۱ µl	۱۶	Padlock Probe
۰/۵ µl	۸	Ligase
۱ µl	۱۶	Template
۶/۵ µl	۱۰۴	dH2O (آب دیونیزه)
۱۰ µl		Total volume

جدول ۶: برنامه‌ی دمایی مرحله‌ی *Ligation*

زمان	دما	تعداد چرخه	مراحل	نام مراحل
۵ دقیقه	۹۵°C		۱	Pre Heat
۳۰ ثانیه	۹۴°C	۱ سیکل	۲	Denaturation
۴ دقیقه	۶۲°C		۳	Ligation

جدول ۷: مقادیر لازم برای ۲۰ میکرولیتر واکنش *RCA*

نمونه	غاظت اولیه	مواد
۲/۵ μl	۴۰ μl	Buffer
۱ μl	۱۶ μl	RCA1 (10 pmol)
۱ μl	۱۶ μl	RCA2(10 pmol)
۱ μl	۱۶ μl	dNTP Mix (5mM)
۰/۵ μl	۸ μl	Bst DNA Polymerase
۱۲	۱۹۲ μl	dH2O (آب دیونیزه)
Ligation ۱۸μl به اضافه ۲ محصول		Total volume

جدول ۸: برنامه‌ی دمایی مرحله‌ی *Amplification*

زمان	دما	تعداد چرخه	مراحل	نام مراحل
۶۰ دقیقه	۶۵°C		۱	Amplification
۲ دقیقه	۸۵°C	۱ سیکل	۲	Final Extension
Hold	۴۰C		۳	Hold


یافته‌ها

با توجه به اینکه منطقه‌ی ژنی ITSrDNA در هر دو قارچ مورد مطالعه دارای اندازه‌ی تقریباً ۶۰۰ bp می‌باشد، انتظار می‌رفت پس از طی مراحل PCR و نهایتاً با بررسی و الکتروفورز محصول PCR با توجه به مارکر مقابل باند ۶۰۰ bp از مارکر متوقف گردد. در بررسی نتایج بدست آمده از مرحله‌ی PCR ملاحظه‌ی باندهای ۶۰۰ bp حاصل از تکثیر ناحیه‌ی ITS گونه *C. carriionii* و *C. yegresii* هر دو

مراحل اجرای کار در دو بخش اتصال با افزودن ترکیبات طبق جدول ۴ در شرایط دمایی موجود در جدول ۶ و ۸ سپس مرحله‌ی تکثیر طبق شرایط موجود در جداول ۷ و ۸ با افزودن ترکیبات و اعمال شرایط دمایی مذکور انجام گردید. نتایج با الکتروفورز محصول RCA با ترکیب ۸ میکرولیتر از محصولات RCA و ۲ میکرولیتر بافر نمونه‌گذاری در هر یک از چاهک‌های ژل الکتروفورز انجام گردید.

امکان بررسی در حد گونه وجود ندارد (شکل ۲).


مورد تایید قرار گرفت. در این بررسی با توجه به اینکه کل منطقه ITS rDNA آمپلی‌فای می‌گردد،



شکل ۲: نتیجه‌ی واکنش PCR برای فارج کلادوفیالوفورا کاریونی و کلادوفیالوفورا یگرزی

اختصاصی تکثیر انجام گردید. این تکنیک جهت بهینه‌سازی واکنش با بررسی دماهای واکنش میزان ترکیبات و آنزیم‌های به کار برده شده و زمان اعمال شده برای واکنش اپتی‌مایز گردید. با توجه به عدم امکان تکثیر در حضور گونه‌های دیگر از کلادوفیالوفورا، واکنش کاملاً اختصاصی و امکان تشخیص در حد گونه را فراهم می‌نماید.

در بررسی نتایج حاصل از واکنش RCA با توجه به شکل ۳ حضور باندهای نرdbانی حاصل از تکثیر تو در تو و گل کلمی واکنش RCA دلالت بر انجام واکنش دارد و این در صورتی است که با توجه به طراحی پروب اختصاصی که به تفصیل اشاره شد هیچ واکنش متقاطع و با غیر اختصاصی طبق پیش‌بینی انجام شده صورت نگرفت و به صورت کاملاً



شکل ۳: نتیجه‌ی واکنش RCA مارکر، ۱) کلادوفیالوفورا کاریونی، ۲) کلادوفیالوفورا یگرزی، ۳) کنترل منفی، ۴) کنترل منفی

بحث

و دو آغازگر، تهیهی آن را میسر گرداند که همین مهم دلیلی بر انعطاف‌پذیری این روش می‌باشد (۱۱، ۱۳، ۲۲). کل واکنش تکثیر تحت شرایط تک دمایی به شکل پیوسته انجام می‌پذیرد در نتیجه نیاز به دستگاه گران قیمت ترمال سایکلر ندارد و مقرنون به صرفه است و همچنین زمانی جهت تغییر دما از دست نمی‌رود و واکنش فقط نیاز به یک سیکل و دمای بهینه فعالیت آنژیم دارد (۱۱ و ۲۳). طبق گزارش ارایه شده توسط لوئیتز و همکاران امکان استفاده از تکنیک RCA در بررسی RNA و تکثیر سیگنالینگ DNA، RNA و پروتئین Microarrays در مقایسه با سایر روش‌های ایزوترمال به عنوان یک مزیت منحصر به فرد است (۱۵، ۲۴-۲۶). ریمار و همکاران در DNA بررسی که توسط تکنیک RCA برای تشخیص ویروسی داشته با بیان اینکه در روش RCA نیاز به پرایمر اختصاصی نیست، توانسته ۱۳ واریته ناشناخته از پایلوما ویروس را شناسایی کند و اساساً مهم‌ترین عملکرد RCA را در همین موضوع بیان نموده است (۲۶-۲۹، ۲۷). با ایجاد یک قالب، خواندن و تکثیر آن توسط آنژیم ایزوترمال نه تنها محصول غیر اختصاصی غالب به شکلی بسته از تولید محصول غیر اختصاصی جلوگیری می‌کند، بلکه با تکثیر اختصاصی این آزمایش را انجام داد و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی خاص ندارد و با یک بنماری ساده نیز می‌توان این تست را عملی نمود. برای تمام گونه‌ها و موجودات کاربرد دارد و گونه‌های وابسته به هم می‌توانند از طریق RCA بسیار دقیق‌تر از PCR شناسایی و تفکیک شوند، زیرا این تکنیک با تفاوت یک باز نوکلئوتید هم امکان تشخیص و تکثیر اختصاصی را دارد. پروب‌های ساخته شده می‌توانند هم برای DNA و هم برای RNA استفاده شود. در آزمایش RCA تشخیص می‌تواند با تعداد اندک DNA نیز شروع شود و حتی قادر است DNA‌یی را که کمتر از 10^{-3} کپی از آن

پاتوژن‌های قارچی عوامل عفونی تهدیدکننده‌ی زندگی برای بیماران بدحال و دارای نقص سیستم ایمنی هستند که در برخی موارد شناخت سریع آن عوامل در حد گونه بسیار ضروری است. روش‌های متداول تشخیصی بخصوص برای قارچ‌های شبه مخمری سیاه بسیار وقت گیر و با توجه به این که شرایط اسپورزایی بسیار متنوعی دارند، امکان تشخیص گونه از طریق بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی (کشت) دشوار است و همینطور روش‌های مولکولی متداول مانند PCR نیز با وجود نواقص تشخیصی وارد برآن باعث گردید تا محققان جهت رفع مشکلات مطرح شده به بررسی تکنیک‌های مختلف تشخیص از جمله RCA روی گردان شوند (۲۱، ۱۱، ۱۵، ۴، ۳). در نتایج بدست آمده از این مطالعه حضور باندهای متواتر و پشت سرهم علاوه بر اینکه نشان دهنده‌ی عملکرد تکنیک RCA می‌باشد، بیان‌گر تکثیر اختصاصی منطقه‌ی ITS1 در هر کدام از گونه‌های ذکر شده می‌باشد. در روش RCA مولکولی برای تشخیص قارچ‌های پاتوژن از جمله کلادوفیالوفورا کاربونی مناطق حایز اهمیت همان منطقه‌ی DNA ریبوزومی ITS1 و ITS2 می‌باشد که یک منطقه‌ی متغیر برای گونه‌های مختلف قارچی می‌باشد که در تکنیک PCR نیز اکثرًا از این منطقه برای تشخیص استفاده می‌شود (۱۳). این روش با ایجاد یک غالب مکملی برای DNA هدف با اتصال اختصاصی و با استفاده از آنژیم DNA Bst پلیمراز که محصول مهندسی ژنتیک جهت تکثیر در شرایط ایزوترمال می‌باشد، مزیت‌هایی را برای این تکنیک ایجاد کرده است که باعث افزایش اختصاصی و همچنین صرف وقت و مواد کمتر شده است (۲۲). با توجه به این که طراحی پروب و پرایمر نیاز به دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات ژنی دارد با بررسی مناطق اختصاصی ITS کلیه‌ی گونه‌های کلادوفیالوفورا می‌توان ناحیه‌ی متغیر گونه‌های مذکور را به دست آورد و با داشتن یک پروب بسته اختصاصی

میکروسکوپی، ماکروسکوپی و مولکولی) برای تشخیص آلدگی‌های قارچی در حدگونه و اختصاصیتی حتی با یک نوکلئوتید تفاوت، سریع بودن، ارزان بودن و نسبتاً با حساسیت بالا روش مناسبی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد از تکنیک RCA به عنوان یک روش کاربردی و آسان با اختصاصیت منحصر به فرد در آزمایشگاه‌های تشخیصی با کمترین امکانات ممکن استفاده نمود.

تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله از معاونت محترم پژوهشی و همکاران آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت حمایت و پشتیبانی ایشان در اجرای این مطالعه نهایت تقدیر و تشکر را دارد.

References

- 1- Amanloo S. Review of fungal diseases in medicine. Aghil: Tehran, Iran; 2008.
- 2- Khosravi AR. Medical Mycology, practical methods. Tehran University: Jihad unit press; 2003.
- 3- Ridely MF. The natural habitat of *Cladosporium carrionii*, a cause of chromoblastomycosis in man queensland institute of medical research. *Aust J Dermatol.* 1957; 4: 23-7.
- 4- Martinez RL, Tovar LJ. Chromoblastomycosis. *J clin dermatol.* 2007; 25: 188-94.
- 5- Emami M, Mogademi M. The first report of chromoblastomycosis in Iran: Paper presented at Second International Congress of Tropical Medicine and Malaria. Amesterdam, Holand. 1988.

موجود است را شناسایی نماید (۱۵، ۲۵ و ۳۲). کارایی و علکرد این تکنیک برای اولین بار در کشورمان ایران مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی شده است. در این مطالعه از دو گونه‌ای که از لحاظ فیلوزنیکی بسیار مشابه هم بودند. جهت بررسی اختصاصیت روش RCA استفاده گردید (۶ و ۷). محصولات واکنش مخلوطی از رشته‌های اصلی DNA و مکمل آن با ساختاری شبیه گل کلم با حلقه‌های متعدد که اتصالاتی با توالی‌های معکوس تکراری با توالی هدف تکثیر شده را ایجاد می‌نمایند (۱۳).

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، تکنیک RCA در مقایسه با روش‌های روتین موجود (بررسی‌های

- 6- Hoog GSde, Nishikaku AS, Zeppenfeldt GF, et al. Molecular Analysis and pathogenicity of the *cladophialophora carrionii* complex with the description of a novel species. *Stud Mycol.* 2007; 58: 219-34.
- 7- Badali H, Gueidan C, Najafzadeh MJ, Bonifaz A, Gerrits AHG, Hoog GS. Biodiversity of the genus *cladophialophora*. *Stud Mycol.* 2008; 61: 175-91.
- 8- Brown TA. Genomes 3. Carland science: New York. 2007.
- 9- Brown TA. Gene cloning and analysis an introduction. UK: Wiley- Black well; 2010.
- 10- Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, et al. Loop mediated isothermal amplification of DNA. *Nucleic Acids Res.* 2000; 28(12): e63.
- 11- Moradi A, Karami A, Hagh Nazari A, Ahmadi Z, Soroori Zanjani R, Javadi SM. Comparison of

- the PCR and LAMP techniques in the diagnosis of salmonella infection. *J Zanjan Uni Med Sci.* 2008; 17: 66-77.
- 12- Notomi T, Nagamine K, Hase T, Accelerated reaction by loop-mediated isothermal amplification using loop primers. *Mol Cell Probes.* 2001; 16: 223-9.
- 13- Zhou X, Kong F, Sorrell TC, Wang H, Duan Y, Chen SCA. Practical method for detection and identification of candida, aspergillus, and scedosporium spp. by use of rolling-circle amplification. *J Clin Microbiol.* 2008; 46: 2423-7.
- 14- Yoshida A, Nagashima S, Ansai T, et al. Loop-mediated isothermal amplification method for rapid detection of the periodontopathic bacteria *porphyromonas gingivalis*, *tannerella forsythia*, and *treponema denticola*. *J Clin Microbiol.* 2005; 43: 2418-24.
- 15- Schweitzer B, Kingsmore S, Combining nucleic acid amplification and detection. *Analytical Biotechnol.* 2001; 12: 21-7.
- 16- Mary c. Edvaed & reachard E. Multiplex PCR: advantages, development, and applications. *Genome Res.* 1994; 30: s65-s75.
- 17- Gusev Y, Sparkowski J, Raghunathan A, et al. A new approach to increase sensitivity for immunohistochemistry and flow cytometry. *Am J Pathol.* 2001; 159: 63-69.
- 18- Howard Hughes Medical Institute, under grants R01-HG00257 and P50-HG00098 primer design. 2000. Available from: <http://frodo.wi.mit.edu/primer3>.
- 19- Larkin MA, Blackshields G, Brown NP, et al. Clustal W, Clustal X version 2.0. Bioinformatics, 2007. Available from: <http://simgene.com/ClustalW>.
- 20- National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine. 1993. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- 21- Vincent M, Xu Y, Kong H. Helicase-dependent isothermal DNA amplification. *Expert Rev Mol Diagn.* 2004; 5: 795-800.
- 22- Reimar J, Hermann I, Annabel R, Marc van R, Hans S. Rolling-circle amplification of viral DNA genomes using phi29 polymerase. *Trends Microbiol.* 2009; 29: 205-11.
- 23- Wang B, Potter SJ, Lin Y, et al. Rapid and sensitive detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus by rolling circle amplification. *J Clin Microbiol.* 2005; 43(5): 2339-44.
- 24- Nallur G, Luo C, FangL, et al. Signal amplification by rolling circle amplification on DNA microarrays. *Nucleic Acids Res.* 2001; 29: e118-e126.
- 25- Schubert J, Habeku A, Kazmaier K, Jeske H. Surveying cereal-infecting geminiviruses in germany-diagnostics and direct sequencing using rolling circle amplification. *Virus Res.* 2007; 127: 61-70.
- 26- Christian AT, Pattee MS, Attix CM, Reed BE, Sorensen KJ, Tucker JD. Detection of DNA point mutations and mRNA expression levels by rolling circle amplification in individual cells. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2001; 98: 14238-43.

- 27- Ogawa T, Tomita Y, Okada M, Shirasawa H. Complete genome and phylogenetic position of bovine papillomavirus type 7. *J Gen Virol.* 2007; 88, 1934-8.
- 28- Yam WC, Chan KH, Poon LLM, et al. Evaluation of reverse transcription-PCR assays for rapid diagnosis of severe acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus. *J Clin Microbiol.* 2003; 41: 4521-4.
- 29- Stevens H, Rector A, Bertelsen MF, Leifsson PS, Ranst MV. Novel papillomavirus isolated from the oral mucosa of a polar bear does not cluster with other papillomaviruses of carnivores. *Vet Microbiol.* 2008. 129, 108-16.
- 30- Nilsson M. Lock and roll: Single-molecule genotyping in situ using padlock probes and rolling circle amplification. *Histochem Cell Biol.* 2006; 126: 159-64.
- 31- Wharam SD, Marsh P, Lloyd JS, et al. Specific detection of DNA and RNA targets using a novel isothermal nucleic acid amplification assay based on the formation of a three-way junction structure. *Nucleic Acids Res.* 2001; 29: e54.
- 33- Moore P. Replicating success rolling circle amplification on plasmid glycerol stock. *Nature.* 2005; 435: 235-8.

The Use of Rolling Circle Amplification for Molecular Identification of Cladophialophora carrionii and Cladophialophora yegresii

Hamzehei H¹, Badali H¹, Rahnema M¹, Ajalli M¹

¹Dept. of Microbiology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

Corresponding Authors: Badali H, Dept. of Microbiology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

E-mail: badalii@yahoo.com

Received: 13 Nov 2011 **Accepted:** 7 Apr 2012

Background and Objective: Epidemiological studies indicate that not only the incidence of fungal infections is dramatically on the rise, especially in the immunocompromised hosts, but also the sensitivity of etiological agents to antifungal drugs shows a remarkable reduction. Therefore, early detection at the species level is critically important for proper clinical management. Because standard diagnostic procedures are time consuming, expensive, and less sensitive, PCR-based molecular techniques have been developed. In the present study, we aim to describe a rapid and sensitive technique based on the rolling circle PCR amplification for accurate and fast identification of *Cladophialophora carrionii* vs. *C. yegresii*.

Materials and Methods: Specific padlock probes were designed based on a single nucleotide polymorphism (SNP) difference in the internal transcribed spacer (ITS) rDNA region of *Cladophialophora* strains to differentiate between *C. carrionii* and *C. yegresii*. The probe sequences are complementary to the target DNA leading to the linker position that after hybridization with the target DNA will be joined together by DNA ligase, form a closed molecule and hybridize to the target DNA for replication at single-temperature conditions.

Results: We successfully amplified the target fungi DNA at the species level without any false and negative cross reactivity. The RCA product was visualized on 1.5% agarose gel to clarify the specificity of the probe-DNA template binding.

Conclusion: These results demonstrate that RCA is a powerful and accurate tool for discrimination and identification of pathogenic fungi.

Keywords: *Rolling circle amplification, DNA, Cladophialophora carrionii, Cladophialophora yegresii, Chromoblastomycosis*