

بررسی اثر آنتی باکتریال غشای آمینوتیک انسان در شرایط متفاوت زمانی، دمایی و pH

دکتر محمد مهدی سلطان دلال^۱، زهره کلافی^۲، دکتر عبدالعزیز رستگار لاری^۱، سید کاظم حسینی^۳، دکتر عباس رحیمی فروشانی^۴،
دکتر زهرا دیلمی خیابانی^۵، فرهاد نیکخواهی^۶، سیامک حیدرزاده^۶

نویسنده‌ی مسوول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده‌ی بهداشت، گروه میکروب شناسی soltanirad۳۴@yahoo.com

دریافت: ۹۰/۷/۲۱ پذیرش: ۹۱/۳/۸

چکیده

زمینه و هدف: غشای آمینوتیک انسان داخلی‌ترین لایه‌ی جفت می‌باشد که به دلیل حضور بتا دهنسین‌های انسانی و الافین‌ها دارای اثر ضد میکروبی است. فعالیت‌های ضد میکروبی به شرایط و عوامل محیطی بستگی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تغییر اثر آنتی‌باکتریال غشای آمینوتیک انسانی در رابطه با سویه‌های استاندارد باکتریایی سالمونلا انتریکا BAA-۷۰۸، اشریشیا کلی ATCC ۲۵۹۲۲، سودوموناس آئروژینوزا ATCC ۲۷۸۵۳، کلبسیلا پنومونیه ATCC ۷۸۱۱، اتروکوکوس فکالیس ATCC ۲۹۲۱۲ در آزمایشگاه بود.

روش بررسی: غشای آمینوتیک از بانک پیوند اعضای بیمارستان امام خمینی از زنانی با سزارین انتخابی که از نظر تست‌های سرولوژیک HIV، HCV، HBV و سیفلیس منفی بودند، تهیه شد و در شرایط استریل به قطعات ۱/۵×۱/۵cm برش داده شد و سپس سوسپانسیون‌های نیم مک فارلند تهیه شده از باکتری‌ها روی محیط مولر هیتون آگار پخش گردید (در بررسی pH سه نوع محیط کشت تهیه گردید). و در مرکز هر پلیت یک قطعه غشا قرار گرفت. نمونه‌ها به لحاظ متغیرهای دمایی (۲۵، ۳۳ و ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد) و زمانی (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت) و pH (۶/۵، ۷، ۷/۵) بررسی شدند.

یافته‌ها: متغیرهای pH و زمان تأثیری در اثر ضد باکتریایی غشا نداشتند؛ اما دماهای ۲۵ و ۳۳ درجه‌ی سانتی‌گراد تنها در سودوموناس آئروژینوزا نسبت به ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد تغییر قابل توجهی را داشتند.

نتیجه‌گیری: اثر ضد باکتری غشای آمینوتیک به جز مواردی خاص، از ثبات بالایی در برابر عوامل محیطی برخوردار است و این پایداری کاربرد آن را در عملکردهای بالینی و در شرایط مختلف گسترش خواهد داد.

واژگان کلیدی: اثر ضد باکتری، عوامل محیطی، غشای آمینوتیک انسان

۱- دکترای تخصصی میکروب شناسی، استاد مرکز تحقیقات مقاومت‌های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- کارشناس ارشد میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

۳- کارشناس ارشد میکروب شناسی، بانک پیوند اعضای بیمارستان امام خمینی

۴- دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

۶- کارشناس ارشد میکروب شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

غشای آمینوتیک انسانی یا آمینون داخلی‌ترین لایه‌ی جفت می‌باشد (۱). غشای آمینوتیک به طور طبیعی ۰/۰۲ تا ۰/۵ میلی‌متر ضخامت دارد که معادل ۶ تا ۸ لایه‌ی سلولی است و مساحت ۱۶۰۰ سانتی‌متر مربع را دارا می‌باشد. این غشا حفره‌ی آمینوتیک را می‌پوشاند و سطح راسی داخلی آن در تماس با مایع آمینوتیک است در حالی که سطح قاعده‌ای خارجی آن در تماس مستقیم با کوریون می‌باشد (۲). آمینون انسان فاقد یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف، اعصاب، عروق لنفاوی و مهم‌تر از همه فاقد عروق خونی است (۳). غشایی شفاف، محکم و نازک با قابلیت جداسازی آسان از کوریون می‌باشد (۴). غشای آمینوتیک متشکل از یک لایه‌ی داخلی حاوی یاخته‌های اپی‌تلیالی است که بر روی یک غشای پایه قرار گرفته اند؛ غشای پایه نیز به نوبه‌ی خود توسط رشته‌هایی باریک به غشایی نازک از بافت همبند که دارای کلاژن‌های بینابینی I, III, V می‌باشد، اتصال یافته است (۵). بافت همبند، بافت مزانشیمی و غیرعروقی است که از سه لایه تشکیل شده است. لایه‌ی فشرده (Compact Layer) در کنار غشای پایه، لایه‌ی فیروپلاست (Fibroblast Layer)، لایه‌ی اسفنجی (Spongy Layer). بنابراین غشای آمینوتیک از ۵ لایه تشکیل شده است (۲). غشای آمینوتیک انسان دارای اثر آنتی باکتریال می‌باشد (۶). غشاهای جنینی و جفت منابع مهمی از ضد میکروب‌های طبیعی موجود در رحم می‌باشند. ضد میکروب‌های طبیعی، پپتیدهایی هستند که ترکیبات ضروری از سیستم ایمنی ذاتی را تشکیل می‌دهند. بتا دهنسین‌های انسانی (HBDs) خانواده‌ی بزرگی از ضد میکروب‌های طبیعی جانوران مهره‌دار هستند. مطالعات حضور بتا دهنسین‌های انسانی ۱-۳ (HBD)، ال‌افین، مهار کننده‌های پروتئازی لوکوسیت ترشحی (SLPI) را در لایه‌ی اپی‌تلیال آمینون نشان داده‌اند. ۲-HBD مانند یک آنتی‌بیوتیک قوی می‌باشد که در پاسخ به ۱-IL در سلول‌های اپی‌تلیال

آمینون بیان می‌شود (۷). در زمان بارداری ضد میکروب‌های طبیعی در مایع آمینوتیک تولید می‌شوند و در جفت، اندومتر رحم و غشاهای جنینی لوکالیزه می‌شوند (۸). اثر آنتی‌باکتریال غشای آمینوتیک توسط جارگارد و همکاران در سال ۲۰۰۱ بر روی گستره‌ی وسیعی از باکتری‌ها شامل استرپتوکوکوس گروه A، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا نشان داده شده است (۹). فعالیت عوامل ضد میکروبی نه تنها به ساختارشان، بلکه به شرایط محیطی مانند pH نیز بستگی دارد. آلماجانو و همکاران در سال ۲۰۰۷، اثر pH را بر ویژگی ضد میکروبی ماده پلی‌فنول به عنوان محافظ مواد غذایی در برابر آلودگی‌ها ثابت کردند (۱۰). تالمی و همکاران در سال ۱۹۹۹ اثر دما را بر ویژگی ضد میکروبی غشای آمینوتیک بررسی کردند (۱۱). با توجه به اثر آنتی‌باکتریال غشای آمینوتیک بر روی گستره‌ی وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها (۹) و افزایش روز افزون فرم مقاوم باکتری‌ها بر داروهای رایج مورد استفاده در برابر آن‌ها (۱۲)، بررسی اثر احتمالی عوامل محیطی در تقویت اثر ضد باکتری غشای آمینوتیک به عنوان ماده‌ی بیولوژیک به صورت یک ضرورت وجود دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر عوامل محیطی (دما، زمان و pH) بر اثر آنتی‌باکتریال غشای آمینوتیک انسان بر روی ۵ سویه‌ی استاندارد سالمونلا انتریکا ۷۰۸-BAA، اشریشیا کلی ۲۵۹۲۲-ATCC، سودوموناس آئروژینوزا ۲۷۸۵۳-ATCC، کلبسیلا پنومونیه ۷۸۸۱-ATCC، اتروکوکوس فکالیس ۲۹۲۱۲-ATCC در شرایط آزمایشگاهی بود.

روش بررسی

این بررسی از نوع توصیفی و به صورت مقطعی می‌باشد که طی ۶ ماه از تیر ماه الی آذر ماه ۱۳۸۹ در بخش میکروب‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردیده است. جفت انسان در مدت زمان کوتاهی پس از یک عمل سزارین انتخابی از خانمی که به لحاظ

از قطعات غشای آمینوتیک قرار داده شد (شعبه به بررسی خاصیت آنتی‌باکتریال در روش دیسک فیوژن در تست آنتی‌بیوگرام). سپس پلیت‌ها در سه انکوباتور با دماهای ۲۵، ۳۳ و ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به‌صورت جداگانه به‌مدت ۲۴ ساعت انکوباسیون گردیدند. در بررسی عامل زمان تمام مراحل فوق انجام گردید با این تفاوت که ۵ پلیت کشت شده در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده شدند و نتایج در بازه‌های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوباسیون ثبت گردید. در مرحله‌ی مربوط به عامل pH، ابتدا محیط‌های مولر هیتتون آگار با سه نوع pH متفاوت ۷، ۷/۵ و ۶/۵ تهیه گردید و سپس همانند مراحل قبل، از هر یک از سوسپانسیون‌ها به‌صورت مجزا ۱۰۰ لاندا برداشته شد و بر روی محیط‌های مولر هیتتون آگار ریخته و به صورت چمنی پخش شد و در مرکز هر یک از محیط‌ها یکی از قطعات غشای آمینوتیک قرار داده شد و ۱۵ پلیت کشت شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده شدند. اندازه‌ی ۴ قطر از هر هاله‌ی عدم رشد توسط خط کش اندازه‌گیری شد و میانگین اقطار محاسبه گردید.

یافته‌ها

در بررسی هر سه عامل، ۲ سویه‌ی کلبسیلا پنومونیه و انتروکوکوس فکالیس نسبت به اثر ضد باکتریایی غشای آمینوتیک مقاوم بودند و هیچ‌گونه هاله‌ی عدم رشدی در رابطه با این سویه‌ها رویت نشد (تصویر ۱)، اما سه سویه‌ی استاندارد دیگر نسبت به غشای آمینوتیک حساس بودند و هاله‌ی عدم رشد در رابطه با آن‌ها رویت شد (در سودوموناس آئروژینوزا هاله عدم رشد بسیار باریک بود و به دلیل حضور پیگمان‌های پیوسیانین به سختی قابل مشاهده بود). در پلیت‌های مربوط به بررسی عامل زمان و pH تغییری در نتایج و همچنین قطر هاله‌ی عدم رشد در سویه‌های حساس مشاهده نشد (تصویر ۲). در بررسی دما در رابطه با سویه


تست‌های سرولوژی HIV، HBV، HCV و سیفلیس منفی بود، تهیه شد. سپس در زیر هود با جریان لاملار، جفت با نرمال سالین شست و شو داده شد تا لخته‌های خون زدوده شوند. غشای آمینوتیک داخلی از کوریون توسط بلانت کالبد شکافی جدا شد. غشای آمینوتیک سه مرتبه با فسفات بافرسالین (PBS) حاوی آنتی‌بیوتیک‌های کلوزاسیلین ۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر، استریتومایسین ۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر و آمفوتریسین B به مقدار ۲/۵ میکروگرم در میلی‌لیتر شست و شو داده شد. بدین طریق عوامل میکروبی در طی عمل زایمان و پس از آن رفع شد. تست‌های میکروب‌شناسی نیز بر روی غشا صورت گرفت (۱۲). تحت شرایط کاملاً استریل در زیر هود، غشا به گونه‌ای که سطح اپی‌تلیالی آن به سمت بالا باشد بر روی سلیفون پهن شد و با نرمال سالین استریل شست‌وشو داده شد و توسط قیچی جراحی به قطعات تقریبی ۱/۵ × ۱/۵ سانتی‌متر مربع برش داده شد. در مرحله‌ی بعد سویه‌ی استاندارد سودوموناس آئروژینوزا (ATCC ۲۷۸۵۳) به‌صورت لیوفیلیزه از مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تهران منتقل شد و در محیط BHI کشت داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه شد. سویه‌های انتروکوکوس فکالیس (ATCC ۲۹۲۱۲)، کلبسیلا پنومونیه (ATCC ۷۸۸۱)، سالمونلا انتریکا (BAA-۷۰۸) و اشریشیاکلی (ATCC ۲۵۹۲۲) از بخش میکروب‌شناسی دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع‌آوری شد. هر ۵ سویه بر روی محیط بلاد آگار حاوی خون گوسفند ۵ درصد کشت داده شد و پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد، از هر یک سویه‌ها سوسپانسیون ۰/۵ مک فارلند تهیه گردید. در بررسی عامل دما، از هر یک از سوسپانسیون‌ها به‌صورت مجزا ۱۰۰ لاندا برداشته شد و بر روی محیط‌های مولر هیتتون آگار (pH=۷/۵) ریخته و به صورت چمنی پخش شد و در مرکز هر یک از محیط‌ها یکی

دو سویه‌ی حساس دیگر (سالمونلا انتریکا و اشریشیاکلی) در هر سه بازه‌ی دمایی مورد بررسی مشاهده نشد. تغییر و عدم تغییر قطر هاله‌ی عدم رشد ۵ باکتری مورد بررسی در حضور متغیرهای دما، زمان و pH در جدول ۱ آورده شده است.


حساس سودوموناس آئروژینوزا قطر هاله‌ی عدم رشد در دمای ۳۳ و ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش یافت و این هاله در ۳۳ درجه‌ی سانتی‌گراد به وضوح قابل رویت بود (تصویر ۳)؛ اما این افزایش قطر در



تصویر ۱: مقاومت به اثر آنتی باکتری غشای آمینوتیک



تصویر ۲: عدم تغییر هاله عدم رشد سالمونلا انتریکا در ۳ نوع pH متفاوت



تصویر ۳: اثر عامل دما در افزایش قطر هاله عدم رشد در سویه‌ی حساس سودوموناس آئروژینوزا

جدول ۱: اندازه‌ی هاله‌ی عدم رشد بر حسب میلی‌متر به طور میانگین در سویه‌های استاندارد باکتریایی در حضور متغیرهای دما، زمان و pH

نام باکتری	دما (°C)			زمان (h)			pH		
	۳۷	۳۵	۳۳	۷۲	۴۸	۲۴	۷/۵	۷	۶/۵
اشریشیا کلی	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
سالمونلا انتریکا	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
کلبسیلا پنومونیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سودوموناس آروژینوزا	۲	۵	۶	۲	۲	۲	۲	۲	۲
انتروکوکوس فکالیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-

بحث

مطالعه‌ی حاضر اثر ممانعت‌کنندگی غشای آمینوتیک را بر روی یک گستره‌ی خاصی از سویه‌های استاندارد باکتریایی مورد بررسی شامل؛ اشریشیاکلی (ATCC۲۵۹۲۲)، سالمونلا انتریکا (BAA-۷۰۸) و سودوموناس آروژینوزا (ATCC۲۷۸۵۳) آشکار ساخت، این در حالی است که ۲ سویه‌ی استاندارد کلبسیلا پنومونیه (ATCC۷۸۸۱) و انتروکوکوس فکالیس (ATCC۲۹۲۱۲) به اثر ضد باکتریایی غشای آمینوتیک مقاومت نشان دادند. جارگارد و همکاران در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ اثر ضد باکتریایی غشاهای آمینون و کوریون را بر روی سویه‌های استرپتوکوکوس گروه A، استرپتوکوکوس‌های گروه B، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، انتروکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار دادند و نتایج مطلوبی را به لحاظ ممانعت از رشد و اندازه‌ی هاله‌ی عدم رشد در استرپتوکوکوس گروه A، استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس گزارش کردند (۹ و ۱۳). نتایج آن‌ها تأییدکننده‌ی مشاهدات ما در رابطه با اثر ضد باکتریایی غشای آمینوتیک انسان در ایجاد هاله‌ی عدم رشد می‌باشد. تالمی و همکاران نیز اثر ممانعت‌کنندگی غشای آمینوتیک، غشای کوریو آمینوتیک و

غشاهایی بر اساس پلی‌اورتان سنتتیک را زمانی که روی پلیت‌های آگاری کشت شده با باکتری قرار می‌گیرند، اثبات کرده‌اند (۱۱). آلماجانو و همکاران در سال ۲۰۰۷، اظهار داشتند که فعالیت ضد میکروبی پپتیدهای طبیعی تنها به ساختارشان بستگی ندارد بلکه به شرایط و عوامل محیطی بستگی دارد و افزایش pH را در افزایش فعالیت ضد میکروبی ماده پلی فنول به اثبات رساندند (۱۰). در مطالعه‌ی حاضر عدم تغییر در قطر هاله‌ی عدم رشد در سویه‌های حساس حاکی از عدم تأثیر متغیر pH بر فعالیت پپتیدهای ضد میکروبی غشای آمینوتیک می‌باشد. تالمی و همکارانش در سال ۱۹۹۹، در بررسی اثر بازه‌های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوباسیون بر اثر ضد میکروبی غشاهای آمینون و کوریون بر علیه استرپتوکوکوس‌های گروه B، نتیجه‌ی منفی گزارش گردید (۱۱). در مطالعه‌ی حاضر نیز عامل زمان در بازه‌های زمانی فوق بر نتایج مربوط به اثر ضد باکتریایی غشا بر روی ۵ سویه‌ی استاندارد مورد بررسی تغییری را ایجاد نکرد که این امر حاکی از عدم تأثیر عامل زمان در اثر ضد باکتری غشا می‌باشد. مای و همکاران در سال ۱۹۶۶، اثر دمای ۳۰ و ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد انکوباسیون را بر روی MIC و MBC

ضد میکروبی موجود در غشای آمنیوتیک انسانی بر علیه سویه‌های حساس باکتریایی و کاربرد این دانش در تولید داروهایی با اثر ضد میکروبی و عوارض جانبی کم‌تر نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سنتتیک امروزی باشند.

نتیجه‌گیری

غشای آمنیوتیک انسانی ترکیبی بیولوژیک با اثر آنتی‌باکتریال نسبتاً پایدار در برابر عوامل محیطی مانند دما، زمان و pH می‌باشد؛ از این رو می‌توان در شرایط محیطی متفاوت از غشای آمنیوتیک به عنوان ماده‌ای با اثر ضد میکروبی پایا همراه با آنتی‌بیوتیک‌ها جهت تسریع درمان بیماری‌های بالینی بهره برد.

چندین آنتی‌بیوتیک مربوط به استافیلوکوکوس‌های مقاوم به متی‌سیلین یا پنی‌سیلین مطالعه کردند، مشابه با این مطالعه توسط هینکز و همکاران در سال ۱۹۹۷ انجام شد که اثر دمای انکوباسیون را روی MIC و MBC آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر بر دیواره‌ی سلولی استرپتوکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار دادند، نتایج هر دو مطالعه حاکی از تأثیر دما بر میزان MIC و MBC آنتی‌بیوتیک‌ها بود (۱۵ و ۱۴). در مطالعه‌ی حاضر افزایش قطر هاله‌ی عدم رشد در دمای ۲۵ و ۳۳ درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد در سویه‌ی حساس سودوموناس آئروژینوزا، اثر دما را به عنوان عامل محیطی بر فعالیت پپتیدهای ضد میکروبی غشای آمنیوتیک در رابطه با برخی از سویه‌های باکتریایی آشکار ساخت. مطالعات آینده می‌توانند در برگزیده‌ی بررسی مکانیسم عمل پپتیدهای

References

- 1- Barachetti L, Giudice C, Mortellaro CM. Amniotic membrane transplantation for the treatment of relin corneal sequestrum: Pilot Study. *Vet Ophthalmol*. 2010; 13: 326-30.
- 2- John T. Human amniotic membrane transplantation: Past, present, and future. *Ophthalmol Clin N Am*. 2003; 16: 43-65.
- 3- Toda A, Okabe M, Yoshida t, Nikaido T. The potential amniotic membrane/ amniotic derived cells for regeneration of various tissues. *J Pharmacol Sci*. 2007; 105: 215-28.
- 4- Ganatra MA. Amniotic membrane in surgery. *Journal of Pakistan Medical Association*. 2003; 53: 1-7.
- 5- Baradaran Rafiei AR, Aghayan HR, Arjmand B, Javadi MA, Barazandeh B. Amniotic membrane transplantation. *Bina J Ophthalmol*. 2006; 11: 531-52.
- 6- Barequet IS, Habot-Wilner Z, Keller N, et al. Effect of amniotic membrane transplantation on the healing of bacterial keratitis. *Investigative Ophthalmology Visual Science*. 2008; 49: 163-67.
- 7- King AE, Paltoo A, Kelly RW, Sallenne JM, Bocking AD, Challis JRG. Expression of natural antimicrobials by human placenta and fetal membranes. *Placenta*. 2007; 28: 161-9.
- 8- Stock SJ, Kelly RW, Riley SC, Calder AA. Natural antimicrobial production by the amnion. *Am Abstet J Gynecol*. 2007; 196: 255-61.
- 9- Kjaergaard N, Hein M, Hyttle L, et al. Antibacterial properties of human amnion and chorion in vitro. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2001; 94: 224-9.

- 10- Almajano MP, Carbó R, Delgado ME, Gordon MH. Effect of pH on the antimicrobial activity and oxidative stability of oil-in-water emulsions containing caffeic acid. *J Food Sci.* 2007; 72: C258- C263.
- 11- Talmi YP, Sigler L, Inge E, Finkelstein Y, Zohar Y. Antibacterial properties of human amniotic. *Placenta.* 1991; 12: 285-8.
- 12- Beumer R, Bloomfield SF, Exner M, Fara GM, Nath KJ, Scott E. Microbial resistance and biocides. 2000. Available from: URL: <http://www.ifh-homehygiene.org>.
- 13- Kjaergaard N, Helming RB. Chorionic membranes constitute a competent barrier to group B streptococcus in vitro. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1999; 83: 165-9.
- 14- May JW, Houghton RH, Perret CJ. The effect of growth at elevated temperatures on some heritable properties of *Staphylococcus aureus*. *J Gen Microbiol.* 1964; 37: 157-69.
- 15- Hinks ET, Daneo- Moore LS. Temperature effects on minimum inhibitory and bactericidal concentrations of cell wall antibiotics in *Streptococcus faecalis*. *Antimicrob Agents Chemother.* 1977; 12: 281-3.

Archive of SID

The Impact of Environmental Factors on the Antibacterial Properties of Human Amniotic Membrane *in vitro*

Soltan Dallal MM^{1,2}, Kalafi Z³, Rastegare Lari A^{1,2}, Hosseini SK⁴, Rahimi foroushani A⁵, Deilami Khiabani Z⁶, Nikkhahi F⁶, Heidarzadeh S¹

¹Division of Microbiology, Dept. of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

²Antimicrobial Resistant Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

³Dept. of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

⁴Transplant Bank, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran.

⁵Dept. of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences Tehran, Iran.

⁶Biological Research Center, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

Corresponding Author: Soltan Dallal MM, Division of Microbiology, Dept. of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Email: soltanirad34@yahoo.com

Received: 13 Oct 2011 **Accepted:** 28 May 2012

Background and Objective: Human amniotic membrane, which is the innermost layer of placenta, contains beta defensins and elafin, which both have antibacterial properties. These antibacterial activities depend on the conditions and environmental factors. The purpose of this study was to evaluate the effect of environmental factors on human amniotic membrane antibacterial properties against *Klebsiella pneumonia* (ATCC7881), *Enterococcus faecalis* (ATCC29212), *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC27853), *Salmonella enteric* (BAA-708), and *E. coli* (ATCC25922) strains *in vitro*.

Materials and Methods: The amniotic membrane samples were obtained from caesarean women in Imam Khomeini hospital. Participating women were all seronegative for HIV, HBV, HCV, and syphilis. The samples were cut into 1.5×1.5 cm pieces. The 0.5 McFarland bacterial suspensions were prepared and spread on Muller-Hinton agar medium, and a piece of membrane was placed in the centre of each plate. Samples were examined at different time intervals (24, 48, and 72 hr), temperatures (25, 33, 37°C) and pH (6.5, 7, and 7.5) as variables.

Results: The results show that time and pH as variable parameters did not affect the antibacterial properties of the amniotic membrane. However, the change in temperature (25 and 33°C vs. 37°C) had a significant impact on *P. aeruginosa*.

Conclusion: Antibacterial properties of the amniotic membrane seem resistant against environmental factors, except for especial cases, and this sustainability could expand its usage in clinical procedures and different conditions.

Keywords: Human amniotic membrane, Antibacterial properties, Environmental factors