

هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم

میررحیم فخرز * *PhD*، محمود تولایی^۱ *PhD*، مسعود هوشمند^۲ *PhD*، عبدا... سجادیان^۳ *MSc*

*آزمایشگاه جنایی، گروه زیست‌شناسی، اداره کل تشخیص هویت ناجا، تهران، ایران

^۱گروه علوم زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج)، تهران، ایران

^۲گروه ژنتیک انسانی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

^۳آزمایشگاه جنایی، گروه زیست‌شناسی، اداره کل تشخیص هویت ناجا، تهران، ایران

چکیده

اهداف: ژنوم میتوکندری سلول‌های انسانی دارای ۱۶۵۶۹ نوکلئوتید است و دگرگونی در ناحیه HVSI، ده برابر سریع‌تر از DNA کروموزومی رخ می‌دهد. این تحقیق با هدف مطالعه میزان پلی‌مورفیسم، تعیین درصد جهش و محاسبه میزان تنوع نوکلئوتیدهای جهش‌یافته و واریانس هاپلوتیپ‌ها در اقوام مختلف ایرانی انجام شد.

روش‌ها: ۳۵۷ نمونه تصادفی خون افراد بومی و غیرخویشاوند منتسب به اقوام فارس، ترک آذری، گیلک، کرد، سیستانی، بلوچ، عرب و ترکمن جمع‌آوری شد. پس از تخلیص DNA میتوکندری و تکثیر ناحیه HVSI، تعیین توالی آن توسط دستگاه توالی‌گر ABI 310 انجام شد. توالی‌ها با برنامه Clustalx با توالی مرجع کمبریج مقایسه و نوکلئوتیدهای جهش‌یافته و پلی‌مورفیسم‌ها مشخص شد. سپس از طریق درخت فیلوژنتیک ژنوم میتوکندری، هاپلوگروپ‌ها مشخص شد.

یافته‌ها: بیشترین جهش با همویلازی بالا در فارس‌ها (۴۰٪) و کمترین مقادیر در سیستانی‌ها (۱۳٪) مشاهده شد. کمترین تنوع هاپلوتیپ مربوط به قوم فارس با ۸۶۲/۰ و بیشترین تنوع هاپلوتیپ مربوط به سیستانی‌ها با ۸۷/۰ بود. در اکثریت اقوام ایرانی هاپلوگروپ HV فراوان‌ترین هاپلوگروپ بود.

نتیجه‌گیری: فراوانی هاپلوتیپ‌های بی‌نظیر DNA میتوکندری بین اقوام، بیشتر از فراوانی آن درون افراد یک قوم است. پایین بودن تنوع در یکی از اقوام، بیانگر رعایت ازدواج درون‌قومی و عدم ورود میتوکندری‌های غیربومی در آن است. بالا بودن واریانس در قومی دیگر نشان‌دهنده اهمیت DNA میتوکندری در شناسایی هویت افراد این قوم در پرونده‌های جنایی است. بالا بودن تعداد جهش در یکی از اقوام نشان‌گر قدیمی‌تر بودن این قوم است.

کلیدواژه‌ها: ژنوم میتوکندری، هاپلوتیپ، ژنتیک قومیتی

mtDNA haplotypes; a powerful tool in anthropology and crime detection

Fakhrz M. R.* *PhD*, Tavallaee M.¹ *PhD*, Hooshmand M.² *PhD*, Sajjadian A.³ *MSc*

*Forensic Laboratory, Department of Biology, NAJA Identification Head-Quarter, Tehran, Iran

¹Department of Biology, Faculty of Science, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

²Department of Human Genetics, National Institute of Genetic Engineering & Biotechnology, Tehran, Iran

³Forensic Laboratory, Department of Biology, NAJA Identification Head-Quarter, Tehran, Iran

Abstract

Aims: Human mitochondrial DNA (mtDNA) contains 16,569 nucleotide and changes in mtDNA HVSI region occur 10 times faster than genomic DNA. The aim of this study was to assess polymorphism, the rate of mutation, homoplasy, frequency of haplogroups, haplotype variance and nucleotide diversity in HVSI region of mtDNA of Iranian ethnic groups.

Methods: Blood samples were randomly obtained from 357 native non-relatives Fars, Azerbaijani, Gilaki, Kurdish, Baluch, Sistani, Turkmen and Arab volunteers. mtDNA was extracted and amplification of HVSI region was carried out. Automated DNA sequencing was carried out on a DNA Sequencer (ABI 310). The sequences were aligned based on the Cambridge reference sequence by Clustalx program and mutations and polymorphisms were determined. Haplogroups were determined according to mtDNA phylogenetic tree.

Results: Highest and lowest homoplasy was observed in Fars people (40%) and Sistani people (13%) respectively. The lowest nucleotide diversity among all studied ethnic groups belonged to Fars people and it was 0.862. Haplotype variance was 0.87 in Sistani people which was the highest. The most common haplogroup among different ethnic groups was HV.

Conclusion: Frequency of mtDNA unique haplotypes among different ethnic groups is higher than that of a single ethnic group. Lower nucleotide diversity in one of ethnic groups demonstrates that they do not marry people with different ethnicities. Higher variance of haplotypes in other ethnic group indicates the importance of mtDNA in detecting their identity in criminal cases. Higher mutations in one of ethnic groups demonstrate that they are the most ancient ethnic group in Iran.

Keywords: Mitochondrial DNA, Haplotype, Ethno Genetic

مقدمه

حل بسیاری از معماهای تاریخی مانند مطالعه رابطه خویشاوندی خانواده رومانف و شناسایی سربازان گمنام ویتنام از طریق مطالعه هاپلو تیپ‌های mtDNA انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل فساد نمونه‌ها و جزئی بودن مقدار نمونه‌های بیولوژیک به‌جامانده در صحنه‌های جرم و سخت بودن استخراج DNA هسته‌ای از آنها و از نمونه‌هایی مثل استخوان، دندان و تار مو، مناسب‌ترین و مطمئن‌ترین راه آنالیز DNA میتوکندری است [۴].

مارکرهای DNA میتوکندری: بیشترین اختلاف و گوناگونی mtDNA در بین افراد یک جمعیت در ناحیه کنترل (D-Loop) و قطعه متغیر HVSI با ۳۴۲ نوکلئوتید و قطعه HVSII با ۲۸۶ نوکلئوتید است که شماره‌گذاری نوکلئوتیدها اشاره به موقعیت آنها در توالی مرجع آن‌درسون دارد. ژنوم میتوکندری انسان برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ در آزمایشگاه فریدریک سنجر در کمبریج تعیین توالی شد. امروزه توالی اصلی آن با آدرس Accession Genebank M63933 در بانک ژنی به‌عنوان توالی مرجع برای مقایسه توالی‌های جدید به کار می‌رود و عموماً به توالی آن‌درسون یا توالی مرجع کمبریج مشهور است [۱]. تخمین زده شده است که افراد غیرخویشاوند، در این ناحیه ۱-۳٪ اختلاف داشته باشند که این اختلاف در بین دو قطعه متغیر HVSI و HVSII توزیع شده است [۲، ۵]. برای آنالیز mtDNA یک فرد و مقایسه آن با فرد دیگر و تعیین هاپلو تیپ‌ها، لازم است توالی آنها تعیین شود. در نواحی مذکور نقاطی به نام Hot Spot وجود دارد که تفاوت‌ها در آن نواحی به‌صورت خوشه‌ای قرار گرفته است [۶]. برای تشخیص تفاوت یا تشابه mtDNA روش‌های غربالگری سریع و جدیدتری نیز ابداع شده است که با استفاده از این روش‌ها، نمونه‌هایی را که قرابتی با هم ندارند، به‌آسانی می‌توان شناسایی کرد. این روش‌ها عبارتند از: کاوشگرهای اختصاصی اولیگونوکلئوتیدی، تعیین توالی در مقیاس کوچک، الکتروفورز ژل دارای شیب غلظت، آزمایش هضم آنزیمی برای آمپلیکون‌های ناحیه HVSI و آزمایش لکه‌گذاری معکوس برای آمپلیکون‌های ناحیه HVSII.


هاپلوگروپ‌های میتوکندری و مهاجرت ژنتیکی انسان امروزی: آنالیز الگوهای DNA میتوکندری انسان امروزی، امکان جستجوی ردپای سفر ژنتیکی زنان و مادران قدیمی انسان را فراهم ساخته است. مدارک به‌دست‌آمده از این مطالعات نشان می‌دهد که گونه‌های انسان امروزی حدود ۱۵۰ هزار سال پیش از این، در آفریقا می‌زیسته‌اند و حدود ۷۰-۶۰ هزار سال پیش به آسیا و ۵۰-۴۰ هزار سال پیش به اروپا و حدود ۳۰-۲۰ هزار سال پیش، از آسیا و اروپا به آمریکا مهاجرت کرده‌اند [۷، ۸].

درخت فیلوژنتیک mtDNA به هاپلوگروپ‌های بزرگ R، N، M، L گروه‌بندی شده و هر یک از این هاپلوگروپ‌های بزرگ، خود به زیرهاپلوگروپ‌ها شاخه‌بندی می‌شوند. هر یک از ماگروهاپلوگروپ‌ها به یک منطقه جغرافیایی خاص از کره زمین تعلق دارد. زیرهاپلوگروپ‌های L در قاره آفریقا، هاپلوگروپ‌های C، D، G، Z در

میتوکندری اندامکی دوغشایی است که به‌صورت رشته‌ای یا دانه‌ای در سیتوپلاسم سلول‌های یوکاریوتیک وجود دارد. میتوکندری‌ها کانون اصلی تنفس سلولی بوده و براساس تئوری همزیستی، انگل‌های اجباری درون سلولی هستند. سنتز پروتئین در میتوکندری همانند باکتری‌ها توسط کلرامفینیکل متوقف می‌شود. در هر سلول هزار الی ۱۰ هزار میتوکندری و در درون هر یک از آنها ۵ تا ۱۰ ژنوم وجود دارد. در بسیاری از گونه‌های بررسی‌شده، DNA میتوکندری طول ثابتی حدود ۵ μm دارد، ولی در مخمرها و نوروسپورا ابعاد مولکولی آنها بزرگ‌تر است، یعنی این که در این جانداران، DNA میتوکندری ممکن است اطلاعات ژنتیکی بیشتری داشته باشد. مقدار GC در DNA میتوکندری بیشتر بوده و گرمای لازم برای تخریب DNA میتوکندری بیشتر از DNA هسته‌ای است. اطلاعات ژنتیکی موجود در DNA میتوکندری برای سنتز تمام پروتئین‌ها و آنزیم‌های موجود در این اندامک کافی نیست.

در بیشتر جانوران، دو رشته DNA میتوکندری چگالی‌های مختلفی دارند، بنابراین آنها را زنجیره‌های H (سنگین) و L (سبک) نام‌گذاری کرده‌اند. جهش در mtDNA می‌تواند در وظایف سلول ایجاد اختلال کند که از دست‌دادن وظایف آن ممکن است انعکاس شدید کلینیکی داشته باشد و به ابتلا به بیماری‌هایی مثل ضعف عضلانی و انحطاط عصبی مانند آلزایمر و هانتینگتون بیانجامد. جهش در mtDNA هنگامی رخ می‌دهد که آنزیم پلی‌مراز خطا کند یا آسیب اکسیداتیو رخ دهد. افرادی که در سلول‌های خود mtDNA جهش‌یافته حمل می‌کنند، به‌صورت تبیین در سلول‌های خود مخلوطی از mtDNA جهش‌یافته و وحشی دارند، شرایطی که هتروپلاسمی خوانده می‌شود. توالی مرجع mtDNA به‌صورت الگویی برای مقایسه توالی ژنوم میتوکندری افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱]. اطلاعات به‌دست‌آمده از این مقایسه، مشخصه‌های مهمی از ژنوم میتوکندری برای درک تکامل در اختیار دانشمندان ژنتیک مولکولی قرار می‌دهد که به‌عنوان ساعت مولکولی در جمعیت‌شناسی و واگرایی انسان‌ها و سایر موجودات کاربرد دارد [۲].

الگوی توارث ژنوم میتوکندری: هنگام تلقیح، اسپرم میتوکندری خود را از دست می‌دهد. بنابراین میتوکندری سلول‌های انسان فقط از مادر به فرزندان منتقل می‌شود [۳]. این در حالی است که مارکرهای کروموزوم Y فقط از پدر به فرزندان پسر و مارکرهای STR به‌صورت مشترک از والدین به فرزندان دختر و پسر منتقل می‌شود. به‌دلیل آن که میتوکندری فقط از مادر به همه فرزندان منتقل می‌شود، هاپلو تیپ‌های آن در مطالعات مردم‌شناسی و شناسایی افراد گم‌شده و قربانیان حوادث و بلایای طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ژنتیک مولکولی از طریق مطالعه هاپلوگروپ‌های اقوام و جمعیت کشورها، مردم‌شناسان و باستان‌شناسان را در شناسایی ارتباط ریشه‌ای آنها و مهاجرت ژنتیکی انسان‌های اولیه در بین قاره‌ها کمک می‌کند.



شکل ۱) نمونه‌ای از الکتروفوروگرام قطعه HVSI در برنامه Chromas

۳- اندازه محصول PCR با توجه به موقعیت پرایمرها بزرگتر از ناحیه HVSI توالی کمبریج بود. بنابراین نوکلئوتیدهای خارج از محدوده ناحیه مورد نظر، حذف و توالی مورد نظر برای ردیف‌بندی آماده شد.
۴- توالی‌ها توسط برنامه Clustalx با توالی مرجع کمبریج مقایسه و نوکلئوتیدهای جهش‌یافته و پلی‌مورفیسم‌ها در ژنوم میتوکندری هر فرد مشخص شد.

۵- براساس نوکلئوتیدهای جهش‌یافته و پلی‌مورفیسم‌ها از طریق درخت فیلوژنتیک ژنوم میتوکندری، هاپلوگروپ هر یک از افراد مشخص و فراوانی هاپلوگروپ‌ها، واریانس هاپلوتیپ‌ها، تنوع نوکلئوتیدها و هموپلازی محاسبه شد.

نتایج

تعداد ۱۶۰ نوکلئوتید جهش‌یافته در ناحیه HVSI افراد مشاهده شد. بیشترین جهش با هموپلازی بالا در فارس‌ها و کمترین تنوع نیز مربوط به قوم فارس با عدد ۰/۸۶۲ بود. واریانس هاپلوتیپ‌ها در بین افراد سیستانی بالاتر از دیگر اقوام با عدد ۰/۸۷ بود. میانگین اختلاف در نوکلئوتیدها، تعداد هاپلوتیپ در هر قوم، واریانس و تنوع اقوام در جدول ۱ نشان داده شده است. هاپلوگروپ HV فراوان‌ترین هاپلوگروپ در اقوام مطالعه‌شده و فراوانی هاپلوگروپ J در اقوام کرد و آذری و فارس به ترتیب ۲۰، ۱۶ و ۱۴٪ بود.

جدول ۱) واریانس و میانگین تغییر نوکلئوتیدی و هموپلازی در اقوام ایرانی

شاخص ← ↓ اقوام	تعداد هاپلوتایپ (K)	واریانس تنوع ژنتیکی	تعداد هاپلوتایپ یونیک	هموپلازی (%)	میانگین تعداد اختلاف در نوکلئوتیدها
فارس	۵۰	۰/۶۱	۳۰	۴۰	۳/۵
آذری	۵۰	۰/۸۱	۴۰	۲۰	۳
گیلکی	۴۷	۰/۸۲	۳۸	۱۹	۲/۷
کردی	۵۰	۰/۷۶	۳۸	۲۴	۲/۸
بلوچ	۴۲	۰/۶۲	۲۶	۳۸	۲/۷
سیستانی	۳۸	۰/۸۷	۳۳	۱۳	۲/۶
ترکمن	۵۰	۰/۸۲	۴۱	۱۸	۳/۱
عرب	۳۰	۰/۷۷	۲۳	۲۳	۲/۸

اوراسیای شرقی [۹] و هاپلوگروپ‌های H، U، T، J و V در اوراسیای غربی بیشتر دیده می‌شوند [۱۰]. با مطالعه الگوهای میتوکندری در سرزمین کهن ایران (سرزمینی که در کریدور بزرگ مهاجرت ژنتیکی شرق به غرب قرار گرفته است)، هاپلوگروپ‌های اقوام مطالعه‌شده ایرانی و فراوانی هاپلوگروپ‌های ویژه اوراسیای شرقی و غربی در هر یک از آنها مشخص می‌شود [۲]. در جمعیت ایران هاپلوگروپ‌های اوراسیای غربی (H، V، U، T، J) و اوراسیای شرقی (M، R، N) با تنوع بالایی دیده می‌شوند که می‌تواند از ویژگی‌های جمعیت ایران باشد. وجود هاپلوگروپ‌های اوراسیای غربی و اوراسیای شرقی مهاجرت ژنتیکی انسان‌ها را از قسمت‌های مختلف در زمان‌های متفاوت به فلات ایران بیان می‌کند [۶].

برای استفاده از ژنوم میتوکندری در تعیین هویت، لازم است هاپلوتیپ‌ها و فراوانی آنها در اقوام مختلف تشکیل‌دهنده جمعیت مطالعه شود. بررسی فراوانی هر یک از هاپلوتیپ‌ها در اقوام جمعیت کشور، امکان تشخیص هویت مجرم از نمونه‌های بیولوژیکی به‌دست آمده از صحنه جرم و شناسایی هویت اجساد مجهول‌الهویه ناشی از سوانح و حوادث را از طریق تبار مادری فراهم می‌سازد [۱۱].

هدف از این تحقیق، مطالعه میزان پلی‌مورفیسم، درصد جهش و میزان هموپلازی (میزان جهش‌های مشابه در بین افراد یک قوم) در اقوام مختلف ایران، بررسی میزان فراوانی هاپلوتیپ‌ها و محاسبه حداقل و حداکثر گوناگونی در هاپلوتیپ‌های اقوام ایرانی و نیز تعیین قدیمی‌ترین اقوام ایرانی و محاسبه میزان تنوع نوکلئوتیدهای جهش‌یافته و واریانس هاپلوتیپ‌ها به‌منظور استفاده در پرونده‌های جنایی بود.

روش‌ها

در این مطالعه، هاپلوتیپ‌های ناحیه HVSI ژنوم میتوکندری ۳۵۷ نفر متناسب به اقوام فارس، ترک آذری، گیلک، کرد، سیستانی، بلوچ، عرب و ترکمن مورد بررسی قرار گرفت. مقدار ۲ میلی‌لیتر خون از افراد غیرخویشاوند، براساس محل تولد و اطلاعات مربوط به ۳ نسل متوالی بنا به اظهارات و اطلاعات ارائه‌شده توسط خود افراد، در میکروتیوب‌های حاوی ضدانعقاد EDTA با غلظت ۰/۵ مولار و pH برابر ۸، تهیه و اقدامات آزمایشگاهی به شرح زیر انجام شد:

۱- پس از تخلیص DNA ژنومیک با روش "سال‌تینگ/وت"، ناحیه HVSI با استفاده از پرایمرهای (F) ONP98 (LF): 5'-ATC ATT GGA CAA GTA GCA TC-3' (R) ONP24 و (HR): 5'-TAG TAA GTA TGT TCG CCT GT-3' تکثیر شد.

۲- توالی محصول PCR با دستگاه توالی‌گر ABI 310 آنالیز و الکتروفوروگرام حاصله با نسخه شماره ۱/۴۵ نرم‌افزار Chromas به‌حالت FASTA تبدیل شد (شکل ۱).

هاپلوگروپ‌های mtDNA جمعیت ساکن در شمال و غرب و مرکز و جنوب شرقی ایران متعلق به شاخه‌های قفقازی بود.

مقایسه دوبه‌دوی اقوام: نوکلئوتیدهای تغییر یافته در بین افراد هر قوم و همچنین اقوام به صورت دوبه‌دو با یکدیگر مقایسه شدند. در ۵۰ نفر از قوم فارس تعداد ۱۸۵ جهش در ۶۳ نقطه، در ۵۰ نفر ترک آذری تعداد ۱۳۷ جهش در ۵۶ نقطه، در ۴۷ نفر گیلکی تعداد ۱۱۶ جهش در ۵۷ نقطه، در ۵۰ نفر کرد تعداد ۱۴۰ جهش در ۴۷ نقطه، در ۴۲ نفر بلوچ تعداد ۱۲۰ جهش در ۵۰ نقطه، در ۳۸ نفر سیستانی تعداد ۱۰۰ جهش در ۴۵ نقطه، در ۳۰ نفر عرب تعداد ۸۲ جهش در ۴۶ نقطه و در ۵۰ نفر ترکمن تعداد ۱۵۰ جهش در ۶۲ نقطه مشاهده شد. براساس میزان جهش مشاهده شده در اقوام مطالعه شده کمترین هموپلازی در نوکلئوتید مربوط به قوم سیستان بود. پائین بودن هموپلازی نشان دهنده تنوع نوکلئوتیدی در ناحیه HVSI قوم سیستان و موثر بودن ژنوم میتوکندری در شناسایی هویت آنها است. با مقایسه دوبه‌دوی نوکلئوتیدهای یونیک اقوام، بیشترین و کمترین تشابه و بیشترین و کمترین تفاوت در الگوی mtDNA آنها مشخص شد. پلی مورفیسم‌های ایجاد شده در الگوی mtDNA قوم کرد بیشترین تشابه را با قوم گیلک داشت و الگوی mtDNA قوم بلوچ بیشترین تفاوت را در نوکلئوتیدهای تغییر یافته با قوم فارس داشت. میانگین درصد اختلاف الگوی mtDNA در اقوام مختلف ایرانی برابر ۰/۱۲۵ بود (جدول ۳).

بحث

مطالعه ما نشان داد در اقوام فارس، آذری، گیلک، کرد و سیستانی فراوان ترین پلی مورفیزم T16126C است، لیکن در دو قوم بلوچ و ترکمن C16223T بیشترین پلی مورفیزم مشاهده شده است. بنابراین نوکلئوتید T16126C از قدیمی ترین پلی مورفیزم‌ها در جمعیت ایران است. ۶۷٪ از هاپلوگروپ‌های mtDNA جمعیت ساکن در شمال، غرب، مرکز و جنوب شرقی ایران متعلق به شاخه‌های قفقازی است. اگرچه فراوانی هاپلوگروپ H در مردم کشور ما به فراوانی اروپا نیست، ولی فراوانی این هاپلوگروپ به‌ویژه شاخه بزرگ HV در کلیه اقوام غیر از ترکمن و بلوچ، بسیار بیشتر از مردم جنوب آسیا و آسیای میانه است. علاوه بر هاپلوگروپ‌های بزرگ، زیرشاخه‌های دیگری نیز در افراد مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفت که معلومات عمیقی از دودمان‌های مختلف را در ساختار درخت فیلوژنتیک ایجاد کرده و مطالعه مردم‌شناسی و قومیت‌شناسی را تسهیل می‌کند [۶، ۲]. در واقع تنوع هاپلوتیپ‌ها در جمعیت ایران یکی از فاکتورهای ارزیابی توان مارکرهای میتوکندری در شناسایی هویت افراد در علوم جنایی است. مهم‌ترین شاخص DNA میتوکندری برای تشخیص هویت در شناسایی مجرمین یا هویت اجساد مجهول‌الهویه واریانس است. با توجه به بالابودن واریانس هاپلوتیپ‌های میتوکندری در یکی از اقوام

فراوانی زیرهاپلوگروپ U7 در اقوام فارس، ترک آذری، گیلک، کرد، بلوچ، سیستانی، ترکمن و عرب به ترتیب ۶، ۱۲، ۱۱، ۸، ۱۰، ۳، ۲ و ۶٪ بود. نتایج به دست آمده، قرار گرفتن ایران را در کریدور جنوب غربی آسیا برای مهاجرت ژنتیکی انسان تاحدودی تایید می‌کند. زیرهاپلوگروپ U7 خودش به دو زیرشاخه تقسیم می‌شود که زیرشاخه U7a دارای جهش از نوع ترانزیشن در نوکلئوتید ۱۶۳۰۹ است و زیرشاخه U7* در نوکلئوتید ۱۶۳۱۸ تغییر کرده است. زمان به هم آمیختگی و رشد همزمان این زیرهاپلوگروپ 38200 ± 13900 سال پیش، محاسبه شد.

در جمعیت مطالعه شده، جهش از نوع ترانزیشن C→T بیشتر از نوع ترانسورژن A→T بود. در مقایسه توالی نوکلئوتیدهای ناحیه متغیر HVSI در اقوام ترکمن و سیستانی با توالی مرجع، الگوی mtDNA بدون تغییر مشاهده نشد. به عبارت دیگر در میتوتیپ همه افراد این قوم، حداقل یک جهش نسبت به ناحیه بسیار متغیر DNA میتوکندری ایجاد شده بود. بیشترین حذف و اضافه شدن نوکلئوتید در ناحیه HVSI مردم سیستان و ترکمن دیده شد (جدول ۲).

جدول ۲) میزان ترانزیشن و ترانسورژن و نوع نوکلئوتیدهای جهش یافته در اقوام مطالعه شده

اقوام ← اِشْاخص	فارس	آذری	گیلک	کرد	بلوچ	سیستانی	ترکمن	عرب
جامعه آماری	۵۰	۵۰	۴۷	۵۰	۴۲	۳۸	۵۰	۳۰
تعداد محل‌های تغییر یافته	۳۰	۴۰	۳۸	۳۸	۲۶	۳۳	۴۱	۲۳
A→G	۱۴	۱۶	۱۸	۱۵	۸	۹	۱۲	۶
G→A	۱۲	۶	۵	۱۲	۱۶	۹	۱۲	۶
T→C	۶۷	۴۹	۳۴	۴۲	۲۵	۳۱	۵۳	۲۶
C→T	۷۲	۵۱	۵۴	۶۰	۴۰	۴۴	۷۰	۳۰
درصد ترانزیشن	۹۳/۷	۹۲/۲	۹۶/۲	۷۸/۲	۹۶/۲	۹۷/۶	۹۴	۹۱/۵
A→T	۴	۶	۴	۲	۲	۱	۱	۲
A→C	۵	۱	۱	۳	۴	۱	۰	۱
G→T	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
G→C	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
C→A	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۱
C→G	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۵	۲
T→A	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
T→G	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
درصد ترانسورژن	۶/۳	۷/۸	۴	۳/۸	۲۱/۸	۲/۴	۶	۸/۵
اضافه	۶	۱	۷	۷	۲	۱۸	۱۹	۵
حذف	۲	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰

بالاترین درصد هموپلازی مشاهده شده مربوط به قوم فارس با ۴۰٪ بود و کمترین هموپلازی مربوط به قوم سیستان با ۱۳٪ بود. ۶۷٪ از

جدول ۳) مقایسه دوبه‌دوی نوکلئوتیدهای تغییر یافته در اقوام مختلف ایران

اقوام	فارس	ترک آذری	گیلگ	کرد	ترکمن	بلوچ	سیستانی	عرب میانگین
فارس	۰	۰/۱۶۲	۰/۱۴۶	۰/۱۲۱	۰/۱۴۱	۰/۱۷۸**	۰/۱۵۲	۰/۱۳۴
ترک آذری	۰/۱۶۲	۰	۰/۱۴۱	۰/۱۳۱	۰/۱۷۲	۰/۱۶۴	۰/۱۶۲	۰/۱۳۸
گیلگ	۰/۱۴۶	۰/۱۴۱	۰	۰/۰۹۹*	۰/۱۵۱	۰/۱۶۴	۰/۱۳۸	۰/۱۲۳
کرد	۰/۱۲۱	۰/۱۳۱	۰/۰۹۹*	۰	۰/۱۳۶	۰/۱۴۹	۰/۱۰۹	۰/۱۰۷
ترکمن	۰/۱۴۱	۰/۱۷۲	۰/۱۵۱	۰/۱۳۶	۰	۰/۱۶۹	۰/۱۳۱	۰/۱۲۹
بلوچ	۰/۱۷۸**	۰/۱۶۴	۰/۱۶۴	۰/۱۴۹	۰/۱۶۹	۰	۰/۱۲۳	۰/۱۳۵
سیستانی	۰/۱۵۱	۰/۱۶۲	۰/۱۳۸	۰/۱۰۹	۰/۱۳۱	۰/۱۲۳	۰	۰/۱۱۵
عرب	۰/۱۷۲	۰/۱۶۹	۰/۱۴۴	۰/۱۱۳	۰/۱۳۸	۰/۱۳۶	۰/۱۰۷	۰/۱۲۲
میانگین کل								
۰/۱۲۵								

* بیشترین تشابه در الگوی mtDNA و ** بیشترین تفاوت را نشان می‌دهد.

2- Tetzlaff S, Atter A, Wegener W, Parson W, Weirich V. Mitochondrial DNA population data of HVS-I and HVS-II sequences from Northeast German. *Forensic Sci Int.* 2007;172:218-24.

3- Giles RE, Blanc H, Cann HM, Wallace DC. Maternal inheritance of human mitochondrial DNA. *Proc Natl Acad Sci USA.* 1980;77:6715-9.

4- Andreasson H, Gyllensten U, Allen M. Real-time DNA quantification of nuclear and mitochondrial DNA in forensic analysis. *Biotechniques.* 2002;33:402-4.

5- Reynolds R, Walker K, Varlaro J, Allen M, Clark E, Alavaren M. Detection of sequence variation in the HVII region of the human mitochondrial genome in 689 individuals using immobilized sequence specific oligonucleotide probes. *J Forensic Sci.* 2000;45:1210-31.

6- Allard MW, Wilson MR, Monson KL, Budowle B. Control region sequences for East Asian individuals in the scientific working group on DNA analysis methods forensic mtDNA data set. *Legal Med.* 2004;6:11-24.

7- Ratnagar S. Archaeological perspectives on early Indian societies. Bombay: Popular Prakashan; 1995.

8- Bulayeva K, Jorde LB, Ostler C, Watkins S, Bulayev O, Harpending H. Genetics and population history of Caucasus populations. *Hum Biol.* 2003;75:837-53.

9- Kivisild T, Tolk HV, Paric J. The emerging limbs and twigs of the East Asian mtDNA tree. *Mol Biol.* 2002;19:1737-51.

10- Torroni A, Richards M, Macaulay V. mtDNA haplogroups and frequency patterns in Europe. *Am J Hum Gen.* 2000;66:1173-7.

11- Ricaut F, Thomas T, Arganini C, Staughton J, Leavesley M, Bellatti M, et al. Mitochondrial DNA variation in Karkar Islanders. *Ann Human Genet.* 2008;172:349-67.

به‌کارگیری مارکر میتوکندری در این قوم با اهمیت‌تر از سایر اقوام است.

نتیجه‌گیری

فراوانی هاپلوتیپ‌های بی‌نظیر و غیرتکراری mtDNA در بین اقوام، بیشتر از فراوانی آن در بین افراد درون یک قوم است. پایین بودن تنوع در یکی از اقوام، بیانگر محدود شدن افراد این قوم و رعایت ازدواج درون‌قومی و عدم ورود افراد غیرقومی در آن است. بالابودن واریانس در قومی دیگر، بیانگر اهمیت DNA میتوکندری در شناسایی هویت افراد این قوم در پرونده‌های جنایی است. بالابودن تعداد جهش در یکی دیگر از اقوام، قدیمی بودن این قوم را نسبت به سایر اقوام بیان می‌کند.

تشکر و قدردانی: بدین وسیله از تمامی مراکز پژوهشی که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع

1- Aderson S, Bankiev AT, Barrell BG, DeBruijn MHL. Sequence and organization of the human mitochondrial genome. *Nature.* 1981;290:457-65.