

راهنمای بالینی مدیریت بیماران با خونریزی پس از زایمان

دکتر فاطمه تارا^۱، دکتر رزیتا داویدی^{۲*}، دکتر نفیسه ثقفی^۳، دکتر معصومه میر تیموری^۴، دکتر هاله قوشخانه ئی^۵، دکتر آزاده سلطانی فر^۶، دکتر مریم صالحی^۷، دکتر سلمه دادگر^۸، دکتر فاطمه عبدالله‌ی^۹، دکتر منیره دباغ^{۱۰}، دکتر عالم تاج صوصاصی^{۱۱}، دکتر زهرا علامه^{۱۲}، دکتر گلناز صبوری^{۱۳}

۱. دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۲. پژوهش عمومی، MPH، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۳. دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۴. استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۵. پژوهش عمومی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۶. استادیار گروه پژوهشی اجتماعی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۷. استاد گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
۸. استاد گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
۹. دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
۱۰. استاد گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۵/۹ تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۲/۳۰

خلاصه

مقدمه: پیچیدگی روند تشخیص و درمان و مشکلات موجود در زمینه مدیریت درمان خونریزی پس از زایمان و عدم وجود یک راهنمای بالینی واحد در این زمینه، منجر به تدوین راهنمای بالینی جامع و بومی به منظور کاهش مرگ و میر و افزایش پیش‌آگهی شد.

روش کار: ابتدا تمام منابع راهنمایهای بالینی بین المللی در موضوع خونریزی پس از زایمان جستجو شد. پس از بررسی کیفیت و نقد راهنمایهای بالینی بر پایه سیستم امتیازدهی Agree، سه راهنمای مناسب با عنوان های راهنمای بالینی مدیریت خونریزی بعد از زایمان کالج رویال متخصصین زنان و مامایی، سازمان جهانی بهداشت و راهنمای بالینی ایرلند انتخاب شدند. به منظور بومی سازی، جداولی طراحی شد که در آنها، توصیه های سه راهنمای بالینی منتخب در قالب سوالات بالینی استخراج شد. شواهد پشتیبان هر توصیه بر اساس رفرنس ذکر شده در راهنمای بالینی مشخص شد و مقالات از نظر پیامدهای اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند. هزینه مداخلات و عوارض جانبی و مزیت بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت راهنمای بومی، پس از جمع بندی، قضاؤت و اجماع اعضاء پanel تخصصی و در غالب مرور مقالات، همراه با شواهد و توصیه ها تدوین شد.

یافته ها: نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قالب توصیه های بالینی ارائه شد. به عنوان مثال: پروفیلاکسی با اکسی توسيک ها در مدیریت مرحله سوم زایمان برای همه باید انجام شود و این تجویز خطر ایجاد خونریزی اولیه پس از زایمان را ۶۰ درصد کاهش می دهد.

کلمات کلیدی: بومی سازی، توصیه های بالینی، خونریزی پس از زایمان

*نویسنده مسئول مکاتبات: دکتر رزیتا داویدی؛ مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران؛ تلفن: ۰۵۱-۸۵۲۱۱۱۹؛ پست الکترونیک: davoodir@mums.ac.ir

در سیستم‌های بهداشتی، بسیاری از زنان قادر به دسترسی به مراقبت‌های ضروری دوران بارداری، زایمان و پس از آن نیستند^(۸). سیستم نظارت بر مرگ و میر بارداری وابسته به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، نشان می‌دهد که خونریزی، عامل مستقیم بیش از ۱۷٪ از ۴۲۰۰ مورد مرگ مادری وابسته به بارداری در ایالات متحده بوده است^(۹). در کشورهای کمتر توسعه یافته، نقش خونریزی در میزان مرگ و میر مادران باز هم بالاتر است^(۱۰، ۱۱). شواهد نشان دهنده این مطلب است که در اکثریت موارد مرگ، میزان مراقبت از مادر پایین تر از سطح استاندارد بوده است. به نظر می‌رسد که کمبود حد و مرزهای مشخص و استاندارد در زمینه ارجاع بیماران، ارزیابی‌های لازم و انواع مختلف درمان‌های مؤثر، لزوم مداخلات به موقع و بجا، درمان غیر جراحی و جراحی و زمان مناسب آن، موجب ناهمگونی و تنوع ارائه خدمات در این مقوله شده است. با تنوین راهنمای بالینی و تعیین راهکارهای عملی و بومی، می‌توان به ارائه خدمات یکسان و استاندارد نزدیک شد. لذا بومی سازی راهنمای بالینی مدیریت خونریزی پس از زایمان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت.

روش کار

در این مرور سیستماتیک مقالات و راهنمای‌های بالینی، تمامی منابع راهنمای‌های بالینی بین المللی (جدول ۱) در موضوع خونریزی پس از زایمان جستجو شد.

جدول ۱- لیست منابع راهنمای بالینی

منابع راهنمای

- National Guidelines Clearinghouse (NGC)
Guidelines International Network (G-I-N)
National Institute for Clinical Excellence (NICE)
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
Ontario Guidelines Advisory Committee (GAC) Recommended Clinical Practice Guidelines
New Zealand Guidelines Group
National Health and Medical Research Council (NHMRC)

عنوان‌های راهنمای بالینی مدیریت خونریزی بعد از زایمان کالج رویال متخصصین زنان و مامایی (۱۲)، سازمان جهانی بهداشت (۱۳) و راهنمای بالینی ایرلند (۱۴) انتخاب شد. به منظور بومی سازی، جداولی طراحی شد که در آنها توصیه‌های سه راهنمای بالینی منتخب در

مقدمه

یکی از شایعترین علل مرگ مادر در تمام دنیا خونریزی پس از زایمان است که جزء علل قابل پیشگیری می‌باشد (۱-۳) و تقریباً بیشتر موارد در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق می‌افتد^(۴).

خونریزی پس از زایمان (PPH) به صورت از دست دادن خون بیشتر از ۵۰۰ میلی لیتر یا بیشتر از دستگاه ژنیتال پس از کامل شدن سومین مرحله زایمان و یا در مدت ۲۴ ساعت پس از زایمان، تعریف شده است^(۵) و در صورتی که میزان خونریزی بیشتر از ۱۰۰۰ میلی لیتر باشد، به آن خونریزی شدید اطلاق می‌شود^(۶). تعریف سازمان جهانی بهداشت از خونریزی پس از زایمان تمام موارد خونریزی بیشتر از ۵۰۰ میلی لیتر می‌باشد^(۷). در حالی که بیشتر موارد مرگ و میر مریبوط به خونریزی، در ۲۴ ساعت اول اتفاق می‌افتد، ممکن است خونریزی به میزان متوسط تا شدید بین ۲۴ ساعت تا ۱۲ هفته پس از زایمان، رخ دهد که به آن خونریزی ثانویه گفته می‌شود. علل شایع PPH عبارتند از خونریزی از محل لانه گزینی جفت، ضربه به دستگاه تناسلی و ساختارهای مجاور آن و یا هر دو، عدم جمع شدگی کامل رحم (آتونی)، پارگی رحم و اختلالات خونریزی دهنده مادر^(۸). آتونی رحم شایعترین علت و به عبارتی علت عده مرگ و میر مادران در سراسر جهان می‌باشد.

متأسفانه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، کاهش سرمایه گذاری در حوزه سلامت و عملکرد ضعیف

هفت راهنمای بالینی در این زمینه موجود بود. سرانجام پس از بررسی کیفیت و نقد راهنمای‌های بالینی بر پایه سیستم امتیازدهی^۱, Agree، سه راهنمای مناسب با

^۱ Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation in Europe

تری بودند حذف شدند. هزینه مداخلات و عوارض جانبی و مزیت بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت راهنمای بومی، پس از جمع بندی، قضایت و اجماع اعضاء پانل تخصصی و در غالب مرور مقالات، همراه با شواهد و توصیه‌ها تدوین شد. درجه توصیه‌ها در این راهنمای (A,B,C,D) مربوط به قدرت شواهد مطالعاتی است که توصیه بر اساس آنها می‌باشد (جدول ۲).

قالب سوالات بالینی استخراج شد. همچنین جمعیت و مداخله (با اقدام) اصلی هر توصیه مشخص شد. شواهد پشتیبان هر توصیه بر اساس رفرنس ذکر شده در راهنمای بالینی مشخص شد و مقالات از نظر پیامدهای اولیه مورد مقایسه قرار گرفت. در صورتی که برای یک سوال بیش از یک توصیه موجود بود و توصیه‌ها با یکدیگر همخوانی نداشتند و یا توصیه‌ها سطوح متفاوت شواهد داشتند، توصیه‌هایی که شواهد پشتیبان آنها دارای سطح پایین

جدول ۲- کلید ارزیابی سطوح شواهد و درجه توصیه‌ها

(Level of Evidence) سطوح شواهد

- ++ ۱- متأنالیز با کیفیت بالا، مرور نظام مند مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT) ها با خطای بسیار ناچیز
- + ۱- متأنالیز خوب طراحی شده، مرور نظام مند مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT)، RCT ها با خطای اندک
- ۱- متأنالیزها، مرور نظام مند مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT)، RCT ها با احتمال خطای بالا
- ++ ۲- مرور نظام مند با کیفیت بالا از مطالعات مورد شاهدی و کوهورت، مطالعات مورد شاهدی و کوهورت با کیفیت بالا و با احتمال بسیار ناچیز خطأ و مخدوش شدگی و احتمال زیاد اینکه رابطه علیتی است.
- . ۲- مطالعات مورد شاهدی و کوهورت خوب طراحی شده با احتمال کم خطأ و مخدوش شدگی و احتمال متوسط اینکه رابطه علیتی است.
- ۳- مطالعات مورد شاهدی و کوهورت با احتمال زیاد خطأ و مخدوش شدگی و خطر بازی که رابطه علیتی نیست.
- ۴- مطالعات غیر تحلیلی مثل گزارش موارد و گزارش موردی

۴ نظر متخصصین

(Grade of Recommendation) درجه توصیه‌ها

- A- حداقل شامل یک متأنالیز، مرور نظام مند مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و یا RCT در سطح ++ که به طور مستقیم برای جمعیت هدف قابل استفاده باشد و یا مجموعه ای از شواهد شامل مطالعات سطح + که به طور مستقیم برای جمعیت هدف قابل استفاده باشد و در کل نشانگر نتایج مشابه باشند.
- B- مجموعه ای از شواهد شامل مطالعات سطح ۲++ که به طور مستقیم برای جمعیت هدف قابل استفاده باشد و در کل نشانگر نتایج مشابه باشند و یا منتج از مطالعات سطح + یا ++ باشد.
- C- مجموعه ای از شواهد شامل مطالعات سطح + که به طور مستقیم برای جمعیت هدف قابل استفاده باشد و در کل نشانگر نتایج مشابه باشند و یا منتج از مطالعات سطح ۲++ باشد.
- D- شواهد سطح ۳ یا ۴ و یا منتج از مطالعات سطح + باشد

یافته‌ها

در این قسمت نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده در قالب توصیه‌های بالینی ارائه می‌شود.

- ۱- پس از تولد نوزاد، میزان خون از دست رفته و پارامترهای بالینی باید به دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند. شواهد کافی برای توصیه اندازه گیری دقیق میزان خون از دست رفته نسبت به تخمین بالینی وجود ندارد (B). (۱۷-۱۵)

- ۲- در خونریزی اولیه پس از زایمان که شامل از دست دادن خون حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر (در صورت عدم وجود علائم بالینی شوک) می‌باشد، اقدامات پایه

شامل نظارت نزدیک، دسترسی وریدی، شمارش کامل خون، تعیین گروه خونی و غربالگری به منظور تسهیل عمل احیاء باید انجام گیرد (C).

۳- اگر خونریزی در بیماری با تشخیص خونریزی اولیه پس از زایمان و تخمین خونریزی در حد ۱۰۰۰ میلی لیتر (یا تخمین خونریزی کمتر و وجود علائم بالینی شوک و تاکی کاردی) ادامه یافت، باید سریعاً یک پروتکل کامل از اقدامات احیاء و هموستان صورت گیرد (C).

۴- مدیریت فعال مرحله سوم زایمان در مقایسه با مدیریت انتظاری و فیزیولوژیک، خطر خونریزی پس از

- شريان لگن در زنان مبتلا به جفت اکرتا مبهم است و نياز به ارزيبايي بيشتر دارد (B) (۲۵-۲۸).
- ۱۲- به محض تشخيص PPH باید چهار عمل به طور همزمان و سريع انجام شود: ارتباط، احياء، ارزيبايي و جستجو، توقف خونريزى (C).
- ۱۳- مشاوران به توافق نظر رسيدند که در مورد استفاده از فاكتور نوترکيب VIIa برای درمان خونريزى پس از زایمان شواهد کافی وجود ندارد و استفاده از آن باید محدود به زنان با انديکاسيون های هماتولوژيك خاص باشد (C) (۲۹، ۳۰).
- ۱۴- ترانكراپيميك اسييد ممکن است در موارد زير به عنوان يك درمان برای خونريزى پس از زایمان مورد استفاده قرار گيرد: (الف) تجويز اکسی توسيين و پروستاگلاندين در توقف خونريزى ناموفق باشد. (ب) خونريزى تا حدی در اثر تروما باشد (C) (۳۱-۳۴).
- ۱۵- ماساز رحمي پس از تشخيص خونريزى پس از زایمان مؤثر می باشد (B) (۳۵، ۳۶).
- ۱۶- فشار بر رحم با دو دست، ممکن است به عنوان يك اقدام در درمان خونريزى پس از زایمان به علت آتونی رحم پس از زایمان واژينال، انجام شود (C) (۳۷).
- ۱۷- پک کردن رحم به عنوان يك درمان برای توقف خونريزى پس از زایمان واژينال توصيه نمي شود (C) (۳۸-۴۲).
- ۱۸- در زنانی که اکسی توسيين را به عنوان پيش گيري در مرحله سوم زایمان دريافت نکرده اند، اکسی توسيين به تنهايي داروي انتخابي در درمان خونريزى پس از زایمان می باشد (A) (۴۳).
- ۱۹- برای مدیريت درمان خونريزى پس از زایمان، اکسی توسيين نسبت به ارگومترین به تنهايي يا ترکيبی از ارگومترین و اکسی توسيين، كربتوسيين و پروستاگلاندين ها ترجيح داده می شود (B).
- ۲۰- اگر اکسی توسيين در دسترس نیست يا اگر خونريزى به اکسی توسيين پاسخ نمی دهد، ارگومترین يا ترکيبی از ارگومترین و اکسی توسيين با دوز ثابت به عنوان درمان ثانويه مورد استفاده قرار گيرد (B).
- ۲۱- اگر خط دوم درمان در دسترس نیست و يا اگر خونريزى به خط دوم درمان پاسخ نمی دهد،
- زایمان و يا ميزان خون از دست رفته مادر را کاهش می دهد (A) (۱۸).
- ۵- پروفيلاكسي با اکسی توسيين باید در مرحله سوم زایمان به همه زنان داده شود و اين تجويز خطر ايجاد خونريزى اوليه پس از زایمان را ۶۰ درصد کاهش می دهد (A) (۱۹، ۲۰).
- ۶- برای زنان بدون عوامل خطرساز برای خونريزى پس از زایمان و زایمان واژينال، اکسی توسيين (۵ یا ۱۰ واحد وريدي) عامل انتخابي برای پروفيلاكسي در مرحله سوم زایمان است (A) (۲۱).
- ۷- در زایمان سزارين، اکسی توسيين (۵ واحد تزريق آهسته داخل وريدي) به منظور افزایش انقباضات رحم و کاهش ميزان خونريزى، باید مورد استفاده قرار گيرد (C) (۲۲، ۲۳).
- ۸- سنتومترین با نام تجاری Alliance ممکن است در نبود فشارخون بالا (به عنوان مثال هموگلوبين پاين در ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ميلي ليتر) پس از زایمان را کاهش می دهد ولی عارضه جانبی استفراغ افزایش می يابد (C).
- ۹- در بيماران سزارين قبلی، باید توسط اولتراسوند (ترجيحاً دليل) محل جفت مورد ارزيبايي قرار گيرد. در جايي که تسهيلات لازم برای انجام MRI وجود داشته باشد می توان از آن برای تشخيص جفت اکرتا/پرکرta استفاده کرد (C) (۲۴).
- ۱۰- بيماران دارای جفت اکرتا/پرکرta در خطر بالاي بروز خونريزى پس از زایمان هستند. هنگامی که پلاستتا اکرتا/پرکرta قبل از تولد تشخيص داده شد، باید مشاوره چند منظوره برای زایمان انجام گيرد. اساتيد مشاور زنان و بيهوشى، جراح عروق و ارولوژيست باید حضور داشته باشند، رзор خون کافي (حداقل ۴ واحد خون کراس مج شده آماده باشد)، پلاسمای منجمد تازه و پلاکت داشته باشيم و زمان و محل زایمان طوري انتخاب شود که امكان دسترسی به مشاور و واحد مراقبت هاي وิژه وجود داشته باشد (C).
- ۱۱- شواهد موجود در مورد سودمندي پيش گيري از خونريزى پس از زایمان با انسداد و يا آمبوليزياسيون

پروستاگلاندین باید به عنوان خط سوم درمان بکار گرفته شود (B) (۴۴، ۴۵).

۲۲- هیچ مزیت اضافی در تجویز میزوپروستول به عنوان درمان کمکی خونریزی پس از زایمان در زنانی که در مرحله سوم زایمان اکسی توسین دریافت کرده اند وجود ندارد. اگر اکسی توسین در دسترس باشد و در مرحله سوم مورد استفاده قرار گرفته باشد، اکسی توسین به تنها نسبت به درمان کمکی میزوپروستول ارجحیت دارد. میزوپروستول ممکن است هنگامی که اکسی توسین در دسترس نباشد به عنوان مثال در زایمان در خانه مورد استفاده قرار گیرد. (A) (۴۶، ۴۷).

۲۳- هنگامی که درمان های دارویی در توقف خونریزی موثر نبودند، اقدام به هموستاز جراحی هر چه سریعتر بهتر است. بالون تامپوناد داخل رحم یا کاندوم تامپوناد، یک مداخله جراحی خط اول مناسب برای بیمارانی است که آتونی رحم علت اصلی خونریزی می‌باشد. اگر این عمل نیز موثر نباشد، مداخلات جراحی نگهدارنده بعدی، بسته به شرایط بالینی و دسترسی به متخصص مربوطه انجام خواهد شد. (C) (۴۸، ۶۴).

۲۴- اگر خونریزی علی رغم درمان با داروهای منقبض کننده رحم، سایر مداخلات نگهدارنده (به عنوان مثال

منابع

- McCormick ML, Sanghvi HC, Kinzie B, McIntosh N. Preventing postpartum hemorrhage in low-resource settings. Int J Gynaecol Obstet. 2002 Jun; 77(3):267-75.
- World Health Organization. Maternal mortality in 1995: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA. Geneva:World Health Organization, 2001.
- Hogan MC, Foreman KJ, Naghavi M, Ahn SY, Wang M, Makela SM, et al. Maternal mortality for 181 countries, 1980- 2008: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal. Lancet. 2010 May 8; 375(9726):1609-23.
- Sloan NL, Langer A, Hernandez B, Romero M, Winikoff B. The etiology of maternal mortality in developing countries: what do verbal autopsies tell us?. Bull World Health Organ. 2001; 79(9):805-10. Epub 2001 Oct 23.
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams's obstetrics. 23th ed. United States of America: McGraw-Hill; 2010.
- Royston E, Armstrong S, editors. Preventing Maternal Deaths. Geneva: World Health Organization; 1989
- World Health Organization. The Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage. Report of a Technical Working Group. Geneva: WHO; 1990.
- Aeun CS, Khor GL, Liabsuetrakul T, Achadi EL, Htay TT, Firestone R, et al. Maternal, neonatal, and child health in southeast Asia: towards greater regional collaboration. Lancet. 2011 Feb 5; 377(9764):516-25.
- Gerberding JL. Centers for disease control and prevention: update: pregnancy related mortality ratios by year of death-united states, 1991-1999. MMWR 52:1, 2003.
- Jegasothy R. Sudden maternal deaths in Malaysia: a case report. J Obstet Gynaecol Res. 2002 Aug; 28(4):186-93.
- Rahman MH, Akhter HH, Khan Chowdhury ME, Yusuf HR, Rochat RW. Obstetric deaths in Bangladesh, 1996-1997.Obstetric deaths in Bangladesh, 1996-1997. Int J Gynaecol Obstet. 2002 May; 77(2):161-9.
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2009. RCOG Green-top Guideline No. 52.
- World Health Organization. WHO Guidelines for the Management of Postpartum Haemorrhage and Retained Placenta. Geneva: World Health Organization; 2009.

14. Royal College of Physicians of Ireland. Prevention and Management of Primary Post Partum hemorrhage. Institute of Obstetricians and Gynecologists: Dublin; 2012.
15. Toledo P, McCarthy RJ, Hewlett BJ, Fitzgerald PC, Wong CA. The accuracy of blood loss estimation after simulated vaginal delivery. *Anesth Analg*. 2007 Dec;105(6):1736-40.
16. Patel A, Goudar SS, Geller SE, Kodkany BS, Edlavitch SA, Wagh K, et al. Drape estimation vs. visual assessment for estimating postpartum hemorrhage. *Int J Gynaecol Obstet*. 2006 Jun; 93(3):220-4.
17. Bose P, Regan F, Paterson-Brown S. Improving the accuracy of estimated blood loss at obstetric haemorrhage using clinical reconstructions. *BJOG*. 2006 Aug;113(8):919-24.
18. Prendiville WJP, Elbourne D, McDonald SJ. Active versus expected management in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev* 2000 ;(3):CD000007.
19. Begley CM, Gyte GM, Murphy DJ, Devane D, McDonald SJ, McGuire W. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010 Jul 7 ;(7):CD007412.
20. Cotter AM, Ness A, Tolosa JE. Prophylactic oxytocin for the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev* 2001 ;(4):CD001808.
21. McDonald SJ, Abbott JM, Higgins SP. Prophylactic ergometrineoxytocin versus oxytocin for the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev* 2004 ;(1):CD000201.
22. Munn MB, Owen J, Vincent R, Wakefield M, Chestnut DH, Hauth JC. Comparison of two oxytocin regimens to prevent uterine atony at caesarean delivery: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2001; 98:386-90.
23. Lokugamage AU, Paine M, Bassaw-Balfroop K, Sullivan KR, Refaey HE, Rodeck CH. Active management of the third stage at caesarean section: a randomised controlled trial of misoprostol versus syntocinon. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2001; 41:411-14.
24. You WB, Zahn CM. Postpartum haemorrhage: abnormally adherent placenta, uterine inversion, and puerperal haematomas. *Clin Obstet Gynecol* 2006; 49:184-97.
25. Mitty HA, Sterling KM, Alvarez M, Gendler R. Obstetric haemorrhage: prophylactic and emergency arterial catheterization and embolotherapy. *Radiology* 1993; 188:183-7.
26. Hansch E, Chitkara U, McAlpine J, El-Sayed Y, Dake MD, Razavi MK. Pelvic arterial embolization for control of obstetric haemorrhage: a five-year experience. *Am J Obstet Gynecol* 1999; 180:1454-60.
27. Ojala K, Perala J, Kariniemi J, Ranta P, Raudaskoski T, Tekay A. Arterial embolization and prophylactic catheterization for the treatment for severe obstetric hemorrhage. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2005; 84:1075-80.
28. Bodner LJ, Nosher JL, Gribbin C, Siegel RL, Beale S, Scorza W. Balloon-assisted occlusion of the internal iliac arteries in patients with placenta accreta/percreta. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2006; 29:354-61.
29. Franchini M, Lippi G. & Franchi M. The use of recombinant activated factor VII in obstetric and gynaecological haemorrhage. *BJOG* 2007; 114: 8-15.
30. Sobieszczyk S. & Breborowicz GH. Management recommendations for postpartum haemorrhage. *Arch Perinat Med* 2004; 10: 1-4.
31. Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, McClelland B, et al. Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007 Oct 17; (4): CD001886.
32. Lethaby A, Farquhar C, CookeI. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2000; (4): CD000249.
33. Gai MY, Wu LF, Su QF, Tatsumoto K. Clinical observation of blood loss reduced by tranexamic acid during and after caesarian section: a multi-center, randomized trial. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2004 Feb 10; 112(2):154-7.
34. As AK, Hagen P, Webb JB. Tranexamic acid in the management of postpartum haemorrhage. *Br J Obstet Gynaecol*. 1996 Dec; 103(12):1250-1.
35. Abdel-Aleem H, Hofmeyr GJ, Shokry M, El-Sonoosy E. Uterine massage and postpartum blood loss. *Int J Gynaecol Obstet*. 2006 Jun; 93(3):238-9. Epub 2006 May 6.
36. Hofmeyr GJ, Abdel-Aleem H, Abdel-Aleem MA. Uterine massage for preventing postpartum haemorrhage. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2008; (3): CD006431.
37. Kovavisarch E, Kosolkittiwong S. Bimanual uterine compression as a major technique in controlling severe postpartum hemorrhage from uterine atony. *J Med Assoc Thai*. 1997 Apr; 80(4):266-9.
38. Haq G, Tayyab S. Control of postpartum and post abortal haemorrhage with uterine packing. *J Pak Med Assoc*. 2005 Sep; 55(9):369-71.
39. Hester JD. Postpartum hemorrhage and reevaluation of uterine packing. *Obstet Gynecol*. 1975 May; 45(5):501-4.
40. Hsu S, Rodgers B, Lele A, Yeh J. Use of packing in obstetric hemorrhage of uterine origin. *J Reprod Med*. 2003 Feb; 48(2):69-71.
41. Nwagha UI, Okaro JM, Nwagha TU. Intraoperative uterine packing with mops: an effective, but underutilized method of controlling post partum haemorrhage – experience from South Eastern Nigeria. *Niger J Med*. 2005 Jul-Sep; 14(3):279-82.
42. Wax JR, Channell JC, Vandersloot JA. Packing of the lower uterine segment – new approach to an old technique. *Int J Gynaecol Obstet*. 1993 Nov; 43(2):197-8.
43. Scottish Obstetric Guidelines and Audit Project. The Management of Postpartum Haemorrhage: A Clinical PracticeGuideline for Professionals Involved in Maternity Care inScotland. SPCERH Publication No. 6. Edinburgh: Scottish Programme for Clinical Effectiveness in Reproductive Health; 1998 [www.nhshealthquality.org/nhsqis/files/MATERNITY SERVICES_PostpartumHaemorrhage_SPCERH6_JUN98.pdf].

44. Oleen MA. & Mariano JP. (1990) Controlling refractory atonic postpartum hemorrhage with Hemabate sterile solution. *Am J Obstet Gynecol.* 1990 Jan; 162(1):205-8.
45. Buttino L Jr. & Garite TJ. The use of 15 methyl F2 alpha prostaglandin (Prostin 15M) for the control of postpartum hemorrhage. *Am J Perinatol.* 1986 Jul; 3(3):241-3.
46. Mousa HA. & Alfirevic Z. (2007) Treatment for primary postpartum haemorrhage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007 Jan 24 ;(1):CD003249.
47. Hofmeyr GJ., Walraven G., Gulmezoglu AM., Maholwana B., Alfirevic Z. Villar J. Misprostol to treat postpartum haemorrhage: a systematic review. *BJOG.* 2005 May; 112(5): 547-53.
48. Ikechebelu JI, Obi RA, Joe-Ikechebelu NN. The control of postpartum haemorrhage with intrauterine Foley catheter. *J Obstet Gynaecol.* 2005 Jan; 25(1):70-2.
49. Akhter S, Begum MR, Kabir Z, Rashid M, Laila TR, Zabeen F. Use of a condom to control massive postpartum haemorrhage. *MedGenMed.* 2003 Sep 11; 5(3):38.
50. Harma M, Gungan N, Ozturk A. B-Lynch uterine compression suture for postpartum haemorrhage due to placenta praevia accreta. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2005 Feb; 45(1):93-5.
51. Ghezzi F, Cromi A, Uccella S, Raio L, Bolis P, Surbek D. The Hayman technique: a simple method to treat postpartum haemorrhage. *BJOG* 2007 Mar, 114:362-5.
52. Joshi VM, Otit SR, Majumder R, Nikam YA, Shrivastava M. Internal iliac artery ligation for arresting postpartum haemorrhage. *BJOG.* 2007 Mar; 114(3):356-61. Epub 2007 Jan 22.
53. Nizard J, Barrinque L, Frydman R, Fernandez H. Fertility and pregnancy outcomes following hypogastric artery ligation for severe post-partum haemorrhage. *Hum Reprod.* 2003 Apr; 18(4):844-8.
54. Wee L, Barron J, Toye R. Management of severe postpartum haemorrhage by uterine artery embolization. *Br J Anaesth.* 2004 Oct; 93(4):591-4. Epub 2004 Jul 26.
55. Hong TM, Tseng HS, Lee RC, Wang JH, Chang CY. Uterine artery embolization: an effective treatment for intractable obstetric haemorrhage. *Clin Radiol.* 2004 Jan; 59(1):96-101.
56. Yong SPY, Cheung KB. Management of primary postpartum haemorrhage with arterial embolism in Hong Kong public hospitals. *Hong Kong Med J.* 2006 Dec; 12(6):437-41.
57. Descargues G, Mauger Tinlot F, Douvrin F, Clavier E, Lemoine JP, Marpeau L. Menses, fertility and pregnancy after arterial embolization for the control of postpartum haemorrhage. *Hum Reprod.* 2004 Feb; 19(2):339-43.
58. Akhter S, Begum MR, Kabir J. Condom hydrostatic tamponade for massive postpartum hemorrhage. *Int J Gynaecol Obstet.* 2005 Aug; 90(2):134-5.
59. Bagga R et al. Postpartum hemorrhage in two women with impaired coagulation successfully managed with condom catheter tamponade. *Indian J Med Sci.* 2007 Mar; 61(3):157-60.
60. Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Arulkumaran S. Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails. *Obstet Gynecol Surv.* 2007 Aug; 62(8):540-7.
61. Serot J, Allouche C, Elhaik S. Use of Sengstaken-Blakemore tube in massive postpartum hemorrhage: a series of 17 cases. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2005 Jul; 84(7):660-4.
62. Nelson WL, O'Brien JM. The uterine sandwich for persistent uterine atony: combining the B-Lynch compression suture and an intrauterine Bakri balloon. *Am J Obstet Gynecol.* 2007 May; 196(5):e9-10.
63. Keriakos R, Mukhopadhyay A. The use of the Rusch balloon for management of severe postpartum haemorrhage. *J Obstet Gynaecol.* 2006 May; 26(4):335-8.
64. Dabelea V, Schultze PM, McDuffie RS Jr. Intrauterine balloon tamponade in the management of postpartum hemorrhage. *Am J Perinatol.* 2007 Jun; 24(6):359-64. Epub 2007 Jun 13.
65. Brace V., Kernaghan D. & Penney G. (2007) Leaming from adverse clinical outcomes: major obstetric haemorrhage in Scotland, 2003-05. *BJOG.* 2007 Nov; 114(11):1388-96.
66. Ghezzi F., Cromi A., Uccella S., Raio L., Bolis P., & Surbek D. The Hayman technique: a simple method to treat postpartum haemorrhage. *BJOG.* 2007 Mar; 114(3):362-5.
67. Hwu YM., Chen CP., Chen HS. & Su TH. (2005) Parallel vertical compression sutures: a technique to control bleeding from placenta praevia or accreta during caesarean section. *BJOG.* 2005 Oct; 112(10):1420-3.
68. Wee L., Barron J. & Toye R. Management of severe postpartum haemorrhage by uterine artery embolization. *Br J Anaesth.* 2004 Oct; 93(4):591-4. Epub 2004 Jul 26.
69. Hong TM. Tseng HS. Lee RC, Wang JH, Chang CY. Uterine artery embolization: an effective treatment for intractable obstetric haemorrhage. *Clin Radiol.* 2004 Jan; 59(1):96-101.
70. Bloom AI, Verstandig A, Gielchinsky Y., Nadjari M., Elchalal U. (2004) Arterial embolisation for persistent primary postpartum haemorrhage: before or after hysterectomy? *BJOG.* 2004 Aug; 111(8):880-4.
71. Yong SPY. & Cheung KB. Management of primary postpartum haemorrhage with arterial embolism in Hong Kong public hospitals. *Hong Kong Med J.* 2006 Dec; 12(6):437-41.
72. French LM, Smaill FM. Antibiotic regimens for endometritis after delivery. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004 Oct 18 ;(4):CD001067.