

بررسی ارتباط بین گروه های خونی ABO و Rh با زخم پیتیک

دکتر بهنام قلعه نویی^{۱*}، دکتر علی فانی^۲، شیما منزوی پور^۳، مصصومه شکری نورعینی^۴

- ۱- دکترای علوم آزمایشگاهی، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
- ۲- استادیار، متخصص داخلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
- ۳- کارشناس پرستاری، بیمارستان امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک
- ۴- پرستار مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اراک

تاریخ دریافت ۸۵/۱۲/۲۷، تاریخ پذیرش ۰۵/۱۰/۸۶

چکیده

مقدمه: زخم پیتیک به وجود زخم در معده یا دوازدهه گفته می‌شود. شیوع آن ۵-۱۰ درصد و در مردان شایع‌تر از زنان است. از عوامل مؤثر در ابتلا، عفونت با هلیکوباتریلوری، مصرف زیاد NSAID، دخانیات و الکل می‌باشد. فاکتور مستعد کننده دیگر، افراد با گروه خونی O می‌باشند. از آنجائی که تقریباً تمامی پژوهش‌های انجام شده در رابطه با تاثیر گروه‌های خونی درابتلا به زخم پیتیک در خارج از کشور انجام شده؛ این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سیستم گروه خونی ABO و Rh با زخم پیتیک انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع مورد - شاهدی بود. حجم نمونه ۳۲۵ نفر از افرادی بودند که به واسطه علائم سوء‌های خاصه جهت انجام آندوسکوپی به کلینیک‌های گوارشی و بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند. گروه مورد ۱۱۰ نفر از بیمارانی بودند که نتیجه آندوسکوپی آنها وجود زخم گوارشی را نشان داده بود. گروه شاهد ۲۱۵ نفر از افرادی بودند که نتیجه آندوسکوپی آنها هیچ‌گونه زخمی را نشان نداده بود. جهت تعیین گروه‌های خونی ABO و Rh پس از تهیه ۵ سی سی خون وریدی از بیماران، از هر دو روش اسلامیدی و لوله‌ای استفاده گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات از محاسبه نسبت شانس، خطر نسی و آزمون آماری کای دو جهت تجزیه و تحلیل استفاده گردید.

نتایج: براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، سن بیماران مورد مطالعه بین ۱۸-۷۵ سال قرارداشت. زنان به دلیل مراجعه بیشتر ۶۸/۶ درصد از بیماران را تشکیل می‌دادند. بین سن و جنس با ابتلا به زخم پیتیک ارتباط معنی‌دار بود. ۲۵/۵ درصد از بیماران مجرد و ۷۲/۵ درصد متاهل بودند. از میان کل مراجعه کنندگان ۳۲/۹ درصد گروه خونی A، ۱۸/۵ درصد گروه خونی B، ۱۱/۱ درصد گروه خونی AB، ۳۷/۵ درصد گروه خونی O و ۸۸ درصد دارای Rh مثبت و ۱۲ درصد دارای Rh منفی بودند که هیچ‌گونه ارتباط آماری معنی‌داری بین گروه‌های خونی ABO و Rh با زخم پیتیک وجود نداشت.

نتیجه گیری: اگرچه در برخی مطالعات بین گروه‌های خونی و زخم پیتیک به اثبات رسیده است اما مطالعه ما نشان دهنده چنین ارتباطی نبود. این امر ممکن است به دلیل شیوع بالای عفونت هلیکوباتریلوری در بیماران مبتلا به زخم پیتیک باشد که نیازمند مطالعات گستره‌تر می‌باشد. سایر عوامل موثر نیز می‌تواند سبک و شیوه زندگی و نوع رژیم غذایی باشد.

وازگان کلیدی: زخم پیتیک، گروه خونی ABO ، Rh

*نویسنده مسئول: اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده علوم پزشکی

Email: ghalenoi@yahoo.com

O می باشد^(۵)). گروه خونی O یکی از چهار گروه اصلی سیستم گروه خونی ABO می باشد. آنتی زن های سیستم ABO هم در سطوح گلوبول های قرمز و هم ترشحات خارجی نظیر بزاق، ادرار و اشک وجود دارند و هر فرد در سرم خود بر علیه آنتی زنی که ندارد آنتی بادی می سازد^(۶). O به دلیل فراوانی زخم پیتیک و آنتی زن های گروه خونی O مطالعاتی در این رابطه در کشورهای مختلف انجام شده است. در جدیدترین مطالعه ای که در سال ۲۰۰۵ توسط کان بای جهت بررسی ارتباط بین زخم پیتیک و هلیکوباکترپیلوری با ABO در ترکیه انجام شد، ارتباط معنی داری بین زخم پیتیک و گروه های خونی ABO پیدا شد^(۷). در ادامه این مطالعه یی در همان سال در تایوان مطالعه دیگری بین گروه های خونی ABO با PU انجام داد که هیچ گونه ارتباط معنی داری پیدا نکرد^(۸). به دلیل عدم مطالعات جامع در این رابطه، در ادامه این تحقیقات، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین گروه های خونی ABO و Rh با زخم پیتیک انجام گردید.

روش کار

مطالعه به روش مورد-شاهدی انجام گرفت. گروه مورد مطالعه ۱۱۰ نفر از افرادی بودند که به نوعی با اختلالات گوارشی (سوء هاضمه) جهت انجام آندوسکوپی به مطب های خصوصی و بیمارستان امام خمینی (ره) ارakk مراجعه کرده بودند و نتیجه آندوسکوپی آنها مثبت گزارش گردیده بود (زمخ پیتیک داشتند). گروه شاهد ۲۱۵ نفر از افرادی بودند که نتایج آندوسکوپی آنها منفی گزارش شده بود. پس از جلب رضایت بیماران و تکمیل پرسشنامه ۵ سی سی خون وریدی جهت تعیین گروه خونی و Rh گرفته و به هر دو روش اسلامی و لوله ای مورد بررسی قرار گرفت.

جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۴ سوالی که در آن علاوه بر اطلاعات دمو گرافیک (فردی)، سوالاتی مبنی بر مشکلات گوارشی بیمار گنجانده شده بود استفاده گردید. پرسشنامه فوق توسط پرسشنامه گران آموزش

مقدمه

زخم پیتیک (PU)^(۱) که به ضایعه مخاطی در معده، پیلو، دوازدهه و مری که با ایجاد یک حفره به طرف بیرون همراه است گفته می شود، بیماری بسیار شایعی است که در بین مردان بیشتر از زنان دیده می شود^(۱). شیوع PU در تمام طول عمر ۵-۱۰ درصد می باشد^(۲). طبق آخرین آمارها، زخم پیتیک در ایالات متحده در بین مردان تقریباً ۱۲ درصد و در بین زنان ۱۰ درصد شایع است، به علاوه سالانه تقریباً ۱۵۰۰۰ مرگ در اثر عوارض PU رخ می دهد. اکثر زخم های پیتیک در معده ایجاد شده و معمولاً به شکل منفرد و گاهی اوقات متعدد و یا سندروم زو گینلرالیسون (زمخ پیتیک شدید همراه با هایپر اسیدیته معده) دیده می شود. مهم ترین عوامل خطر زا در ایجاد زخم پیتیک عفونت با هلیکوباکترپیلوری، مصرف زیاد داروهای ضد التهاب غیر استرتوئیدی (NSAID) شامل آسپرین، ایبوبروفن و...، مصرف زیاد نوشیدنی های کافئین دار، دخانیات و الکل می باشد^(۳). فاکتور مستعد کننده احتمالی دیگر افراد دارای گروه خونی O می باشند که طبق مطالعات انجام شده بیش از سایر گروه های خونی در معرض ابتلاء به زخم پیتیک قرار دارند^(۴). امروزه مشخص شده است که زخم پیتیک نتیجه نهائی عدم تعادل بین عوامل تهابی و دفاعی در مخاط معده و دوازدهه است. علایم بالینی آن شامل، سوء هاضمه به صورت دردی با مرکزیت فوقانی شکم یا نوعی ناراحتی شامل احساس پری، نفخ، تهوع یا اتساع، درد اپیگاستر ۴۵-۶۰ دقیقه متعاقب غذا یا درد شبانه که هر دو با غذا یا آنتی اسیدها و گاه با استفراغ برطرف می شوند. علائم معمولاً مزمن و پریودیک می باشند، استفراغ، کاهش وزن، بی اشتہابی، آنمی فقر آهن، خون مخفی در ملدغون می باشد. جهت درمان این بیماری هم درمان دارویی و هم جراحی استفاده می شود. همان طور که گفته شد یکی از عواملی که باعث افزایش خطر ابتلاء به زخم پیتیک می شود سابقه خانوادگی مثبت زخم پیتیک در افراد با گروه خونی

1- peptic ulcer.

از ۲۱۵ نفر گروه شاهد؛ ۶۴ نفر گروه خونی A (۵۹) نفر A مثبت و ۵ نفر A منفی)، ۴۴ نفر گروه خونی B (۴۱) نفر B مثبت و ۳ نفر B منفی)، ۲۷ نفر گروه خونی AB (۲۳) نفر AB مثبت و ۴ نفر AB منفی)، ۸۰ نفر گروه خونی O (۷۰) نفر O مثبت و ۱۰ نفر O منفی)؛ داشتند. با تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته مشخص شد که بین گروههای خونی ABO و Rh با زخم پیتیک ارتباط معنی داری وجود نداشت.

بحث

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که هیچ گونه ارتباط معنی داری بین گروههای خونی ABO و Rh با زخم پیتیک وجود نداشت. مطالعات زیادی تأثیر مثبت گروههای خونی ABO را در ایجاد زخم پیتیک گزارش کردند^(۶)، در مقابل عدم تأثیر این سیستم در زخم پیتیک نیز گزارش شده است. در جدیدترین مطالعه‌ای که توسط یی و همکاران در سال ۲۰۰۵ در تایوان بر روی ۳۴۷ بیمار دچار سوء هاضمه مراجعه کننده که تحت آندوسکوبی قرار گرفته و گروه خونی آنها تعیین گردیده بود هیچ گونه ارتباط خونی معنی داری بین گروههای خونی ABO با زخم پیتیک پیدا نشد^(۷). روبرتسون نیز در استرالیا تحقیقی در همین رابطه بر روی ۵۰۰ نفر از اهدا کنندگان خون که به صورت تصادفی از نظر PU بررسی شده بودند انجام داد که هیچ گونه ارتباطی بین تأثیر ABO بر PU پیدا نکرد^(۸). کلر و همکاران نیز در سال ۲۰۰۲ مطالعه‌ای تحت عنوان ارتباط بین گروههای خونی ABO یا PU بر روی ۳۳۰ بیمار در آلمان انجام دادند که هیچ ارتباط آماری معنی داری در مورد تأثیر ABO بر زخم پیتیک پیدا نکردند^(۹). البته براساس نتایج به دست آمده از برخی مطالعات که بر روی تأثیر ABO و Rh در ابتلا به زخم پیتیک و هیلکوباکترپیلوری به دست آمده است، مشخص شده که گروههای خونی O و A بیشتر در معرض ابتلا به هیلکوباکتر پیلوری قرار دارند که این امر توسط تمایل بیشتر هیلکوباکتر پیلوری در اتصال به آنتی ژن‌های گروههای O و A تفسیر شده است. این

دیده تکمیل و فاکتورهای مورد مطالعه در بین دو گروه بررسی شد. در این مطالعه نمونه‌ها از کلینیک‌های گوارش و بخش آندوسکوبی بیمارستان امام خمینی شهرستان اراک جمع‌آوری گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از محاسبه نسبت شانس (OR)، خطر نسبی (RR) و آزمون آماری کای دو استفاده شد. اخلاق پژوهش با رعایت بیانیه هلسینکی در نظر گرفته شد.

نتایج

تعداد کل بیماران مورد مطالعه که در این پژوهش وارد شدند ۳۲۵ نفر از افرادی بود که با علائم سوء هاضمه مزمن به کلینیک‌های گوارش و بخش آندوسکوبی بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه و توسط متخصص، انجام آندوسکوبی برای آنها ضروری تشخیص داده شده بود. از بیماران مورد مطالعه هیچ یک از مطالعه خارج نشدند. بیماران بین سنین ۱۸-۷۵ سال قرار داشتند. زنان به دلیل مراجعه بیشتر، ۶۸/۶ درصد از بیماران مورد مطالعه را تشکیل می‌دادند. ۲۲۳ نفر زن و ۱۰۲ نفر مرد بودند، که از میان ۱۱۰ نفر گروه مورد ۶۶ نفر زن و ۴۴ نفر مرد بودند و از میان ۲۱۵ نفر گروه شاهد ۱۵۷ نفر زن و تنها ۵۸ نفر مرد بودند که بین جنس و ابتلا به زخم پیتیک ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. از میان کل مراجعه کنندگان ۳۲/۹ در صد گروه خونی A (۳۰/۴) درصد A مثبت و ۲/۵ درصد A منفی)، ۱۸/۵ درصد گروه خونی B (۱۶ درصد B مثبت و ۲/۵ درصد B منفی)، ۱۱/۱ درصد گروه خونی AB (۹/۶ درصد AB مثبت و ۲/۵ درصد AB منفی)، ۳۷/۵ درصد گروه خونی O (۳۲ درصد O مثبت و ۵/۵ درصد O منفی)؛ داشتند.

در ۱۰۰ نفر گروه مورد؛ ۴۳ نفر گروه خونی A (۴۰) نفر A مثبت و ۳ نفر A منفی)، ۱۶ نفر گروه خونی B (۱۱) نفر B مثبت و ۵ نفر B منفی)، ۹ نفر گروه خونی AB (۸) نفر AB مثبت و ۱ نفر AB منفی)، ۴۲ نفر گروه خونی O (۳۳ نفر O مثبت و ۹ نفر O منفی)؛ داشتند.

در اجرای این طرح یاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می آید.

منابع

۱. بحرینی ه . بیماریهای گوارش. چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۳، ص ۲۵.
۲. آقازاده ب ، بروجردی م. در ترجمه مبانی طب داخلی سیسیل ۲۰۰۱. آندرولی، لوسکالزو، گریگر، کارپتنر(مولفین)، چاپ اول، تهران، انتشارات گلبان، ۱۳۸۰، ص ۳۱۲.
۳. سامی پ. در ترجمه پرستاری داخلی جراحی ۲۰۰۰، پرستاری بیماری های گوارش. برونر و سودارت (مولفین)، چاپ سوم، تهران، انتشارات بشری، ۱۳۸۰، ص ۳۰.
4. Pavlo S. ABO Lewis secretor and non secretor phenotypes Patients infected by the helico bacter pylory and peptic ulcer. J Clin Patho 2001;54(10):809-11.
5. Macnair T. Peptic ulcer. 10th ed. New York: Eurjinternal Medicin;1998.p.33:15.
6. O'Neil D. ABO blood types [monograph on internet].[Last updated:April 5,2007]. Available from: http://anthro. palomar.edu/ blood/ ABO_system.htm
7. Kanbay M, Gur G, Arsalan H, Yilmaz U, Boyacioglus. The relation of ABO blood group, age, geder, smoking and Helicobacter Pylori infection. Dig Dis Sci 2005;50 (7):1214-7.
8. Yei CJ, Chang JG, Shih MC, Lin SF, Chang CG, Ko FT, et al. Lewis blood genotype of peptic ulcer and gastric cancer patients in Taiwan. World J Gastroenterol 2005;11(31):4891-4.
9. Robertson MS, Cade JF, Savoia HF, Clancy RL. Helicobacter pylori infection in the Australian community:current prevalence and lack of association with ABO blood groups. Intern Med J 2003;33(4):163-7.
10. Keller R, Dinkel KC, Christl SU, Fischbach W. Interrelation between ABH blood group O, Lewis(B) blood group antigen, Helicobacter pylori infection, and occurrence of peptic ulcer. Z Gastroenterol 2002;40(5):273-6.

مطالعات، بیشتر بر روی تأثیر گروه های خونی ABO بر عفونت هیلکوباکتریلوری مت مرکز شده و طبق نتایج به دست آمده از بیشتر این تحقیقات ارتباط معنی داری بین تأثیر گروه های خونی بر هیلکوباکتریلوری دیده شده است(۴-۷).

نتیجه گیری

براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق هیچ گونه ارتباط آماری معنی داری بین گروه های خونی ABO و Rh با زخم پیتیک وجود نداشت. مطالعه حاضر و بعضی تحقیقات مشابه آن تأثیر گروه های خونی ABO و Rh را در ابتلا به زخم پیتیک را نشان نداده اند. شاید علت اختلاف ناشی از تفاوت در سبک و شیوه زندگی، جامع نبودن طرح به صورت کلی در ایران، تفاوت در رژیم غذائی و... بوده باشد. که این امر را می توان با مطالعات جامع تر و کلی تر در سطح کشور و سطح جهان تأیید یا رد نمود. علت دیگر هم زمانی انجام پژوهش ها بر روی ارتباط بین زخم پیتیک و هیلکوباکتریلوری با ABO می باشد چرا که هیلکوباکتریلوری خود ریسک فاکتور زخم پیتیک می باشد. عامل موثر دیگر فراوانی گروه خونی O نسبت به سایر گروه های خونی می باشد. نهایتاً توصیه می شود که مطالعات بیشتری بر روی تأثیر ABO و Rh در ابتلا به زخم پیتیک صورت گیرد تا افراد مستعد شناسایی و آموزش های لازم جهت پیش گیری از PU داده شود.

تشکر و قدردانی

تحقیق حاضر طرح تحقیقاتی مصوب باشگاه پژوهش گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد که بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقا دکتر یوسفی راد و مخصوصاً جناب آقا رامین زارع، دکتر علی چهرئی، آقایان فروغی و طهماسبی و سرکار خانم ها داوودی، مریم خانی و بیات، مدیریت و قسمت آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی (ره)، آقای فرجی سوپرواپر آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره) و کلیه عزیزانی که صمیمانه ما را

Investigating the relation between ABO blood group and Rh with peptic ulcer

Ghalenoei B^{1*}, Fani A², Monzavi-poor Sh³, Shokri Noor Eini M⁴

Abstract

Introduction: Peptic ulcer is a condition in which there is an ulcer in stomach or duodenum. The incidence of peptic ulcer is 5 to 10% and is more prevalent in men. Infection with helicobacter pylori, NSAIDS, smoking and alcoholism are of the most important risk factors. Another risk factor is the O blood group. Since most researches in this field are done abroad this study is done with the aim of determining the relation between ABO blood group and Rh with peptic ulcer.

Materials and Methods: In this case-control study, 325 persons with dyspepsia were investigated. These individuals were referred for endoscopy. The case group was 110 persons in whom endoscopy had revealed a peptic ulcer and control group was 215 persons in whom endoscopy had showed no sign of ulcer. Blood grouping was performed by slide and tube methods .Chi 2 test was used for data analysis.

Results: Based on the results patients' age was between 18-75 years. 68.6% of samples were women because they had more referrals. There was a significant relation between age and sex with peptic ulcer. 25.5% of patients were single and 72.5% married. Among all samples; 32.9% had A blood group, 18.5% B, 11.1% AB and 37.5% O; and 88% were Rh positive and 12% Rh negative. There was no significant relation between ABO blood group and Rh with peptic ulcer. The gathered data was analyzed using odds ratio, relative risk and Chi 2 test.

Conclusion: Although some investigations have showed correlations between ABO blood group and ulcer peptic, our data showed no correlation. This may be due to the prevalence of helicobacter pylori infection among patients with peptic ulcer which needs more investigations. Other effective factors may be life style and nutrition.

Key words: Peptic ulcer, ABO blood group, Rh

* Corresponding author; Email: ghalenoi@yahoo.com

1 -PhD of laboratory sciences, Arak Azad University of medical sciences.

2 - Assistant professor, Arak University of medical sciences.

3 - BSC of nursing, Amirkabir hospital, Arak University of medical sciences.

4 - BSc of nursing, emergency and accident management center (115).