

اثر التیام بخشی عصاره آبی الکی گیاه یونجه بر روی سوراخ های ایجاد شده در غضروف گوش خرگوش

دکتر جینا خیاط زاده^۱، دکتر مجید فرهودی^۲، حسین رفیعی^{۳*}

- ۱- استادیار، دکترای زیست شنای جانوری و تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
۲- استادیار پژوهشی، دکترای آسیب شناسی دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، مشهد، ایران
۳- کارشناس ارشد زیست شناسی - علوم تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

تاریخ دریافت ۸۸/۳/۲۶، تاریخ پذیرش ۸۸/۵/۲۶

چکیده

مقدمه: اختلالات غضروفی و حرکتی از شایع ترین مشکلات جامعه انسانی می باشد. حضور ویتامین های مختلف از قبیل A و C سرعت ترمیم را افزایش می دهد. در این تحقیق از گیاه یونجه با نام علمی مدیکاگوساتیوا که سرشار از ویتامین های A، C، E و K می باشد، استفاده گردید و روند ترمیم غضروف لاله گوش خرگوش مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش کار: در طی یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی برای انجام آزمایش ها ۶ خرگوش نر نژاد نیوزیلندی به وزن تقریبی ۲/۵ تا ۳ کیلوگرم انتخاب شدند. پس از حذف موهای گوش خرگوش با کرم موبر و بی حسی آن توسط اسپری لیدوکائین ۱۰ درصد، ۴ سوراخ به قطر ۴ میلی متر در موقعیت مدیال هر یک از گوش ها ایجاد گردید (جمعاً ۴۸ موضع). سوراخ های گوش های تست هر روز توسط عصاره یونجه و سوراخ های گوش های کنترل توسط سرم فیزیولوژی تیمار شدند. مساحت سوراخ ها و فاصله دو لبه غضروف در روزهای مختلف اندازه گیری شدند. هم چنین نمونه برداری بافتی برای مشاهدات میکروسکوپی با رنگ توکسیلین- انوزین (روزهای ۵۰-۰) انجام شد.

نتایج: ترمیم و بازسازی و سرعت بسته شدن در سوراخ های تیمار نسبت به سوراخ های کنترل سریع تر بود ($p < 0.004$). هم چنین، ضخامت غضروف و تعداد کندروسیت و نیز تراکم فیبروبلاست ها در بافت همینند تازه تشکیل شده در نمونه های تست نسبت به کنترل زیادتر بود.

نتیجه گیری: احتمالاً عصاره یونجه به علت مقادیر بالای ویتامین های A و C باعث تسریع روند ترمیم و بازسازی در غضروف گوش خرگوش گردیده است و لذا امکان استفاده های فارماکولوژیک را مطرح می نماید.

واژگان کلیدی: یونجه، ترمیم زخم، غضروف گوش، خرگوش

*نویسنده مسئول: مشهد، موسسه تحقیقات واکسن سرم سازی رازی

Email: rafiei.hossein@gmail.com


مقدمه

به طور کلی منظور از ترمیم و بازسازی زخم، رشد مجدد سلول‌هایی است که از لحاظ ساختمان و کار شبیه سلول‌های آسیب دیده هستند و جایگزین آنها می‌شوند. جانشین شدن سلول‌های از بین رفته به وسیله تکثیر سلول‌های ذخیره فقط در بافت‌هایی که سلول‌های آن‌ها قابلیت تقسیم میتوزی را داشته باشند امکان پذیر است. به همین دلیل بازسازی در بافت‌های پستانداران در مقایسه با دوزیستان و برخی ماهی‌ها دارای محدودیت‌هایی است (۱). بلاستما یک توده سلولی غیر تمایز یافته است که توانایی رشد یا بازسازی اندام و یا تولید بخش‌هایی از بدن را داراست و همانند سلول‌های جنین باعث بازسازی بافت، اندام و استخوان می‌شود. سلول‌های بافت بلاستما قابلیت تقسیم میتوزی دارند (۲، ۳).

یکی از مثال‌های اپی مورفیک ترمیم (wound healing) و بازسازی (regeneration) زخم در پستانداران، بررسی فرایند ترمیم و بازسازی سوراخ‌های ایجاد شده در گوش خرگوش می‌باشد. در این فرایند پس از التهاب (inflammation)، پاک سازی و مهاجرت اپیتلیومی، اسکار تولید شده به طور کامل سطح زخم را نمی‌پوشاند. پس از آن بافت بلاستما که تجمعی از سلول‌های مزانشیمی است به وجود می‌آید. با گذشت زمان دو لبه زخم به هم متصل و بافت گرانوله زیر آن را پرمی کند که در آن تکثیر فیبروبلاست‌های درم و رشته‌های کلاژن با آرایش تصادفی و نامنظم وجود دارند و تدریجاً در دستجات منظم طولی و لابلای فیبروبلاست‌های دوکی شکل، جهت یابی مجدد پیدا می‌کنند. جهت بازسازی کامل غضروف، در لبه غضروفي قدیمی سلول‌های مزانشیمی، بلاستما به فیبروبلاست و سپس به کندروبلات تمایز می‌یابند. دو لبه غضروف رشد کرده و به همدیگر می‌رسند و تیغه غضروفي کامل ایجاد می‌گردد. در تمام مراحل رشد غضروف پری کندریوم واضح همراه با فیبروبلاست‌های متعدد (که به کندروبلات تبدیل خواهند شد) دیده می‌شوند (۴-۶).

از آنجایی که غضروف تیغه بینی، سطح مفاصل استخوانی و انتهای شکمی دنده‌ها در انسان از نوع هیالین شبیه به گوش خرگوش است بنابراین احتمالاً نتایج حاصل از ترمیم و بازسازی غضروف گوش خرگوش قابل تعمیم به انسان است (۷).

تاثیر گیاهان و داروهای مختلف بر روند ترمیم گوش خرگوش مطالعه شده است اما تا کنون اثر گیاه یونجه بر روند ترمیم در هیچ بافت و موجودی مورد بررسی قرار نگرفته است. در طب سنتی از یونجه برای درمان آرتريت و انباشته شدن آب در بافت‌ها (مثل بیماری ادم) استفاده می‌شود. هم‌چنین این گیاه حاوی مقدار زیادی ویتامین A و C است و کوبیده آن زخم را به سرعت التیام داده و از خونریزی جلوگیری می‌کند (۸). اگرچه تاثیر بسیاری داروها یا ویتامین‌ها بر روند ترمیم غضروف بررسی شده است، اما با توجه به محتویات گیاه یونجه و ارزان بودن آن در صورت التیام بخش بودن بر روند ترمیم به عنوان داروی گیاهی با عوارض جانبی کمتر از داروهای صنعتی معرفی خواهد شد. هدف از این تحقیق بررسی ترمیم سوراخ‌های ایجاد شده در غضروف گوش خرگوش با استفاده از عصاره یونجه بوده که سرعت تشکیل غضروف و تغییرات هیستولوژیکی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.



شکل ۱. مقایسه روند ترمیم سوراخ تیمار (شکل سوراخ دایره است)

روش کار

در طی یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی برای انجام آزمایش ۶ راس خرگوش نر نژاد نیوزیلندی به وزن

برای عصاره های روغنی ۳ تا ۴ ساعت و برای عصاره های غیر روغنی ۴ تا ۵ ساعت است (۸).

هر ۲۰ دقیقه ظرف شیشه ای از آب خارج شده و به خوبی تکان داده شد. برای صاف کردن عصاره به دست آمده از آب میوه گیری های قدیمی که دارای طلق ژلاتینی بود استفاده شد. به ترتیب ابتدا کاغذ صافی بعد پارچه تترن و سپس طلق داخل آب میوه گیری قرار داده شد. سپس مخلوط عصاره و گیاه در چند مرحله داخل آب میوه گیری گذاشته شده و تفاله آن جدا گردید. عصاره به دست آمده در داخل ظرف شیشه ای تیره رنگ در یخچال نگهداری شد (۸).

روی سوراخ های تست دو بار در روز و در وقت معینی با عصاره یونجه و سوراخ های کنترل با سرم فیزیولوژی تا ۵۰ روز پس از ایجاد سوراخ تیمار موضعی (توسط سرننگ) انجام شد.


به منظور بررسی ماکروسکوپی بسته شدن سوراخ در روزهای معین به کمک کاغذ میلی متری مساحت سوراخ ها تا زمان بسته شدن آن ها اندازه گیری شد و با آنالیز آماری آنوا (Anova) و آزمون تی (T-test) بین سوراخ های تست و کنترل مقایسه میانگین داده ها صورت گرفت و نمودارهای لازم ترسیم شد.

برای تهیه مقاطع میکروسکوپی پس از ضد عفونی و بی حس کردن گوش، حیوان مجدداً در محفظه مخصوص قرار داده شد. از دستگاه پانچی با قطر سوراخ به اندازه ۶ میلی متر استفاده شد و گوش خز گوش ها در بازه های زمانی مشخص (روزهای ۳، ۵، ۷، ۱۰ و...) در موقعیت های در حال ترمیم مجدداً سوراخ گردید. هم چنین از بافت سالم پانچ شده نوبت اول به عنوان نمونه شاهد (دست نخورده) استفاده شد. سپس بافت ها به فیکساتور بوئن انتقال داده شد و مراحل مختلف آبگیری با درجات صعودی اتانول، پارافین دهی، قالب گیری، برش گیری (توسط دستگاه میکروتوم Leitz ۱۵/۲ و برش هایی با ضخامت ۷ میکرون) انجام گردید. پس از آن مقاطع روی لام تمیز قرار گرفتند، آبدهی با درجات

تقریبی ۲/۵ تا ۳ کیلوگرم از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد تهیه شد. تمامی آزمایش ها در بخش حیوانات موسسه انجام گرفته است.

به منظور ایجاد سوراخ ابتدا موهای اضافی در لاله گوش توسط کرم موبر برداشته شد. سپس با استفاده از الکلی گوش ها را ضد عفونی کرده و خرگوش در محفظه مخصوصی که برای ثابت نگه داشتن به کار می رود، قرار داده شدند. سپس گوش ها با استفاده از دستگاه پانچ که به همین منظور تهیه شده بود به شکل دایره در موقعیت مدیال و در دو طرف رگ اصلی سوراخ شدند. در هر گوش ۴ سوراخ هر یک به قطر ۴ میلی متر ایجاد شد (شکل ۱). جمعاً ۴۸ موضع برای مطالعه فراهم آمد. در ۳ خرگوش، سوراخ های ایجاد شده در گوش راست به عنوان تست و سوراخ های ایجاد شده در گوش چپ به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. در ۳ خرگوش دیگر برعکس عمل شد.

برای عصاره گیری ابتدا قسمت های هوایی بزرگ و ساقه گیاه یونجه را خرد نمودیم. سپس ۱۵۰ گرم یونجه خرد شده داخل ظرف شیشه ای یک لیتری ریخته شد و به آن ۷۵۰ گرم حلال اضافه گردید. حلال های غیر روغنی توانایی استخراج اجزای بیوفنلی، تانن ها، ویتامین ها، ترپن ها و آمینواسیدها و حلال های روغنی توانایی استخراج کارتنوئیدها و اسیدهای چرب ضروری را دارند. در این پژوهش اتانول استفاده شد زیرا که یک حلال غیر روغنی می باشد و ماندگاری عصاره را بالا برده، مانع از تغییر ماده ویتامینی می شود. درب ظرف شیشه ای محکم بسته شد و جهت جلوگیری از حرارت مستقیم، بر روی سه پایه در ظرف شیشه ای بزرگ تر پر از آب گرم قرار داده شد. برای عصاره های روغنی دمای آب ۷۵ درجه و برای عصاره های غیر روغنی دمای آب ۶۵ درجه در نظر گرفته می شود. با توجه به این که یونجه حاوی مقدار زیادی ویتامین C است و حداکثر درجه ماندگاری آن، 2 ± 32 درجه سانتی گراد است، جهت ماندگاری ویتامین C دما را کاهش داده و مدت زمان حرارت دادن افزایش می یابد. زمان استخراج



نمودار ۱. مقایسه مساحت سوراخ های تیمار شده با عصاره ی یونجه با مساحت سوراخ های کنترل در دوره ی مورد مطالعه (برای تمامی روزها) ($p < 0.004$)

۲- با توجه به بررسی های انجام شده، میزان آماس، تورم و التهاب در سوراخ های تیمار شده با عصاره یونجه نسبت به سوراخ های کنترل کاهش یافت.

به طور کلی در این تحقیق مشاهدات میکروسکوپی زیرحاصل شد:

۱- افزایش فیبروبلاست ها در بافت همبند تازه تشکیل شده در نمونه تست نسبت به کنترل (شکل ۲- روز ۵).

۲- افزایش تعداد کندروسیت ها و کندروبلاست ها در غضروف تست نسبت به کنترل که با نزدیک شدن به انتهای دوره ی ترمیم مشهودتر به نظر می رسید (شکل ۳- روز ۱۰).

۳- فاصله دو لبه زخم در نمونه تست کمتر از کنترل می باشد (شکل ۴، روز ۱۵).

۴- افزایش ضخامت غضروف که با گذشت زمان ترمیم در سوراخ های تست نسبت به سوراخ های کنترل واضح تر و بارزتر شد (شکل ۵- روز ۲۰).



۵- فاصله دو لبه غضروف در سوراخ های تست بسیار کمتر از سوراخ های کنترل است (شکل ۶- روز ۲۷ و نمودار ۲)

نزولی اتانول و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و انوزین و تری کرم انجام پذیرفت. طی مطالعه میکروسکوپی لام ها، فاصله دو لبه غضروف از یکدیگر و ضخامت غضروف با میکرومتر چشمی برای نمونه های تست و کنترل اندازه گیری شد و آنالیز آماری مقایسه میانگین ها و رسم نمودار صورت گرفت. هم چنین تراکم فیروبلات ها در بافت تازه تمایز یافته ارزیابی شد.





نتایج

نتایج ماکروسکوپی حاصل از مقایسه مساحت سوراخ های تیمار با سوراخ های کنترل در روزهای مختلف به صورت زیر بود:

۱- افزایش سرعت بسته شدن سوراخ های تیمار شده با عصاره یونجه نسبت به سوراخ های کنترل (شکل و نمودار ۱). میانگین زمان بسته شدن کامل سوراخ های تست در روز ۲۰ و در سوراخ های کنترل روز ۳۰ بود.





شکل ۲. شکل بالا فیروبلات های کنترل و شکل پایین فیروبلات های نمونه تیمار شده با عصاره یونجه در روز ۵ را نشان می دهد (هماتوکسیلین و انوزین) - درشت نمایی * ۱۰




شکل ۵. شکل بالا ضخامت غضروف کنترل و شکل پایین ضخامت غضروف تیمار شده با عصاره یونجه در روز ۲۰ را نشان می دهد (هماتوکسیلین و انوزین)، P پری کندریوم و Ca نشان دهنده غضروف است) - درشت نمایی * ۱۰

شکل ۳. شکل بالا کندروسیت های کنترل و شکل پایین کندروسیت های نمونه تیمار شده با عصاره یونجه (تری کرم) در روز ۱۰ را نشان می دهد. کندروسیت (C)، کندروبلاست (Co)، فیبروبلاست (F) و لاکونا (L) درشت نمایی * ۴۰



شکل ۶. شکل بالا فاصله دو لبه غضروف را در نمونه کنترل و شکل پایین فاصله دو لبه غضروف را در نمونه تیمار شده با عصاره یونجه در روز ۲۷ را نشان می دهد (هماتوکسیلین و انوزین)، (فاصله دو لبه غضروف با M مشخص شده است) - درشت نمایی * ۱۰
(n = 8, p < 0.004)



شکل ۴. شکل بالا فاصله دو لبه زخم نمونه کنترل و شکل پایین فاصله دو لبه زخم نمونه تیمار شده با عصاره یونجه در روز ۱۵ را نشان می دهد (هماتوکسیلین و انوزین)، درشت نمایی * ۱۰


حضور ویتامین A سبب افزایش میزان پروتئین سازی برای همانندسازی و به تبع آن افزایش تقسیم سلولی می گردد. شینگتون و همکاران در سال ۲۰۰۶ اسید رتینوئیک را بر صفحه رشد بررسی و این ویتامین را یک تنظیم کننده بالقوه ی کندروژنزیس شناختند (۹).

بارنهل و همکاران در سال ۲۰۰۶ ثابت نمود که غلظت های بالای ویتامین A از بیان فنوتیپ های متفاوت کندروسیت های دنده ای در محیط کشت جلوگیری و آن ها را یکپارچه می کند. آن ها نقش فیزیولوژیکی رتینوئیک اسید را در تحریک تکثیر و رشد سلول های غضروفی بدون تغییر موثر در تمایز فنوتیپشان به اثبات رساندند (۱۰).

مطالعات گودمن و همکاران سبب هدایت آن ها به کشف ارتباط بین اثر ویتامین A بر روی غضروف و نقش بیولوژیکی در ادامه رشد و بقای موجود شده است. رتینوئیک اسید، α رتینوئیک اسید و Ro8-7669 (acyclopentyl analogy of retinoid acid) در رشد غضروف در کشت اندام در محیط آزمایشگاه بسیار موثر بود (۱۱).

نقص در ویتامین A و همین طور ویتامین A زیادی سبب رشد غیر طبیعی استخوان می شود و صفحه رشد کندروژن را تنظیم می کند و این فرضیه را که مقدار دهانی رتینوئیک اسید، بلند صفحه رشد درشت نی را کاهش می دهد، مطرح می کند. برای تعیین این که آیا رتینوئیک اسید به طور مستقیم بر صفحه رشد تاثیر دارد یا خیر استخوان های قوزک پای جنین رت را در محیط آزمایشگاه در حضور اسید رتینوئیک کشت دادند. در این سیستم رتینوئیک اسید از رشد بیش از اندازه استخوان های طولی به وسیله ی سه مکانیسم جلوگیری نمود که شامل:

کاهش تکثیر کندروسیت ها به وسیله ی اتصال به H-thymidine مخصوصاً در منطقه ی تکثیر و رشد صفحه ۲- کاهش سنتز ماتریکس به وسیله ی اتصال به گلیکوز آمینو گلیکان و ۳- کاهش هایپر تروفی می باشد. لذا نتیجه گرفتند که رتینوئیک سبب تنظیم رشد طولی از طریق



نمودار ۲. مقایسه فاصله دو لبه غضروف سوراخ های تیمار شده با عصاره یونجه و سوراخ های کنترل (برای تمامی روزها $p < 0.004$)

بنابراین تفاوت آشکاری در هیستولوژی زخم های در حال ترمیم تست نسبت به کنترل مشاهده می شود. بدین مفهوم که سرعت بسته شدن سوراخ ها، هم چنین سرعت پیشروی و ترمیم تیغه غضروف، ضخامت غضروف، تعداد کندروسیت ها، کندروبلاست ها و فیروبلاست ها در بافت تازه تشکیل شده در سوراخ های تست نسبت به کنترل به طور آشکارا بیشتر گردید.

بحث

نتایج تحقیق حاضر مبنی بر سرعت بخشیدن ترمیم غضروف در حضور عصاره گیاه یونجه هم راستا با نتایج تحقیقات متعددی است که تاثیر ویتامین A و ویتامین C و مشتقات آن ها بر رشد غضروف را نشان می دهد. از جمله در مورد اسید رتینوئیک اسید که هم کاهش و هم افزایش آن بر یکپارچگی ماتریکس خارج سلولی تاثیر می گذارد. ضمن این که اثرات رتینوئیک اسید بر کاتابولیسم غضروف به اثبات رسیده است. استفاده از رتینوئیک اسید در نمونه های غضروف انسانی و حیوانی سبب تولید کلاژن و پروتئوگلیکان می شود. مشاهدات اخیر نشان می دهد که رتینوئیک اسید به همراه انکوسین (oncostain) اثر عمیقی بر بازگرداندن ماتریکس خارج سلولی از دست رفته دارد. این دو ترکیب میزان ماتریکس متالوپروتئاز را تنظیم می کند.

جلوگیری از تکثیر صفحه رشد کندروسیت، هایپر تروفی کندروسیت و سنتز ماتریکس می شوند (۱۲).

با تمام این تفصیل حضور مقادیر مناسب ویتامین A (به تناسب جاندار) برای تسریع روند ترمیم و بازسازی (به خصوص در غضروف) ضروری است. با توجه به این که در گیاه یونجه مقادیر بالای ویتامین A وجود دارد (۸، ۱۳) به نظر می رسد نقش التیام بخشی عصاره این گیاه بر ترمیم غضروف می تواند احتمالاً به حضور ویتامین A بالا یا مشتقات آن مربوط باشد، هر چند برای تایید این مطلب پیشنهاد می شود در طرح های آینده تاثیر فراکسیون های مختلف موجود در عصاره به طور جداگانه و خالص شده مورد مطالعه قرار گیرد. از طرفی در سال ۱۹۹۷ کوپمن و همکاران نشان دادند که تزریق بالای اسید رتینوئیک (۶۰ میلی گرم در روز) موجب افزایش تراکم سلول های آماسی می شود (۱۴). در سال ۲۰۰۶ آبدل مالک و اسپنسر نیز نشان دادند که اسید رتینوئیک ۱ درصد باعث افزایش سلول های آماسی، التهاب و آشوب بافتی می گردد (۱۵). این نتایج نیز منطبق بر مشاهدات تحقیق ما است که در آن استفاده از عصاره گیاه یونجه نشانه های التهاب و آماس را کاهش می دهد و لذا این نکته نیز مجدداً تأییدی بر این احتمال است که شاید بتوان یک علت بروز نتایج فوق در عصاره یونجه را به وجود مشتقات ویتامین A مربوط دانست.

از طرفی عصاره یونجه حاوی ویتامین C می باشد (۱۳). از آنجا که ویتامین C دارای عملکردهای فیزیولوژیک بسیاری در بدن است و اغلب همراه با ترمیم زخم به خاطر شکل گیری و تنظیم آرایش رشته های کلاژن مطرح می شود شاید بتوان قسمتی از اثر التیام بخشی عصاره یونجه را به حضور این ماده مربوط دانست. ویتامین C یک کوفاکتور است که دارای هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین می باشد که دو جز ضروری در شکل گیری کلاژن با پیوندهای هیدروژنی قوی هستند. این ویتامین هم چنین برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی نیاز است که در بیماران با زخم های باز قابل ملاحظه است. برخی عملکردهای دیگر

ویتامین C عبارتند از: آنتی اکسیدانی برای جلوگیری از صدمه هایی که به سلول های بدن وارد می شود، اثرات ضد التهاب و محافظت ویتامین E از اکسایش در خون و بازیابی آن برای شکل دادن به فعالیت هایش (۱۶).

زخم بسیاری از بیماران با وجود سادگی بدون ویتامین C ترمیم نخواهد شد و در واقع کاهش یا نقص در ویتامین C باعث کاهش فراوانی در سرعت بسته شدن زخم می گردد (۱۷).

برگ و همکاران در طی آزمایش های گوناگون متوجه شدند که ویتامین C در مقادیر بالا (مولتی گرم نه میلی گرم) در جلوگیری از خونریزی و بازگشت به حالت اول موثر است. هم چنین بدون حضور ویتامین C شکل گیری و جایگزینی بافت های جدید امکان پذیر نیست. آن ها هم چنین با بررسی توسط پرتوی X دریافتند که غضروف (هم در ماتریکس بین سلولی و هم در پری کندریوم) دارای مقادیر بالایی فیبرهای کلاژن است که بدون وجود ویتامین C فاقد عملکرد است و حضور آن سبب تسریع روند رشد و بازسازی در غضروف می شود. آن ها نشان دادند حتی استخوان هم به طور ظریفی دارای سازماندهی کابل های کلاژن بین سلول ها بوده که بدون ویتامین C فاقد عملکرد می باشد (۱۸). لذا نتایج این تحقیق در ارتباط با ازدیاد رشد تیغه غضروفی و ضخامت آن در لاله گوش خرگوش هم راستا با نتایج مرتبط با حضور ویتامین C در مقالات دیگر است و از این نظر شاید بتوان توجه تاثیرات عصاره یونجه را به حضور ویتامین C نیز (علاوه بر ویتامین A) مربوط دانست.

از جمله مواد موثر در ترمیم زخم ها اسیدهای آمینه می باشند. لیزین یک آمینواسید ضروری است که بدن نمی تواند تولید کند و باید در رژیم غذایی وجود داشته باشد در حالی که توانایی ساخت پرولین را دارد. یک زخم ممکن است روزانه ۱۰۰ گرم پروتئین استفاده کند و نیاز برای آمینواسیدهای ضروری برای درمان زخم را بالا ببرد (۱۸). در سال ۲۰۰۱ روسل نشان داد که نقص در لیزین و پرولین از

استفاده فارماکولوژیک از این گیاه در ترمیم زخم‌ها از دلایل متعدد برخوردار است و امید است نتایج این تحقیق زمینه استفاده های فوق را فراهم کند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کمک‌ها، رهنمودها و فداکاری بی‌پایان جناب آقای دکتر امین رفیعی، کمک‌های بی‌شائبه سرکار خانم زهرا وحدتی و همین‌طور پرسنل زحمتکش بخش حیوانات موسسه واکسن و سرم سازی رازی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

1. Mescher AL, Neff A, King M. Proteomic analysis of changes during the onset of amphibian limb regeneration. The FASEB J 2008; 22:984-5.
2. Stocum DL. Self-organization of the limb bud and regeneration blastema: mechanisms to establish proximal and distal boundaries. FASEB J 2007; 21: A203.
3. Mead KS. An investigative laboratory exercise examining the cell signaling and regulatory properties of neurons in the regenerating forelimbs of the Axolotl *Ambystoma mexicanum*. J of Undergraduate Neurosci Edu 2005; 4(1): A17-A21.
4. Grey JE, Harding KG. ABC of Wound Healing, Philadelphia: Blackwell 2006. p. 1-5.
5. Stadelmann WK, Digenis AG, Tobin GR. Physiology and healing dynamics of chronic cutaneous wounds. American J of Surgery 1998; 176 (2): 26S-38S.
6. Stolz JF. Mechanobiology: cartilage and Chondrocyte. Lancaster: IOS press; 2008. Vol 5. p. 202-10.
7. Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Basic Histology. 9th ed. Stamford: Appleton & Lange; 2005. p. 22-9
8. Cseke LJ, Kirakosyan A, Kaufman PB, Warber SL, Duke JA, Briemann HL. Natural products from plants, 2th Edition, CRC Press, 2006, 8(3):268-77.

ترمیم زخم جلوگیری می‌کند. آن‌ها هم‌چنین نشان دادند که نه تنها ویتامین C، لیزین و پرولین برای ساختن بافت آسیب دیده ضروری است بلکه یک تعداد از ماکرومولکول‌های ویژه که تولید انرژی کرده و کوفاکتورهای آنزیمی لازم برای ساخت و ساز هستند، نیز لازمند. هم‌راستا با این نتایج، از آنجا که عصاره یونجه نیز حاوی برخی اسیدهای آمینه از جمله لیزین می‌باشد (۱۹) لذا نقش ترمیمی این گیاه قابل توجه به نظر می‌رسد.

در تحقیقات تن کوپل و همکاران در سال ۲۰۰۱ اهمیت غضروف در ترمیم کامل بافت گوش خرگوش به اثبات رسیده است به طوری که اگر سوراخ‌های ایجاد شده بر روی لبه گوش که ناحیه بازی از آن باقی می‌ماند انجام شود، ترمیم با شکست روبرو می‌گردد و در واقع حضور پری کندریوم ضروری است (۲۰).

در تحقیق حاضر در روند ماکروسکوپی ترمیم سوراخ‌ها، سرعت بسته شدن نمونه تست به طور معنی‌داری از نمونه کنترل بالاتر بود و این مسئله احتمالاً گویای وجود مواد موثره‌ای در عصاره‌ی آبی الکلی گیاه یونجه است که بر روند تکثیر سلولی اپیتلیوم و لذا ترمیم زخم موثرند. از آنجا که سرعت رشد و ترمیم تیغه غضروفی در نمونه‌های تیمار افزایش معنی‌داری نسبت به کنترل داشته است، لذا عصاره‌ی آبی الکلی گیاه یونجه ظاهراً علاوه بر اپیتلیزاسیون، بر کندروژنز و تمایز سلول‌های کندروبلاست و سرعت بازسازی غضروف و ازدیاد آن نیز موثر است.

نتیجه گیری

با توجه به این که عصاره یونجه حاوی بسیاری مواد موثر است که هر یک مطابق مقالات متعدد بر ترمیم زخم موثر بوده‌اند، حضور توأم ویتامین A، C و اسیدهای آمینه در این عصاره دلایل کافی جهت توصیه مکانیسم‌های احتمالی تاثیر گذار بر روند ترمیم غضروف را در اختیار می‌نهد و با توجه به ارزان بودن و سهولت تهیه این گیاه و عدم مشاهده برخی اثرات سوء مواد دارویی و صنعتی،

9. Shington WD, Jones D, Xu X, Cawston TE, Rowan AD. Retinoic acid and Oncostatin M combine to promote cartilage degradation via matrix metalloproteinase-13 expression in bovine but not human chondrocyte. *Rheumatology J* 2006; 45:958-65.
10. Barnhill JG, Fye CL, Williams DW, Reda DJ, Harris CL, Clegg DO. Chondroitin product selection for the glucosamine/chondroitin arthritis intervention trial. *J Am Pharm Assoc* 2006; 46 (1): 14-24.
11. Goodman De Witt S, Smith JE, Hembry RM, Dingle JT. Comparison of effects of vitamin A and its analog upon rabbit ear cartilage in organ culture and upon growth of vitamin A-deficient rat. *J of Lipid Research* 1974; 15: 406-14.
12. Enomoto M, Pan H, Suzuki F, Takigawa M. Physiological role of vitamin A in growth cartilage cells: low concentrations of retinoic acid strongly promote the proliferation of rabbit costal growth cartilage cells in culture. *J Biochem* 1990; 107(5):743-8.
13. Foster S, Johnson RL. National geographic desk reference to nature's medicine. Desk reference to nature medicine Washington DC: National geographic Society; 2006.
14. Liaudet-Coopman ED, Berchem GJ, Wellstein A. In vivo inhabitation of angiogenesis and induction of apoptosis by retinoic acid in squamous cell carcinoma. *Clinical Cancer Research* 1997; 3(2):179-84.
15. Abdelmalek M, Spencer J. Retinoids and wound healing. *Dermatol Surg* 2006; 32(10) 1219-30.
16. Parsons KK, Maeda N, Yamauchi M, Banes AJ, Koller BH. Ascorbic acid-independent synthesis of collagen in mice. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2005; 290:1131-9.
17. Ter Riot G, Kessels AG, Knipschild PG. Randomize clinical trial of ascorbic acid in the treatment of pressure ulcers. *J Clin Epidemiol* 1995; 48(12):1453-60.
18. Berg RA, Steinmann B. Ascorbate deficiency results in decreased collagen production: under-hydroxylation of praline lead to increased intracellular degradation. *Arch Biochem Biophys* 2003; 22(6):681-6.
19. Russell L. The importance of patient' s nutritional status in wound healing. *Br J Nurs* 2001; 10(6):42, 44-9.
20. Ten Koppel PG, Van Osch GJ, Verwoerd CD, Vorwoerd-Verhoef HL. A new in vivo model for testing cartilage grafts and biomaterials: the rabbit pinna punch hole model. *Biomaterial* 2001; 22:1407-14.

The wound healing effect of *Medicago sativa* extract on pinna rabbit cartilage

Khayat-zadeh J¹, Farhoodi M², Rafiei H^{3*}

1- Assistant Professor, PhD of Animal and Developmental Biology, Department of Biology, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2- Research Assistant Professor, PhD of Veterinary Pathology, Department of Pathology, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3- MSc of Developmental Biology, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad, Iran

Received 16 Jun, 2009 Accepted 17 Aug, 2009

Abstract

Background: Cartilaginous and movement diseases are the most prevalent problem in human. Various vitamins like A and C increase the process of regeneration and wound healing. In this research, the Alfalfa plant with scientific name *Medicago sativa*, that contains a lot amount of A, C, E and K vitamins, was used and effect of its extract on regeneration of pinna rabbit cartilage was studied.

Materials and Methods: In this experimental laboratory study, 6 New Zealand male rabbits with 2.5-3 kg weight have been selected. After shaving hairs on ears with depilation cream, the ear were anesthetized by lidocaine 10% and 4 holes were punched with 4 mm diameter in medial situation of each ear. Test ears by extract of *Medicago sativa* and control ear were treated by normal saline every day. Holes era and the distance of two edges of cartilage were measured in various days of healing. Also, tissue sampling for microscopic observation by H&E color (day 0-50) was done.

Results: Regeneration and healing of the treated holes with extract of *Medicago sativa* was faster than the control holes ($p < 0/004$). Also, thickness of cartilage and cell density of chondrocytes and fibroblasts in the newly formed connective tissues in test were more than control.

Conclusion: The extract of *Medicago sativa* because of A, C vitamins containing, probably increased the wound healing and regeneration of the rabbit ear cartilage and suggest the pharmacological usages.

Keywords: *Medicago Sativa*, Wound healing, Ear cartilage, Rabbit

*Corresponding author;
Email: rafiei.hossein@gmail.com
Address: Razi Reseach Center, Mashhad, Iran