

مقاله پژوهشی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جلد دوم، شماره دوم، تابستان و زمستان ۱۳۸۲

## بررسی اثرات آلومینیوم خوراکی بر غلظت گلوکز ناشتا و پس از تست تحمل گلوکز در موش صحرایی

صالح زاهدی اصل<sup>۱</sup>، لیلا بهبود<sup>۲</sup>، بهزاد زارع<sup>۳</sup>

### خلاصه

**سابقه و هدف:** اگرچه مدارک قوی دال بر وجود سمیت آلومینیوم در اثر ورود آن به بدن از طریق مصرف غذا وجود ندارد، اثر مصرف مداوم غذای حاوی آلومینیوم ممکن است منجر به مسمومیت با آن شود. در این بررسی اثر خوراکی آلومینیوم با مقادیر مختلف روی غلظت گلوکز خون ناشتا و پس از تست تحمل گلوکز مورد مطالعه قرار گرفته است.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه، به مدت دو ماه، به شش گروه موش صحرایی با محدوده وزنی ۱۸۰-۲۲۰ گرم (از هر دو جنس نر و ماده)، غذای حاوی آلومینیوم با مقادیر ۷۵، ۱۲۵، ۲۱۲/۵، ۳۱۲/۵ و ۲۵۰۰ میلی‌گرم در هر کیلوگرم غذا، به مدت ۶۰ روز داده شد. یک گروه کنترل هم در این مدت غذای معمولی مصرف می‌کردند. در طی این مدت هر ۱۵ روز یک بار، خونگیری از دم و سپس اندازه‌گیری قند خون ناشتا و همچنین تست تحمل گلوکز (۴۵ دقیقه پس از تجویز غلظت ۱ گرم در کیلوگرم گلوکز) بر روی گروههای مختلف انجام می‌شد.

**یافته‌ها:** آلومینیوم روی غلظت گلوکز ناشتا و پس از تست تحمل گلوکز اثر افزایشی داشت که از الگوی واپسته به دوز و واپسته به زمان تبعیت می‌کرد، اگرچه شدت تغییرات مشاهده شده در میزان تحمل گلوکز بیشتر از قندخون ناشتا بود. غلظت گلوکز ناشتا گروه کنترل در انتهای دو ماه آزمایش  $113/8 \pm 4$  میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر و در گروهی که غذای حاوی آلومینیوم (۲۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) را دارا بود  $165/9 \pm 1$  میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر بوده است که به طور معنی‌دار بیشتر است.

**نتیجه‌گیری:** نتایج این بررسی مشخص می‌کند ورود آلومینیوم زیاد به همراه غذا می‌تواند سبب اختلال در متابولیسم کربوهیدرات شده که به صورت افزایش در قند خون ناشتا و نارسایی در قسمت تحمل گلوکز بروز می‌کند این یافته می‌تواند زمینه‌ساز بیماری دیابت می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** آلومینیوم، گلوکز ناشتا، تست تحمل گلوکز، موش صحرایی

## مقدمه

غلظت گلوكز ناشتا در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

### مواد و روش‌ها

بررسی روی موش‌های صحرایی نر و ماده آلبینو با محدوده وزنی  $180\pm 10$  گرم ( $268\pm 6$  میانگین  $\pm$  خطای استاندارد) صورت گرفت. حیوانات از انسستیتو رازی حصارک تهییه، در شرایط استاندارد ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی و دمای محیط  $22\pm 2$  نگهداری شدند و به استثنای روزهای آزمایش دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. حیوانات گروه آزمایش (تعداد=۹) در طول آزمایش (تا ۶۰ روز) از غذایی استفاده کردند که حاوی دوزهای مختلف ( $212/5$ ،  $75/5$ ،  $625/5$  و  $125/5$  میلی‌گرم آلومینیوم به ازای گرم غذا) بود که به صورت کلرور آلومینیوم به آن اضافه شده بود. برای تهییه غذاهای حاوی آلومینیوم، غذای تهییه شده از شرکت غذایی دام شوستر خمیر و پس از اضافه کردن آلومینیوم به مقدار مورد نظر مجدداً به صورت اولیه در آورده می‌شد.

نمونه‌های خون در ابتدای آزمایش و هر ۱۵ روز یک بار به صورت ناشتا و یا به دنبال آزمایش تست گلوكز از طریق دم روی EDTA تهییه و پلاسما با سانتریفوژ کردن جدا می‌شد. گلوكز خون به روش اورتوفولیدین [۳] مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. ضریب تغییرات داخل و بین اندازه‌گیری گلوكز بر روی نمونه‌های با غلظت‌های گلوكز پایین و بالا به ترتیب  $3/5$ ،  $2/2$  و  $2/6$  و  $1/69$  بوده است. برای انجام تست تحمل گلوكز مقدار ۱ گرم گلوكز به ازای کیلوگرم وزن بدن حیوانات تجویز و غلظت نمونه خون  $45$  دقیقه پس از تجویز گلوكز تهییه شد. مقایسه با استفاده از روش student-t-test صورت گرفته و مقادیر p کمتر از  $0.05$  معنی‌دار تلقی شده است.


### نتایج

نتایج مطالعه نشان می‌دهد که دوزهای  $625$ ،  $1250$  و  $2500$  میلی‌گرم در هر کیلوگرم غذا توانسته غلظت گلوكز را به طور معنی‌دار نسبت به گروه کنترل افزایش دهد. غلظت گلوكز ناشتا گروه کنترل در روز اول و شصتم به ترتیب  $111\pm 7$  و  $113/8\pm 4$  میلی‌گرم درصد میلی‌لیتر بود در حالی که در گروهی که غذای حاوی آلومینیوم را با مقادیر مختلف

آلومینیوم عنصری است که به وفور در طبیعت یافت می‌شود و حدود ۸ درصد از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد [۱۴]. به نظر می‌رسد که آلومینیوم نقش فیزیولوژیک برای بدن نداشته باشد [۳۷]. جذب آن از روده باریک بسیار کم [۲۱] و مقادیر آن در پلاسمما پایین است [۱۵]. در سال‌های اخیر اثرات سمی این عنصر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ارتباط مسمومیت با آلومینیوم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی با بیماری آلزایمر [۲] اوستئومالاسی [۳۴] و کم خونی [۱،۳۱] در سال‌های اخیر پیشنهاد شده است. در مطالعات اخیر که در خارج از بدن صورت گرفته اثر مهاری آلومینیوم روی فعالیت کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ بعضی سلول‌ها مشخص شده است [۴،۵،۱۹]. تداخل کلسیم با کانال‌های کلسیمی لیگاندی و متابولیسم فسفاتیدیل اینوزیتول نیز پیشنهاد شده است. نشان داده شده که آلومینیوم افزایش کلسیم داخل سلولی ناشی از کرباکول را در سلول‌های نوروبلاستوما مهار می‌کند [۳۶]. اختلال در متابولیسم فسفاتیدیل اینوزیتول به وسیله آلومینیوم در برش‌های کورتکس و هیپوکامپ [۲۵] بافت میوکارد [۲۶] و کبد موش [۱۲] نیز نشان داده شده است. اثر مهاری آلومینیوم در انقباض عضله صاف وابسته به کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ [۱۸،۲۹] و یا متابولیسم فسفاتیدیل اینوزیتول [۳۵] نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که متابولیسم کربوهیدرات در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی غیرطبیعی است [۲۰،۲۸] و حداقل قسمتی از این اختلال می‌تواند مربوط به اختلال در ترشح انسولین باشد [۹،۳۲]. با توجه به نقش کلسیم و کانال‌های وابسته به ولتاژ آن در ترشح انسولین [۳،۳۳] و نیز اثر مهارکنندگی کانال‌های کلسیمی متوسط آلومینیوم [۹،۱۰،۱۱] و نیز این واقعیت که غلظت آلومینیوم در پلاسمای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی بالا است [۸،۲۲] این امکان وجود دارد که اختلال در ترشح انسولین، مربوط به غلظت بالای آلومینیوم سرم در این بیماران باشد. بنابراین در این بررسی، اثر تجویز آلومینیوم خواهی روی


در تست تحمل گلوکز نیز مصرف درازمدت آلمینیوم توانست متابولیسم گلوکز را مختل کند. مصرف غذای حاوی آلمینیوم به صورت وابسته به دوز و زمان توانست غلظت گلوکز سرمه بعد از تست تحمل گلوکز را افزایش دهد. دو ماه پس از مصرف غذای حاوی ۲۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم غذا غلظت گلوکز پس از تست تحمل گلوکز  $217 \pm 6$  میلی گرم در مقایسه با روز شصتم گروه کنترل  $123 \pm 8$  به طور معنی دار ( $p < 0.05$ ) افزایش داشته است (نمودار ۳).




نمودار ۳ - مقایسه غلظت گلوکز پلاسما پس از تست تحمل گلوکز روز اول و روز شصتم گروه کنترل و گروهی که غذای حاوی آلمینیوم به میزان ۲۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم غذا مصرف کرده بودند

وزن حیوان هایی که غلظت های  $625$ ،  $1250$  و  $2500$  میلی گرم با وزن هر کیلوگرم غذا آلمینیوم را مصرف کرده بودند نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشته است (جدول ۱).

دربافت کرده دوزهای  $625$ ،  $1250$  و  $2500$  میلی گرم به طور معنی داری افزایش داشته است. غلظت گلوکز ناشتاپی گروههای یاد شده پس از دو ماه به ترتیب  $127 \pm 6$ ،  $116 \pm 3$  و  $165 \pm 10$  میلی گرم در صد میلی لیتر بوده که به طور معنی دار از غلظت گلوکز روز اول همان گروهها بیشتر بوده است (نمودار ۱).



نمودار ۱ - مقایسه غلظت گلوکز ناشتاپی پلاسما گروه کنترل و گروههایی که در غذای خود آلمینیوم با مقدار  $2500$  میلی گرم به ازای کیلوگرم غذا به مدت  $60$  روز دریافت کرده بودند در گروهی که آلمینیوم را به مقدار  $2500$  میلی گرم در کیلوگرم غذا مصرف کرده بود مقدار گلوکز پلاسما به طور معنی دار از روز پانزدهم افزایش معنی دار داشت در حالی که در گروه کنترل غلظت گلوکز تغییری در مدت  $2$  ماه آزمایش نشان نداد (نمودار ۲).



نمودار ۲ - مقایسه غلظت گلوکز ناشتاپی در مقاطع زمانی مختلف گروه کنترل و گروهی که در غذای خود آلمینیوم ( $2500$  میلی گرم به ازای کیلوگرم غذا) به مدت دو ماه دریافت کرده بودند

## جدول ۱- اثر دوز و زمان مصرف آلومینیوم بر روی وزن حیوانات (تعداد=۹)

۲۵۰۰	۱۲۵۰	۶۲۵	۳۱۲/۵	۲۱۲/۵	۷۵	.	میلی گرم به ازای کیلوگرم غذا
میانگین ± خطای معیار							
۲۱۲/۵±۵/۰	۲۰۵/۴±۶/۲	۲۰۱/۵±۶/۴	۱۹۹/۳±۶/۴	۲۱۰/۷±۵/۲	۲۰۷/۴±۶/۷	۲۱۳/۱±۵/۹	۱
۲۰۶/۸±۸/۳	۲۰۴/۵±۷/۱	۲۰۵/۲±۵/۶	۲۰۴±۶/۷	۲۱۵/۳±۶/۹	۲۱۰/۸±۶/۹	۲۲۱/۶±۶/۳	۱۵
۱۹۸/۵±۹/۴	۲۰۷/۱±۳/۹	۲۰۳/۴±۵/۷	۲۰۰/۶±۷/۹	۲۲۲/۱±۹/۶	۲۱۳/۵±۷/۵	۲۲۲±۷/۵	۳۰
۲۰۶/۶±۳/۶	۲۰۴/۷±۴/۴	۲۰۱/۳±۶/۴	۲۰۳/۲±۹/۰	۲۱۹/۷±۷/۰	۲۲۲/۸±۸/۷	۲۲۱/۳±۶/۹	۴۵
۱۹۴/۵±۳/۷##	۱۹۸/۲±۴/۸##	۲۰۲/۴±۶/۰ #	۲۰۹/۵±۶/۵	۲۲۶±۷/۰	۲۲۹/۲±۱/۰	۲۳۰±۷/۷	۶۰

# تعییرات معنی‌دار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در همان روز  $p < 0.05$  یا  $> 0.05$ 

## بحث

[۱۹، ۴۵]. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بعضی از مطالعات نشان می‌دهند که تجویز آلومینیوم طولانی‌مدت به صورت تجربی به حیوان‌ها [۱۷] و نیز در معرض قرار گرفتن انسان [۱۰] در مواردی قادر به افزایش غلظت آلومینیوم در پلاسمای نشده است، بنابراین ممکن است که اثر مورد پیش‌بینی که افزایش غلظت آلومینیوم در این مطالعه نباشد در مایعات خارج سلولی منجر به مهار کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ می‌شود توجه کننده اثر ناشی از او آلومینیوم علاوه بر این که آلومینیوم وارد شده به بدن ممکن است به صورت متصل به پروتئین‌ها در گردش خون باشد [۷] و بدین ترتیب غلظت آلومینیوم آزاد در پلاسمای ممکن است به اندازه‌ای نباشد که بتواند اثر مهاری خود را روی کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ اعمال کند. مطالعات نشان می‌دهند که تجویز دراز مدت آلومینیوم سبب تجمع عنصر با مقادیر متفاوت در بافت‌های مختلف بدن می‌شود [۶] و می‌تواند اثر خود را از داخل سلول‌ها، اعمال کند. تاکنون مطالعه‌ای که تجمع آلومینیوم را در سلول‌های B مدنظر قرار دهد، انجام نشده است.

در مطالعه‌ای نشان داده شده که تجویز مکرر آلومینیوم به مدت ۴ هفته توائسته غلظت آن را در کبد افزایش دهد که با کاهش مقدار گلوتاتیون و گلوتاتیون پراکسیداز همراه بوده است [۱۶]، از طرف دیگر افزایش فعالیت لاكتات دهیدروژناز (LDH)، آسپارتات ترانسفراز (ALT) از شاخص‌های دیگری بوده که به دنبال مسمومیت تجربی ایجاد شده در موش‌های

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که وجود مقدار زیاد آلومینیوم در رژیم غذایی موش‌های صحرایی به افزایش غلظت گلوكز ناشتا و همچنین پس از تست تحمل گلوكز منجر می‌شود که همراه با کاهش وزن حیوان نیز است. این افزایش در غلظت گلوكز می‌تواند به دلیل مقاومت در برابر انسولین [۳۸]، یا کاهش ترشح انسولین [۱۳] و یا هر دو باشد. تاکنون بررسی مشابهی که در آن نقش آلومینیوم تجویز شده به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته باشد، صورت نگرفته است اما اختلال متابولیسم گلوكز در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی که غلظت بالای آلومینیوم را در گردش خون خود دارند [۲۰، ۱۵] نشان داده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بیماران مبتلا به نارسایی مزمن دارای ترشح انسولین بالا و مقاومت در برابر انسولین هستند [۲۴].

غلظت بالای گلوكز ناشتا و پس از تست تحمل گلوكز در این بررسی در راستای یافته‌ها در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی است اما با توجه به این که انسولین در این مطالعه اندازه‌گیری نشده است نتیجه‌گیری این که گلوكز بالا به دلیل ترشح انسولین کم یا مقاومت به انسولین باشد امکان‌پذیر نیست. البته بر مبنای تئوری مطالعه قاعده‌تاً باید ترشح انسولین در این حیوانات کم شده باشد. ترشح انسولین در سلول‌های B با باز شدن کانال‌های کلسیم وابسته به ولتاژ صورت می‌گیرد کلسیم [۲۷] و اثر آلومینیوم در مهار کانال‌های کلسیمی وابسته، ولتاژ نشان داده شده است

هایی که در معرض آلمینیوم قرار داشته‌اند میزان گلوکز-۶ فسفاتاز در سلول‌های عضلانی کم شده است. بدین ترتیب با توجه به حجم بافت عضله اسکلتی در حیوان، این نوع اختلال در عضله اسکلتی می‌تواند سبب افزایش غلظت گلوکز در پلاسمای شود.

با توجه به نتایج این بررسی به نظر می‌رسد که تماس با آلمینیوم در صورتی که بالاتر از دوزهای خاصی باشد می‌تواند منجر به اختلال در متابولیسم کربوهیدرات شود و حائز اهمیت است که وضعیت افرادی که در صنایع مرتبط با آلمینیوم مشغول هستند از این نظر نیز بررسی شده و موارد ایمنی در این رابطه مدنظر قرار گیرد.

#### تقدیر و تشکر:

انجام این پژوهه به صورت پایان‌نامه دانشجویی بوده و هزینه انجام آن توسط دانشکده داروسازی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفته است. بدین وسیله از مسئولان زیربط تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

صرایبی نشان از فعالیت غیرطبیعی کبد داشته است [۱۶]. همین بررسی نشان می‌دهد که سنتزپروتئین در کبد نیز زیاد هم شده است. این اختلال‌ها شاید به تنها ی اختلال در فعالیت کبد را در متابولیسم گلوکز که یک منبع قوی برای جذب گلوکز است [۲۰] را توجیه نکند اما احتمال آن را بیشتر می‌کند.

مطالعه‌ای که توسط هاگلین و همکاران در سال ۱۹۹۴ صورت گرفته [۱۱] نشان می‌دهد که تجویز آلمینیوم به مدت ۱۰ هفته می‌تواند میزان گلوکز-۶ فسفاتاز را در سلول‌های کبدی کم کند که این کار سبب کاهش میزان برداشت گلوکز توسط سلول‌های کبدی خواهد شد [۲۰]. بنابراین برای نشان دادن اثر آلمینیوم در متابولیسم گلوکز به وسیله کبد شاید احتیاج به کار بیشتری باشد. بافت‌های دیگری که در جذب گلوکز از پلاسمای نقش قابل توجهی دارند بافت‌های چربی و عضلات اسکلتی هستند [۲۰]. مطالعه‌ها گلین و همکاران هم‌چنین [۱۱] نشان داده که که تجویز آلمینیوم هیدروکساید به مدت ۱۰ هفته به خوک‌ها توانسته متابولیسم گلوکز را در عضله اسکلتی تغییر دهد بدین ترتیب که حیوان

#### منابع

- [1] Abreo K Brown ST Sella M. Correction of microcytosis following elimination of an occult source of aluminium contamination of dialysate. *Am J Kid Dis.* 1989; 13: 465- 468.
- [2] Alfrey AC Legendre GR Kaehny WD. The dialysis encephalopathy syndrome. Possible aluminium intoxication. *N Eng J Med.* 1976; 294: 189-190.
- [3] Bas F Darendeliler F Demirkol D Bundak R Saka N Gunoz H. Successful therapy with calcium channel blocker (nifedipine) in persistent neonatal hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 1999; 12: 873-878.
- [4] Busselberg D Platt MD Carpenter DO. Mammalian Voltage activated Calcium Channel currents are blocked by  $Pb^{2+}$   $Zn^{2+}$  &  $Al^{3+}$ . *J Of Neurophysiology.*1994; 7: 1491-1497.
- [5] Busselberg D Platt MD Hass & Carpenter DO. Voltage Gated Calcium Channel currents of rat dorsal root ganglion (DRG) cells are blocked by  $Al^{3+}$ . *Br Res.* 1993; 622: 163-168.
- [6] El-Maraghy SA Gad MZ Fahim AT Hamdy MA. Effect of cadmium and aluminum intake on the antioxidant status and lipid peroxidation in rat tissues. *J Biochem Mol Toxicol.* 2001; 15: 207-214.
- [7] Exley C, Burgess , Day JP, Jeffery EH, Melthil S Yokel RA. Aluminium toxicokinetics. *J Toxicol Environment H.* 1996; 48: 596-584.
- [8] Fernandez-Martin JL Canteros A Alles A Massari P Cannata-Andia J. Aluminum exposure in chronic renal failure in iberoamerica at the end of the 1990s: overview and perspectives. *Am J Med Sci.* 2000; 320: 96-9. Review.

- [9] Feneberg R Sparber M Veldhuis JD Mehls O Ritz E Schaefer F. Altered temporal organization of plasma insulin oscillations in chronic renal failure. *J Clin Endocrinol Metab.* 2002; 87: 1965-1973.
- [10] Gupta SK Waters DH Gwilt PR. Absorption and disposition of aluminum in the rat. *J Pharm Sci.* 1986; 75: 586-589.
- [11] Haglin L Essen-Gustavsson B Lindholm A. Hypophosphatemia induced by dietary aluminium hydroxide supplementation in growing pigs: effects on erythrocytes, myocardium, skeletal muscle and liver. *Acta Vet Scand.* 1994; 35: 263-271.
- [12] Haug A, Shi B, Vitorello. Aluminium interaction with phosphoinositide-associated signal transduction. *Arch Toxicol.* 1994; 68: 1-7.
- [13] Holness MJ Greenwood GK Smith ND Sugden MC. Diabetogenic impact of long-chain omega-3 fatty acids on pancreatic beta-cell function and the regulation of endogenous glucose production. *Endocrinology.* 2003; 144: 3958-3968.
- [14] Klein GL. The aluminium content of parental solutions: current studies. *Nutrition Reviews.* 1991; 49: B 74-79.
- [15] Lin JL Lim PS Leu ML. Relationship of body iron status and serum aluminium in chronic renal insufficiency patients not taking any aluminium-containing drugs. *Am J Nephrol.* 1995; 15: 118-122.
- [16] Moshtaghi AA Taher M Fazilat M Amozadeh H. Aluminium toxicity and changes in serum parameters related to liver function in rats. *Clin Chem Enzym Comms.* 1996; 7: 187-192.
- [17] Mussi I, Calzaferri G, Buratti M & Alessio L. Behaviour of plasma and urinary aluminium levels in occupationally exposed subjects. *Int Arch Occup Environ Health.* 1984; 54: 155-161.
- [18] Neveu D Avingard FJ Fernandez A Richard S Nargeot J. Differential  $\beta$  adrenergic regulation and phenotype modulation of Voltage-gated calcium currents in rat aortic myocytes. *J Physiol.* 1994; 479: 171-182.
- [19] Platt B Busselberg D. Actions of aluminium on Voltage Activated Calcium Channel currents. *Cellular and Molecular Neurobiology.* 1994; 14: 819-829.
- [20] Porterfield SP. *Endocrine Physiology.* 2<sup>nd</sup> Ed. Mosby Londo 2001; 85-104.
- [21] Powell JJ Thompson RPH. The chemistry of aluminium in the gastrointestinal lumen and its uptake & absorption. *Proc Nutr Soc.* 1993; 52: 241-253.
- [22] Salahudeen AK Deogaygay B Fleischmann E Bower JD. Race-dependent survival disparity on hemodialysis: higher serum aluminum as an independent risk factor for higher mortality in whites. *Am J Kidney Dis.* 2000; 36: 1147-1154.
- [23] Sechi LA Catena C Zingaro L Melis A De Marchi S. Abnormalities of glucose metabolism in patients with early renal failure. *Diabetes.* 2002; 51: 1226-1232.
- [24] Sechi LA Catena C Zingaro L Melis A De Marchi S. Abnormalities of glucose metabolism in patients with early renal failure. *Diabetes.* 2002; 51: 1226-1232.
- [25] Shafer TJ Mundy WR Tilson HA. Aluminium decreases muscarinic adrenergic and metabotropic receptor-stimulated phosphoinositid hydrolysis in hippocampal and cortical slices from rat brain. *Brain Research.* 1993; 629: 133-140.
- [26] Shafer TJ Mundy WR. Effect of aluminium on neuronal signal transduction mechanisms underlying distribution of phosphoinositide hydrolysis. *Gen Pharma.* 1995; 26: 884-895.
- [27] Smith PA Proks P. Inhibition of the ATP-sensitive potassium channel from mouse pancreatic beta-cells by surfactants. *Br J Pharmacol.* 1998; 124: 529-539.
- [28] Smogorzewski MJ Massry SG. Liver metabolism in CRF. *Am J Kidney Dis.* 2003; 4: S127-32.

- [29] Thurzova M Kventansky R Krizanova O. Modulation of the L-type Ca channels by insulin treatment in rat aorta. *Gen Physiol Biophys.* 1995; 14: 217-224.
- [30] Tietz NW. *Tietz text book of clinical chemistry* 2<sup>nd</sup> edition WB. Saunders Co. London. 1994; 656-666.
- [31] Varma PP Kumar R Prasher PK Roy ND. Hypochromic anaemia in chronic renal failure—role of aluminium. *J Assoc Physicians India.* 1999; 47: 690-693.
- [32] Vazelov E Borissova AM Kirilov G Assenova B Tchetirska M Krivoshiev S.L-carnitine consecutively administered to patients on hemodialysis improves beta-cell response. *Int J Artif Organs.* 2003; 26: 304-307.
- [33] Virsolv A Smith P Bertrand G Gros L Heron L Salazar G Puech R Bataille D. Block of Ca(2+)-channels by alpha-endosulphine inhibits insulin release. *Br J Pharmacol.* 2002; 135: 1810-1818.
- [34] Ward MK Feest TG Ellis HA Parkinson IS Kerr DNS Herrington J Goode GL. Osteomalacic dialysis osteodystrophy. Evidence for a waterborne etiologic agent probably aluminium. *Lancet.* 1978; I: 841-845.
- [35] Weber LP Chow WL Moshenk J belsher S Macleod KM. Pharmacological investigation of signaling mechanisms contributing to phasic and tonic components of the contractile response of rat arteries to noradrenaline. *Can J Physiol Pharmacol.* 1995; 73: 594-601.
- [36] Wood PC Wojcikiewics RJH Burgess J Castleden CM Nahorski SR. Aluminium inhibits muscarinic agonist induced inositol 1,4,5 triphosphat production and calcium mobilization in permeabilized SH-SY5Y human neuroblastoma cells. *J Neurochem.* 1994; 62: 2219-2223.
- [37] Yokel RA Allen DD Mayer JJ. Studies of aluminium neurobehavioral toxicity in the intact mammal. *Cellular & Molecular Neurobiology.* 1994; 14: 791-808. [32] Vazelov E Borissova AM Kirilov G Assenova B Tchetirska M Krivoshiev S.L-carnitine consecutively administered to patients on hemodialysis improves beta-cell response. *Int J Artif Organs.* 2003; 26: 304-307.
- [38] Zanquette MM Seraphim PM Sumida DH Cipolla-Neto J Machado UF. Calorie restriction reduces pinealectomy-induced insulin resistance by improving GLUT4 gene expression and its translocation to the plasma membrane. *J Pineal Res.* 2003; 35: 141-148.