

**غنى سازی ماکارونی با نیامین، ریبوفلاوین، نیاسین و آهن و تأثیر فرایند  
تولید و پخت ماکارونی بر این ریز مغذيها**

میترا قاضی زاده<sup>۱</sup>، محمد تقی مظلومی<sup>۲</sup>، فروغ اعظم طالبان<sup>۳</sup>، بنفسه گلستان<sup>۴</sup>،  
محمود بهنام مرادی<sup>۵</sup>، مرتضی عبداللهی<sup>۶</sup>، حمیدرضا فلاحت پیشه<sup>۷</sup>، نیلوفر چوبدار<sup>۸</sup>،  
رزیتا کمیلی فنود<sup>۹</sup>، فرحناز فتح اردوبادی<sup>۱۰</sup>، لیلی اختری<sup>۱۱</sup>، سید علی شفیقی<sup>۱۲</sup>

۱- پژوهشیار انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲- کارشناس ارشد صنایع غذایی ۳- استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ۴- مشاور انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۵- رئیس گروه کنترل کیفی پژوهشکده غلات ۶- استادیار انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۷- پژوهشیار انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۸- محقق انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۹،۱۰-۱۲- کارشناس آزمایشگاه انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ۱۱- لیسانس مکرو بیولوژی کشور

حکیمہ

با توجه به نتایج بررسیهای انجام شده مبنی بر کمبود آهن و ویتامین B<sub>6</sub> در کشور و مصرف رو به رشد ماکارونی این تحقیق به منظور بررسی غنی‌سازی ماکارونی با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن و تاثیر فرایند تولید و پخت بر این ریز مغذيهای در استیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور غذایی گرفت. تحقیق به روش تجربی بر روی شش تیمار کاملاً یکنواخت و همگن از ماکارونیهای غنی‌شده با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و دو نوع ملح آهن تولید شده در خط تولید ماکارونی بلند کارخانه البرز ماکارون صورت گرفت. برای این منظور سه فرمول مختلف با هر نوع ملح آهن (O<sub>Fe</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O, EDTA) تهیه گردید. مقدار تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن افزوده شده به ترتیب در دامنه ۴-۱۴/۸، ۲۷۵-۳۵۰/۲-۶۸۷-۲۸۷ میلی گرم در کیلوگرم آرد مصرفی بود. میزان باقیمانده تیامین، ریوفلاوین و نیاسین نمونه‌های غنی‌شده پس از فرایند تولید و پخت با دستگاه HPLC تعیین گردید و با محصول تولیدی همان کارخانه (شاهد) مقایسه گردید. تاثیر فرایند تولید بر رنگ و تاثیر پخت ماکارونی بر رنگ و طعم نمونه‌ها با روش رتبه بندی توسط ۳۰ ارزیاب خانگی (Inhouse) ارزیابی شد. برای آنالیز آماری پارامترهای کمی از نرم افزار SPSS، آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفة و t-test زوجی و برای ویژگیهای حسی از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آنالیز نمونه‌ها نشان داد که تیامین، ریوفلاوین و نیاسین موجود در ماکارونیهای غنی‌شده با فرمولاسیونهای مختلف پس از فرایند تولید به ترتیب ۷۰/۱۷ و ۷۱/۵-۷۹/۰۸، ۷۷/۷۹-۷۳/۷۲ و ۷۰/۸-۷۶/۳۹ و ۵۲/۵۴-۶۳/۹۲، ۸۶/۱-۸۷/۲۲ و پس از فرایند پخت به ترتیب ۷۰/۱۷-۷۹/۰۸، ۷۷/۷۹-۷۳/۷۲ و ۷۰/۸-۷۶/۲۰ درصد حفظ شد. بالا رفتن میزان ریز مغذيهای افزوده شده، مقدار باقیمانده آنها در محصول غنی‌شده در تمامی تیمارها و فرایندهای مورد بررسی نیز افزایش یافت. کمترین درصد کاهش در میزان تیامین مشاهده گردید و پس از آن نیاسین و ریوفلاوین قرار داشتند. ارزیابی حسی نمونه‌های خام و پخته نشان داد که بین تیمارهای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی تفاوت بین شاهد و تیمارهای مختلف معنادار بود ( $P<0.05$ ). با توجه به نتایج طرح مبنی بر کاهش بخشی از ریز مغذيهای در طی تولید و پخت، غنی‌سازی ماکارونی با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن امکان پذیر است. مناسب ترین فرمول برای غنی‌سازی، استفاده از ۱۱ میلی گرم تیامین، ۴/۸ میلی گرم ریوفلاوین، ۷۵ میلی گرم نیاسین و ۲۸/۶ میلی گرم آهن (بر پایه H<sub>2</sub>O, O<sub>Fe</sub>SO<sub>4</sub>) در کیلوگرم آرد است که می‌تواند بخشی از عوارض ناشی از کمبود این ریز مغذيهای را بر طرف نماید.

**کلیدوازگان** : غنی سازی، ماکارونی، تیامین، ریوفلاوین، نیاسین، آهن

[۵] Watanabe و Ciacco (۱۹۹۰) اسپاگتی را با تیامین، ریوفلاوین و نیاسین غنی سازی کردند و تاثیر روش‌های خشک کردن و شرایط انبارمانی را بر میزان این ریزمغذیها مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این مطالعات نشان داد که کیفیت اسپاگتی به شرایط انبار، میزان ویتامینهای افزوده شده و درجه حرارت خشک کردن بستگی ندارد. کاهش ویتامینها در مرحله پخت بیشتر از مرحله خشک کردن بود. نور تاثیری بر میزان تیامین و نیاسین نداشت. ولی باعث کاهش شدید ریوفلاوین شد [۶]. Dexter و همکاران (۱۹۸۲) نیز آرد اسپاگتی را با مخلوط ریزمغذیهای تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن غنی سازی نموده و تاثیر شرایط فرایند و پخت را بر میزان ریزمغذیها مورد بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی نشان داد که پس از پخت ۳۰٪ ریوفلاوین، ۴٪ تیامین و ۴۸٪ نیاسین در اسپاگتی باقی ماند و غنی سازی بر رنگ اسپاگتی موثر بود [۷]. به منظور بررسی امکان غنی سازی ماکارونی با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن و تاثیر فرایند تولید و پخت بر میزان این ریزمغذیها این تحقیق در انسنتیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با همکاری کارخانه البرز ماکارون در سالهای ۱۳۸۰-۸۲ انجام گردید.

## ۲- مواد و روشها

تحقیق در دو مرحله انجام شد. در مرحله مقدماتی (Pre Study) برای ارزیابی قابلیت تولید ماکارونی غنی شده با آهن از نظر پذیرش رنگ و طعم و عرضه محصول در بازار، مقادیر مختلف دو نوع ملح آهن  $\text{FeSO}_4$ ،  $\text{NaFeEDTA}$ ،  $\text{H}_3\text{O}$  در دامنه ۲۸/۶-۸۸ میلی گرم آهن به ازاء هر کیلوگرم آرد مصرفی، در بخش تغذیه کننده خط تولید با ریزمغذیها (Feeder)، که توسط مجریان طرح و متخصصین شرکت البرز ماکارون طراحی و ساخته شده بود، با آب مخلوط و به صورت محلول یکنواخت به صورت تدریجی با درنظر گرفتن حجم آب مورد نیاز به ازاء ۱۰۰ کیلوگرم آرد با سیستم کترل اتوماتیک به خط تولید محصول

## ۱- مقدمه

ویتامینها با شرکت در ساختمان کوآنزیمهای و املاح معدنی به عنوان فعال کننده آنزیمهای نقش مهمی در متابولیسم ایفا می‌نمایند. لذا کمبود آنها موجب بروز آشفتگیهایی در روند واکنش‌های متابولیکی می‌گردد که سرانجام به توجه به نتایج حاصل از بررسی طرح امنیت غذا و تعزیه که در انسنتیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور اجرا گردید و نتایج آن به عنوان محور اساسی در برنامه سوم اقتصادی مورد لحاظ واقع شد در میان مشکلات تغذیه‌ای کشور، به کمبود آهن و ویتامین  $B_2$  در جامعه اشاره گردیده است [۱]. نتایج بررسی‌های تغذیه‌ای در طی سالیان گذشته نیز نشانگر این مطلب است و در بیان اهمیت مشکل همین بس که حتی در کشورهای صنعتی بسیار پیشرفتی نیز بخشهای وسیعی از مردم جامعه تعدادی از مواد مغذی از جمله ویتامینها را از طریق غذای مصرفی در حد توصیه شده (RDA)<sup>۱</sup> دریافت نمی‌نمایند [۲]. عوارض ناشی از تداوم این مشکل می‌تواند به بروز بیماری‌های متعددی ناشی از کمبود این عوامل منجر گردد. غلات و فراورده‌های آن به عنوان اصلی ترین منابع تأمین کننده انرژی و پروتئین در کشور هستند [۱]. نظر به ظرفیت تولید اسمی ۳۷۰۰۰۰ تن ماکارونی در کشور و برآورد مصرف سرانه بیش از شش کیلوگرم در سال [۳] و روند رو به افزایش قیمت برنج که موجب رویکرد مردم به مصرف بیشتر ماکارونی گردیده است، ماکارونی می‌تواند به عنوان یکی از بهترین حامل‌های ویتامینهای گروه  $B$  و آهن در امر غنی سازی انتخاب شود. Kulp (۲۰۰۰) از غنی سازی ماکارونی به عنوان روشی مناسب برای تامین مواد مغذی یاد می‌کند [۴]. با توجه به اینکه مصرف پاستا<sup>۲</sup> و نودل‌ها<sup>۳</sup> در اغلب کشورها متدائل است، FAO نیز آنها را حامل مناسبی برای غنی سازی اعلام نموده است

1.Recommended daily allowance.

2.Pasta

3.Noodles

ریوفلاوین و نیاسین تیمارهای حاوی این ریز مغذیها و ملح آهن  $\text{SO}_4\text{Fe}, \text{vH}_2\text{O}$  پس از فرایند تولید و پخت با دستگاه HPLC (Waters آمریکا، پمپ مدل ۵۱۰، دتکتور UV-Visible مدل ۴۸۶، دتکتور فلورسانس مدل ۷۲۵ و نرم افزار کروماتوگرافی Autochro-۲۰۰۰) تعیین گردید. برای اندازه‌گیری تیامین و ریوفلاوین از فاز متحرک استات سدیم ۰/۰۵ مولار و اتانول به نسبت ۳۰:۷۰ به صورت ایزو کراتیک، سرعت جریان فاز متحرک ۱ میلی لیتر در دقیقه، ستون Novapak c<sub>18</sub> به طول ۱۵۰ و قطر ۳/۹ میلی متر و دتکتور فلورسانس استفاده شد. تعیین میزان تیامین در طول موج em=۴۳۵ و em=۳۶۶ نانومتر و ریوفلاوین در طول موج em=۵۲۲ و em=۴۲۲ نانومتر صورت گرفت. حجم تزریقی ۲۰ میکرو لیتر بود. برای اندازه‌گیری نیاسین از فاز متحرک آب و اسید استیک گلاسیال به نسبت ۲:۹۸ به صورت ایزوکراتیک، سرعت جریان فاز متحرک ۱/۵ میلی لیتر در دقیقه، ستون PRP-X100 به طول ۲۵۰ و قطر ۱/۴ میلی متر هامیلتون آمریکا و دتکتور UV-Visible با طول موج ۲۵۴ نانومتر استفاده شد. حجم تزریقی ۵۰ میکرولیتر بود [۸]. نتایج حاصل با نمونه غنی‌نشده تولید همان کارخانه که با مواد اولیه و شرایط مشابه تهیه گردیده بود (شاهد) مقایسه شد. برای حفظ بیشترین میزان ریز مغذیها پس از فرایند پخت، ۱۰۰ گرم ماکارونی را به پسر حاوی ۸۰۰ میلی لیتر آب جوش متقل کرده و حرارت دادن ۲۰-۲۵ دقیقه ادامه یافت. با استفاده از درپوش مناسب تقریباً تمام آب جذب ماکارونی شد. تاثیر فرایند تولید بر رنگ و هم چنین رنگ و طعم شش تیمار ماکارونیهای تولیدی حاوی ریز مغذیها و دو نوع ملح آهن پس از فرایند پخت با روش رتبه‌بندی ارزیابی شد. برای این منظور ابتدا سه نمونه ماکارونی غنی‌شده با  $\text{SO}_4\text{Fe}, \text{vH}_2\text{O}$ ، تیامین، ریوفلاوین و نیاسین و یک نمونه شاهد به صورت خام در ظروف مشابه که با اعداد سه رقمی تصادفی رمزگذاری شده بودند به طور

اضافه شد. شش فرمول ماکارونی حاوی نوع و مقادیر مختلف آهن (سه تیمار با دو نوع ملح آهن بدون افزودن سایر ریز مغذیها) و مواد اولیه یکسان در خط تولید ماکارونی بلند کارخانه البرز ماکارون با شرایط کاملاً یکسان و ثابت در حجم یک تن تولید و در پوشش‌های مقاوم به نور بسته‌بندی شد. از محصولات تولید شده به صورت کاملاً تصادفی نمونه‌برداری شد. تاثیر فرایند تولید بر رنگ محصولات غنی‌شده و هم چنین رنگ و طعم محصولات تولیدی پس از فرایند پخت توسط همکاران طرح مورد ارزیابی مقدماتی قرار گرفت. با توجه به نتایج ارزیابی حسی مقدماتی و قابلیت تولید ماکارونی غنی‌شده مرحله اصلی طرح به شرح زیر انجام گرفت.

در مرحله اصلی (Main Study) شش تیمار کاملاً یکنواخت و همگن با استفاده از مقادیر مختلف دو نوع ملح آهن ( $\text{SO}_4\text{Fe}, \text{vH}_2\text{O}$ ،  $\text{NaFe EDTA}, \text{vH}_2\text{O}$  و  $\text{Fe}, \text{vH}_2\text{O}$ )، تیامین هیدروکلراید، ریوفلاوین و نیاسین با درجه غذایی تولیدی شرکتهای Merck, Roch DPL و *Roch* ماکارونی بلند کارخانه البرز ماکارون با شرایط مرحله مقدماتی طرح تولید و بسته‌بندی شد (جدول ۱). از خط تولید به صورت کاملاً تصادفی نمونه‌برداری شد.

جدول ۱ میزان ریز مغذی‌های مورد استفاده در غنی‌سازی آرد ماکارونی

ریز مغذی‌ها	فرمول ۱ (Mg/kg)	فرمول ۲ (Mg/kg)	فرمول ۳ (Mg/kg)
تیامین	۴/۴	۷/۷	۱۱
ریوفلاوین	۲/۶۴	۲/۷۲	۴/۸
نیاسین	۳۵/۲	۵۵/۱	۷۵
آهن <sup>۱</sup> $\text{SO}_4\text{Fe}, \text{vH}_2\text{O}$ یا $\text{NaFe EDTA}, \text{vH}_2\text{O}$	۲۸/۶	۵۸/۳	۸۸

نمونه‌ها در کارتهای مقواوی به آزمایشگاه انتستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور منتقل شد. میزان تیامین،

### ب) مرحله اصلی

۱- نتایج آنالیز شیمیایی: میانگین و انحراف معیار باقیمانده تیامین، ریبوфلاوین و نیاسین در نمونه‌های غنی‌سازی شده و شاهد پس از فرایند تولید و پخت در جداول ۲ و ۳ و همچنین درصد کاهش این ویتامینها پس از تولید و پخت در جدول ۴ منعکس گردیده است.

جدول ۲ میانگین و انحراف معیار تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین بعد از فرایند تولید (میلی گرم درصد)

فرمولاسیون	تیامین	ریبوفلاوین	نیاسین
فرمول ۱	۰/۶۲۱ $\pm$ ۰/۰۰۶	۰/۲۰۷ $\pm$ ۰/۰۰۹	۳/۱۱۴ $\pm$ ۰/۳۷۸
فرمول ۲	۰/۹۵۷ $\pm$ ۰/۰۶۴	۰/۲۷۶ $\pm$ ۰/۰۳۶	۴/۸۹۲ $\pm$ ۰/۱۷۸
فرمول ۳	۱/۲۷۱ $\pm$ ۰/۰۹۳	۰/۴۱۱ $\pm$ ۰/۰۴۷	۷/۵۹۳ $\pm$ ۰/۱۰۰
شاهد	۰/۱۸ $\pm$ ۰/۰۱۷	۰/۰۴۷ $\pm$ ۰/۰۰۱	۰/۷۳۲ $\pm$ ۰/۰۱۹

جدول ۳ میانگین و انحراف معیار تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین بعد از پخت (میلی گرم درصد)

فرمولاسیون	تیامین	ریبوفلاوین	نیاسین
فرمول ۱	۰/۴۲۱ $\pm$ ۰/۰۹۵	۰/۱۴۸ $\pm$ ۰/۰۰۵	۲/۱۸۵ $\pm$ ۰/۳۸۶
فرمول ۲	۰/۶۸۴ $\pm$ ۰/۰۳۸	۰/۲۰۹ $\pm$ ۰/۰۲۵	۳/۰۷۲ $\pm$ ۰/۰۲۶
فرمول ۳	۰/۹۳۷ $\pm$ ۰/۰۲۸	۰/۳۲۵ $\pm$ ۰/۰۳۷	۵/۲۶۹ $\pm$ ۰/۴۰۱
شاهد	۰/۰۶۹ $\pm$ ۰/۰۱۶	۰/۰۳ $\pm$ ۰/۰۰۵	۰/۰۷۳ $\pm$ ۰/۰۰۳

همانگونه که در جداول ۳ و ۲ مشاهده می‌شود با افزایش میزان ریز مغذيهای در فرمول غنی‌سازی در کلیه تیمارهای مورد بررسی میزان باقیمانده به طور معناداری افزایش یافته است ( $P < 0.05$ ). در فرایند تولید تیامین مقاومترین ویتامین بود. در فرایند پخت کمترین کاهش مربوط به ریبوفلاوین بود. تحلیل آماری نتایج یاد شده نشان داد که میزان باقیمانده تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین موجود در نمونه‌های غنی‌سازی شده و شاهد پس از فرایند تولید و پخت با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند ( $P < 0.05$ ).

تصادفی در اختیار ۳۰ ارزیاب خانگی (Inhouse) که همگی از کارکنان انسستیتو تغذیه بودند قرار گرفت. از ارزیابها درخواست شد نمونه‌ها را از نظر پذیرش ویژگی رنگ رتبه‌بندی نمایند به‌طوری که برای نمونه با بیشترین پذیرش رتبه یک و کمترین پذیرش رتبه ۴ منظور گردد. [۱۰، ۹]. نمونه‌های ماکارونی با کمی نمک با روش پخت یاد شده تهیه و در ظروف مشابه که با اعداد سه رقمی تصادفی رمزگذاری شده بودند در اختیار ارزیابها قرار داده شد. از ارزیابها درخواست گردید نمونه‌ها را از نظر پذیرش ویژگی رنگ و طعم رتبه‌بندی نمایند. در مرحله بعدی نمونه‌های خام و پخته ماکارونی غنی‌شده با  $\text{NaFeEDTA}, \text{H}_2\text{O}$ ، تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین و نمونه شاهد به روش قبلی ارزیابی گردید. برای تعیین ویژگی‌های کمی مانند میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی استفاده شد. برای مقایسه پارامترهای کمی بین تیمارها از روش آنالیز واریانس یکطرفه ( $F = 0.05$ ) و متعاقباً بسته به نیاز از مقایسه چند گانه توکی استفاده شد. برای مقایسه مقادیر باقیمانده هر یک از ویتامینها در مراحل فرایند تولید و پخت از آزمون t-test زوجی بهره‌گیری شد. برای انجام آنالیزهای آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد. در مورد ویژگی‌های حسی از روش رتبه‌بندی و آزمون فریدمن استفاده گردید.

## ۳- یافته‌ها

### الف) مرحله مقدماتی

نتایج ارزیابی حسی مقدماتی رنگ نمونه‌ها نشان داد که هر دو منع آهن براحتی در غنی‌سازی ماکارونی قابل استفاده بوده و علیرغم آنکه در بعضی مراجع به تیرگی بیش از حد ماکارونی غنی‌شده با  $\text{FeSO}_4$  اشاره شده بود در این مرحله از تحقیق تغییر نامطلوبی مشاهده نشد که این موضوع در نمونه‌های پخته شده شاخص تر بود.



جدول ۴ در صد کاهش تیامین، ریبو فلاوین و نیاسین در نمونه‌های غنی سازی شده و شاهد پس از تولید و پخت

نیاسین				ریبو فلاوین				تیامین				فرمولاسیون			
( میلی گرم در صد گرم آرد)*				( میلی گرم در صد گرم آرد)*				( میلی گرم در صد گرم آرد)*				فرایند			
۱	۲	۳	شاهد	۱	۲	۳	شاهد	۱	۲	۳	شاهد				
۰/۷۳۲	۷/۵۹۳	۴/۸۹۲	۳/۱۱۴	۰/۰۴۷	۰/۴۱۱	۰/۲۷۶	۰/۲۰۷	۰/۱۸	۱/۲۷۱	۰/۹۵۷	۰/۶۲۱	فرایند تولید			
۲۳/۶۱	۳۶/۰۵	۴۱/۸۶		۳۷/۰۸	۴۶/۷۲	۴۷/۴۶		۱۳/۹	۱۲/۶۸	۱۳/۲۷		در صد کاهش پس از تولید			
۰/۰۷۳	۰/۲۶۹	۳/۰۷۲	۲/۱۸۵	۰/۰۳	۰/۳۲۵	۰/۲۰۹	۰/۱۴۸	۰/۰۶۹	۰/۹۳۷	۰/۷۸۴	۰/۴۲۱	فرایند پخت			
۳۰/۶۱	۳۷/۲۰	۲۹/۸۳		۲۰/۹۲	۲۴/۲۸	۲۸/۵۰		۲۷/۲۸	۲۸/۵۳	۳۲/۲۱		در صد کاهش پس از پخت			
۴۶/۹۹	۵۹/۸۴	۵۹/۲۰		۴۹/۴۶	۵۹/۶۰	۶۲/۴۴		۳۷/۰۲	۳۷/۰۹	۴۱/۲۰		کاهش نهایی پس از تولید و پخت			

\*کلیه نتایج بر اساس ماده خشک بیان شده است.

مقایسه دو تایی میانگینها نیز نشان داد که شاهد با فرمول یک، فرمول ۲ و فرمول ۳ اختلاف معنادار دارد ( $P<0.05$ ). همچنین تفاوت میانگین فرمول ۱ و ۳ نیز معنادار بود ( $P<0.05$ ).

جدول ۵ نتایج ارزشیابی ویژگی رنگ در سه فرمول ماکارونی غنی سازی شده خام و شاهد (ملح  $\text{SO}_4\text{Fe}$ )

فرمولاسیون	جمع				شاهد
	۱	۲	۳	۴	
فرمول ۱	۷	۶	۱۰	۷	۲۰
فرمول ۲	۱۴	۵	۸	۳	
فرمول ۳	۹	۱۶	۵	--	

نتایج تحلیل آماری مقایسه ویژگی رنگ ماکارونی غنی سازی شده با تیامین، ریبو فلاوین، نیاسین و آهن، مقایسه دو تایی میانگینها نشان داد که شاهد با فرمول یک، فرمول ۲ و فرمول ۳ اختلاف معنادار دارد ( $P<0.05$ ). تفاوت نمونه‌های غنی سازی شده در ویژگی رنگ با یکدیگر معنادار نبود.

نتایج تحلیل آماری با بهره‌گیری از آزمون t-test مزدوج مقایسه میزان ویتامینهای باقیمانده در فرایند تولید و پخت نشان داد که اختلاف میزان تیامین غیر از شاهد خام و پخته و فرمول ۲ در حالت خام و پخته در بقیه موارد معنادار نبود. از نظر اختلاف باقیمانده‌های ریبو فلاوین غیر از فرمول ۲ در حالت خام و پخته و فرمول ۳ در حالت خام و پخته در بقیه موارد تفاوت معنادار بود ( $P<0.05$ ). از نظر اختلاف میانگین باقیمانده‌های نیاسین در تمام موارد اختلاف معناداری را نشان دادند ( $P<0.05$ ).

## ۲- نتایج ارزیابی حسی

نتایج تاثیر فرایند تولید بر رنگ و فرایند پخت بر رنگ و طعم نمونه‌های غنی سازی شده با تیامین، ریبو فلاوین، نیاسین و دو نوع ملح آهن ( $\text{NaFe SO}_4\text{Fe}$ ,  $7\text{H}_2\text{O}$ ) و  $3\text{H}_2\text{O}$  ( $\text{EDTA}$ ,  $7\text{H}_2\text{O}$ ) و نمونه شاهد در جداول ۱-۵ منعکس گردیده است.

تحلیل آماری نتایج مقایسه ویژگی رنگ ماکارونیهای غنی سازی شده با تیامین، ریبو فلاوین، نیاسین و آهن ( $\text{FeSO}_4$ ,  $7\text{H}_2\text{O}$ ) و نمونه شاهد خام با استفاده از آزمون فریدمن وجود تفاوت معناداری را در محصولات خام نشان داد ( $P<0.05$ ).

جدول ۸ نتایج ارزشیابی ویژگی طعم در سه فرمول ماکارونی  
غنى سازی شده و شاهد پخته (ملح  $\text{SO}_4\text{Fe}$ )

فرمولاسیون	رتبه					جمع
	۱	۲	۳	۴	۵	
شاهد	۱۷	۸	۲	۳	۳	۲۰
فرمول ۱	۲	۱۱	۱۱	۶	۶	۳۰
فرمول ۲	۵	۹	۱۱	۵	۵	۳۰
فرمول ۳	۶	۲	۶	۱۶	۶	۳۰

نتایج تحلیل آماری مقایسه ویژگی رنگ ماکارونیهای غنى سازی شده با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن ( $\text{NaFeEDTA}, 3\text{H}_2\text{O}$ ) و نمونه شاهد پخته با استفاده از آزمون فریدمن وجود تفاوت معناداری را در ویژگی رنگ محصولات پخته نشان داد ( $P < 0.05$ ). مقایسه دوتایی میانگینها نشان داد که اختلاف شاهد با فرمول یک، فرمول ۲ و فرمول ۳ معنادار است ( $P < 0.05$ ). ولی اختلاف نمونه‌های غنى سازی شده پخته در ویژگی رنگ با یکدیگر معنادار نبود.

جدول ۹ نتایج ارزشیابی ویژگی رنگ در سه فرمول ماکارونی  
غنى سازی شده خام و شاهد پخته (ملح  $\text{NaFeEDTA}$ )

فرمولاسیون	رتبه					جمع
	۱	۲	۳	۴	۵	
شاهد	۱۹	۷	۲	۲	۲	۲۰
فرمول ۱	۳	۱۱	۱۰	۶	۶	۳۰
فرمول ۲	۲	۸	۱۳	۷	۷	۳۰
فرمول ۳	۶	۳	۳	۱۵	۳	۳۰

نتایج تحلیل آماری مقایسه ویژگی طعم ماکارونیهای غنى سازی شده با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن ( $\text{NaFeEDTA}, 3\text{H}_2\text{O}$ ) و نمونه شاهد پخته با استفاده از آزمون فریدمن وجود تفاوت معناداری را در ویژگی طعم محصولات پخته نشان داد ( $P < 0.05$ ). مقایسه دوتایی میانگینها نشان داد که شاهد با فرمول ۱، فرمول ۲ و فرمول ۳ اختلاف معنادار دارد ( $P < 0.05$ ). ولی اختلاف نمونه‌های غنى سازی شده پخته در ویژگی طعم با یکدیگر معنادار نبود.

جدول ۶ نتایج ارزشیابی ویژگی رنگ در سه فرمول ماکارونی  
غنى سازی شده خام و شاهد پخته (ملح  $\text{NaFeEDTA}$ )

فرمولاسیون	رتبه					جمع
	۱	۲	۳	۴	۵	
شاهد	۱۵	۱۰	۹	۳	۳	۳۱
فرمول ۱	۴	۷	۹	۱۱	۶	۳۱
فرمول ۲	۳	۱۲	۷	۹	۹	۳۱
فرمول ۳	۹	۲	۱۲	۸	۸	۳۱

نتایج تحلیل آماری مقایسه ویژگی رنگ ماکارونی غنى سازی شده با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن ( $\text{FeSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}$ ) و نمونه شاهد پخته با استفاده از آزمون فریدمن وجود تفاوت معنی داری را در محصولات پخته نشان داد ( $P < 0.05$ ). مقایسه دو تایی میانگینها نشان داد که تفاوت شاهد با فرمول یک، فرمول ۲ و فرمول ۳ معنادار است ( $P < 0.05$ ). تفاوت نمونه‌های غنى سازی شده پخته در ویژگی رنگ با یکدیگر معنادار نبود.

جدول ۷ نتایج ارزشیابی ویژگی رنگ در سه فرمول ماکارونی  
غنى سازی شده و شاهد پخته (ملح  $\text{SO}_4\text{Fe}$ )

فرمولاسیون	رتبه					جمع
	۱	۲	۳	۴	۵	
شاهد	۲۳	۴	۲	۱	۱	۳۰
فرمول ۱	۳	۱۳	۸	۶	۶	۳۰
فرمول ۲	۱	۷	۱۰	۱۲	۷	۳۰
فرمول ۳	۳	۶	۱۰	۱۱	۳	۳۰

نتایج تحلیل آماری مقایسه ویژگی طعم ماکارونیهای غنى سازی شده با تیامین، ریوفلاوین، نیاسین و آهن ( $\text{NaFeEDTA}, 3\text{H}_2\text{O}$ ) و نمونه شاهد پخته با استفاده از آزمون فریدمن وجود تفاوت معناداری را در محصولات پخته نشان داد ( $P < 0.05$ ). مقایسه دو تایی میانگینها نشان داد که تفاوت شاهد با فرمول یک، فرمول ۲ و فرمول ۳ معنادار است ( $P < 0.05$ ). ولی اختلاف نمونه‌های غنى سازی شده پخته در ویژگی رنگ با یکدیگر معنادار نبود.

کاهش حجم آب مصرفی برای پخت، استفاده از درپوش مناسب و ادامه حرارت دادن تا جذب تقریباً کامل آب توسط ماکارونی نتایج مطلوبتری حاصل شد. درصد کاهش ریبو فلاؤین در فرایند تولید در محدوده ۴۶/۰۸-۳۷/۰۸ در نوسان بوده است. به طوری که در هر سه نمونه میانگین مقادیر باقیمانده تفاوت معناداری را به لحاظ آماری با یکدیگر نشان دادند ( $P<0.05$ ). از طرف دیگر با افزایش مقدار ریبوفلاؤین افزوده شده درصد کاهش ویتامین تقلیل یافت. بنحویکه درصد کاهش ریبوفلاؤین در فرمول ۱ و ۲ و نمونه شاهد تقریباً یکسان بود ولی در فرمول ۳ این روند به چشم نمی خورد که احتمالاً می تواند به خطای آزمایش مربوط باشد. نتایج مطالعات Watanabe نشان داد که با افزایش دمای فرایند میزان از دست رفتن ویتامین  $B_2$  افزایش یافته است و بالاترین میزان کاهش ۲۶ درصد بوده است در حالی که در تحقیق حاضر بالاترین میزان کاهش ۴۶/۰۷ درصد بوده است که این اختلاف می تواند به تفاوت دمای مورد استفاده برای خشک کردن ماکارونی در این دو تحقیق مربوط باشد. اگر RDA ریبوفلاؤین به طور متوسط ۱/۱ میلی گرم در روز در نظر گرفته شود، ۱۰۰ گرم ماکارونی غنی شده (خشک) پس از فرایند تولید در فرمولهای یک، دو و سه به ترتیب قادر به تامین ۱۸/۸۱، ۲۵/۰۹ و ۳۷/۲۶ درصد ریبوفلاؤین توصیه شده خواهد بود. در فرایند پخت ماکارونی غنی سازی شده درصد کاهش ریبوفلاؤین با افزایش میزان ویتامین افزوده شده کمتر شد (از ۰/۹۲٪ به ۰/۵۰٪). میزان ریبو فلاؤین باقیمانده پس از مرحله پخت در این تحقیق از ۷۱/۵ تا ۷۹/۰۸ درصد بود. این نتایج با یافته های Watanabe که میزان باقیمانده ریبو فلاؤین را ۴۹-۴۳٪ گزارش کرد [۶] و دکستر و همکاران که باقیمانده ریبو فلاؤین را ۳۰٪ گزارش نمودند [۷] تفاوت قابل ملاحظه ای دارد که بی شک این بهبود وضعیت به بهینه سازی روش پخت باز می گردد در فرایند تولید ماکارونی غنی سازی شده، با افزایش مقدار نیاسین افزوده شده میزان اتلاف این ویتامین (از ۰/۸۶٪ تا ۰/۶۱٪) کاهش یافت. اساساً نیاسین نسبت به

جدول ۱۰ نتایج ارزشیابی ویژگی طعم در سه فرمول ماکارونی غنی سازی شده خام و شاهد (ملح NaFeEDTA)

فرمولاسیون	رتبه			
	۱	۲	۳	۴
شاهد	۱۷	۳	۸	۲
فرمول ۱	۶	۷	۱۰	۷
فرمول ۲	۲	۸	۷	۱۳
فرمول ۳	۵	۱۲	۵	۸

#### ۴- بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های طرح، مقدار کاهش تامین در مرحله فرایند تولید در محدوده ۱۳/۹۰-۱۲/۶۸ درصد در نوسان بوده است. به طوری که در هر سه نمونه میانگین مقادیر باقیمانده تفاوت معناداری را به لحاظ آماری با یکدیگر نشان داده اند ( $P<0.05$ ). به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که درصد کاهش تامین در مرحله تولید ماکارونی غنی سازی شده با میزان تامین افزوده شده ارتباطی ندارد و تاثیر فرایند تولید در هر سه فرمولاسیون تقریباً ثابت است. این نتایج با یافته های Watanabe همخوانی دارد [۶]. اگر RDA تامین به طور متوسط ۱/۲ میلی گرم در روز در نظر گرفته شود ۱۰۰ گرم ماکارونی غنی شده (خشک) در فرمولهای یک، دو و سه به ترتیب قادر به تامین ۵۱/۷۵، ۷۹/۷۵ و ۱۰۵/۹ درصد تامین توصیه شده خواهد بود. در فرایند پخت ماکارونی غنی سازی شده نیز با افزایش میزان تامین افزوده شده، باقیمانده نیز افزایش می یابد. درصد کاهش تامین در مرحله پخت در دامنه ۲۱/۲۲-۲۸/۲۶ در نوسان بود و تمام نمونه ها از نظر میانگین مقدار باقیمانده تفاوت معناداری به لحاظ آماری با یکدیگر نشان دادند ( $P<0.05$ ). در این مرحله با افزایش میزان غنی سازی، درصد افت تامین کاهش یافت. اگر به نتایج تحقیق Watanabe و Dexter مراجعه گردد مشاهده می شود که کاهش ویتامینهای محلول در آب در فرایند پخت بالاست ولی در مطالعه حاضر با تغییر روش پخت شامل

به علت اهمیت حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان با درآمد پایین استفاده از  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  به عنوان منبع آهن توصیه می شود. برای مطالعات آتی مقایسه روشاهای مختلف فرایند تولید و بهینه سازی روشاهای فرآوری و مقایسه روشاهای مختلف اندازه گیری ویتامینها پیشنهاد می شود.

## ۶- منابع

- [۱]قاسمی، حسین. ۱۳۷۷. گزارش نهایی طرح امنیت غذا و تغذیه کشور- مطالعات الگوی برنامه ریزی و اجرا. انسیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، صفحات: ۱۹-۲۰.
- [۲]Buzina, Ratko. 1988. Vitamins in food fortification. vitamin informations status paper, Human nutrition and health vitamins and fine chemicals Division: 6,20.
- [۳]حساس، محمد رضا. ۱۳۷۶. طرح مطالعات صنایع تبدیلی غذا- گزارش بررسی وضعیت موجود در صنایع ماکارونی با تحلیلی بر عملکرد سیاستها. طرح امنیت غذا و تغذیه کشور، مطالعات الگوی برنامه ریزی و اجرا، جلد اول، انسیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور: صفحه ۲۰.
- [۴]Kulp K, Ponte, Jr, 2000. Hanbook of Cereal Science and Technology. 2<sup>nd</sup> ed. Marcel Dekker , New York: 655-657, 677-704.
- [۵]FAO Food and nutrition paper-60, 1997. Micronutrient fortification of food: technology and quality control (Annex 4). Report of an FAO technical meeting, Rome, Italy, 20-23 November 1995.
- [۶]Watanabe E, Ciacco CF. 1990. Influence of processing and cooking on the retention of thiamine, riboflavin and niacin in spaghetti; Food Chemistry; 36: 223-231.
- [۷]Dexter JE, Matsuo RR, and Morgan BC. 1982. Effects of processing conditions and cooking time on riboflavin, thiamine, and niacin levels in enriched spaghetti. Cereal Chemistry; 59(5): 328-332.
- [۸]Eitenmiller, Ronald R. 1999. Vitamine Analysis for the Health and Food Sciences. CRC Press. U.S.A: 281-290, 359-360.
- [۹]قاضیزاده ، میترا ، رازقی ، سید علیرضا . ۱۳۷۷ . روشاهای ارزیابی حسی مواد غذایی. انسیتو تحقیقات

حرارت، اکسیداسیون و قلیا پایدار است [۱۲]. نتایج این تحقیق با یافته های Watanabe که میزان اتلاف نیاسین در طی فرایند تولید را ۱/۵ برابر ریبو فلاوین گزارش نمود اختلاف دارد. با توجه به پایداری حرارتی ذکر شده ، می توان به نتایج این تحقیق با نگاه مثبتی نگریست. با توجه به نتایج حاصله اگر RDA نیاسین به طور متوسط ۱۵ میلی گرم در روز به حساب آید ، ۱۰۰ گرم ماکارونی غنی شده (خشک) پس از فرایند تولید در فرمولهای یک ، دو و سه به ترتیب قادر به تامین ۲۰/۷۶ ، ۲۰/۱۳ و ۳۲/۳۲ درصد نیاسین توصیه شده خواهد بود. در فرایند پخت ماکارونی غنی سازی شده میزان اتلاف نیاسین ۲۹/۸۳- ۳۷/۲۰ درصد بود . این نتایج با یافته های Watanabe که کاهش نیاسین را در ماکارونی پخته ۲۹-۳۴ درصد گزارش نموده است کاملا همخوانی دارد [۶] ولی با یافته های Dexter و همکاران که بالاترین میزان نیاسین حفظ شده در فرایند پخت را ۴۸٪ گزارش نموده اند تفاوت دارد [۷].

ارزیابی حسی نمونه های غنی سازی شده با دو نوع ملح آهن و سایر ریز مغذيهای نشان داد که میزان ریز مغذيهای افزوده شد تاثیر معناداری بر ویژگیهای حسی نمونه های غنی شده ندارد. اگر چه تغییراتی در اثر استفاده از ترکیبات آهن در رنگ محصول مشاهده شد ولی در مقایسه با نتایج سایر تحقیقات این پژوهه نتیجه بهتری داشت.

## ۵- نتیجه گیری کلی پیشنهادات

نتایج این تحقیق نشان داد که غنی سازی ماکارونی با ویتامینهای  $\text{B}_1$  ،  $\text{B}_2$  ، نیاسین و آهن امکان پذیر است. اگر میانگین RDA ویتامینهای  $\text{B}_1$  و  $\text{B}_2$  و نیاسین به ترتیب ۱/۲ به ۱/۱ و ۱۵ میلی گرم در روز در نظر گرفته شود و هدف تامین حداقل ۳۰٪ نیاز بر مبنای ماکارونی خشک باشد فرمول پیشنهادی عبارت خواهد بود از ۱۱ میلی گرم تیامین هیدروکلراید، ۴/۸ میلی گرم ریبو فلاوین ، ۷۵ میلی گرم نیاسین و ۲۸/۶ میلی گرم آهن در کیلو گرم آرد مصرفی.

- Chapman and Hall: 444-449 .
- [12]Passmore R, Eastwood MA. 1986.Human Nutrition and Dietetics, 8<sup>th</sup>ed.Churchill livingstone:155.
- تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ، صفحات : ۷۰-۷۳
- [10]ISO 8587. 1988. Sensory analysis. Methodology-Ranking, first ed.
- [11]Lawless HT, Heymann H. 1998. Sensory Evaluation of Food-Principles and Practices.