

## پایداری نوشابه های غیر الکلی گاز دار حاوی سوکروز و شربت ذرت غنى از فروکتوز در طول دوران نگهداری

مهتا ميرزايی<sup>1\*</sup>، غلامرضا مصباحي<sup>1</sup>، سيد محمد ابراهيم زاده موسوي<sup>2</sup>

محمود امين لاري<sup>1</sup>

1- بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

### چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه پایداری نوشابه های پرتقالی، کولا و لیمویی حاوی شربت ذرت غنى از فروکتوز و سوکروز در طول دوران نگهداری بود. این پژوهش بر روی فرمولاسیون سه نوع نوشابه کولا، لیمویی و پرتقالی انجام گرفت و سوکروز موجود در آن ها با نسبت های 60% و 80% و 100% با شربت ذرت غنى از فروکتوز جایگزین شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شامل pH، اسیدیته، بریکس، دانسیته و رنگ در زمان های یک، دو و چهار ماه از زمان ساخت در نوشابه های نگهداری شده در دما های 4°C، 25°C و 40°C مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه های شاهد حاوی سوکروز که در شرایط مشابه ساخته و نگهداری شدند، مقایسه گردیدند. نمونه ها در دوران نگهداری دچار تغییرات معنی داری در pH، اسیدیته، دانسیته و بریکس شدند ( $P<0.05$ ) و از این جهت تفاوت معنی داری بین نمونه های شاهد و نمونه های حاوی شربت ذرت غنى از فروکتوز وجود نداشت. شربت رنگ نمونه های پرتقالی و کولا در طول دوران نگهداری دچار تغییر معنی داری نشدند ( $P>0.05$ ) ولی حضور آفتاب باعث ناپایداری رنگ کارموزین موجود در نوشابه های پرتقالی شد و وجود شربت ذرت غنى از فروکتوز این اثر را تشدید کرد.

**کلید واژگان:** سوکروز، شربت ذرت غنى از فروکتوز، نوشابه های غیر الکلی، پایداری

### 1- مقدمه

گردید و تولید دکستروز از نشاسته در سال 1977 آغاز شد [3]. دکستروزکریستاله هیدراته، مالتو دکسترن، شربت ذرت و نهایتا شربت ذرت غنى از فروکتوز از جمله محصولات به دست آمده از نشاسته ذرت بوده اند. اولین نوع شربت ذرت

تمایل برای به کار گیری نوع تازه ای از شیرین کننده ها در نوشابه های غیر الکلی گاز دار با معرفی شربت ذرت غنى از فروکتوز قوت یافت. تصفیه این شربت در آمریکا از زمان جنگ های داخلی و با توسعه فرایند آبکافت نشاسته شروع

\*مسئول مکاتبات: m\_mirzaeishiraz@yahoo.com

سوکروز با بخش تحقیق و توسعه شرکت زمزم ایران انجام شد و عملیات جایگزینی سوکروز با شربت ذرت غنی از فروکتوز در نوشابه های ساخته شده با فرمولاسیون این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

عملیات تحقیق روی سه فرمولاسیون از نوشابه ها شامل نوشابه های کولا، پرتقالی و لیمویی صورت گرفت. مواد اولیه ساخت نوشابه ها از شرکت زمزم ایران به صورت عصاره شامل کارامل، اسانس کولا، آئنی فوم، کافئین، اسید فسفریک، آب و بنزووات سدیم در نوشابه های کولا، اسانس پرتقالی، اسید لاکتیک، سوربات پتاسیم، بنزووات سدیم، اسید سیتریک، سانست یلو، کارموزین و آب در نوشابه های پرتقالی و عصاره لیمو برای نوشابه های لیمویی تامین گردید. شربت ذرت غنی از فروکتوز مصرفی از نوع ۵۵% فروکتوز، از شرکت Cargill Sweeteners در ترکیب خریداری شد.

دستگاه pH متر مدل MP230 Toledo (شرکت Mdttler، سوئیس)، رفراکتومتر مدل Attago (شرکت HachDr/4000) (ژاپن)، اسپکتروفوتومتر مدل universal 32 (شرکت Hach، آمریکا) و سانتریفوژ مدل 32 (شرکت Hettich، آلمان) از وسایل مورد استفاده در این تحقیق بوده اند.

سوکروز موجود در هر سه فرمولاسیون با نسبت های ۶۰٪، ۸۰٪ و ۱۰۰٪ جایگزین شد و به طور همزمان نمونه های شاهد نیز با ۱۰۰٪ سوکروز ساخته شدند. نمونه های تهیه شده با سیستم Post - Mix (افزودن آب گاز دار به شربت آماده شده) در دماهای ۲۵°C، ۴۰°C و ۴۰°C برای زمان های یک، دو و چهار ماه نگهداری شده و از نظر خصوصیات کیفی شامل pH، اسیدیته، بریکس و دانسیته و رنگ مورد بررسی قرار گرفتند.

pH طبق روش AOAC:11.04، درجه بریکس طبق روش AOAC:12.004، اسیدیته نوشابه ها طبق روش AOAC:12.036 و وزن مخصوص طبق روش AOAC:12.001 اندازه گیری شده و با نمونه های شاهد مقایسه شدند [8]. برای بررسی رنگ، نوشابه هایی فاقد مواد کدر

غنى از فروکتوز که در سال ۱۹۷۷ تولید شد دارای ۱۵٪ فروکتوز بوده است و بعد ها شربت ذرت غنی از فروکتوز محشی ۴۲٪ فروکتوز وارد بازار شد و در بین سال های ۱۹۷۰-۱۹۸۰ این روند توسعه یافت و شربت ۵۵٪ به عنوان شیرین کننده مناسب برای استفاده در صنعت نوشابه سازی روانه بازار شد و کارخانجات نوشابه سازی به فکر به کار گیری این ترکیب ارزان قیمت به عنوان جایگزینی برای سوکروز افتادند [2].

شربت گلوكز تحت فرایند آبکافت اسیدی یا آنزیمی با استفاده از آلفا آمیلاز، گلوكو آمیلاز و پلولاناز از نشاسته ذرت تولید می شود. شربت به دست آمده شیرینی معادل ۷۰٪ سوکروز دارد بنابر این با به کار گیری آنزیم گلوكز ایزومراز و تبدیل درصدی از گلوكز به فروکتوز، شربت ذرت غنی از فروکتوز ساخته می شود که می تواند جایگزینی مناسب برای سوکروز باشد [5, 4, 3]. شربت ذرت غنی از فروکتوز مایعی شفاف دارای مزه شیرین و بدون هیچ طعم مزاحم و دارای شیرینی و خواص کاربردی مشابه سوکروز است و دارای بوی مخصوص به خود می باشد [6, 7, 8]. این شیرین کننده در تمام محصولات غذایی که نیاز به شیرین شدن دارند و دارای رطوبت بالایی هستند می توانند مورد استفاده قرار گیرد [9].

تحقیقات نشان داده است استفاده از شربت ذرت غنی از فروکتوز به جای سوکروز از تغییر طعم در نوشابه ها در طی مدت نگهداری جلوگیری می کند [10, 11, 12]. شربت ذرت غنی از فروکتوز می تواند از طریق افزایش فشار اسمزی به پایداری محصول کمک کند [5, 13]. هدف از این تحقیق مقایسه پایداری فیزیکوشیمیابی نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز با نمونه های حاوی سوکروز در طول دوران نگهداری بوده است.

## 2- مواد و روش ها

مراحل انجام این تحقیق درآزمایشگاه و عملیات جایگزینی

جدول 1 بررسی pH نوشابه های پرتفالی حاوی سوکروز و شربت ذرت غنی از فروکتوز با تغییر دما و زمان

چهار ماه	دو ماه	یک ماه	زمان صفر	دما	نسبت جایگزینی
aA 2/88	aA 2/9	aA** 2/9	aA*2/91	4°C	شاهد
aA 2/89	aA 2/9	aA 2/91	aA 2/92	4°C	%60
bA 2/83	bA 2/85	abA 2/86	bA 2/86	4°C	%80
bA 2/81	bCA 2/83	bA 2/83	cA 2/82	4°C	%100
bcB 2/8	bB 2/85	aA 2/93	aA 2/91	25°C	شاهد
cC2/78	bcB 2/83	aA 2/89	aA 2/92	25°C	%60
cdC2/74	bcB 2/82	bB2/83	bA 2/86	25°C	%80
dC2/7	cB2/76	bA2/82	cA2/82	25°C	%100
حذف	cB2/79	bB2/83	aA2/91	40°C	شاهد
حذف	cC2/78	bB2/83	aA2/92	40°C	%60
حذف	cB2/76	bcA2/8	bA2/86	40°C	%80
حذف	dB2/72	cB2/76	cA2/82	40°C	%100

\* حروف کوچک برای مقایسه آماری ستون ها و حروف بزرگ برای مقایسه آماری ردیف ها به کار رفته اند.

\* اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی دار ( $P < 0.05$ ) می باشند.

جدول 2 بررسی اسیدیته نوشابه های پرتفالی حاوی سوکروز و شربت ذرت غنی از فروکتوز با تغییر دما و زمان

چهار ماه	دو ماه	یک ماه	زمان صفر	دما	نسبت جایگزینی
cdA0/113	dA0/109	0/112	bA*0/107	4°C	شاهد
		bcA**			
dA0/112	dA0/110	bcA0/111	abA0/108	4°C	%60
cA0/114	bcA0/114	bA0/113	aA0/109	4°C	%80
cA0/114	cdA0/113	bA0/113	aA0/110	4°C	%100
abA0/119	dB0/110	cB0/109	bB0/107	25°C	شاهد
bA0/118	dB0/112	bcB0/112	abB0/108	25°C	%60
aA0/120	cdB0/113	bB0/113	aB0/109	25°C	%80
aA0/121	bcAB0/115	bcAB0/112	aB0/110	25°C	%100
حذف	bcA0/114	bcAB0/112	bB0/107	40°C	شاهد
حذف	bA0/116	bAB0/113	abB0/108	40°C	%60
حذف	abA0/119	bB0/114	aB0/109	40°C	%80
حذف	aA0/121	aAB0/116	aB0/110	40°C	%100

\* حروف کوچک برای مقایسه آماری ستون ها و حروف بزرگ برای مقایسه آماری ردیف ها به کار رفته اند.

\* اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی دار ( $P < 0.05$ ) می باشند.

تحقیقات buffo و همکاران (2001) نشان داد که نوشابه های موجود در بطری های پلاستیکی نگهداری شده در دمای محیط در مدت کوتاهی تولید اسید استیک و ۳- متیل بوتانال و اتانول کرده اند. تحقیقات نشان داده است در این مدت تعداد مخمر ها به طور معنی داری افزایش یافته است و مخمر شناسایی شده در آن ها *S. cerevisiae* بوده است که مخمری مقاوم به بنزووات سدیم موجود در نوشابه ها می باشد [16]. در تحقیقات دیگر نیز مخمر *S.cerevisiae* به عنوان مخمر غالب موجود در نوشابه ها شناسایی شد و مشخص شد که این مخمر دربرابر اسید بنزوئیک موجود در نوشابه ها مقاوم می باشد [17].

تحقیق Battey و همکاران (2002) نیز نشان داده است که مخمر های عامل فساد می توانند باعث کاهش pH در طول دوران نگهداری در نوشابه ها شوند [18]. تحقیقات Adegoke و همکاران (1995) نیز نشان داد که در نوشیدنی های تخمیری بعد از 48 ساعت نگهداری از ۵/۱ به ۴/۳ مخمر نشان داده است [19]. ولی تحقیقات Islam و همکاران (1990) در مورد نوشابه های کربناته با طعم انبه حاوی ۷ و ۱۰٪ پالپ انبه و ۹/۰۷ و ۱۱/۷ و ۱۳/۱۵٪ قند و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵٪ مواد جامد محلول و اسیدیته ۰/۱ و ۰/۱۵ و دارای ۳٪ بنزووات سدیم و ۳٪ حجمی گاز دی اکسید کربن بعد از 210 روز نگهداری در دمای محیط به جز مقدار ویتامین ث که به طور معنی داری کاهش یافته است بقیه موارد شامل pH و اسیدیته و درصد مواد جامد محلول و میزان قند ها دچار تغییر معنی داری نشده اند [20]. تحقیق حاضر نشان داد که کاهش pH در دمای های بالاتر نگهداری با شدت بیشتری در مقایسه با دمای های کمتر اتفاق می افتد. تحقیقات Islam و همکاران (1990) نیز در مورد اثر دمای نگهداری بر رشد میکرو ارگانیسم ها در آبمیوه ها و نوشابه ها نشان داد که نگهداری در دمای  $30^{\circ}\text{C}$  برای کمتر از 48 ساعت باعث افزایش معنی داری در تعداد اولیه مخمر و پک و لاکتو باسیل های افزوده شده به نوشابه ها شده است ولی در نمونه های نگهداری شده در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  کاهش اندکی در شمارش کلی میکروبی

کننده در فرمولا سیوون ساخته شده و در شرایط مشابه نگهداری شدند و از روش AOAC:12040 در طول موج های 498 نانومتر برای نوشابه های پر تقالی و 610 نانومتر برای نوشابه های کولا استفاده شد و میزان جذب نور در نمونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت [14].

نتایج آزمایشات از طریق طرح آماری بلوک های کاملاً تصادفی مورد تجزیه قرار گرفت و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه دان肯 استفاده شد.

### 3- نتایج و بحث

خصوصیات مورد نظر در نسبت های مختلف جایگزینی مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه های شاهد حاوی سوکروز مقایسه شد. همچنین تغییر در خصوصیات فیزیکو شیمیایی نوشابه ها در طول دوران نگهداری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد.

نتایج به دست آمده برای نوشابه های کولا و لیمویی نیز مشابه بود.

همانطور که در جداول قابل بررسی است در طول دوران نگهداری و بر اثر دو عامل دما و زمان pH نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز و نمونه های شاهد به طور معنی داری کاهش یافته است. این اثر می تواند با رشد مخمرها در این شرایط توجیه شود به طوریکه با مصرف قند موجود در نوشابه ها و تولید اسید، باعث کاهش pH نمونه ها می شوند.

تحقیقات نشان داده است هر چند که انواع میکرو ارگانیسم ها می توانند در نوشابه ها یافت شوند ولی فقط تعداد کمی از آن ها که اسید دوست هستند دارای حضور موثر می باشند.

عواملی مانند pH، اسیدیته، میزان قند و وجود ترکیبات نگهدارنده معمولاً از رشد مخمرها جلوگیری می کند ولی *S.cerevisiae* *Candida* *Zygosaccharomyces bailii*, *lipolytica* گاهی می توانند بر این شرایط غلبه کنند و بنابر این مهترین گروه میکرو ارگانیسم های موجود در نوشابه ها هستند که شرایط اسیدی را می توانند تحمل کنند [15].

جدول 3 بررسی دانسیته نوشابه های پر تقالی حاوی سوکروز و شربت ذرت غنی از فروکتوز با تغییر دما و زمان

چهار ماه	دو ماه	یک ماه	زمان صفر	دما	نسبت جایگزینی
bA1/04	bA1/041	cA**1/04	bA*1/04	4°C	شاهد
bA1/04	cA1/039	bA1/04	bA1/04	4°C	%60
aA1/043	bA1/042	bA1/042	aA1/043	4°C	%80
abA1/042	aA1/044	abA1/043	aA1/043	4°C	%100
bcA1/039	bcA1/041	bcA1/041	bA1/04	25°C	شاهد
cB1/038	bcA1/041	cA1/04	bA1/04	25°C	%60
dB1/036	abA1/043	bA1/042	aA1/043	25°C	%80
dB1/035	abA1/043	aA1/044	aA1/043	25°C	%100
حذف	cA1/039	cA1/04	bA1/04	40°C	شاهد
حذف	dB1/036	dA1/039	bA1/04	40°C	%60
حذف	dB1/035	bA1/042	aA1/043	40°C	%80
حذف	dB1/036	aA1/044	aA1/043	40°C	%100

\* حروف کوچک برای مقایسه آماری ستون ها و حروف بزرگ برای مقایسه آماری ردیف ها به کار رفته اند.

\* اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی دار ( $P < 0.05$ ) می باشند.

جدول 4 بررسی بریکس نوشابه های پر تقالی حاوی سوکروز و شربت ذرت غنی از فروکتوز با تغییر دما و زمان

چهار ماه	دو ماه	یک ماه	زمان صفر	دما	نسبت جایگزینی
aA11	aA11	aA**11	aA*11	4°C	شاهد
aA10/9	aA10/9	aA11	aA11/2	4°C	%60
aA11	aA10/8	aA11	aA11	4°C	%80
aA11	aA11	aA11	aA11	4°C	%100
abB10/7	aA11/2	aA11/1	aA11	25°C	شاهد
abB10/6	aA11	aA11/2	aA11/2	25°C	%60
abB10/6	aA11/2	aA11/3	aA11/1	25°C	%80
bB10/5	aA10/9	aA11	aA11	25°C	%100
حذف	bB10/2	bAB10/5	aA11	40°C	شاهد
حذف	bB10/2	bAB10/8	aA11/2	40°C	%60
حذف	bB10/2	bAB10/6	aA11	40°C	%80
حذف	bB10/3	bAB10/7	aA11	40°C	%100

\* حروف کوچک برای مقایسه آماری ستون ها و حروف بزرگ برای مقایسه آماری ردیف ها به کار رفته اند.

\* اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی دار ( $P < 0.05$ ) می باشند.

نتایج نشان داد رنگ نوشابه های کولا و پرتقالی در برابر دما (25°C و 4°C) و تا 4 ماه نگهداری پایدار می باشد و از این جهت تفاوتی بین نمونه های شاهد و نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز وجود نداشت.

پایداری رنگ نوشابه های پرتقالی و کولا در حضور آفتاب نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد.

همان طور که نتایج نشان می دهند رنگ نوشابه های پرتقالی در حضور نور نایپایدار بود و بعد از گذشت یک تا دو هفته تغییر رنگ محسوسی در نمونه ها مشاهده شد و با بالا رفتن نسبت جایگزینی سوکروز با شربت ذرت غنی از فروکتوز نایپایداری رنگ به طور معنی داری افزایش یافت. تحقیقات نشان داد نایپایداری رنگ مربوط به رنگ کارموبیزین به کار رفته در نوشابه های پرتقالی می باشد که از گروه رنگ های آزو می باشد و در حضور نور آفتاب نایپایدار می باشد. به کار بردن اسید اسکوربیک نایپایداری رنگ ها را تشدید کرد و ریبوфلافوین نتوانست اثر محافظتی بر رنگ آن ها داشته باشد.

در تحقیقات دیگر هم عنوان شده است که رنگ کارموبیزین از گروه رنگ های آزو هستند و دارای پیوند دوگانه نیتروژن می باشند. هر واکنش شیمیایی که بتواند این پیوند را بشکند باعث از بین رفتن رنگ این ترکیبات می شود. بنابراین این گروه از رنگ ها در حضور واکنش های اسید و احیا نایپایدار می باشند و در حضور قند های احیا کننده، اسید اسکوربیک و در حضور اسیدها این اثر تشدید می شود [22]. تحقیقات Change (1994) در مورد اثر شربت ذرت غنی از فروکتوز بر رنگ نوشابه ها نشان داد در مواردی که در فرمولاسیون نوشابه ها از اسید اسکوربیک استفاده می شود این ترکیب باعث نایپایداری رنگ کارموبیزین می شود. برای جلوگیری از این اثر در فرمولاسیون می توان از ریبوفلافوین استفاده کرد. در واقع ریبوفلافوین می تواند از اثر اسید اسکوربیک در نایپایدار کردن رنگ، جلوگیری کند [23] Aranyosi همکاران (1999) در تحقیقی دریافتند که وجود ترکیبات احیائ کننده نایپایداری رنگ های آزو را در برابر نور تشدید می کند [24]. Mingozzi, Turtura (1992) دریافتند که نور آفتاب در مقایسه با گرما و

مشاهده شده است [21]. نتایج آزمون میکروبی نیز حاکی از رشد مخمر در نوشابه ها بعد از 4 ماه نگهداری در دمای محیط و دو ماه نگهداری در دمای 40°C بود. شاهد دیگر بر رشد مخمر ها در طول دوران نگهداری، بادکردگی بطری های حاوی نوشابه در دماهای بالای نگهداری بود به طوری که نگهداری عنوان کرده اند [22]. همچنین با گذشت زمان در نمونه های نگهداری شده در دماهای بالای نگهداری اسیدیته به طور معنی داری افزایش می یابد. این اثر نیز می تواند با رشد و فعالیت مخمرها در طول دوران نگهداری و بخصوص Adegoke و همکاران (1995) نیز در مورد نوشابه های تخمیری نشان داد 0/1% افزایش یافته است [19]. شربت ذرت غنی از فروکتوز دارای دانسیته بالاتری نسبت به محلول سوکروز با بریکس برابر دارد بنابر این این پدیده که با با لا رفتن نسبت جایگزینی در نوشابه ها دانسیته به طور معنی داری افزایش یابد دور از انتظار نمی باشد.

در طول نگهداری نوشابه ها، با گذشت زمان در دماهای بالای نگهداری دانسیته به طور معنی داری کاهش می یابد. این اثر نیز با فعالیت مخمر ها و تجزیه قند ها در طول دوران نگهداری قابل توجیه می باشد.

همانطور که نتایج نشان می دهند در هر سه نوع نوشابه با گذشت زمان و در دماهای بالای نگهداری درجه بریکس به طور معنی داری کاهش یافته است. این اثر نیز در کنار کاهش pH، افزایش اسیدیته و کاهش دانسیته با فعالیت مخمر ها در طول نگهداری و تجزیه قندها قابل توجیه است

#### 4- بررسی پایداری رنگ نوشابه ها

پایداری رنگ نوشابه های پرتقالی و کولا نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد.

**جدول 5** بررسی تغییر رنگ نوشابه های پرتفالی حاوی سوکروز و شربت ذرت غنی از فروکتوز از طریق اندازه گیری جذب نوری در طول موج 498 نانومتر با تغییر دما و زمان

چهار ماه	دو ماه	یک ماه	زمان صفر	دما	نسبت جایگزینی
1/292	1/299	1/395	*1/298	4°C	شاهد
1/312	1/303	1/305	1/294	4°C	%60
1/311	1/4	1/29	1/29	4°C	%80
1/296	1/22	1/28	1/288	4°C	%100
1/302	1/3	1/302	1/298	25°C	شاهد
1/289	1/342	1/312	1/294	25°C	%60
1/293	1/296	1/324	1/29	25°C	%80
1/225	1/225	1/296	1/288	25°C	%100
1/246	1/202	1/315	1/298	40°C	شاهد
1/342	1/126	1/309	1/294	40°C	%60
1/289	1/22	1/299	1/29	40°C	%80
1/298	1/112	1/276	1/288	40°C	%100

\*اعداد موجود در جدول دارای اختلاف آماری معنی دار ( $P < 0.05$ ) نبوده اند.

**جدول 6** بررسی تغییر رنگ نوشابه های کولا حاوی سوکروز و شربت ذرت غنی از فروکتوز از طریق اندازه گیری جذب نوری در طول موج 610 نانومتر با تغییر دما و زمان

چهار ماه	دو ماه	یک ماه	زمان صفر	دما	نسبت جایگزینی
0/346	0/334	0/336	*0/325	4°C	شاهد
0/33	0/33	0/325	0/299	4°C	%60
0/317	0/329	0/329	0/319	4°C	%80
0/324	0/351	0/348	0/309	4°C	%100
0/338	0/334	0/335	0/325	25°C	شاهد
0/346	0/346	0/352	0/299	25°C	%60
0/347	0/344	0/34	0/319	25°C	%80
0/345	0/336	0/332	0/309	25°C	%100
0/311	0/339	0/325	0/325	40°C	شاهد
0/324	0/346	0/342	0/299	40°C	%60
0/306	0/311	0/334	0/319	40°C	%80
0/292	0/341	0/332	0/309	40°C	%100

\*اعداد موجود در جدول دارای اختلاف آماری معنی دار ( $P < 0.05$ ) نبوده اند.

جدول 7 بررسی رنگ نوشابه های پرتقالی نگهداری شده در شرایط آفتاب از طریق اندازه گیری جذب نوری در طول موج 498 نانومتر

چهار هفته	دو هفته	یک هفته	زمان صفر	نسبت جایگزینی
aC0/456	aB***1/202	aA**1/285	aA*1/295	شاهد
bcD0/246	bC0/625	bcB0/986	aa1/29	%60
bcD0/234	bC0/546	cB0/802	aA1/285	%80
cD0/136	cC0/424	dB0/636	aA1/276	%100

\*حروف کوچک برای مقایسه آماری ستون ها و حروف بزرگ برای مقایسه آماری سطرها به کار رفته اند.

\*\*اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی دار می باشند.

\*\*\*اعداد موجود در جدول میانگین چهار تکرار می باشد.

جدول 8 بررسی رنگ نوشابه های کولا نگهداری شده در شرایط آفتاب از طریق اندازه گیری جذب نوری در طول موج 610 نانومتر

چهار هفته	دو هفته	یک هفته	زمان صفر	نسبت جایگزینی
aB0/289	aB0/312	aA**0/322	aA*0/345	شاهد
aB0/265	aA0/321	aA0/312	aA0/326	%60
aB0/249	aA0/329	aA0/341	aA0/335	%80
aB0/252	aA0/340	aA0/338	aA0/349	%100

\*حروف کوچک برای مقایسه آماری ستون ها و حروف بزرگ برای مقایسه آماری سطرها به کار رفته اند.

\*\*اعدادی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی دار می باشند.

\*\*\*اعداد موجود در جدول میانگین چهار تکرار می باشد.

نگهداری در دماهای C 25 ° و C 40 ° نشان دادند ( $P<0.05$ ) و این اثر در دماهای بالاتر و با طولانی شدن زمان به طور محسوس تری قابل بررسی بود و از این جهت تفاوت معنی داری بین نمونه های شاهد و نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز مشاهده نشد . نتایج آزمون های میکروبی انجام شده بر روی نوشابه ها، حاکی از رشد مخمر ها در دماها و زمان های بالای نگهداری بود از طرفی بطری ها در این مدت دچار باد کردگی شدند و طعم ترشیدگی نیز در آن ها محسوس بود بنابر این تغییرات ایجاد شده در طول دوران نگهداری مربوط به رشد مخمر ها و بنابر این استفاده از قند موجود و تولید اسید می باشد.

فعالیت مخمرها دارای بیشترین اثر در نایپایداری رنگهای آزو است [25] بنابر این پیشنهاد می شود در صورت به کار بردن شربت ذرت غنی از فروکتوز در نوشابه ها تا حد امکان نوشابه ها از معرض مستقیم نور آفتاب مصون باشند و یا از رنگ سانست یلو به تنها بی در فرمولاسیون آن ها استفاده شود. رنگ نوشابه های کولا نیز در حضور نور آفتاب بعد از گذشت چهار هفته از زمان نگهداری در حضور آفتاب، کاهش معنی داری را نشان می دهد ولی از این نظر تفاوتی بین نمونه های شاهد و نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز وجود ندارد. نتایج نشان داد در طول دوران نگهداری هر سه نوع نوشابه دچار تغییر معنی داری در خواص فیزیکوشیمیایی شدند . به طوریکه pH، اسیدیته، دانسیته و بریکس کاهش معنی دار و میزان اسیدیته افزایش معنی داری را در طول دوران

- [6] Battey, A. S., S. Duffy and D. W. Schaffner . 2002 .Modeling yeast spoilage in cold filled ready to drink beverages with *Saccharomyces cerevisiae*, *Zygosaccharomyces bailii* and *Lipolytica candida*, Applied and Environmental Microbiology, 68 ( 4 ) : 1901-1906.
- [7] Bornstein, B. L., S. G. Wiet and M. Pombo 1993. Sweetness Adaptation of Some Carbohydrate and High Potency Sweeteners, Journal of Food Science, Vol. 58, No. 3, PP. 595-598.
- [8] Buffo, R. A, G. A. Reineccius and G.W. Oehlert . 2001. “ Factors affecting the emulsifying and rheological properties of gum acacia in beverage emulsions” Food Hydrocolloids, 15( 1 ) : 53-66.
- [9] Chang, P. K. 1994. Color – stable syrup and beverage compositions fortified with vitamin C and method of making such compositions, United States Patent, US. 5 336 510, US . 40592 (19930331).
- [10] Clydesdale, F. M., R.W. Griffen and L. M. Holcomb. 1995. Effect of color and sweeteners on the sensory characteristic of soft drink, Journal of Food Quality, 18(5) : 425-442.
- [11] Daw, Z. Y., E. I. Gizawy and A. M. B. Said. 1994. “Microbiological evaluation of some local juices and drinks” Chemical Microbiology Technology Lebensmittel, 16 (1/2) : 8-15 ( Abs ).
- [12] Gabarra, R. and W. Hartel (1998). Corn Syrup Solids and There Saccharide Fractions Affect Crystallization of Amorphous Sucrose, Journal of Food Science, Vol. 63, No. 3.
- [13] Hansson, A., J. Andersson, A. Leufuen and K.Pehrson(2002). Effect of Changes in pH on The Release of Flavour Compounds From a Soft Drink Related Model System, Food Chemistry, Vol. 74, PP. 429-435.
- [14] Horwitz, W. (1975).Official Methods of the Association of Official Analytical Chemists.U.S: AOAC International Publisher.
- [15] Islam, M. N., J. A. Begum and U. D. Shams. 1990. Studies on carbonated beverage based on mango pulp , Bangladesh

## 4- نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان داد تفاوت معنی داری از جهت تغییر در خواص فیزیکوشیمیابی شامل pH, اسیدیته, دانسیته و درجه بریکس در طول دوران نگهداری بین نمونه های شاهد و نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز وجود نداشت هر چند که به کار بردن شربت ذرت غنی از فروکتوز باعث پایداری نسبی ذرات در نوشابه های پر تقالی شد و از طرفی به کار بردن شربت ذرت غنی از فروکتوز ناپایداری رنگ نوشابه های پر تقالی را در حضور نور تشدید کرد.

## 5- سپاسگزاری

نویسندهای این مقاله مرتب سپاس و قدردانی خود را از حمایت های مالی، علمی و فنی شرکت زمزم ایران اعلام می دارند.

## 6- منابع

- [1] Adegoke, G. O., R. N. Nwaigwe, and G. B. Oguntiemein.1995. Microbiological and biochemical changes during the production of sekete – a fermented beverage made from maize, Journal of Food Science and Technology – India , 32( 6 ) : 516-518 ( Abs ).
- [2] Anon (1996). High Fructose Corn Syrup, FDA Consumer, Vol. 30. Iss. 9.
- [3] Anderson, J.and L. Young ( 2002). Sugar and Sweeteners,.www. ext.colostate.edu
- [4] Aranyosi, P., M. Czilik, E. Remi, G. Paragh, A. Vig and I. Rusznk.1999. “ The light stability of azo dyes and azo dyeings. kinetic studies on the role of dissolved oxygen in the photofading of two heterobifunctional azo reactive dyes in aqueous solution” Dyes and Pigments, 43( 3 ) : 173-182 ( Abs ).
- [5] Ashurst, P. R.(1998 ).The Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices. Engeland: Sheffield Academic Press.

- [22] Nigam, P., D. Singh (1995). Enzyme and Microbial System Involved in Starch Processing, Enzyme and Microbial Technology, Vol. 17, PP. 770-775.
- [23] Portmann, M. O. and D. Kilcast (1998). Descriptive Profiles of Synergistic Mixtures of Bulk And Intense Sweeteners, Food Quality And Performance, Vol. 9, No. 4, PP. 221-229.
- [24] Turtura, G. C. and A. Mingizzi .1992. "Microbiological research on soft drinks: Discolouring of natural flavoured products " Zentralblatt Fuer Microbiology, 147 (1/2) : 51-60 ( Abs).
- [25] Vandermaarel, M. J., B. Vanderveen, J. C. M. Uitdehaag, H. Leemhuis and L. Dijkhuizen (2002). Properties and Applications of Starch - Converting Enzymes of The Alpha- Amylase Family, Journal of Biotechnology, Vol. 94, Iss. 2, PP. 137-155. Abs.
- Journal of Agricultural Science 17 ( 2 ) : 169-172 ( Abs).
- [16] Kirk, O., T. V. Borchert and C. C. Fuglsang (2002) . Industrial Enzyme Applications, Current Opinion in Biotechnology.
- [17] Kitts, D. D. (1998). The Function Role of Sugar in Food, Carbohydrate News, Iss. 4.
- [18] Loureiro, V., and A. Querol . 1999. The prevalence and control of spoilage yeasts in food and beverages , Trends in Food Science and Technology, 10 (11 ) : 356-365.
- [19] Meyer, S. and W. Eiriha(2002). Optimizing Sweetener Blends For Low Calorie Beverages, Food Technology, Vol. 56, No. 7, PP.42-45.
- [20] Nabors, L. O.(2002). Sugar Replacement For Food and Beverages, Food Technology, Vol. 56, No. 7, PP.28-34.
- [21] Nguyen, Q. D. , J. M. Rezessy, S. M. Claeysens, I. Stals, and A. Hoschke(2002). Purification and Characterisation of Amylolytic Enzymes From Termophilic Fungus Thermomyces Lanuginosus Strain ATCC 34626, Enzyme and Microbial Technology , Vol. 31, Iss. 3,2, PP. 345-352.

## **Stability of non alcoholic beverage contained high fructose corn syrup and sucrose during storage**

**Mirzaei, M.<sup>1</sup>\*, Mesbahi, Gh.,<sup>1</sup> Ebrahimzadeh Moosavi, M.,<sup>2</sup>Aminlari,M.<sup>1</sup>**

1. Academic Member of Islamic Azad University, Shahre Ghods Branch.
2. Academic Member of Food Science and Technology, Shiraz University.
3. Associate Prof. of Food Science and Technology, Tehran University.
4. Prof. of Food Science and Technology, Shiraz University.

The goal of this research was comparing physicochemical stability of non alcoholic carbonated beverages contained high fructose corn Syrup and sucrose during storage.

Soft drinks were made with three formulations of lemon , cola and orange soft drinks and in their formulations ,sucrose was replaced with 60%, 80% and 100% of HFCS (55%) and were stored at 4 °C, 25 °C and 40 °C for one , two and four months. Samples were analysed for titrable acidity, pH, density, brix and color stability.

pH, brix and density decreased although titrable acidity increased during storage. There was no significant difference between samples contained HFCS and sucrose( $P>0.05$ ).

Results showed that color of samples were stable at different temperatures ( 4 °C, 25 °C and 40 °C) of storage up to four months( $P<0.05$ ) but exposing to sun light made Carmoisine unstable and HFCS intensified this effect.

**Key Words:** HFCS (High Fructose Corn Syrup ), Sucrose, Soft drinks, Stability

---

\*Corresponding author E-Mail address: m\_mirzaeishiraz@yahoo. Com.