

## بررسی و ارائه روشی مناسب جهت تولید کنسانتره پروتئینی پنبه دانه برای صرف انسان

محمد رضا کوشکی<sup>1\*</sup>، صادق خوشگذران آبرس<sup>2</sup>، محمد حسین عزیزی<sup>3</sup>، سبا بلقیسی<sup>4</sup>، محمد علی نجفی<sup>4</sup>

- 1- استادیار گروه تحقیقات صنایع غذایی
  - 2- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس
  - 3- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  - 4- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
- (تاریخ دریافت: 89/5/19 تاریخ پذیرش: 89/7/22)

### چکیده

امروزه، تقاضا برای منابع ارزان و جایگزین منابع پروتئین حیوانی جهت استفاده در تولید مواد غذایی با ارزش افزوده افزایش یافته است. لذا بسیاری از محققین به تولید منابع پروتئین گیاهی روی آورده اند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر امکان سنجی تولید کنسانتره پروتئینی پنبه دانه از کجاله آن جهت صرف انسان است. سه روش مختلف، روش استخراج با ان-بوتanol : اسید، مخلوط حلال ها (آب : استن : هگزان) و اتانول - فراغشایی، جهت تولید کنسانتره پروتئین پنبه دانه مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد نظر (به درصد) عبارت بودند از: ازت، حلالیت ازت، محتوی روغن، فیبر خام، گوسپیول کل و گوسپیول آزاد. آنالیز آماری در قالب 3 طرح آماری جداگانه و با استفاده از طرح بلوک های کاملاً تصادفی و بررسی در سطح معنی دار بودن در یک درصد ( $\alpha = 0.01$ ) انجام پذیرفت. پس از مقایسه داده های حاصل با مقادیر استاندارد جهانی نتایج ذیل بدست آمد: روش های استخراج با ان-بوتanol : اسید (9 مرتبه شستشو با اسید کلریدریک)، استفاده از مخلوط حلال ها (نسبت 30 : 3 : 67 به همراه استخراج کلاسیک) و روش اتانول - فراغشایی (استخراج قلیایی با فراغشایی 20000 molecular weight Cut off: که روش تولیدی آخر به عنوان مطلوب ترین روش جهت تولید کنسانتره پروتئین پنبه دانه معرفی گردید.

**کلید واژگان:** پنبه دانه، کجاله پنبه دانه، کنسانتره پروتئین پنبه دانه، روش های استخراج و استاندارد جهانی

### ۱- مقدمه

آورده اند [1, 2, 3]. پروتئین پنبه دانه برای نخستین بار در سال 1876 به عنوان منبع پروتئینی در رژیم های غذایی کم نشاسته

تقاضا برای منابع ارزان پروتئین که بتوان در تولید مواد غذایی با ارزش افزوده از آن بهره برد، در سطح جهان رو به افزایش است

به

\*مسئول مکاتبات: mr\_koushki@yahoo.com

بررسی و ارائه روشی مناسب جهت تولید کنسانتره پروتئین گیاهی روی

لذا تحقیقات بسیاری در جهت تولید منابع پروتئین گیاهی روی  
دانه

[13-15]، آرد آفتابگردان بدون روغن [16] و بذر کنف [17] (Kenaf).

کشور ما با توجه به موارد فوق الذکر یکی از مناطق پنبه خیز جهان است لذا در این مطالعه معروفی بهترین روش تولید کنسانتره پروتئینی پنبه دانه از این منبع گیاهی با هدف استفاده انسان بررسی گردید. در این مطالعه 3 روش استخراج مختلف به کار گرفته شدند که عبارت بودند از: ان - بوتانول : اسید، مخلوط حلال ها به همراه روش استخراج مرطوب و اتانول - فراغشایی. فاکتورهای میزان ازت، حلالیت ازت، چربی، فیبر خام، گوسپیول کل و گوسپیول آزاد جهت ارزیابی کارایی روش استخراج و مقایسه آن با مقادیر استاندارد اندازه گیری شدند.

## 2- مواد و روشها

### 2-1- روشها

کلیه آزمون ها طبق روش های مندرج در [18] انجام گرفتند، که عبارتند از: فیبر خام (Ba 6-84)، ازت (Ba 4e-93) به کمک دستگاه Kejheldal Auto Analyzer مدل 1030، محتوی Electro روغن (Ba 3-38) به کمک دستگاه سوکسله Thermal EME 6، حلالیت ازت (Ba 11-65)، گوسپیول آزاد (Ba 7-58) و گوسپیول کل (Ba 8a-99) با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی فشار بالا Shimatzu مدل sil-2AS (همراه با ستون DS 4/6 \* 15 cm) و اسپکتروفوتومتری (SAD - 2AS Shimatzu مدل 2-2

### 2-2- آماده سازی پروتئین کنسانتره پنبه دانه

پنبه دانه مورد استفاده تحت نام رقم ورامین از مرکز اصلاح بذر ورامین تهیه و به منظور یکنواختی نمونه و حذف پارامترهای ناخواسته، مقدار 20 کیلوگرم به طور تصادفی از نقاط مختلف انبیار انتخاب و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه ها بوجاری و پس از پاک کردن به 20 بخش تقسیم شدند و سپس 4 بخش

و ایران به ترتیب 30/46 و 90000 هکتار، عملکرد 734 کیلوگرم و 3621/41 در هکتار و تولید 102/74 میلیون پوند و 3000000 تن و تولید جهانی کنجاله پنبه دانه 13/96 میلیون تن می باشد [5].

کنسانتره پروتئین پنبه دانه با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص خود نظری ایجاد رنگ های مختلف بسته به pH [6]، ایجاد کف پایدار با حجم بالاتر از کف حاصل از تخم مرغ، فراورده های نانوایی، دسرهای منجمد و سس های سالاد [4]. یکی از فاکتورهای مهم در پنبه دانه وجود ماده رنگی گوسپیول می باشد. گوسپیول ( $C_{30}H_{30}O_8$ ) یک ترکیب آلدهیدی پلی فنلی زرد رنگ است که به وفور در غدد رنگی پنبه دانه یافت می شود که کاربرد آن در گیاه پنبه دانه ایجاد مقاومت در برابر حمله حشرات می باشد [7]. گزارشات متفاوتی در خصوص تاثیر این ماده بر انسان وجود دارد، نظری اثر ضد سرطانی [8] و کاهش اشتها [9]. گوسپیول به دو شکل آزاد و پیوندی وجود دارد. گوسپیول پیوندی سبب بد رنگی و بد طعمی فرآورده های حاصل از پنبه دانه می شود. مطالعات انجام شده نشان داد گوسپیول باند شده عامل اصلی بد رنگی در ایزوله های پروتئینی است. وجود مقادیر اندک گوسپیول آزاد در فرآورده های پنبه دانه مثبت ارزیابی شده و این امر به علت خاصیت آنتی اکسیدانی گوسپیول آزاد می باشد [10، 4]. برای رفع این مشکلات سیستم ها و روش های مختلفی ابداع شده اند از جمله فرآیند سیکلون مایع ، طبقه بندی با جریان هوا، استخراج توسط حلال های شیمیایی، اصلاح ژنتیکی پنبه دانه. برخی از این سیستم ها هم اکنون در کشورهای آمریکای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، هند و ایتالیا رایج شده اند [11، 12].

روش های بسیاری برای تولید پروتئین کنسانتره گیاهی به کار رفته اند که عبارتند از: رسوب دهی ایزوالکتریک، رسوب دهی الكلی، رسوب دهی ایزوالکتریک همراه با رسوب دهی الكلی و انحلال قلیایی همراه با رسوب دهی ایزوالکتریک از بادام زمینی

v/w) با آب قلیایی : کنجاله (دما اتاق، بمدت 30 دقیقه و 10/5 = pH مخلوط می شود. پس از فیلتراسیون سوسپانسیون، محلول با اسید کلریدریک 0/01 نرمال خشی شد (دما اتاق، بمدت 30 دقیقه و 5 = pH). در ادامه مجدداً فیلتر و خشک گردید [19].

**2-5- روشن استخراج اتانول - فراغشاپی.** متغیر اول فرآیند استخراج مرطوب پروتئین با 3 سطح استخراج اسیدی، کلاسیک و قلیایی و متغیر دوم نوع فیلتر مشتمل بر Cut off: 20000 سطح: فراغشاپی<sup>۵</sup> (تحت فشار 3 بار) با Cut off: 10000 molecular weight ، فیلتر با molecular weight و شاهد بدون فیلتراسیون. نخست روغن کشی حلال اتانول

(دما اتاق و بمدت 8 ساعت) و تکمیل فرایند روغن کشی در دستگاه سوکسله (با همان نسبت در دما اتاق و بمدت 4 ساعت) انجام و پس از حلال زدایی استخراج مرطوب پروتئین در 3 سطح انجام گرفت. استخراج اسیدی، اختلاط کنجاله با آب اسیدی به نسبت 15:1 (دما اتاق، بمدت 30 دقیقه و pH = 4/5) سانتریفیوژ<sup>6</sup> (30 دقیقه و 6000 rpm) و تقسیم آن به 3 بخش شاهد (بدون فراغشاپی)، فراغشاپی Cut off: 10000 molecular weight 20000 و molecular weight تا دستیابی به 1 به 12/5 حجم اولیه و استخراج قلیایی، اختلاط کنجاله با آب قلیایی به نسبت v/w 15:1 (دما اتاق، بمدت 30 دقیقه و pH = 9) سانتریفیوژ (30 دقیقه و 6000 rpm) و تقسیم آن به 3 بخش شاهد (بدون فراغشاپی)، فراغشاپی Cut off: 20000 molecular weight Cut off: 10000 weight و دستیابی به 1 به 12/5 حجم اولیه و استخراج کلاسیک، اختلاط کنجاله با آب قلیایی به نسبت v/w 1:15 (دما اتاق، بمدت 30 دقیقه و pH = 10/5) سانتریفیوژ (30 دقیقه و

جهت انجام آزمایشات برداشت شد. نمونه به دست آمده را با دست پوست کنده و مغز دانه ها را تحت دما 4 درجه سانتی گراد در خرد کن خرد و تحت همان دما نگه داری شد. در هر مرحله از آزمایش مقدار مورد نیاز روزانه به طور تصادفی از نمونه های تهیه شده برداشته و آزمایشات لازم بر روی آن انجام شد.

**2-3- روشن استخراج با ان - بوتانول : اسید.** در این روش تعداد دفعات شستشو دارای 3 ، 5 ، 7 و 9 سطح و نوع اسید دارای دو سطح اسید کلریدریک و اسید سولفوریک بود. نخست مغز پنهان دانه به نسبت 1:3 (v/w) با حلال هگزان 16 ساعت در دما اتاق مخلوط شد. پس از فیلتراسیون<sup>۱</sup> سوسپانسیون و حلال زدایی<sup>۲</sup> نمونه خشک شده آسیاب<sup>۳</sup> و الک<sup>۴</sup> گردید. عمل شستشو در هر مرتبه به کمک 1 حلال (92٪) ان - بوتانول : 8٪ اسید کلریدریک و یا اسید سولفوریک 0.005 pH = 4/5 نمونه (v / W) انجام گرفت. در ادامه سوسپانسیون مجدداً فیلتر و خشک گردید [25].

**2-4- روشن استخراج با مخلوط حلال های آب : استن: هگزان.** نسبت میان حلال ها یک متغیر با 3 سطح روش استخراج مرطوب پروتئین با 3 سطح شاهد، اسیدی و کلاسیک به عنوان متغیر دیگر در نظر گرفته شدند. ابتدا با کمک مخلوط حلال ها (نسبت 1:15 v/w) 1 حلال به کنجاله در نقطه جوش و بمدت 4 ساعت) روغن کشی انجام شد و پس از حلال زدایی و آسیاب کردن نمونه، آرد خارج شده از الک را به 3 سطح تقسیم نموده که بخش اول نمونه شاهد بدون انجام استخراج مرطوب، بخش دوم استخراج اسیدی به نسبت 15:1 (v/w) با آب اسیدی : کنجاله مخلوط می گردد (دما اتاق، بمدت 30 دقیقه و pH = 4/5). پس از فیلتراسیون سوسپانسیون حاصل در آون خشک شد و بخش سوم استخراج کلاسیک به نسبت

1. پمب خلا و اوتمن 3

2. در آون مدل Ehret 2000، دما ۴۵ °C و بمدت 10 ساعت


3. Super national

4. DT: 10 Shaker مدل 80، دستگاه

5. کمپرسور Neuberger مدل 1/4 ، مخزن تحت فشار Sartorius مدل 17531 با حداکثر فشار 7 بار و فیلتر قابل تعویض از جنس استات سلولز 2000 MS mistrah .6

بررسی و ارائه روشی مناسب جهت تولید کنسانتره پروتئین اسید سولفوریک در مقایسه با اسید کلریدریک با 9 مرتبه شستشو درصد ازت و حلالیت ازت پایین تر و گوسپیول آزاد و کل بالاتری داشت.

طبق استاندارد جهانی [24] پروتئین کنسانتره پنbe دانه با هدف مصرف انسان بایستی خصوصیات مشخصی را دارا باشد (جدول). مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری آن - بوتانول : اسیدکلریدریک با مقادیر استاندارد جهانی نشان می دهد که تمامی فاکتورها مناسب می باشند، بجز گوسپیول آزاد بالا که آن را برای مصرف انسان نامطلوب می سازد (نمودار 1).



نمودار 1 مقایسه کنسانتره پروتئین تولید شده توسط آن - بوتانول: اسیدکلریدریک (9 مرتبه شستشو) با استاندارد جهانی

(6000)، سپس خشی سازی بخش رویی با اسید کلریدریک 0/01 نرمال (بمدت 30 دقیقه و pH = 5) و تقسیم آن به 3 Cut off: 20000 molecular Cut off: 10000 weight weight تا دستیابی به 1 به 12/5 حجم اولیه و سپس نمونه ها خشک شدند [20].

## 6-2- تجزیه و تحلیل آماری

اعداد به دست آمده در قالب 3 طرح آماری جداگانه و با استفاده از طرح بلوك های کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده پس از آنالیز واریانس با آزمون دانکن مقایسه شدند و از کلیه نتایج به دست آمده مقایسه میانگین به روش آزمون حداقل انحراف از معیار به عمل آمد و سطح معنی داری در این تحقیق  $\alpha = 0/01$  در نظر گرفته شد [21].

## 3- نتایج و بحث

همانطور که در جدول 1 می توان مشاهده نمود، شستشو با حلال آن - بوتانول : اسید کلریدریک در متغیرهای درصد محتوی روغن و گوسپیول آزاد میان دفعات شستشو یافت نشد. در خصوص سایر متغیرها اختلاف معنی دار یافت شد به گونه ای که با افزایش دفعات شستشو درصد ازت، حلالیت ازت و فیبر خام افزایش یافتد لذا بالاترین راندمان تولید پروتئین با 9 بار شستشو حاصل گردید. همچنین میزان گوسپیول کل از 0/59226 به 0/2748 کاهش یافت. در نتیجه کمترین میزان گوسپیول کل با 9 بار شستشو بدست آمد. که با توجه به اینکه گوسپیول سبب بد رنگی و بد طعمی فراورده های حاصل از پنbe دانه می شود [11] بنابراین کاهش آن مطلوب می باشد. اگرچه در مطالعات انجام گرفته هیچ رابطه ای میان مصرف گوسپیول در پروتئین کنسانتره پنbe دانه و اثر سوء بر انسان یافت نشد [9, 22, 23]. بکارگیری اسید سولفوریک نیز نتایجی مشابه به همراه داشت. البته استفاده از

جدول 1 اثر متقابل نوع اسید و دفعات شستشو بر ویژگی های مورد بررسی (درصد)

ان - بوتانول: اسید سولفوریک			ان - بوتانول: اسیدکلریدریک			حلال		
ان - بوتانول: اسید سولفوریک			ان - بوتانول: اسیدکلریدریک			دفعات شستشو		
ان	ان	ان	ان	ان	ان	ازت	ازت	حالیت ازت
9	7	5	9	7	5	11/863 <sup>A</sup>	10/704 <sup>B</sup>	10/197 <sup>C</sup>
11/863 <sup>A</sup>	10/511 <sup>B</sup>	10/163 <sup>C</sup>	11/920 <sup>A</sup>	10/704 <sup>B</sup>	10/197 <sup>C</sup>	ازت	ازت	حالیت ازت
91/26 <sup>D</sup>	91/13 <sup>D</sup>	90/76 <sup>E</sup>	92/80 <sup>A</sup>	92/56 <sup>B</sup>	92/23 <sup>C</sup>			

0/55 <sup>A</sup>	0/63 <sup>A</sup>	1/87 <sup>A</sup>	0/59 <sup>A</sup>	0/65 <sup>A</sup>	2/10 <sup>A</sup>	محتوی روغن
7/43 <sup>C</sup>	6/53 <sup>B</sup>	5/88 <sup>A</sup>	7/42 <sup>A</sup>	6/51 <sup>B</sup>	5/84 <sup>C</sup>	فیبر خام
0/37160 <sup>E</sup>	0/44316 <sup>C</sup>	0/71461 <sup>A</sup>	0/27480 <sup>F</sup>	0/37700 <sup>D</sup>	0/59226 <sup>B</sup>	گوسپیول کل
0/09804 <sup>A</sup>	0/11791 <sup>A</sup>	0/34612 <sup>A</sup>	0/08198 <sup>A</sup>	0/09485 <sup>A</sup>	0/29276 <sup>A</sup>	گوسپیول آزاد


حرروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح  $\alpha = 0/01$  می باشد.

جدول 2 استاندارد جهانی میزان ترکیبات در کنسانتره پروتئین پنبه دانه

گوسپیول آزاد (%)	گوسپیول کل (%)	فیبر خام (%)	محتوی روغن (%)	حالیت ازت (%)	ازت (%)
0/06667	1/3334	5/55	6/67	65	8/889

در ادامه، مقایسه نتایج حاصل از روش استخراج قلیایی با فراغشایی molecular weight Cut off: 20000 با مقادیر ارائه شده در استاندارد جهانی، نشان داد این روش تمامی فاکتورهای مورد نظر در کنسانتره پروتئین را دارا بود (نمودار 3).

نتایج نشان دادند که سطوح نسبت حلال ها و روش استخراج مرطوب بر کلیه فاکتورها بجز درصد گوسپیول آزاد اثر معنی دار داشت (جدول 3). سطوح نسبت حلال های 60 : 39 : 30 : 39 : 30 : 67 : 3 در روش استخراج کلاسیک نسبت به شاهد و استخراج اسیدی بجز درصد میزان روغن و گوسپیول آزاد، که مقدار بیشتری برخوردار بودند، مطلوب می باشند. که با نتایج یو و همکاران [15] همخوانی دارد. در مورد درصد محتوی روغن و ازت نتایج دو مطالعه انجام گرفته در پروتئین کنسانتره بادام زمینی و دانه آمارانتوس (Amaranthus) به ترتیب توسط هایون و همکاران [14] و بخارانو - اوچان و ماریا نتو [20] با یافته های مطالعه حاضر مطابقت دارند به گونه ای که استخراج کلاسیک نسبت به اسیدی درصد محتوی روغن و ازت بالاتری داشت. سطوح نسبت حلال 44 : 53 : 3 با استخراج کلاسیک نیز بجز در فاکتورهای گوسپیول کل (اسیدی: 0/11893 و کلاسیک: 0/1242) و گوسپیول آزاد (اسیدی: 0/0339 و کلاسیک: 0/04092) نسبت به استخراج اسیدی مطلوب تر بود. لذا سطح نسبت حلال 30 : 37 : 67 : 3 با توجه به دارا بودن مقادیر نتایج بهتری به همراه داشت (گوسپیول کل و آزاد پایین تر). در جستجو به عمل آمده منابعی در خصوص تولید کنسانتره پروتئین از پنبه دانه یافت نگردید. لذا مطالعه حاضر با تحقیقات دیگران که از منابع متفاوت برای تولید کنسانتره پروتئین استفاده کردند مقایسه گردید. درصد ازت حاصل از روش پیشنهادی در این تحقیق پایین تر از بادام زمینی [14] و بالاتر از دانه آمارانتوس [20] بود.



نمودار 3 مقایسه کنسانتره پروتئین تولید شده توسط استخراج قلیایی همراه با فراغشایی molecular Cut off: 20000 با استاندارد جهانی weight

### 3- نتیجه گیری

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کاهش منابع غذایی و گرانی پروتئین حیوانی، منابع گیاهی جهت استفاده به عنوان منبعی جایگزین برای پروتئین حیوانی توجه خاصی را به خود جلب کرده اند. لذا در این مطالعه از پنبه دانه جهت تولید کنسانتره پروتئین استفاده گردید و با توجه به فاکتور محدود کننده گوسپیول

کل و آزاد در آن سعی شد تا روشی تولیدی ارائه گردد که ضمن به حداقل رساندن مقادیر این دو فاکتور محدودکننده، فراورده ای مطابق با استاندارد جهانی با هدف مصرف انسان ارائه گردد.

مقایسه نهایی میان 3 روش آن - بوتانول : اسید کلریدریک (9 مرتبه شستشو)، مخلوط حلال ها با سطح نسبت 30 : 67 : 3 به همراه استخراج کلاسیک و روش استخراج قلیایی به همراه فراغشایی molecular weight Cut off: 20000 با یکدیگر و استاندارد جهانی نشان داد که روش استخراج قلیایی به همراه فراغشایی molecular weight Cut off: 20000 پروتئین با خصوصیاتی بهتر را فراهم می سازد.

جدول 3 اثر متقابل سطوح نسبت حلال‌ها و روش استخراج مرطوب برابر ویژگی‌های مورد بررسی (درصد)

3 : 67 : 30			3 : 53 : 44			1 : 39 : 60			آب : استن : هگزان	
کلاسیک	اسیدی	شاهد	کلاسیک	اسیدی	شاهد	کلاسیک	اسیدی	شاهد	روش	استخراج
14/985 C	11/997 F	9/558 <sup>I</sup>	15/584 <sup>B</sup>	12/358 E	9/910 <sup>H</sup>	16/192 <sup>A</sup>	13/531 D	10/317 B	ازت	
90/27 <sup>A</sup>	89/67 <sup>B</sup>	89/60 <sup>B</sup>	85/97 <sup>C</sup>	85/33 <sup>D</sup>	85/27 <sup>D</sup>	77/27 <sup>F</sup>	76/80 <sup>F</sup>	76/77 <sup>F</sup>	حلالیت ازت	
12/73 <sup>A</sup> B	11/56 <sup>A</sup>	9/260 <sup>BC</sup>	7/01 <sup>C</sup>	8/73 <sup>BC</sup>	7/55 <sup>C</sup>	8/21 <sup>C</sup>	6/9 <sup>D</sup>	3/51 <sup>D</sup>	محتوی روغن	
1/63 <sup>D</sup>	3/74 <sup>A</sup>	3/14 <sup>B</sup>	0/92 <sup>E</sup>	2/47 <sup>C</sup>	2/36 <sup>C</sup>	0/63 <sup>E</sup>	2/61 <sup>C</sup>	1/80 <sup>D</sup>	فیبر خام	
0/823 <sup>G</sup>	0/081 <sup>H</sup>	0/09280 F	0/12420 <sup>D</sup>	0/11893 <sup>F</sup>	0/14470 <sup>I</sup>	0/27797 <sup>B</sup>	0/27377 <sup>C</sup>	0/29603 <sup>A</sup>	گوسیپول کل	
0/0116 B	0/0105 B	0/0214 <sup>AB</sup>	0/04092 <sup>AB</sup>	0/0339 <sup>AB</sup>	0/0538 <sup>A</sup>	0/02119 <sup>AB</sup>	0/01975 <sup>A</sup> B	0/03839 <sup>A</sup> B	گوسیپول آزاد	

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح  $\alpha = 0/01$  می‌باشد.

جدول 4 اثر متقابل روش استخراج و نوع فراغشایی بر ویژگی‌های مورد بررسی (درصد)

اسیدی	کلاسیک			قلیایی			روشن			استخراج
100000 mw	20000 mw	شاهد	100000 mw	20000 mw	شاهد	100000m w	20000 <sup>7</sup> mw	شاهد	فیلتر	
11/90 <sup>G</sup>	12/125 <sup>F</sup>	11/54 <sup>I</sup>	16/171 <sup>B</sup>	16/187 <sup>A</sup>	15/840 <sup>C</sup>	13/611 <sup>E</sup>	14/903 <sup>D</sup>	11/968 <sup>H</sup>	ازت	
95/20 <sup>E</sup>	95/23 <sup>E</sup>	95/67 <sup>E</sup>	97/50 <sup>AB</sup>	97/50 <sup>AB</sup>	97/53 <sup>A</sup>	97/33 <sup>C</sup>	97/20 <sup>D</sup>	97/40 <sup>BC</sup>	حلالیت ازت	
3/12 <sup>DE</sup>	3/05 <sup>B</sup>	3/88 <sup>E</sup>	3/74 <sup>C</sup>	3/95 <sup>C</sup>	3/40 <sup>D</sup>	5/82 <sup>B</sup>	6/23 <sup>A</sup>	3/001 <sup>E</sup>	محتوی روغن	
3/82 <sup>D</sup>	3/93 <sup>C</sup>	3/20 <sup>F</sup>	4/53 <sup>B</sup>	4/82 <sup>A</sup>	3/75 <sup>E</sup>	1/83 <sup>H</sup>	1/92 <sup>G</sup>	1/67 <sup>I</sup>	فیبر خام	
0/0162 <sup>D</sup>	0/0147 <sup>D</sup>	0/01196 D	0/01597 C	0/01683 <sup>D</sup>	/0337 0 <sup>B</sup>	0/27797 <sup>H</sup> H	0/00323	1/61237 <sup>A</sup>	گوسیپول کل	
0/0168 <sup>B</sup>	0/0126 <sup>B</sup>	0/01453 B	0/01196 B	0/01073 <sup>B</sup>	0/01293 B	0/00347 <sup>C</sup>	0/0031 <sup>C</sup>	1/54063 <sup>A</sup>	گوسیپول آزاد	

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح  $\alpha = 0/01$  می‌باشد

[1]Chandi, G. K. and Sogi, D. S. 2007. Functional properties of rice bran protein concentrate. Journal of Food Engineering. 79: 592–597.

#### 4- منابع

7. Molecular weight

- [14]Wu, H., Wang, Q., Ma, T. and Ren, J. 2009. Comparative studies on the functional properties of various proteins concentrate preparations of peanut protein. *Food Research International.* 42: 343–348.
- [15]Yu, J., Ahmedna, M. and Goktepe, L. 2007. Peanut protein concentrates: Production and functional properties as affected by processing *Food Chemistry.* 103: 121–129.
- [16]Ordóñez, C., Asenjo, M. G., Benítez, C. and González, J. L. 2001. Obtaining a protein concentrate from integral defatted sunflower flour. *Bioresource technology.* 78: 187-190.
- [17]Mariod, A. A., Fathy, S. F. and Ismail, M. 2010. Preparation and characterization of protein concentrates from defatted kenaf seed. *Food Chemistry.* 1-6.
- [18]Official methods and recommended practices of the A.O.C.S. 5<sup>th</sup> edition. 2005.
- [19]Muller, L. L., Jacks, T. J. and Hensalving, T. 1975. Aqueous solvents for extraction glanded cottonseed protein without gland rupture. *J.A.O.C.S.* 28(53): 598-601.
- [20]Bejarano-Luján, D. L. and Netto, F. M. 2010. Effect of alternative processes on the yield and physicochemical characterization of protein concentrates from *Amaranthus cruentus*. *LWT - Food Science and Technology.* 43: 736–743.
- [21]Basiri, A. 1989. Statistical Patterns in agriculture. University of Shiraz press. (in Farsi)
- [22]Bressani, R., Braham, J. E. and Elias, L. C. 1980. Human nutrition and gossypol. *Food and Nutrition Bulletin.* 2 (4): 24.
- [23]Verdery, B. and Marion, C. 1971. Technology for the production of protein foods from cottonseed flour. FAO. Rome. 12-18.
- [24]Pandey, S. N. 1998. Cottonseed and its utilization. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi (India). 212 p.
- [25]Hron, R. J., Abraham, G., Kuk, M. S. and Isher, G.S. 1992. Acidic ethanol extraction of cottonseed. *J.A.O.C.S.* 9(69): 951-952.
- [2]Rangel, A. Domont, G. B., Pedrosa, C. and Ferriera, S. T. 2003. Functional properties of purified vicilins from cowpea (*Vigna unguiculata*) and pea (*Pisum sativum*) and cowpea protein isolate. *Journal of Agricultural and Food Chemistry.* 51: 5792–5797.
- [3]Sogi, D. S., Garg, S. K. and Bawa, A. S. (2002). Functional properties of seed meals and protein concentrates from tomato processing waste. *Journal of Food Science.* 67:2997–3001.
- [4]Spadaro, J. J. and Gardner Homer, K. J. 1979. Food uses for cottonseed protein. *J.A.O.C.S.* 3(56): 422-424.
- [5]USDA. 2010. World Agricultural Production.
- [6]Wan, P. J., Green, J., Cater, C. M. and Mattil, K. F. 1979. Factors influencing the color of cottonseed protein products. *J food science.* 2 (44): 470-479.
- [7]Blauwinkel, R., Xu, S., Harrison, J. H., Loney, K. A., Riley, R. E. and Calhoun, M. C., 1997. Effect of whole cottonseed, gossypol, and criminally protected lysine supplementation on milk yield and composition. *J. Dairy Sci.* 80, 1358–1365.
- [8]Leblance, M. L., Russo, J., Kudelka, A. P. and Smith, J. A. 2002. An in vitro study of inhibitory activity of gossypol, a cottonseed extract, in human carcinoma cell lines. *Journal of Pharmacological Research.* 46 (6): 551-555.
- [9]Berardi, L. C. and Gold blatt, L. A. 1980. Toxic constituents of plant foodstuffs. 2<sup>nd</sup> edition. Academic Press. New York. 184-236.
- [10]Dowd, M. K. and Pelitire, S. M. 2001. Recovery of gossypol acetic acid from cottonseed soap stock. *Industrial Crops and Products.* 14: 113-123.
- [11]Kadan, R. S., Ziegler, G. M. and Spadaro, J. J. 1978. Color of cottonseed flour and isolates as affected by mixed solvent extraction. *Cereal Chem.* 55(6): 919-926.
- [12]Zhang, W. J., Xu, Z. R., Zhao, S. H., Jiang, J.F., Wang, Y. and Yan, X. H. 2006. Optimization of process parameters for reduction of gossypol levels in cottonseed meal by *canadia tropicalis* ZD-3 during solid substrate fermentation. *Journal of Toxicology.* 48: 221-226.
- [13]Liu, D. C., Zhang, W. N. and Hu, X. H. 2001. The research on preparation and functional properties of peanut protein. *Journal of Wuhan Polytechnic University.* 4(1-3): 10.



## Study of appropriate method on cottonseed protein concentrate production for human consumption

Koushki M. R.<sup>1\*</sup>, Khoshgozaran Abras, S.<sup>2</sup>, Azizi M. H.<sup>3</sup>, Belghaisi, S.<sup>4</sup>,  
Najafi, M. A.<sup>4</sup>

1- Assistant Professor, Department of Food Technology Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2-M.Sc. student in Food Science and Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3-Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

4- M.Sc. graduate in Food Science and Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

(Received:89/5/19 Accepted: 89/7/22)

At present, demands for inexpensive and alternative protein sources for animal protein, in order to be used in value-added foods have been increased. Therefore, many researchers shifting on production of plant protein resources. So, the objective of present study was possibility measurements of cottonseed protein concentrate production for human consumption from cottonseed meal. Three different methods, n-butanol : acid, mixed solvents (water : acetone : hexan) and ethanol-ultra filtration, in order to produce cottonseed protein concentrate were examined. Variables (percentage) were nitrogen, nitrogen solubility, fat, crude fiber, total gossypol and free gossypol. Statistical analysis was performed in the three distinct statistical patterns and by using blocks completely random and examination at significantly  $\alpha = 0.01$ . After comparing resulted data with world standard measurements, results obtained as follow: extraction methods with n-butanol : acid (9 times washing along with HCl), using mixed solvents (30 : 67 : 3 ratio along with classic extraction) and ethanol-ultra filtration (alkaline extraction along with ultra filtration molecular weight Cut off: 20000) were suitable. The last extraction method was demonstrated as most appropriate method to produce cottonseed protein concentrate.

**Keywords:** Cottonseed, Cottonseed meal, Protein concentrate, Extraction methods and World standard

---

\* Corresponding Author E-Mail address: mr\_koushki@yahoo.com