

بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک نوشیدنی شیری تخمیری پروپیوتیک حاوی اسید پروپیونیک در پایان تخمیر و طی نگهداری یخچالی

شهلا فرهادی^۱، کیانوش خسروی دارانی^{۲*}، مرتضی مشایخ^۳، سید امیر محمد

مرتضویان^۴، عبدالرضا محمدی^۵، فرزانه شهراز^۶

- ۱- دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 - ۲- استادیار گروه تحقیقات صنایع غذایی، انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 - ۳- استادیار گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 - ۴- استادیار گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 - ۵- استادیار گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 - ۶- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- (تاریخ دریافت: ۹۰/۱/۲۸ تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۷)

چکیده

هدف تحقیق حاضر تولید نوشیدنی شیری تخمیری با استفاده از پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی و بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک، بلافارسله پس از تخمیر و طی دوره نگهداری یخچالی است. در این مطالعه با استفاده از طرح فاکتوریل کامل، اثر دو متغیر دمای گرمخانه‌گذاری و نسبت ریزسازواره‌های موجود در تلقیح بر ویژگی‌های میکروبیولوژیک نوشیدنی شیری تخمیری بررسی شد. برای تهیه نوشیدنی شیری تخمیری از کشت همزمان لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس و پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی به نسبت ۱ به ۲، ۱ به ۴ و ۱ به ۸ دمای گرمخانه‌گذاری 35°C و 30°C تا رسیدن به 40°C استفاده شد. قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس از طریق کشت نوشیدنی تهیه شده روی محیط MRS آکار و گرمخانه‌گذاری در دمای 37°C و قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی از طریق کشت روی محیط سدیم لاکاتات آکار و گرمخانه‌گذاری در دمای 30°C تعیین شد. قابلیت زنده‌مانی ریزسازواره‌های تلقیح شده، در نمونه حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک در روزهای ۰، ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸ و 28°C تعیین شد. به علاوه میزان دوفاز شدن نوشیدنی شیری تهیه شده طی ۷ روز نگهداری بیشترین اندازه گرفته شد. بیشترین تعداد سلول زنده پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی در نوشیدنی تهیه شده با استفاده از نسبت لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس به پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی معادل ۱ به ۴ و گرمخانه‌گذاری در دمای 30°C به دست آمد. قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی با دمای گرمخانه‌گذاری ارتباط معکوس و معنی داری ($P < 0.05$) را نشان داد. بیشترین قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی تهیه شده با استفاده از نسبت لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس به پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی معادل ۱ به ۸ و گرمخانه‌گذاری در دمای 35°C مشاهده شد. قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی و لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس طی ۲۸ روز نگهداری در دمای 4°C در هفته اول و آخر به ترتیب، به طور قابل ملاحظه کاهش یافت.

کلید واژگان: پروپیوتیک، پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی، لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس، نوشیدنی شیری تخمیری، ویژگی‌های میکروبیولوژیک.

*مسئول مکاتبات: kiankh@yahoo.com

به علت تولید اگزوپلیساقارید، ویسکوزیته محصول نهایی را افزایش می دهنند. به طوری که ماست تهیه شده از طریق کشت همزمان باکتری های آغازگر ماست و پروپیونی باکتریوم توانی بی از مستحکم ترین ساختار برخوردار بود. در ماست تهیه شده با استفاده از رشد همزمان پروپیونی باکتریوم توانی بی، پروپیونی باکتریوم جنسنهنی بی و باکتری های آغازگر ماست بالاترین میزان استالدید در روز اول به دست آمد. گونه های پروپیونی باکتریوم به علت فعالیت پروتئولیتیک پایین که منجر به رشد آهسته این باکتری ها می شود، در صورتی که به تهایی به عنوان باکتری آغازگر در تهیه محصولات لبنی استفاده شوند مدت زمان گرمخانه گذاری را افزایش می دهند در حالی که در کشت همزمان با باکتری های آغازگر ماست (استرپوکفرکوس ترموفیلوس^۳ و لاکتوپاسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس^۴) و سایر باکتری های اسیدلاکتیک مدت زمان گرمخانه گذاری کاهش می یابد [۶]. با عنایت به این که در زمینه تولید نوشیدنی شیری تخمیری با استفاده از پروپیونی باکتریوم در ایران، نه تنها در مقیاس صنعتی بلکه در مقیاس آزمایشگاهی نیز مطالعه ای انجام نشده است و با توجه به رشد روزافزون مصرف نوشیدنی های لبنی، هدف تحقیق حاضر تولید نوشیدنی شیری تخمیری با استفاده از کشت همزمان پروپیونی باکتریوم فرئوڈنریچی بی زیرگونه شرمانی بی^۵ و لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس^۶ و بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک محصول تولید شده، پس از تخمیر و طی نگهداری یخچالی است.

۲- روش تحقیق

۱-۲- کشت آغازگر

لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس La-5 از شرکت پیشگامان پخش صدیق تهیه شد. پروپیونی باکتریوم فرئوڈنریچی بی زیرگونه شرمانی بی (DSM 20270) به صورت لیوپلیزه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران خریداری و در محیط مایع پروپیونی باکتریوم کشت و هر ماه پاساژ داده شد. این محیط کشت شامل ۱ درصد کازئین، ۰/۵ درصد عصاره مخمر و ۱ درصد لاکتات سدیم در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر است که پس

۱- مقدمه

پروپیونی باکتریوم ها ریزسازواره های گرم مثبت، کاتالاز مثبت، غیراسپورزا، غیرمتحرک، بی هوازی اختیاری و میله ای شکل اند و همانند سایر پروپیوتیک ها، اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در تخمیر انجام شده توسط گونه های پروپیونی باکتریوم، ۳ مول اسید لاکتیک به ۲ مول اسید پروپیونیک، ۱ مول اسید استیک و ۱ مول دی اکسید کربن تبدیل می شود (۱). فواید پروپیوتیک گونه های پروپیونی باکتریوم به خوبی شناخته شده است. برخی گونه های پروپیونی باکتریوم قادر به تولید ویتامین های B₂ و B₁₂ هستند که این موضوع به خصوص در کشورهای دچار کمبود این ویتامین ها و در رژیم افراد گیاهخوار اهمیت دوچندان می یابد [۲ و ۳]. این باکتری ها از طریق تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بر pH روده اثر کرده و جذب آهن و کلسیم را در روده افزایش می دهند [۴ و ۵]. از طرف دیگر رشد بیفیدو باکتریوم ها را افزایش می دهند و از این طریق فلور میکروبی روده را تنظیم و منجر به حفظ سلامت دستگاه گوارش می شوند [۶]. پروپیونی باکتریوم ها همچنین از طریق مهار سنتز کلسترول در کبد، از طریق ممانعت از فعالیت آنزیم هیدروکسی متیل-گلوتاریل Co.A سنتاز و افزایش دفع اسیدهای صفرایی از طریق مدفعه، قادر به کاهش سطح کلسترول پلاسمای هستند [۷ و ۸]. از فواید دیگر به کارگیری گونه های پروپیونی باکتریوم در تهیه محصولات لبنی می توان به ارتقای ویسکوزیته در محصولاتی نظری ماست (از طریق تولید اگزوپلیساقاریدها) [۶، ۹ و ۱۰] و مهار رشد ریزسازواره های نامطلوب در محصول (از طریق تولید اسید پروپیونیک و باکتریوسین) و در نتیجه افزایش ماندگاری محصول [۶] اشاره کرد. با وجود مطالعات زیادی که در زمینه استفاده از گونه های پروپیونی باکتریوم به عنوان باکتری آغازگر در تهیه پنیر انجام شده است، تنها در مطالعه انجام شده توسط اکینسی و گورل در سال ۲۰۰۸ از کشت همزمان باکتری های آغازگر ماست و ترکیبات متفاوت پروپیونی باکتریوم ها شامل پروپیونی باکتریوم توانی بی^۱ و پروپیونی باکتریوم جنسنهنی بی^۲ با میزان تلقیح ۲ درصد حجمی در تمام نمونه ها، به منظور تهیه ماست استفاده شد. براساس نتایج این مطالعه فعالیت پروپیونی باکتریوم ها با باکتری های آغازگر ماست تداخلی نداشت. پروپیونی باکتریوم ها

3. *Streptococcus thermophilus*

4. *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus*

5. *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *shermanii*

6. *Lactobacillus acidophilus*

1. *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *thoenii*

2. *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *jensenii*

اضافه شد و به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۳۵۰۰ rpm سانتریفیوژ شد. پس از آماده‌سازی نمونه، میزان اسید پروپیونیک تولید شده در محصول با استفاده از دستگاه HPLC مجهر به ستون ODS-5 اندازه‌گیری شد. جهت آنالیز از فاز متحرک شامل اسید سولفوریک 10^{-4} مولار (فاز متحرک A) و متانول (فاز متحرک B) و سرعت جریان 1 mL/min استفاده و آنالیز اسیدهای مذکور در طول موج آشکارساز معادل 210 nm انجام شد.

۴-۲ تعیین قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروپیوتیک

قابلیت زنده‌مانی لاكتوباسیلوس اسیدوفیلوس از طریق کشت محصول تولید شده بر روی محیط کشت MRS آگار و گرمخانه‌گذاری در دمای 37°C و در شرایط هوایی به مدت ۷۲ ساعت در رقت‌های 10^{-3} تا 10^{-7} [۱۲] و قابلیت زنده‌مانی پروپیونیک‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمنانی بی از طریق کشت بر روی محیط سدیم لاكتات آگار و گرمخانه‌گذاری در دمای 30°C و در شرایط غیرهوایی به مدت ۷ روز در رقت‌های 10^{-3} تا 10^{-7} بررسی شد. شرایط بی‌هوایی با استفاده از جار بی‌هوایی و گازپک ایجاد شد. به‌منظور تهیه محیط کشت سدیم لاكتات آگار از ۱۰ گرم کازئین، ۱۰ گرم عصاره مخمیر، ۱۰ گرم لاكتات سدیم، ۲ گرم پیرووات سدیم، ۲ گرم گلیسین، $1/5$ گرم کلرید سدیم، $0/5$ گرم توانین $0/25$ ، 80 گرم دی‌پتانیم هیدروژن فسفات و 12 گرم آگار در 1000 mL لیتر آب مقطر استفاده شد. پس از تنظیم pH در بازه $0/2 \pm 7$ ، محیط کشت تهیه شده در دمای 121°C به مدت 15 ± 7 دقیقه اتوکلاو شد [۱۱]. کلیه آزمایش‌ها با 3 تکرار انجام شد و نتایج به صورت میانگین گزارش شد. نسبت بقاء رشد (GPI) از تقسیم تعداد نهایی باکتری‌های تلقیح شده بر تعداد اولیه آن‌ها به‌دست آمد [۱۳].

۵-۲ تعیین میزان دوفاز شدن نمونه‌ها طی نگهداری یخچالی

میزان دوفازشدن محصول تولید شده حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک طی نگهداری در دمای 4°C به مدت 7 روز، با استفاده از استوانه مدرج 100 mL لیتری ستون اندازه‌گیری شد. به‌منظور تعیین میزان دوفازشدن، نوشیدنی حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک توسط دستگاه هموزنایزر اولتراتوراکس

از تهیه و تنظیم pH در بازه $7/2 - 7$ در دمای 121°C به مدت 15 دقیقه اتوکلاو شد. به‌منظور آماده‌سازی پروپیونیک‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمنانی بی برای تلقیح، 1 mL لیتر سوسپانسیون مادر حاوی 10^9 cfu/mL باکتری در 250 mL لیتر محیط مایع پروپیونیک‌باکتریوم پاساژ داده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 30°C قرار داده شد. بعد از $گذشت ۴8$ ساعت، 250 mL لیتر محیط مایع در دمای 4°C با سرعت 3000 g به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ شد. پس از جدا کردن فاز رویی، به رسوب حاصله 25 mL لیتر بافر نمکی فسفات اضافه و مجدداً با سرعت 3000 g در دمای 4°C برای 15 دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب به‌دست آمده از این مرحله با 15 mL لیتر محلول بافر نمکی فسفات و گلیسرول به نسبت 85 به 15 به ترتیب، به خوبی برای مدت 15 دقیقه مخلوط شد و سوسپانسیون به‌دست آمده در 15 ویال ستون 1 mL لیتری تقسیم شد و در فریزر -80°C قرار گرفت. به‌منظور تعیین تعداد دقیق باکتری موجود در هر ویال، یک ویال در رقت‌های 10^{-6} تا 10^{-12} روی محیط سدیم لاكتات آگار کشت داده شد. پلیت‌های کشت داده شده به مدت 7 روز در دمای 30°C در شرایط غیرهوایی قرار داده شد (6 و 11). بر اساس نتایج به‌دست آمده سوسپانسیون موجود در هر ویال تهیه شده حاوی 10^{11} cfu/mL پروپیونیک‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمنانی بی است.

۲-۲ روش تولید نمونه‌ها

شیر مورد استفاده برای تولید نوشیدنی از طریق بازسازی پودر شیر خشک بی چربی و پس از استاندارد کردن ماده خشک (معادل 4 درصد) تهیه شد. شیر بازسازی شده، 30 دقیقه در دمای 85°C حرارت داده شد. سپس از کشت همزمان لاكتوباسیلوس اسیدوفیلوس و پروپیونیک‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمنانی بی به نسبت 1 به 4 و 1 به 8 به ترتیب (بر اساس تعداد سلول‌های زنده ریزسازواره‌های تلقیح شده)، استفاده شد. گرمخانه‌گذاری در دمای 35 ، 30 ، 30 و 40°C تا رسیدن به 4 pH انجام شد. ساختهای اسیدیته و پتانسیل احیا طی مدت زمان تخمیر اندازه‌گیری شدند.

۲-۳ اندازه‌گیری میزان اسید پروپیونیک

پس از هموژن کردن محصول توسط دستگاه اولتراتوراکس، 20 mL اسید سولفوریک $1/10$ مولار به 5 گرم نمونه تهیه شده

بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک نوشیدنی شیری
سطح معنی دار 0.05 از نرم افزار SPSS بر مبنای طرح عاملی کامل (فاکتوریل کامل) بررسی شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد.

۳- یافته‌ها و بحث

نتایج حاصل از ارزیابی آماری اطلاعات به دست آمده در خصوص قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس و پروپیونی‌بacteriyom فرئوذریچی‌بی زیرگونه شرمنانی‌بی در جدول ۱ و ۲ آورده شده است.

در 2 سرعت 5000 و (rpm) 15000 هموزن شد. سپس نوشیدنی شیری تخمیری در استوانه مدرج 100 میلی‌لیتری در دمای 4°C به مدت 7 روز نگهداری شد و میزان دوفاز شدن در محصول، طی این مدت اندازه گرفته شد. درصد سرمدهی طی دوره نگهداری یخچالی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد [۱۴]:

$$\text{درصد سرمدهی} = \frac{100}{(\text{کل ارتفاع نمونه} / \text{ارتفاع بخش سرم در سطح})}$$

۶-۲- ارزیابی آماری

وجود تفاوت معنی دار میان میانگین داده‌های حاصل از تیمارهای اعمال شده، با استفاده از آزمون ANOVA در

جدول ۱ نتایج حاصل از ارزیابی آماری اطلاعات به دست آمده در خصوص قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس

| منبع تغییرات | SS | D. F | Variance | F. value | F (table) $\alpha = 0.05$ | P. value |
|-------------------------|----------|------|-----------|----------|------------------------------|----------|
| دما | ۰/۰۸۵۶۰۷ | ۲ | ۰/۰۴۲۸۰۳۵ | ۰/۸۲۰۵۷۳ | ۳/۵۵ ^۱ | ۴/۳۲۶ |
| نسبت تلقیح | ۰/۴۸۴۴۹۶ | ۲ | ۰/۲۴۲۲۴۸۰ | ۴/۶۴۴۰۶۲ | ۳/۵۵ ^۱ | ۰/۷۶۴ |
| اندرکش دما و نسبت تلقیح | ۰/۰۹۷۹۴۸ | ۴ | ۰/۰۲۴۴۸۷۱ | ۰/۴۶۹۴۳۵ | ۲/۹۳ ^۲ | ۶/۲۴۱ |
| خطا | ۰/۹۳۸۹۳۴ | ۱۸ | ۰/۰۵۲۱۶۳۰ | - | - | - |
| مجموع | ۱/۶۰۶۹۸۵ | ۲۶ | - | - | - | - |

۱- جدول با درجه آزادی معادل 2 ، درجه آزادی خطای معادل ۱۸ و $\alpha=0.05$

۲- جدول با درجه آزادی معادل 4 ، درجه آزادی خطای معادل ۱۸ و $\alpha=0.05$

جدول ۲ نتایج حاصل از ارزیابی آماری اطلاعات به دست آمده در خصوص قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌بacteriyom فرئوذریچی‌بی زیرگونه شرمنانی‌بی

| منبع تغییرات | SS | D. F | Variance | F. value | F (table) $\alpha = 0.05$ | P. value |
|-------------------------|-----------|------|----------|----------|------------------------------|----------|
| دما | ۱۰/۰۹۶۱۹۶ | ۲ | ۵/۰۴۸۰۹۸ | ۷۴/۷۴۱۵۲ | ۳/۵۵ ^۱ | ۰/۰۴۷ |
| نسبت تلقیح | ۳/۲۹۸۵۱۹ | ۲ | ۱/۶۴۹۲۵۹ | ۲۴/۴۱۸۷۳ | ۳/۵۵ ^۱ | ۰/۱۴۵ |
| اندرکش دما و نسبت تلقیح | ۰/۶۵۱۲۰۴ | ۴ | ۰/۱۶۲۸۰۱ | ۲/۴۱۰۴۱ | ۲/۹۳ ^۲ | ۱/۲۱۶ |
| خطا | ۱/۲۱۵۷۳۴ | ۱۸ | ۰/۰۶۷۵۴۱ | - | - | - |
| مجموع | ۱۵/۲۶۱۶۵۲ | ۲۶ | - | - | - | - |

۱- جدول با درجه آزادی معادل 2 ، درجه آزادی خطای معادل ۱۸ و $\alpha=0.05$

۲- جدول با درجه آزادی معادل 4 ، درجه آزادی خطای معادل ۱۸ و $\alpha=0.05$

رشد نخواهد داشت. به علاوه کاهش سریع pH می‌تواند منجر به کابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی‌شود. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد، با افزایش دمای گرمخانه‌گذاری از ۳۰ به ۳۵ و ۴۰ در هر یک از نسبت‌های تلقیح شده، طول مدت گرمخانه‌گذاری از حدود سه روز به دو روز کاهش می‌یابد. در مطالعه انجام شده توسط اکینسی و گورل در سال ۲۰۰۸ نیز گزارش شد که فعالیت پروتولیتیک پایین گونه‌های پروپیونی‌باکتریوم منجر به رشد آهسته این باکتری‌ها می‌شود [۶]. به علاوه بر اساس نتایج مطالعات انجام شده دمای مناسب رشد لاکتوپاسیلوس/اسیدوفیلوس 30°C - ۴۰ - ۳۵ است (۱۵). در هر یک از ۳ سطح دمای به کار برده شده، بیشترین قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی در نسبت ریزسازواره‌های تلقیح شده معادل ۱ به ۴ به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد، قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی با افزایش نسبت تلقیح ۴:۱ به ۸:۱ کاهش می‌یابد. علت این موضوع می‌تواند ناشی از کمبود مواد مغذی مورد نیاز در محیط، به دلیل تلقیح مقادیر زیاد پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی باشد.

۳-۱-۳- قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی‌بلافاصله پس از تخمیر

قابلیت زنده‌مانی و ظرفیت رشد پروپیونی‌باکتریوم اسیدوفیلوس در جدول ۳ آورده شده است. بیشترین قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی در نوشیدنی تهیه شده با استفاده از نسبت لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس به پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی معادل ۱ به ۴ و گرمخانه‌گذاری در دمای 30°C به دست آمد. قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) با دمای گرمخانه‌گذاری ارتباط دارد، به‌طوری‌که با افزایش دمای گرمخانه‌گذاری از ۳۰ به 40°C در هر یک از نسبت‌های تلقیح شده، قابلیت زنده‌مانی این باکتری به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. علت این موضوع می‌تواند رشد سریعتر لاکتوپاسیلوس/اسیدوفیلوس در دمای 35°C و 40°C نسبت به دمای 30°C باشد که در نتیجه آن سرعت کاهش pH افزایش و طول مدت گرمخانه‌گذاری کاهش می‌یابد و پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌فرصت کافی برای

جدول ۳ قابلیت زنده‌مانی و نسبت بقاء رشد باکتری‌های پروپیوتیک در پایان دوره تخمیر*

| تیمار | نسبت دمای گرمخانه‌گذاری | تعداد اولیه باکتری‌های پروپیوتیک (log cfu/mL) | | | | تعداد نهایی باکتری‌های پروپیوتیک (log cfu/mL) | | | | نسبت بقاء رشد (GPI) | |
|--------|-------------------------|---|------|-------|-------------------|---|--------------------|-------|-------|---------------------|--|
| | | P** | A*** | P + A | P | A | P + A | P | A | P + A | |
| ۱ به ۲ | 30°C | ۷/۳۰ | ۷/۰۰ | ۷/۴۸ | ۷/۴۱ ^c | ۷/۶۹ ^b | ۷/۸۸ ^d | ۱/۲۸ | ۴/۹۰ | ۲/۵۳ | |
| ۱ به ۲ | 35°C | ۷/۳۰ | ۷/۰۰ | ۷/۴۸ | ۷/۰۸ ^c | ۷/۷۸ ^{ab} | ۸/۱۶ ^{bc} | ۰/۶۰ | ۶/۰۳ | ۴/۸۰ | |
| ۱ به ۲ | 40°C | ۷/۳۰ | ۷/۰۰ | ۷/۴۸ | ۶/۰۳ ^d | ۸/۰۱ ^{ab} | ۸/۰۲ ^{cd} | ۰/۰۵ | ۱۰/۲۰ | ۳/۵۰ | |
| ۱ به ۴ | 30°C | ۷/۶۰ | ۷/۰۰ | ۷/۷۰ | ۸/۶۰ ^a | ۸/۰۶ ^{ab} | ۸/۷۷ ^a | ۱۰/۰۰ | ۱۱/۵۰ | ۱۰/۰۵ | |
| ۱ به ۴ | 35°C | ۷/۶۰ | ۷/۰۰ | ۷/۷۰ | ۷/۴۲ ^c | ۸/۱۴ ^a | ۸/۲۲ ^{bc} | ۰/۶۶ | ۱۳/۸۰ | ۳/۴۰ | |
| ۱ به ۴ | 40°C | ۷/۶۰ | ۷/۰۰ | ۷/۷۰ | ۷/۰۶ ^c | ۸/۱۱ ^{ab} | ۸/۱۵ ^{bc} | ۰/۲۹ | ۱۲/۹۰ | ۲/۸۲ | |
| ۱ به ۸ | 30°C | ۷/۹۰ | ۷/۰۰ | ۷/۹۵ | ۸/۰۵ ^b | ۸/۰۸ ^{ab} | ۸/۳۷ ^b | ۱/۴۰ | ۱۲/۰۰ | ۲/۶۰ | |
| ۱ به ۸ | 35°C | ۷/۹۰ | ۷/۰۰ | ۷/۹۵ | ۷/۳۶ ^c | ۸/۱۶ ^a | ۸/۲۳ ^{bc} | ۰/۲۹ | ۱۴/۴۰ | ۱/۸۹ | |
| ۱ به ۸ | 40°C | ۷/۹۰ | ۷/۰۰ | ۷/۹۵ | ۶/۴۷ ^d | ۸/۱۲ ^{ab} | ۸/۱۴ ^{bc} | ۰/۰۴ | ۱۳/۲۰ | ۱/۵۶ | |

* میانگین‌هایی که در یک ستون با حروف متفاوت نشان داده شده‌اند، به طور معنی‌دار با یکدیگر متفاوت هستند ($p < 0.05$).

** پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی‌زیرگونه شرمانی بی


*** لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس

شرمانی بی تحریک نماید [۱۶]. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان اسید تولید شده توسط گونه‌های پروپیونی‌باکتریوم در روز دوم و در محیط حاوی لاکتات معادل میزان اسید تولید شده در روز هشتم و در محیط حاوی لاکتوز است [۱۷].

۳-۳ قابلیت زنده‌مانی ریزسازواره‌های تلقیح

شده طی نگهداری یخچالی

با توجه به این که نوشیدنی تهیه شده با استفاده از نسبت لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس به پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی- بی معادل ۱ به ۴ و گرمخانه‌گذاری در دمای 30°C حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک بود این نمونه به مدت ۲۸ روز در دمای 4°C نگهداری و در روزهای ۰، ۱۴، ۷، ۲۱ و ۲۸ قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروپیوتیک تلقیح شده، در نمونه تعیین شد. قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی و لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی شیری تخمیری حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک، طی ۲۸ روز نگهداری در دمای 4°C در شکل ۱ آورده شده است. قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی از $\log \text{cfu/mL}$ ۸/۶۶ در روز ۰ در روز 4°C در روز ۲۸ و قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس از $\log \text{cfu/mL}$ ۸/۲۹ در روز ۰ به $6/95$ در روز ۲۸ کاهش یافت. قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی طی ۲۸ روز نگهداری در دمای 4°C در هفته اول به طور قابل ملاحظه کاهش یافت و پس از سازگاری با این شرایط، کاهش قابل ملاحظه در قابلیت زنده‌مانی این ریزسازواره مشاهده نشد.



شکل ۱ قابلیت زنده‌مانی پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی و لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس طی ۲۸ روز نگهداری در دمای 4°C

۲-۳ قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس

اسیدوفیلوس بلافالاصله پس از تخمیر

همان‌طورکه در جدول ۳ مشخص است، بیشترین تعداد زنده لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی تهیه شده با استفاده از نسبت لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس به پروپیونی‌باکتریوم 35°C مشاهده شد. در نسبت ثابت ریزسازواره‌های تلقیح شده، بیشترین قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در دمای 35°C به دست آمد. افزایش نسبت پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی اثر منفی بر قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس نداشت که همانند نتایج مطالعه اکینسی و گورل در سال ۲۰۰۸ [۶] نشان دهنده عدم تداخل فعالیت گونه‌های پروپیونی‌باکتریوم با رشد باکتری‌های آغازگر لاتکنیک است. بلکه افزایش نسبت پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی منجر به افزایش جزئی در قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس شد. نتایج مطالعه لیو و مون (۱۳۸۲) نشان داد، کشت مخلوط لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس و پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی منجر به افزایش میزان رشد هر دو ریزسازواره و قابلیت زنده‌مانی بالاتر لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس می‌شود. به طوری که، تعداد سلول‌های زنده لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در کشت مخلوط لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس و پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی $1/4$ برابر کشت خالص لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس است. در این مطالعه گزارش شد، تولید CO_2 توسط پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی منجر به تحریک رشد لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس می‌شود [۱۶]. نتایج مطالعه انجام شده توسط مرتضویان (۲۰۰۸) نیز نشان داد افزودن گاز CO_2 تا حدود ۰/۴ درصد (وزنی / حجمی) نه تنها اثر سوء بر رشد پروپیوتیک‌ها ندارد بلکه بقای آن‌ها را نیز در مواردی افزایش CO_2 می‌دهد. همچنین در این مطالعه مشاهده شد افزودن گاز CO_2 اثر مثبت بیشتری بر بقای لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به بیفیا-پاکتریوم دارد [۱۴]. به علاوه، تولید مقادیر بالای لاکتات توسط لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس می‌تواند رشد پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه شرمانی بی و تولید اسید توسط این ریزسازواره را در کشت مخلوط لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس و پروپیونی‌باکتریوم فرئودنریچی بی زیرگونه

طی نگهداری نوشیدنی تهیه شده در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ ۴، دو فاز در استوانه مدرج قابل رویت بود: فاز شفاف رویی و فاز کدر قرار گرفته در قسمت پایین استوانه مدرج. نتایج به دست آمده نشان داد با افزایش سرعت هموژنیزاسیون از 5000 rpm به 15000 rpm میزان دوفاز شدن افزایش می‌یابد. با افزایش بیشتر سرعت هموژنیزاسیون با از هم گسیختگی درشت مولکول‌های کلئیدی موجود در شیر، سرعت ترسیب افزایش می‌یابد. فرآیند سرمدهی شامل دو رویداد هم‌زمان رسوب تدریجی فاز پراکنده و جداشدن بخش سرم به سطح است. هرچه ذرات تشکیل دهنده یک پراکنش (دیسپرسیون) ریزتر باشند، چگالی نسبی هر یک از آن‌ها نسبت به فاز آبی در قیاس با وضعیتی که این ذرات به یکدیگر می‌پیوندند و فضاهای میان‌بافتی شامل فاز آبی در ساختار توده‌های انبوه شده در آن‌ها پدید می‌آید، بیشتر است. تیمارهای همگن شده به سبب ریزتر شدن قابل توجه ذرات، سرعت سرمدهی به مراتب بیشتری نسبت به تیمارهای همگن نشده دارند زیرا در تیمارهای همگن نشده ساختارهای توده شکل و کم‌چگالت، رسوب کمتر آن‌ها را نتیجه می‌دهد. در مطالعه انجام شده توسط مرتضویان (۲۰۰۸) نیز مشاهده شد تیمارهای همگن شده به سبب ریزتر شدن قابل توجه ذرات، سرعت سرمدهی به مراتب بیشتری نسبت به تیمارهای همگن نشده دارند [۱۴].


۴- نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب‌ترین دما جهت رشد پروپیونیک‌باکتریوم فرئوندریچی‌بی زیرگونه شرمنانی‌بی و لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در این محصول، به ترتیب 30°C و 25°C است. بیشترین قابلیت زنده‌مانی پروپیونیک‌باکتریوم فرئوندریچی‌بی زیرگونه شرمنانی‌بی و لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس به پروپیونیک‌باکتریوم فرئوندریچی‌بی معادل ۱ به ۴ و ۱ به ۸ به ترتیب، به دست آمد. قابلیت زنده‌مانی هیچ یک از باکتری‌های تلقیح شده، در پایان نگهداری یخچالی به کمتر از $10^{\text{cfu/mL}}$ کاهش نیافت. بنابراین نوشیدنی شیری تهیه شده در گروه محصولات پروپیوتیک قرار گیرد زیرا سطح پیشنهادی از طرف صنایع تولید کننده محصولات پروپیوتیک $10^{\text{cfu/g}}$ سلول زنده این باکتری حسی با استفاده از آزمون هدونیک نشان داد، نوشیدنی تهیه

نتایج مطالعه انجام شده توسط پارکس و همکاران (۱۹۶۷) نیز نشان داد، گونه‌های پروپیونیک‌باکتریوم قادر به رشد در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ ۷/۲ و کمتر می‌باشد [۱۸]. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، قابلیت زنده‌مانی لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس طی ۲۸ روز نگهداری یخچالی، در هفته آخر به طور قابل ملاحظه کاهش می‌یابد. علت کاهش قابل ملاحظه لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس در هفته آخر می‌تواند ناشی از تشدید اثر مهارکنندگی اسیدهای آلی تولید شده در محصول در اثر کاهش pH، طی ۲۸ روز نگهداری یخچالی باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، اثر مهارکنندگی اسیدهای آلی بر حسب pH، نوع و غلظت اسید، نوع سویه و فاز رشد باکتریابی متفاوت است [۱۹ و ۲۰]. نتایج مطالعه لیند و همکاران در سال ۲۰۰۵ نشان داد اسید پروپیونیک از خاصیت مهارکنندگی بیشتری نسبت به اسید استیک و لاکتیک برخوردار است. همچنین اثر مهارکنندگی اسیدهای آلی با کاهش pH، به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. (۲۱). قابلیت زنده‌مانی هیچ یک از باکتری‌های پروپیوتیک تلقیح شده، در پایان نگهداری یخچالی به کمتر از $10^{\text{cfu/mL}}$ کاهش نیافت. بنابراین نوشیدنی شیری تهیه شده در گروه محصولات پروپیوتیک قرار گیرد زیرا سطح پیشنهادی از طرف صنایع تولید کننده محصولات پروپیوتیک $10^{\text{cfu/g}}$ سلول زنده این باکتری- هاست [۲۲].

۴-۳- میزان دوفاز شدن

شکل ۲ میزان دوفاز شدن نوشیدنی شیری حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک را در دو سرعت متفاوت هموژنیزاسیون (a: 5000 rpm و b: 15000 rpm) نشان می‌دهد.



شکل ۲ درصد ترسیب نوشیدنی لبنی حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک در ۲ سرعت متفاوت هموژنیزاسیون (a: 5000 rpm و b: 15000 rpm)

- [11] Tharmaraj, N. and Shah, N.P., 2003. Selective Enumeration of *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacteria*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus*, and *Propionibacteria*. *J. Dairy Sci.* 86: 2288-2296.
- [12] Lourens-Hattingh, A., Viljoen, B.C., 2001. Yogurt as probiotic carrier food (Review). *Int Dairy J.* 11: 1-17.
- [13] Mortazavian, A.M., Khosrokhavar, R., Rastegar, H., Mortazaei, G.R., 2010. Effects of dry matter standardization order on biochemical and microbiological characteristics of doogh (Iranian fermented milk drink). *Ital. J. Food Sci.* 22(1): 98-104.
- [14] Mortazavian, A.M., 2008. Effects of fundamental formulating and process factors on qualitative aspects of probiotic Doogh. PhD Diss. Univ. Tehran. [in Persian]
- [15] Gomes, A.M.P., Malcata, F.X., 1999. *Bifidobacterium* spp. and *Lactobacillus acidophilus*: biological, biochemical, technological and therapeutical properties relevant for use as probiotic bacteria. *Trends Food Sci. Technol.* 10: 139-157.
- [16] Liu, J.A.P., Moon, N.J., 1982. Commensalistic interaction between *Lactobacillus acidophilus* and *Propionibacterium shermanii*. *Appl. Environ. Microbiol.* 44(3): 715-722.
- [17] El-Hagarawy, I.S., Slatter, W.L., Harper, W.J., 1957. Organic acid production by propionibacteria. I. Effect of strains, pH, carbon source, and intermediate fermentation products. *J. Dairy Sci.* 10(56): 579-587.
- [18] Parks, H.S., Reinbold, G.W., Hammond, E.G., Clark, W.S., 1967. Growth of Propionibacteria at low temperatures. *J. Dairy Sci.* 50(4): 589-591.
- [19] Cheung, H.N.B., Huang, G.H., Yu, H., 2010. Microbial-growth inhibition during composting of food waste: Effects of organic acids. *Bioresour. Technol.* 101: 5925-5934.
- [20] Sundberg, C., Jonsson, H., 2005. Process inhibition due to organic acids in fed-batch composting of food waste – influence of starting culture. *Biodegradation*. 16: 205-213.
- [21] Lind, H., Jonsson, H., Schnurer, J., 2005. Antifungal effect of dairy propionibacteria—contribution of organic acids. *Int. J. Food Microbiol.* 98: 157-165.
- [22] Chandan, R.C., 1999. Enhancing market value of milk by adding cultures. *J. Dairy Sci.* 82: 2245-2256.

شده حاوی بیشترین میزان اسید پروپیونیک در مقایسه با سایر نوشیدنی‌های تهیه شده از مطابقیت بیشتری برخوردار است.

۵- منابع

- [1] Zhang, A., Yang, S., 2009. Propionic acid production from glycerol by metabolically engineered *Propionibacterium acidipropionici*. *Process Biochemistry*. 44: 1346-1351.
- [2] Leblance, J.G., Rutten, G., Bruinenberg, P., Sesma, F., Savoy de Giori, G., Smid, E.J., 2006. A novel dairy product fermented with *Propionibacterium freudenreichii* improves the riboflavin status of deficient rats. *Nutrition*. 22: 645-651.
- [3] Quesada-Chanto, A., Schmid-Meyer, A.C., Schroeder, A.G., Carvaiho-Jonas, M.F., Blanco, I., Jonas R., 1998. Effect of oxygen supply on biomass, organic acids and vitamin B12 production by *Propionibacterium shermanii*. *World J. Microbiol. Biotechnol.* 14: 843-846.
- [4] Bougle, D., Vaghefi-Vaezzadeh, N., Roland, N., Bouvard, G., Arhan, P., Bureau, F., Neuville, D., Maubois, J.L., 2002. Influence of short-chain fatty acids on iron absorption by proximal colon. *Scand. J. Gastroenterol.* 37: 1008-1011.
- [5] Trinidad, T.P., Wolever, T.M., Thompson, L.U., 1996. Effect of acetate and propionate on calcium absorption from the rectum and distal colon of humans. *Am. J. Clin. Nutr.* 63: 754-758.
- [6] Ekinci, F.Y., Gurel, M., 2008. Effect of using propionic acid bacteria as an adjunct culture in yogurt production. *J. Dairy Sci.* 91: 892-899.
- [7] Deming, C., Morand, C., Levrat, M.A., Besson, C., Moundras, C., Remesy, C., 1995. Effect of propionate on fatty acid and cholesterol synthesis and on acetate metabolism in isolated rat hepatocytes. *Br. J. Nutr.* 74: 209-219.
- [8] Hara, H., Haga, S., Aoyama, Y., Kiriyama, S., 1999. Short chain fatty acids suppress cholesterol synthesis in rat liver and intestine. *J. Nutr.* 129: 942-948.
- [9] Deutsch, S.M., Falentin, H., Dols-Lafargue, M., Lapointe, G., Roy, D., 2008. Capsular exopolysaccharide biosynthesis gene of *propionibacterium freudenreichii* subsp. *Shermanii*. *Int. J. Food microbiol.* 125: 252-258.
- [10] Gorret, N., Maubois, J.L., Ghoul, M., Engasser, J.M., 2001. Exopolysaccharide production by *Propionibacterium acidipropionicii* on milk microfiltrate. *J. Appl. Microbiol.* 90: 779-787.

Study of the microbiological characteristics of fermented dairy probiotic beverage containing propionic acid after fermentation and during cold storage

Farhadi, S. H. ¹, Khosravi-Darani, K. ^{2 *}, Mashayekh, M. ³, Mortazavian, A. M. ⁴,
Mohammadi, A. ⁵, Shahraz, F. ⁶

1- Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

2- National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Sciences and Food
Technology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

3- Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

4- Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

5- Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

6- Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

(Received:90/1/28 Accepted:90/12/7)

The objective of this research was to produce fermented dairy beverage with *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *shermanii* and study the microbiological characteristics immediately after fermentation and during cold storage. In this study, impact of two process variables of incubation temperature and inoculation ratio on microbiological characteristics was studied by full factorial design. For the preparation of the fermented dairy beverage, a mixed culture of *Lactobacillus acidophilus* and *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *shermanii* was grown at the ratio of 1:2, 1:4 and 1:8 and incubation was performed at 30, 35 and 40°C until the pH reached 4 ± 0.1 . Cell count of *L. acidophilus* was conducted on MRS Agar and incubation at 37 °C. Enumeration of *P. freudenreichii* ssp. *shermanii* was done on sodium lactate agar (NaLa agar) medium and incubation at 30 °C. In the most suitable condition for propionic acid production, profile of viability of microorganisms was determined in intervals of 0, 7, 14, 21 and 28 days. Also, phase separation of produced beverage was studied during the first week of storage at 4°C. The maximum viable cell count of *P. freudenreichii* ssp. *shermanii* was occurred by inoculation ratio of 1 to 4 and incubation temperature of 30 °C. There was an adverse and significant ($P < 0.05$) relationship between viability of *P. freudenreichii* ssp. *shermanii* and incubation temperature. The maximum cell count of *L. acidophilus* was observed in a mixed culture of *L. acidophilus* and *P. freudenreichii* ssp. *shermanii* at ratio of 1 to 8 and incubation temperature of 35°C. Considerable decreased cell counts of *P. freudenreichii* ssp. *shermanii* and *L. acidophilus* were obtained during the first and the last weeks of cold storage, respectively.

Key words: Fermented dairy beverage, *Lactobacillus acidophilus*, Microbiological characteristics, Probiotic, *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *shermanii*.

* Corresponding Author E-Mail address: kiankh@yahoo.com