

## مدل‌سازی اثر افزودن صمغ فارسی و پودر تفاله هویج بر ویژگی‌های بینایی دونات با استفاده از روش سطح پاسخ

مهران نوری<sup>۱\*</sup>، بهزاد ناصحی<sup>۲</sup>، سامان آبدانان مهدی‌زاده<sup>۳</sup>

۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۲- دانشیار گروه‌مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۳- استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

(تاریخ دریافت: ۹۴/۰۴/۱۳ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۷/۱۳)

### چکیده

در این پژوهش اثر افزودن صمغ فارسی و پودر تفاله هویج به فرمولاسیون دونات به منظور تهیه یک فرآورده کم‌چرب با محتوی فیبری بالا و ویژگی‌های حسی مطلوب با استفاده از شیوه سطح پاسخ و با یک طرح چرخش‌پذیر مرکب مرکزی مورددیررسی قرار گرفت. متغیرهای مستقل صمغ فارسی (۰-۱۵٪)، پودر تفاله هویج (۰-۱۵٪) و آب (۳۸-۵۳٪) بود. متغیرهای وابسته شامل ویژگی‌های بافت سطحی، شاخص‌های رنگ پوسته، ویژگی‌های ساختار مغز و ویژگی‌های حسی دونات بود. نتایج نشان داد با افزودن پودر تفاله هویج به فرمولاسیون، زبری سطح نمونه‌های دونات افزایش یافته و ویژگی‌های ساختار مغز افت می‌کنند ( $p < 0.05$ ). آب فرمولاسیون دارای یک تأثیر منفی درجه دوم معنی‌داری بر ساختار مغز دونات بود ( $p < 0.05$ ). همچنین یک اثر مقابل توجه بین آب و پودر تفاله هویج بر ویژگی‌های ساختار مغز مشاهده شد ( $p < 0.05$ ). با افزایش سطح پودر تفاله هویج و کاهش سطح آب فرمولاسیون، شاخص  $L^*$  سطح نمونه‌ها کاهش و شاخص  $a^*$  سطح آنها افزایش یافت ( $p < 0.05$ ). همچنین نتایج ارزیابی حسی نشان داد با افزودن سطوح بالاتر پودر تفاله هویج نمرات پذیرش مصرف‌کننده کاهش معنی‌دار یافت ( $p < 0.05$ ). نتایج آنالیز همبستگی بمحبوبی نشان داد شاخص‌های بینایی، همبستگی قوی ( $p < 0.05$ ) با ویژگی‌های حسی دونات داشتند که بیان‌کننده توانایی تکنیک‌های پردازش تصویر در پیش‌بینی پذیرش مصرف‌کننده بود. شیوه سطح پاسخ نشان داد دونات با فرمولاسیون بهینه شامل ۱/۱۷٪ صمغ فارسی، ۷/۴۴٪ پودر تفاله هویج و ۴۸/۲۹٪ آب دارای محتوی فیبری بالا، محتوی روغن کاهش یافته و ویژگی‌های حسی قابل قبولی بود.

**کلید واژگان:** ماشین بینایی، ساختار مغز، بافت سطحی، فیبرهای خوراکی، دونات

\*مسئول مکاتبات: mnouri1366@gmail.com

ظاهری فرآورده‌های غلات، رنگ و خصوصیات ساختار مغز<sup>۲</sup> مانند تعداد، مساحت و دانسته سلول‌های گاز و تخلخل بافت مغز است که طی سال‌های اخیر به خوبی توسط تکنیک‌های ماشین بینایی و پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۹-۱۵]. از دیگر مشخصه‌های ظاهری مواد غذایی بافت سطحی<sup>۳</sup> این مواد است که بیان‌کننده آرایش فضایی سطوح خاکستری پیکسل‌های تصویر است [۱۶]. سطح ماده غذایی که تغییرات شیمیایی و فیزیکی اولیه ماده در آن رخ می‌دهد، اولین مشخصه‌ای از جسم است که توسط مصرف‌کننده درک می‌شود. از این‌رو، درک و پیش‌بینی تأثیر مواد سازنده، ترکیب شیمیایی، فرآیندهای تکنولوژیکی و همچنین انبارهایی بر ویژگی‌های سطحی مواد غذایی ضروری می‌باشد [۱۷].

دونات‌ها فرآورده‌ایی بر پایه آرد گندم‌اند که به دلیل فرآیند تولید آن‌ها (سرخ کردن به شیوه غوطه‌وری) از ویژگی‌های حسی مطلوبی برخوردار است، با این حال طی سرخ کردن مقدار زیادی روغن به خود جذب می‌کنند [۱۸]. همچنین به دلیل استفاده آرد تصفیه‌شده گندم، دونات‌ها از مقادیر پایین ترکیبات مفیدی از جمله فیبرهای خوراکی برخوردارند [۱۹]، بنابراین در این پژوهش صمع فارسی<sup>۴</sup> (PG) به عنوان یک منع ارزان و فراوان در کشور [۲۰]، به منظور کاهش جذب روغن و پودر تفاله هویج<sup>۵</sup> (CPP) که یک منع سرشار از فیبرهای خوراکی و یک محصول جانبی<sup>۶</sup> کارخانجات تولید آب میوه است [۲۱]، به منظور بهبود ویژگی‌های تغذیه‌ای به فرمولاسیون دونات افروده شد. با این وجود، علیرغم مهم بودن ویژگی‌های بافتی و تغذیه‌ای دونات، در این مطالعه تأثیر افروden صمع فارسی و پودر تفاله هویج بر روی ویژگی‌های ظاهری دونات مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت ویژگی‌های ظاهری در پذیرش مصرف‌کننده و تأثیر اجزاء فرمولاسیون ماده غذایی بر این ویژگی‌ها، هدف این پژوهش بررسی تأثیر منابع فیبری صمع فارسی و پودر تفاله هویج بر مشخصه‌های بینایی دونات با استفاده از شیوه سطح پاسخ<sup>۷</sup> و تکنیک‌های ماشین بینایی بود.

2. Crumb grain

3. Surface texture

4. Persian gum

5. Carrot pomace powder

6. Byproduct

7. Response surface methodology

## ۱- مقدمه

افزایش آگاهی‌ها نسبت به ویژگی‌های کیفی مواد غذایی، سبب بالا رفتن انتظار برای بهبود کیفیت این محصولات و لزوم بهبود سیستم‌های ناظارتی شده است [۱]. اگرچه مهم‌ترین شاخص‌های کیفی محصولات غذایی شامل ویژگی‌های تغذیه‌ای، شیمیایی، مکانیکی، سلامتی‌بخشی و حسی است، با این وجود، پذیرش محصول در درجه اول بستگی به ویژگی‌های ظاهری آن دارد؛ بهنحوی که یک محصول با ظاهری خوب توسط غالب مصرف‌کننده‌ها پذیرفته می‌شود [۲]. بنابراین ارزیابی ظاهری محصولات طی فرآیند تولید که می‌تواند به کمک مسئولین کنترل کیفی و کارکنان آموزش‌دیده انجام گیرد ضروری است. با این وجود بازرسی‌های کیفی توسط نیروی انسانی اغلب با خطا همراه بوده و مستلزم پرداخت هزینه‌های کارگری بالایی است [۳]. بنابراین استقرار سیستم‌های اندازه‌گیری و بازرسی ماشینی از جمله ماشین بینایی<sup>۸</sup> در خطوط تولید مواد غذایی ضروری به نظر می‌رسد. ماشین بینایی، شامل تصویربرداری، پردازش و آنالیز تصاویر است که می‌تواند سبب تسهیل ارزیابی سریع و غیر مخرب ویژگی‌های ظاهری محصولات غذایی شود [۴]. طی سال‌های اخیر بازرسی خودکار بر پایه فناوری ماشین بینایی به طور موقیت‌آمیزی برای ارزیابی حسی مواد غذایی و کشاورزی بکار گرفته شده است [۳]. کاندرارانته و همکاران (۲۰۰۷) از تکنیک‌های ماشین بینایی به خوبی در دسته‌بندی گوشت استفاده نمودند [۵]. همچنین کابرو و همکاران (۲۰۱۱) مزیت‌های به کارگیری تکنیک‌های ماشین بینایی را در بازرسی خودکار و ارزیابی کیفی میوه و سبزیجات را گزارش کردند [۶]. در پژوهشی دیگر گونزالز-بارون و باتلر (۲۰۰۸) نشان دادند تکنیک‌های پردازش تصویر و ماشین بینایی می‌توانند به خوبی در ارزیابی ویژگی‌های ساختار مغز نان بکار گرفته شوند [۷].

فرآورده‌های غلات از شروع شکل‌گیری تمدن‌های پشمی عمده‌ترین منابع غذایی جواع را تشکیل داده‌اند [۸]. ظاهر این محصولات یکی از ویژگی‌های مهم کیفی آن‌ها است که با طعم محصول همبستگی داشته و بر درک بینایی مصرف‌کننده و تصمیم او بر خرید محصول تأثیر بسزایی دارد [۳]. از جمله مشخصه‌های

1. Machine vision

### ۳-۲- تهیه دونات

برای تهیه دونات شکر، پودر شیر خشک بدون چربی، نمک و شورتینینگ در یک کاسه جدا با هم مخلوط و سپس تخم مرغ به این مخلوط اضافه شد. پس از افزودن آب به کاسه (طبق طرح آزمایشات بند ۸-۲) عصاره وانیل اضافه شد. با مخلوط مخمر و آب مخصوص آن ( $35^{\circ}\text{C}$ ) در یک ظرف جداگانه، سوسپانسیون مخمر تهیه و به مدت ۵ دقیقه نگه داشته شد. مخلوط آرد گندم و سطوح مختلف صمغ فارسی و پودر تفاله هویج (طبق طرح آزمایشات بند ۸-۲) در یک کاسه جداگانه با بیکینگ پودر مخلوط شده و به سایر اجزاء اضافه شد. سپس سوسپانسیون مخمر به مخلوط افروده و این مخلوط تا تشکیل یک خمیر مناسب ورز داده شد. در انتها خمیر به قطعاتی یکشکل به وزن تقریباً ۵۰ گرم بریده شد. قطعات خمیر پس از طی فرآیند تخمیر ( $27^{\circ}\text{C}$ ) به مدت ۳۰ دقیقه در یک سرخ کن (Moulinex, model F18-) حاوی روغن مخصوص سرخ کردنی (مخلوطی از روغن های آفتابگردان، پالم و سویا) (شرکت صنعتی بهشهر، تهران، ایران) سرخ شد ( $200 \pm 20^{\circ}\text{C}$  ثانیه). دونات ها پس از خنک شدن در دمای اتاق و بر روی دستمال های کاغذی در بسته های پلی اتیلنی کدگذاری شده بسته بندی شدند.

### ۴- آنالیز تصویر

تصویربرداری از نمونه های دونات ۱۲ ساعت پس از پخت همزمان با ارزیابی های حسی انجام شد. بررسی ویژگی های رنگی و ریخت شناسی نمونه ها با استفاده از یک سیستم آنالیز تصویر شامل یک دوربین تصویربرداری دیجیتال (Canon PowerShot SX60 HS, Japan Pentium(R) Dual-Core processor and Windows 7 Ultimate) انجام شد. تصویربرداری در یک فاصله ثابت  $30\text{ cm}^3 \times 100 \times 100$  و با نور پردازی با زاویه  $45^{\circ}$  درجه توسط لامپ های فلوئور سنتی) انجام شد. تصاویر سپس به محیط The MathWorks Inc., MATLAB R2014a (Natick, Mass, USA) منتقال داده و توسط این نرم افزار ویژگی های رنگی و ریخت شناسی استخراج شد.

## ۲- مواد و روش ها

### ۱-۲- مواد اولیه و فرمولاسیون دونات

نمونه های دونات بر اساس فرمولاسیون و دستور پخت مورد استفاده توسط ملیتو و فارکاس (۲۰۱۳) تهیه شدند [۲۲]. این فرمولاسیون شامل آرد گندم (۹٪ پروتئین) (شرکت آرد جنوب، خوزستان، ایران) (۱۰۰٪)، آب (۳۸٪) شورتینینگ (بهشهر، تهران، ایران) (۹٪)، تخم مرغ (۱۳٪)، آب برای تهیه سوسپانسیون مخمر (۱۳٪)، شکر (۷/۳٪) پودر شیر خشک بدون چربی (شرکت پگاه، خوزستان، ایران) (۷/۳٪)، مخمر خشک فعال (شرکت ناب مایه، شیمی، تهران، ایران) (۱/۶٪)، بیکینگ پودر (سهیل پودر، تهران، ایران) (۱/۶٪) و نمک (۱/۶٪) بود. همه افروزنی ها بر اساس نسبت وزنی وزنی آرد بود.

### ۲-۲- تهیه صمغ فارسی و پودر تفاله هویج

صمغ فارسی از درختان بادام کوهی واقع در شهرستان نورآباد لرستان در شهریور ۱۳۹۳ جمع آوری شد. فراکسیون های یکنونگ (سفید شفاف) پس از جداسازی توسط اتانول (۰/۹۶٪) شسته شد. Heraeus, model UT 5042 (Germany) این فراکسیون ها توسط آون (Moulinex, model 320, Spain) در دمای  $60^{\circ}\text{C}$  خشک شد. سپس صمغ ها توسط آسیاب آشپزخانه ای (Canon PowerShot SX60 HS, Japan Pentium(R) Dual-Core processor and Windows 7 Ultimate) در دمای  $500\text{ }\mu\text{m}$  شد. پودر حاصله در بسته های پلی اتیلن بسته بندی و در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  نگهداری شد. به منظور تهیه پودر تفاله هویج، پس از فرآیند آبمیوه گیری توسط یک دستگاه آبمیوه گیر (پارس خزر، مدل JC-700P، تهران، ایران) تفاله هویج توسط آون (Heraeus, model UT 5042, Germany) در دمای  $60^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۲ ساعت) خشک شد. تفاله خشک شده توسط دستگاه آسیاب (Moulinex, model 320, Spain) پودر و با الک با مش  $500\text{ }\mu\text{m}$  غربال شد. سپس پودر تفاله هویج در بسته های پلی اتیلن بسته بندی و در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  نگهداری شد.

## مدل‌سازی اثر افرودن صمع فارسی و پودر تفاله هویج...

پیشنهاد کردند [۲۷]. در این مطالعه، پس از انتقال تصاویر به محیط متلب، شاخص‌های ممان درجه دوم زاویه‌ای<sup>۷</sup> (ASM) یا انرژی<sup>۸</sup> (ENR)، تباین<sup>۹</sup> (CON)، همبستگی<sup>۱۰</sup> (COR)، همگنی<sup>۱۱</sup> (HOM) و انتروپی<sup>۱۲</sup> (ENT) (جدول ۱) بعنوان توصیف‌کننده بافت سطحی توسط الگوریتم ماتریس هم رخداد سطح خاکستری محاسبه شد [۱۷].

### ۶-۲- ارزیابی حسی

برای ارزیابی حسی نمونه‌های دونات از یک گروه ۱۵ نفره شامل ۵ زن و ۱۰ مرد از دانشجویان گروه صنایع غذایی کمک گرفته شد. نمونه‌های دونات بر اساس پذیرش ظاهر پوسته، ظاهر مغز، رنگ پوسته، آroma، بافت، طعم و مزه و پذیرش کلی در یک مقیاس هدونیک ۹ نقطه‌ای و نمره‌دهی از ۱ (دوست نداشتن شدید) تا ۹ (دوست داشتن شدید) مورد ارزیابی قرار گرفتند [۲۸].

### ۷-۲- آنالیز همبستگی

در این پژوهش، ارتباط بین شاخص‌های ظاهری و شاخص‌های حسی با استفاده از مقادیر ضربی همبستگی (r) که مقیاسی از رابطه خطی بین دو متغیر است مورد ارزیابی قرار گرفت. ضربی همبستگی با استفاده از رابطه (۱) و با استفاده از نرم‌افزار (SAS 9.1 Institute, Cary, NC)

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

در این رابطه  $x_i$  و  $y_i$  اندازه‌گیری متغیر  $X$  و  $Y$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) و همچنین  $\bar{x}$  و  $\bar{y}$  میانگین‌های نمونه  $X$  و  $Y$  می‌باشند.

### ۴-۱- رنگ دونات

برای تعیین رنگ پوسته نمونه‌ها از مدل رنگی CIE L\*a\*b\* (CIELAB) استفاده شد. آنچهایی که تصاویر در فضای رنگی RGB گرفته شده بود، عملیات تبدیل فضای رنگی، برای به دست آوردن شاخص‌های CIE L\*a\*b\* انجام شد. پس از عملیات تبدیل فضای رنگی سه شاخص L\*, a\* و b\* که بیان‌کننده مقدار روشنایی تصویر است، a\* که بیان‌کننده قرمزی (مقادیر مثبت) و سبزی (مقادیر منفی) بودن است تعیین شد [۲۳].

### ۴-۲- ساختار مغز دونات

به منظور بررسی ساختار مغز دونات از هر تیمار ۱۰ تصویر رنگی (RGB) (۲۴ بیتی) از مغز نمونه‌ها تهیه شد. تصاویر پس از انتقال به محیط متلب<sup>۱</sup>، توسط نرم‌افزار به فرم خاکستری (۸ بیتی) تبدیل شد. عملیات بخش‌بندی<sup>۲</sup> پس از بهبود تباین تصاویر بر روی یک ناحیه ۳ cm × ۳ cm از مرکز هر تصویر، با استفاده از الگوریتم اتسو<sup>۳</sup> صورت پذیرفت [۲۴]. در این پژوهش از دو شاخص دانسته سلول‌ها<sup>۴</sup> (تعداد سلول در cm<sup>۳</sup>) و مساحت سلول‌ها<sup>۵</sup> (mm<sup>۲</sup>) برای مطالعه ساختار مغز نمونه‌های دونات استفاده شد [۲۵, ۱۱].

### ۴-۳- بافت سطحی دونات

در این مطالعه از ماتریس هم رخداد سطح خاکستری<sup>۶</sup> (GLCM) برای محاسبه شاخص‌های بافت سطحی استفاده شد. در این روش اصول کار بر پایه محاسبات انجام شده بر روی هیستوگرام‌های درجه دوم تصاویر مقیاس خاکستری است. GLCM، یک ماتریس مرتعی است که اندازه آن منوط به بیشینه شدت خاکستری پیکسل‌های موجود در تصویر است. این ماتریس i, j بیان‌گر تعداد رخداد یک زوج پیکسل، در یک عنصر ماتریس (P<sub>ij</sub>) با مقادیر شدت خاکستری i و j در فاصله مکانی ویژه δ در امتداد یک مسیر معین d (افقی، عمودی یا قطری) در یک تصویر است [۲۶]. هارلیک و همکاران (۱۹۷۳) برای اولین بار یک آنالیز کمی GLCM با ۱۴ توصیف‌کننده بافت سطحی را

- 7. Angular Second Moment
- 8. Energy
- 9. Contrast
- 10. Correlation
- 11. Homogeneity
- 12. Entropy

- 1. Matlab
- 2. Segmentation
- 3. Otsu algorithm
- 4. Cells density
- 5. Area of cells
- 6. Grey-level co-occurrence matrices

**Table 1** Extraction of textural features from GLCM.

descriptor	Formula	Description
Contrast	$CON = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \left( \sum_i \sum_j p(i,j) \right)$	Returns a measure of the intensity contrast between a pixel and its neighbor over the whole image. Contrast is 0 for a constant image
Correlation	$COR = \frac{\sum_i \sum_j (i-j) - \mu^2}{\sigma^2}$ $\mu = \sum_i \sum_j i p(i,j)$	Returns a measure of how correlated a pixel is to its neighbor over the whole image. Range = [-1 1] Correlation is 1 or -1 for a perfectly positively or negatively correlated image. Correlation is NaN for a constant image.
Energy	$ASM = \sum_i \sum_j p^2(i,j)$ $ENR = \sqrt{ASM}$	Returns the sum of squared elements in the GLCM. Range = [0 1] Energy is 1 for a constant image.
Homogeneity	$HOM = \sum_{i,j} \frac{p(i,j)}{1 +  i-j }$	Returns a value that measures the closeness of the distribution of elements in the GLCM to the GLCM diagonal. Range = [0 1] Homogeneity is 1 for a diagonal GLCM.
Entropy	$ENT = - \sum_i \sum_j p(i,j) \log(p(i,j))$	Entropy is a measure of statistical randomness, it is related to a measure of the image disorder.

i and j: row and column numbers in the GLCM matrix,  $\mu$  : means,  $\sigma$  : standard deviation,  $p(i,j)$  th entry in a normalised grey-level cooccurrence matrix.

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{i=1}^3 \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=i+1}^3 \beta_{ij} x_i x_j \quad (2)$$

در این رابطه  $Y$ ,  $\beta_0$ ,  $\beta_i$ ,  $\beta_{ii}$  به ترتیب پاسخ، ثابت معادله (عرض از مبدأ)، ضریب اثرات خطی، ضریب اثرات درجه دوم و ضریب اثرات متقابل می‌باشند. همچنین  $x_i$  و  $x_j$  سطوح متغیرهای غیر وابسته می‌باشند. با استفاده از آنالیز واریانس<sup>۱</sup> و بر اساس شاخص  $p$ -value معنی‌داری مدل‌ها و عبارات معادله مورد بررسی و فاکتورهای غیر معنی‌دار مشخص شد. همچنین شاخص‌های عدم تناسب<sup>۲</sup>، ضریب تعیین<sup>۳</sup> ( $R^2$ )، ضریب تعیین تعدیل شده ( $adj-R^2$ ) و شاخص دقیقت کفايت<sup>۴</sup> به منظور بررسی کفايت مدل محاسبه شد [۳۰]. در این مطالعه نرمافزار دیزاین اکسپریت<sup>۵</sup> ۷.۰.۰ (Stat-Ease Inc., Minneapolis, MN,) برای طراحی و آنالیز آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.

## ۸-۲-۲- طراحی آزمایشات و آنالیز داده‌ها

برای طراحی آزمایشات به منظور دستیابی به سطوح بهینه صمغ فارسی ( $X_1$ ), پودر تفاله هویج ( $X_2$ ) و آب ( $X_3$ ) برای تولید یک دونات کم‌چرب با محتوی فیبری بالا و موردنیزیرش مصرف‌کننده از شیوه سطح پاسخ (RSM) و یک طرح گردش پذیر مرکب مرکزی<sup>۶</sup> (CCRD) با ۳ فاکتور و ۵ سطح استفاده شد [۲۹]. دامنه هر یک از متغیرهای مستقل طبق آزمایشات مقدماتی تعیین شد (جداول ۲). ویژگی‌های رنگی ( $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$ ), ویژگی‌های بافت سطحی (انرژی، تباین، همبستگی، همگنی و انتروپی) و ویژگی‌های ساختار مغز (مساحت و دانسیته سلول‌ها) و همچنین ویژگی‌های حسی شامل، ظاهر پوسته، ظاهر مغز، رنگ پوسته، آروما، بافت، طعم و مزه و پذیرش کلی که بهترین توصیف را از ویژگی‌های ظاهری و حسی دونات دارند به عنوان متغیرهای وابسته (پاسخ) در نظر گرفته شد. پس از انجام آنالیز رگرسیون مدل‌های چندجمله‌ای درجه دوم برای هر یک از پاسخ‌ها برآزیده شد (رابطه ۲).

2. ANOVA

3. Lack-of-fit

4. Coefficient of determination

5. Adequate precision

6. Design Expert

1. Central composite rotatable design

**Table 2** Experimental range and values of the independent variables in the central composite design.

Independent variables	symbol	Levels	-1.682	-1	0	1	1.682
Persian gum (%)	X <sub>1</sub>	0.00	0.30	0.75	1.20	1.50	
Carrot pomace powder (%)	X <sub>2</sub>	0.00	3.04	7.50	11.96	15.00	
Water (%)	X <sub>3</sub>	38.00	41.04	45.50	49.96	53.00	

کفايت مدل‌های معنی‌دار برای پیش‌بینی، به دلیل رضایت‌بخش بودن  $R^2$  بالا بود [۳۳]. مقادیر بالای شاخص دقت کفايت مطلوب می‌باشند، بطوريکه مقادیر بالای ۴ نشان‌دهنده عملکرد مناسب مدل در پیش‌بینی است [۳۴]. در اين مطالعه، به استثنای شاخص انتروپي، ساير مدل‌های پیشنهاد شده داراي دقت کفايت بالاتر از ۴ بودند.

### ۲-۳ - ساختار مغز دونات

در اين پژوهش به منظور محاسبه شاخص‌های ساختار مغز، مراحل پردازش تصویر شامل انتقال تصاویر رنگی به محیط متلب، تبدیل تصاویر از فرم رنگی (۲۶ بیتی) به فرم خاکستری (۸ بیتی)، بهبود تباین تصاویر مقیاس خاکستری و در انتهای بخش‌بندی تصاویر و تبدیل تصاویر ۸ بیتی به باينری <sup>۱</sup> بود (شکل ۱). فييرهای غير محلول سبب ايجاد نقاط گستنگی در ساختار خمير و تسهيل خروج گاز از آن می‌شوند [۳۵]. بر اين اساس تأثیر منفی پودر تفاله هویج بر مساحت و دانسيته سلول‌ها می‌تواند ناشی وجود فييرهای نامحلول باشد که بخش عمدۀ فييرهای موجود در آن را تشکيل می‌دهند [۳۶]. باگرالی و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند جايگزینی آرد گندم با ۱۵ درصد يا سطوح بيشتر از نشاسته مقاوم سبب کاهش حجم و تعداد و مساحت سلول‌های گاز می‌شود [۳۷]. در شکل ۲ اثرات درجه دوم و متقابل افزودن پودر تفاله هویج و آب بر ويژگی‌های ساختار مغز نشان داده شده است. همان‌طور که قابل مشاهده است افزودن آب تأثير منفی درجه دوم معنی‌داری بر ويژگی‌های ساختار مغز دونات داشت ( $p < 0.05$ ).

### ۹-۲ - بهينه‌سازی فرمولاتيون و اعتبار سنجي مدل

يك روش مفيد برای بهينه‌سازی پاسخ‌های چندگانه استفاده از تکnik بهينه‌سازی همزمان و توابع مطلوبیت<sup>۱</sup> است [۳۱]. بنابراین با استفاده از ابزار بهينه‌سازی عددی نرم‌افزار دیزاین اکسپرت پیشینه سطح صمغ فارسی (متغير مستقل)، بیشینه سطح پودر تفاله هویج (متغير مستقل) و بیشینه پذيرش کلی مصرف‌کننده (متغير وابسته) در نظر گرفته شد. سپس فرمولاتيونی با بالاترین مقدار مطلوبیت به عنوان بهينه انتخاب شد. به منظور اعتبار سنجي مدل، دونات‌های با فرمولاتيون بهينه تهيه و پس انجام آزمایشات مقادير تجربی به دست آمده با مقادير برآورد شده توسط آزمون *t*-test در سطح احتمال ۵ درصد توسط نرم‌افزار SAS 9.1(SAS Institute, Cary, NC) با يكديگر مقایسه شد.


### ۳ - نتایج و بحث

#### ۱-۳ - برازش مدل

در اين مطالعه با استفاده از شيوه سطح پاسخ، بيست آزمون طراحی و سپس آناليز واريанс و رگرسيون به منظور برازش مدل‌های سطح پاسخ و بررسی معنی‌داری فاکتورهای مدل انجام شد (جداول ۳-۶). نتایج آناليز واريанс نشان داد به استثنای شاخص‌های همگنی، <sup>a</sup> و آroma برای ساير پاسخ‌ها مدل چندجمله‌ای درجه دوم معنی‌دار ( $p < 0.05$ ) بود. همچنین شاخص عدم برازش که معياری از كيفيت برازش مدل‌ها است و دقت مدل در پیش‌بینی تغييرات را نشان می‌دهد [۳۲]، غير معنی‌دار ( $p > 0.05$ ) بود. همچنین آناليز آماری نشان داد که

2. Binary


1. Desirability functions



**Fig. 1.** A typical digital image of donut crumb from a  $3 \times 3 \text{ cm}^2$  field of view: (a) the original image, (b) the grey-level image, (c) the contrast adjusted image, (d) the binarized image.

غلظت‌های بالای آب افزودن پودر تفاله هویج اثر مخرب کمتری بر ساختار مغز داشت که نشان از وجود یک اثر متقابل معنی‌دار (p < 0.05) بین آب و پودر تفاله هویج بر ویژگی ساختار مغز دونات بود.

با افزایش سطح آب فرمولاسیون تا یک مقدار معین ویژگی های ساختار مغز بهبود یافت ولی با افزایش بیشتر آب فرمولاسیون ویژگی های ساختار مغز افت پیدا نمود که دلیل آن می تواند کاهش ویسکوزیته و تسهیل خروج هوا از بافت فرآورده باشد. همچنین همان طور که در شکل ۲ قایل مشاهده است در



**Fig 2** Response surface plots for the effects of independent variables on responses variables: (a) cell density, (b) area of cell.

معنی دار شاخص  $L^*$  و کاهش معنی دار شاخص  $a^*$  شد. این اثر می‌تواند ناشی از رقیق شدن پودر تفاله هویج و سایر اجزاء خمیر با افایش، محتمل آب فرمولاسیون باشد.

۳-۴- سطحی افت دو نات

در این مطالعه، به منظور بررسی شاخص‌های بافت سطحی، میانگین مقادیر محاسبه شده در چهار جهت (۹۰، ۴۵ و ۱۳۵ درجه) و با در نظر گرفتن یک پیکسل برای یک فاصله در الگوریتم GLCM استفاده شد.

رنگ یوسته دونات

افزودن پودر تفاله هویج به فرمولاسیون دونات سبب کاهش معنی دار شاخص<sup>\*</sup> L و افزایش معنی دار شاخص های<sup>\*</sup> a و<sup>\*</sup> b شد (۰/۰۵ p). افزایش قرمزی رنگ پوسته را می توان ناشی از محتوی کاروتین پودر تفاله هویج دانست [۳۸]. کومار و کوما (۱۱) نشان دادند که با افزودن تفاله هویج به فرمولاسیون یک نوع شیرینی شاخص<sup>\*</sup> L کاهش و شاخص<sup>\*</sup> a افزایش می باید. همچنین افزودن آب به فرمولاسیون دونات سبب افزایش [۳۹]

**Table 3** Actual levels of independent variables and observed values of responses of visual properties.

Trial	PG (%)	CPP (%)	Water (%)	Energy	Contrast	Correlation	Homogeneity	Entropy	Cell density	Area of cell	L*	a*	b*
1	0.30	11.96	49.96	0.32	0.3	0.64	0.87	6.05	304.49	139.99	74.43	27.53	36.34
2	0.75	7.50	53.00	0.51	0.16	0.61	0.9	5.96	295.27	130.88	83.38	13.70	42.38
3	0.75	7.50	45.50	0.57	0.16	0.66	0.92	5.75	454.78	195.86	74.01	25.13	40.70
4	0.30	3.04	49.96	0.65	0.09	0.64	0.96	5.95	457.36	188.14	84.28	14.45	40.25
5	0.75	7.50	45.50	0.56	0.18	0.64	0.92	5.71	411.71	181.74	76.53	24.54	44.08
6	0.75	7.50	45.50	0.57	0.13	0.62	0.93	5.65	394.13	177.29	77.02	22.02	46.10
7	0.30	3.04	41.04	0.79	0.05	0.7	0.98	5.5	486.60	189.72	77.25	26.39	41.40
8	1.20	3.04	49.96	0.69	0.08	0.64	0.97	5.81	478.18	195.8	85.89	13.44	38.75
9	0.75	0.00	45.50	0.74	0.11	0.66	0.93	5.32	495.82	198.61	85.30	11.40	45.79
10	0.00	7.50	45.50	0.56	0.16	0.65	0.9	5.76	340.58	153.06	75.02	26.50	46.78
11	0.30	11.96	41.04	0.3	0.27	0.67	0.86	5.5	259.04	116.48	70.60	29.44	25.95
12	1.20	3.04	41.04	0.8	0.04	0.69	0.96	5.46	499.38	202.95	78.02	26.01	40.79
13	1.50	7.50	45.50	0.59	0.15	0.61	0.93	5.49	402.67	169.84	78.51	22.52	44.88
14	0.75	7.50	45.50	0.55	0.18	0.65	0.91	5.51	435.91	190.57	77.53	21.60	45.54
15	1.20	11.96	41.04	0.32	0.26	0.65	0.88	5.58	271.98	133.01	72.10	28.54	24.35
16	0.75	7.50	45.50	0.58	0.16	0.61	0.93	5.64	443.82	184.7	76.00	24.93	45.88
17	0.75	15.00	45.50	0.32	0.26	0.62	0.88	5.71	261.42	120.85	65.21	27.54	33.14
18	0.75	7.50	38.00	0.58	0.15	0.68	0.92	5.59	337.22	131.68	77.97	20.58	40.60
19	0.75	7.50	45.50	0.4	0.21	0.65	0.9	5.71	423.09	183.22	75.57	25.53	40.07
20	1.20	11.96	49.96	0.34	0.28	0.6	0.88	5.94	325.02	150.51	73.91	28.52	37.79

همبستگی پایین‌تر و انتروپی، تباين بالاتری می‌باشند [۱۷]. نتایج نشان داد پودر تفاله هویج و آب تأثیر معنی دار ( $p < 0.05$ ) و مشابهی بر ویژگی‌های سطحی دونات داشتند. با افزایش درصد پودر تفاله هویج و محتوی آب فرمولاسیون، انرژی و همبستگی کاهش و در مقابل تباين و انتروپی افزایش یافت. اين تغييرات نشان‌دهنده تأثیر افودن اين دو متغير بر زيرتر شدن سطح نمونه‌ها بود. کاهش گرانزوی خمير که در پي افزایش محتوي رطوبت آن رخ می‌دهد می‌تواند سبب تسهيل خروج حباب‌های هوای طی فرا آيند پخت شود. از اين‌رو با افزایش محتوي آب

اندازه‌گيری‌های مقدماتی در فواصل مکانی مختلف (تا ۱۰ پیکسل) نشان داد کمتر بودن فاصله و صاف بودن تصویر ارتباط مستقیمي با هم دارند به شكلی که با افزایش فاصله مقادير تباين و انتروپی افزایش و مقادير همگنی، همبستگی و انرژی کاهش می‌يابد. از آنجايكه کاهش يا افزایش فاصله مکانی يك روند را در تغييرات شاخص‌ها بافت سطحی نشان داد، از اين‌رو در اين مطالعه فاصله مکانی يك پیکسل انتخاب شد. سطوح دارای انرژی، همگنی و همبستگی بالاتر و انتروپی و تباين پایین‌تر صاف‌تر می‌باشند. در مقابل سطوح زيرتر دارای انرژی، همگنی و

گلوتن و تضعیف شبکه گلوتن-نشاسته می‌شود [۳۷]. با تضعیف ساختار خمیر خروج هوا از طریق سطح تسهیل می‌شود. بنابراین تأثیر افزودن پودر تفاله هویج بر زبرتر شدن سطح فرآورده می‌تواند ناشی از تضعیف شبکه گلوتن و افزایش نرخ خروج بخارآب از طریق سطح ماده غذایی باشد.

فرمولاسیون، رطوبت خمیر افزایش و گرانزوی آن کاهش می‌یابد که متعاقب آن طی پخت حباب‌های هوای بیشتری از سطح ماده خارج می‌شود. درنتیجه زبرتر شدن سطح نمونه‌ها را می‌توان ناشی از خروج بیشتر حباب‌های هوای از سطح نمونه‌ها دانست. افزودن فیبرهای غیر محلول سبب کاهش غلظت پروتئین‌های

**Table 4** Regression coefficients of the second-order polynomial equations for visual properties of donut.

Source	Energy	Contrast	Correlation	Homogeneity	Entropy	Cell density	Area of cell	L*	a*	b*
$\beta_0$	0.54	0.17	0.64	0.92	5.66	426.14	185.08	76.13	2.23	27.59
$\beta_1$	0.01 <sup>ns</sup>	-0.005 <sup>ns</sup>	0.009 <sup>ns</sup>	0.005 <sup>ns</sup>	-0.048 <sup>ns</sup>	9.30 <sup>ns</sup>	4.11 <sup>ns</sup>	0.67 <sup>ns</sup>	-0.023 <sup>ns</sup>	1.01 <sup>ns</sup>
$\beta_2$	- 0.17***	0.08***	-0.01 <sup>ns</sup>	0.03***	0.074*	-84.58***	-26.76***	- 4.99***	0.97**	3.38***
$\beta_3$	-0.02 <sup>ns</sup>	0.01 <sup>ns</sup>	-0.01***	-0.002 <sup>ns</sup>	0.17***	-6.49 <sup>ns</sup>	3.12 <sup>ns</sup>	2.17**	-0.60*	0.067 <sup>ns</sup>
$\beta_1 \beta_1$	0.007	0.004 <sup>ns</sup>	-0.004 <sup>ns</sup>	0.001 <sup>ns</sup>	0.005 <sup>ns</sup>	-12.47 <sup>ns</sup>	-5.35 <sup>ns</sup>	0.10 <sup>ns</sup>	0.0033 <sup>ns</sup>	-0.10 <sup>ns</sup>
$\beta_2 \beta_2$	- 0.008 <sup>ns</sup>	-0.006 <sup>ns</sup>	0.003 <sup>ns</sup>	-0.002 <sup>ns</sup>	-0.03 <sup>ns</sup>	-9.99 <sup>ns</sup>	-5.96 <sup>ns</sup>	-0.43 <sup>ns</sup>	0.46*	0.34 <sup>ns</sup>
$\beta_3 \beta_3$	- 0.003 <sup>ns</sup>	-0.004 <sup>ns</sup>	0.005 <sup>ns</sup>	-0.0007 <sup>ns</sup>	0.05 <sup>ns</sup>	-32.04**	-16.20***	1.49**	-0.12*	0.60 <sup>ns</sup>
$\beta_1 \beta_2$	- 0.001 <sup>ns</sup>	-0.001 <sup>ns</sup>	-0.006 <sup>ns</sup>	0.005 <sup>ns</sup>	0.01 <sup>ns</sup>	-5.57 <sup>ns</sup>	-0.48 <sup>ns</sup>	-0.17 <sup>ns</sup>	-0.22 <sup>ns</sup>	2.19 <sup>ns</sup>
$\beta_1 \beta_3$	0.004 <sup>ns</sup>	0.001 <sup>ns</sup>	-0.0012 <sup>ns</sup>	0.002 <sup>ns</sup>	0.036 <sup>ns</sup>	-6.38 <sup>ns</sup>	-1.70 <sup>ns</sup>	-0.15 <sup>ns</sup>	-0.02 <sup>ns</sup>	1.19 <sup>ns</sup>
$\beta_2 \beta_3$	0.036 <sup>ns</sup>	-0.003 <sup>ns</sup>	0.0037 <sup>ns</sup>	0.002 <sup>ns</sup>	0.014 <sup>ns</sup>	32.51*	8.72*	-0.16 <sup>ns</sup>	0.068 <sup>ns</sup>	-0.095 <sup>ns</sup>
Model (p)	0.006	0.004	0.013	0.272	0.007	0.005	0.001	0.001	0.028	0.054
Lack of fit (p)	0.489	0.088	0.766	0.031	0.175	0.126	0.063	0.227	0.141	0.012
R <sup>2</sup>	0.901	0.901	0.804	0.768	0.826	0.904	0.927	0.951	0.765	0.725
Adj-R <sup>2</sup>	0.810	0.704	0.629	0.559	0.670	0.819	0.861	0.907	0.553	0.477
Adeq Precision	11.89	9.32	7.844	7.21	8.68	11.78	12.98	18.23	7.63	6.59

<sup>ns</sup> No significant.

\* Significant at  $p \leq 0.05$ .

\*\* Significant at  $p \leq 0.01$ .

\*\*\* Significant at  $p \leq 0.001$ .

\*\*\*\* Significant at  $p \leq 0.0001$ .

نسبت به ویژگی‌های تعزیزی فibre‌های خوراکی می‌توانست در افزایش نمرات حسی تأثیر مثبتی داشته باشد [۳۷]. همچنین افزایش محتوی آب فرمولاسیون تأثیر مثبت معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) بر ویژگی‌های حسی فرآورده داشت. تأثیر مثبت افزایش سطح آب را می‌توان به رقیق شدن پودر تفاله هویج در فرمولاسیون نسبت داد.

### ۳-۵- ارزیابی حسی

نتایج ارزیابی حسی نشان داد افزودن پودر تفاله هویج اثر منفی معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) بر ویژگی‌های ظاهری نمونه‌ها دارد به شکلی که با افزایش سطوح پودر تفاله هویج نمرات ویژگی‌های حسی کاهش یافت. با این وجود، وجود آگاهی مصرف کنندگان

**Table 5** Actual levels of independent variables and observed values of responses of sensory properties.

Trial	PG (%)	CPP (%)	Water (%)	Crust appearance	Crumb appearance	Crust colour	Aroma	Texture	Taste	Overall acceptance
1	0.30	11.96	49.96	3.38	5.17	3.66	5.77	2.80	3.66	3.47
2	0.75	7.50	53.00	6.03	5.94	6.87	5.87	5.34	5.88	6.02
3	0.75	7.50	45.50	4.62	6.00	4.85	6.77	4.66	4.02	5.87
4	0.30	3.04	49.96	6.87	7.01	7.84	8.13	6.87	7.07	6.89
5	0.75	7.50	45.50	4.67	7.00	5.38	6.00	4.87	4.73	6.5
6	0.75	7.50	45.50	5.07	5.23	5.07	5.77	4.93	5.47	5.47
7	0.30	3.04	41.04	6.07	7.28	6.56	6.35	6.04	6.05	6.97
8	1.20	3.04	49.96	6.87	7.96	7.53	5.68	7.71	7.56	7.87
9	0.75	0.00	45.50	8.47	7.98	8.47	8.77	8.47	8.40	8.73
10	0.00	7.50	45.50	4.60	5.30	4.53	6.33	3.53	4.53	5.55
11	0.30	11.96	41.04	2.65	3.05	2.27	7.35	1.87	2.47	2.23
12	1.20	3.04	41.04	6.07	8.76	6.60	8.88	7.15	6.39	7.65
13	1.50	7.50	45.50	4.80	6.60	3.07	5.67	4.84	4.55	5.58
14	0.75	7.50	45.50	4.07	5.79	4.80	6.63	4.55	4.47	5.33
15	1.20	11.96	41.04	2.65	5.88	2.27	5.86	2.87	2.47	2.54
16	0.75	7.50	45.50	5.07	5.55	5.88	7.51	4.04	4.93	5.37
17	0.75	15.00	45.50	2.15	4.27	1.88	7.68	1.47	2.46	2.17
18	0.75	7.50	38.00	3.01	3.20	4.30	6.76	3.77	3.66	3.05
19	0.75	7.50	45.50	5.68	5.70	4.19	5.76	4.87	5.73	6.71
20	1.20	11.96	49.96	3.27	4.97	3.49	5.76	3.87	3.47	3.76

**Table 6** Regression coefficients of the second-order polynomial equations for sensory properties of donut.

Source	Crust appearance	Crumb appearance	Crust colour	Aroma	Texture	Taste	Overall acceptance
$\beta_0$	4.87	5.85	5.02	6.41	4.64	4.89	6.33
$\beta_1$	0.017 <sup>ns</sup>	0.53	-0.21 <sup>ns</sup>	-0.18 <sup>ns</sup>	0.46 <sup>**</sup>	0.049 <sup>ns</sup>	0.06 <sup>ns</sup>
$\beta_2$	-1.80 <sup>***</sup>	-1.33 <sup>**</sup>	-2.04 <sup>***</sup>	-0.45 <sup>ns</sup>	-2.06 <sup>***</sup>	-1.83 <sup>***</sup>	-1.94 <sup>***</sup>
$\beta_3$	0.59 <sup>**</sup>	0.35 <sup>ns</sup>	0.67 <sup>***</sup>	-0.34 <sup>ns</sup>	0.44 <sup>***</sup>	0.59 <sup>**</sup>	0.74 <sup>**</sup>
$\beta_1 \beta_1$	0.082 <sup>ns</sup>	0.18 <sup>ns</sup>	-0.40 <sup>*</sup>	-0.17 <sup>ns</sup>	-0.095 <sup>ns</sup>	-0.13 <sup>ns</sup>	0.36 <sup>ns</sup>
$\beta_2 \beta_2$	0.13 <sup>ns</sup>	0.24 <sup>ns</sup>	0.091 <sup>ns</sup>	0.61 <sup>*</sup>	0.18 <sup>ns</sup>	0.19 <sup>ns</sup>	-0.38 <sup>ns</sup>
$\beta_3 \beta_3$	-0.15 <sup>ns</sup>	-0.31 <sup>ns</sup>	0.24 <sup>ns</sup>	-0.065 <sup>ns</sup>	0.035 <sup>ns</sup>	0.048 <sup>ns</sup>	-0.49 <sup>*</sup>
$\beta_1 \beta_2$	-0.014 <sup>ns</sup>	0.023 <sup>ns</sup>	0.013 <sup>ns</sup>	-0.20 <sup>ns</sup>	0.015 <sup>ns</sup>	-0.12 <sup>ns</sup>	0.16 <sup>ns</sup>
$\beta_1 \beta_3$	-0.014 <sup>ns</sup>	-0.45 <sup>ns</sup>	-0.065 <sup>ns</sup>	-0.44 <sup>ns</sup>	-0.025 <sup>ns</sup>	-0.005 <sup>ns</sup>	-0.078 <sup>ns</sup>
$\beta_2 \beta_3$	0.031 <sup>ns</sup>	0.28 <sup>ns</sup>	0.050 <sup>ns</sup>	-0.033 <sup>ns</sup>	0.068 <sup>ns</sup>	0.001 <sup>ns</sup>	0.28 <sup>ns</sup>
Model (p)	0.0001	0.007	0.0001	0.181	0.0001	0.0001	0.0002
Lack of fit (p)	0.641	0.135	0.795	0.192	0.615	0.996	0.405
R <sup>2</sup>	0.951	0.830	0.965	0.621	0.984	0.960	0.925
Adj-R <sup>2</sup>	0.907	0.677	0.935	0.280	0.971	0.925	0.857
Adeq Precision	17.01	9.67	19.92	5.96	31.29	18.91	12.69

<sup>ns</sup> No significant.<sup>\*</sup> Significant at p ≤ 0.05.<sup>\*\*</sup> Significant at p ≤ 0.01.<sup>\*\*\*</sup> Significant at p ≤ 0.001.<sup>\*\*\*\*</sup> Significant at p ≤ 0.0001.

هویج و ۴۸/۲۹ درصد آب انتخاب شد. پس از عملیات بهینه‌سازی، برای اعتبار سنجی مدل دونات‌هایی با فرمولاسیون بهینه تهیه و ویژگی‌های حسی و ظاهری آن با مقادیر پیش‌بینی شده مقایسه گردید. نتایج این مقایسه نشان داد که مقادیر تجربی و برآورد شده دارای اختلاف آماری معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) نبودند که نشان‌دهنده اعتبار مدل ارائه شده بود (جدول ۷).

### ۶-۳- بهینه‌سازی فرمولاسیون و اعتبار سنجی مدل

به منظور تولید یک دونات با محتوی فیبری بالا و موردنیزیرش مصرف‌کننده با استفاده از ابزار بهینه‌سازی نرم‌افزار دیزاین اکسپرت مناسب‌ترین فرمولاسیون با بالاترین مطلوبیت ( $D = ۰/۶۰$ ) شامل ۱/۱۷ درصد صمغ فارسی، ۷/۴۴ درصد پودر تفاله

**Table 7** Predicted and experimental values of response variables.

Response variables	Predicted values	Experimental values
Area of cell	183.75	176.44 $\pm$ 8.44
Cell density	427.66	412.85 $\pm$ 16.36
L*	80.20	79.03 $\pm$ 1.04
a*	18.48	16.89 $\pm$ 1.88
b*	63.43	64.51 $\pm$ 1.31
Energy	0.58	0.58 $\pm$ 0.01
Contrast	0.15	0.15 $\pm$ 0.02
Correlation	0.62	0.61 $\pm$ 0.05
Entropy	5.58	5.61 $\pm$ 0.52
Crust appearance	5.53	6.10 $\pm$ 0.75
Crumb appearance	6.68	6.25 $\pm$ 0.19
Crust colour	6.32	7.90 $\pm$ 0.55
Crumb colour	6.79	6.17 $\pm$ 0.75
Texture	5.74	5.50 $\pm$ 0.67
Taste	5.62	5.66 $\pm$ 0.80
Overall acceptance	6.10	5.50 $\pm$ 0.65

و ارزیابی ویژگی‌های ظاهری دونات دانست. طی سال‌های اخیر کاربرد تکنیک‌های ماشین‌بینایی و پردازش تصویر در ارزیابی‌های ظاهری مواد غذایی به خوبی نشان داده شده است [۳]. فونگارو و کوال (۲۰۱۳) با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر ویژگی‌های سطحی پاستاهای ایتالیایی را مورد بررسی قرار دادند [۱۷]. آن‌ها وجود همبستگی بین ویژگی‌های سطحی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه‌های پاستا را گزارش کردند. همچنین در پژوهشی که توسط گیرولامی و همکاران (۲۰۱۴) انجام شد از یک سیستم بینایی کامپیوتی و آنالیز تصویر به همراه ارزیابی حسی به منظور ارزیابی ظاهر سوسیس استفاده شد [۳۸].

### ۷-۳- آنالیز همبستگی

در ارزیابی آنالیز همبستگی، ضرایب منفی معرف رابطه معکوس، ضرایب مثبت معرف رابطه مستقیم و ضرایب حوالی صفر نمایانگر عدم وجود رابطه خطی بین متغیرها است. آنالیز همبستگی به خوبی نشان داد شاخص‌های بینایی ارتباط خطی قوی با ویژگی‌های حسی دونات دارند (جدول ۸). نتایج این آزمون نشان داد دونات‌هایی با سطح صاف‌تر، رنگ روشن‌تر و مغزی متخلف‌تر نزد مصرف‌کنندگان پذیرش بالاتری دارند. بنابراین با توجه به نتایج آنالیز همبستگی می‌توان تکنیک‌های ماشین‌بینایی و پردازش تصویر را ابزاری مناسب در پیش‌گویی

**Table 8.** Correlation coefficients between the visual properties and the sensory parameters of donut.

	Energy	Contrast	Correlation	Homogeneity	Entropy	Cell density	Area of cell	L*	a*	b*
Crust appearance	0.78**	-0.78***	0.13**	0.73**	-0.13 <sup>ns</sup>	0.78****	0.75**	0.85***	-0.74***	0.57**
Crumb appearance	0.73***	-0.70*	0.17***	0.72**	-0.17 <sup>ns</sup>	0.77****	0.76****	0.62**	-0.44*	0.37 <sup>ns</sup>
Crust colour	0.81***	-0.80**	0.19*	0.76*	-0.02 <sup>ns</sup>	0.75**	0.69***	0.87****	-0.77**	0.56**
Aroma	0.38*	-0.35 <sup>ns</sup>	0.37 <sup>ns</sup>	0.24 <sup>ns</sup>	-0.42*	0.32 <sup>ns</sup>	0.24 <sup>ns</sup>	0.09 <sup>ns</sup>	-0.19 <sup>ns</sup>	0.03 <sup>ns</sup>
Texture	0.84***	-0.83***	0.22***	0.81***	-0.19 <sup>ns</sup>	0.84****	0.77****	0.88	-0.74***	0.51*
Taste	0.79***	-0.79***	0.14**	0.76**	-0.11 <sup>ns</sup>	0.78****	0.73***	0.87***	-0.77***	0.57**
Overall acceptance	0.82****	-0.80****	0.18**	0.77****	-0.16 <sup>ns</sup>	0.86****	0.86****	0.77***	-0.61**	0.56**

<sup>ns</sup> No significant.\* Significant at  $p \leq 0.05$ .\*\* Significant at  $p \leq 0.01$ .\*\*\* Significant at  $p \leq 0.001$ .\*\*\*\* Significant at  $p \leq 0.0001$ .

#### ۴- نتیجه‌گیری نهایی

در این پژوهش اثر افزودن صمغ فارسی و پودر تفاله هویج به فرمولاسیون بر ویژگی‌های ظاهری و حسی دونات مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد پودر تفاله هویج و آب اثرات خطی، درجه دوم و متقابل معنی‌داری ( $p < 0.05$ ) بر ویژگی‌های ساختار مغز دونات دارند. افزودن پودر تفاله هویج سبب زبرتر شدن سطح فرآورده و تیره‌تر شدن رنگ آن شد ( $p < 0.05$ ). نتایج ارزیابی حسی نشان داد پودر تفاله هویج سبب کاهش معنی‌دار نمرات مریبوط به ویژگی‌های حسی شد ( $p < 0.05$ ). همچنین روش سطح پاسخ نشان داد دونات با فرمولاسیون بهینه شامل ۱/۱۷٪ صمغ فارسی، ۷/۴۴٪ پودر تفاله هویج و ۴۸/۲۹٪ آب دارای محتوی فیری بالا و ویژگی‌های حسی قابل قبولی بود. همچنین نتایج آنالیز همبستگی به خوبی نشان داد ویژگی‌های بینایی همبستگی بالایی با ویژگی‌های حسی دونات دارند ( $p < 0.05$ ). این یافته‌ها نشان داد سیستم‌های ماشین بینایی می‌توانند به عنوان یک ابزار سریع و غیرمخترب در ارزیابی ویژگی‌های بینایی فرآورده‌های نانوایی مفید واقع شود.

#### ۵- منابع

- [2] ElMasry, G., Cubero, S., Moltó, E., & Blasco, J, 2012, In-line sorting of irregular potatoes by using automated computer-based machine vision system, *Journal of Food Engineering*, 112(1), 60-68 .
- [3] Brosnan, T., & Sun, D.-W, 2004, Improving quality inspection of food products by computer vision—a review, *Journal of Food Engineering*, 61(1), 3-16 .
- [4] Du, C.-J., & Sun, D.-W, 2004, Recent developments in the applications of image processing techniques for food quality evaluation, *Trends in food science & technology*, 15(5), 230-249.
- [5] Chandraratne, M. R., Kulasiri, D., & Samarasinghe, S, 2007, Classification of lamb carcass using machine vision: comparison of statistical and neural network analyses, *Journal of Food Engineering*, 82(1), 26-34.
- [6] Cubero, S., Aleixos, N., Molto, E., Gomez-Sanchis, J., & Blasco, J, 2011, Advances in machine vision applications for automatic inspection and quality evaluation of fruits and vegetables, *Food and Bioprocess Technology*, 4(5), 829-830.
- [7] Gonzales-Barron, U., & Butler, F, 2008, Discrimination of crumb grain visual appearance of organic and non-organic bread loaves by image texture analysis, *Journal of Food Engineering*, 84(3), 480-488.

- [1] Shewfelt, R. L., & Bruckner, B, 2000, *Fruit and vegetable quality: an integrated view*: CRC Press.

- extraction from their texture images, *Food Research International*, 51(2), 693-705 .
- [18] Brannan, R. G., Mah, E., Schott, M., Yuan, S., Casher, K. L., Myers, A., & Herrick, C, 2014, Influence of ingredients that reduce oil absorption during immersion frying of battered and breaded foods, *European Journal of Lipid Science and Technology*, 116(3), 240-254 .
- [19] Baljeet, S., Ritika, B., & Reena, K, 2014, Effect of incorporation of carrot pomace powder and germinated chickpea flour on the quality characteristics of biscuits, *International Food Research Journal*, 21(1), 217-222 .
- [20] Abbasi, S., & Mohammadi, S, 2013, Stabilization of milk-orange juice mixture using Persian gum: Efficiency and mechanism, *Food Bioscience*, 2, 53-60 .
- [21] Chau, C.-F., Chen, C.-H., & Lee, M.-H, 2004, Comparison of the characteristics, functional properties, and in vitro hypoglycemic effects of various carrot insoluble fiber-rich fractions, *LWT-Food Science and Technology*, 37(2), 155-160 .
- [22] Melito, H. S., & Farkas, B. E, 2012, Impact of Infrared Finishing on the Mechanical and Sensorial Properties of Wheat Donuts, *Journal of food science*, 77(9), E224-E230 .
- [23] Quevedo, R., Díaz, O., Caqueo, A., Ronceros, B., & Aguilera, J, 2009, Quantification of enzymatic browning kinetics in pear slices using non-homogenous L\* color information from digital images, *LWT-Food Science and Technology*, 42(8), 1367-1373 .
- [24] Otsu, N, 1979, A threshold selection method from grey-level histograms, *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, 9(1), 62-66 .
- [25] Sánchez-Pardo, M., Ortiz-Moreno, A., García-Zaragoza, F., Necoechea-Mondragón, H., & Chanona-Pérez, J, 2012, Comparison of pound cake baked in a two cycle microwave-toaster oven and in conventional oven, *LWT-Food Science and Technology*, 46(1), 356-362 .
- [26] Bharati, M. H., Liu, J. J., & MacGregor, J. F, 2004, Image texture analysis: methods and comparisons, *Chemometrics and intelligent laboratory systems*, 72(1), 57-71 .
- [27] Haralick, R. M., Shanmugam, K., & Dinstein, I. H, 1973, Textural features for image classification, *Systems, Man and*
- [8] Kent, D., & Amos, A, 1967, Modern cereal chemistry: Food Trade Press, London.
- [9] Balestra, F., Cocci, E., Pinnavaia, G., & Romani, S, 2011, Evaluation of antioxidant, rheological and sensorial properties of wheat flour dough and bread containing ginger powder, *LWT-Food Science and Technology*, 44(3), 700-705 .
- [10] Fan, F., Ma, Q., Ge, J., Peng, Q., Riley, W. W., & Tang, S, 2013, Prediction of texture characteristics from extrusion food surface images using a computer vision system and artificial neural networks, *Journal of Food Engineering*, 118(4), 426-433 .
- [11] Hager, A.-S., & Arendt, E. K, 2013, Influence of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), xanthan gum and their combination on loaf specific volume, crumb hardness and crumb grain characteristics of gluten-free breads based on rice, maize, teff and buckwheat, *Food Hydrocolloids*, 32(1), 195-203 .
- [12] Hirte, A., Primo-Martín, C., Meinders, M. B., & Hamer, R. J, 2012, Does crumb morphology affect water migration and crispness retention in crispy breads? *Journal of Cereal Science*, 56(2), 289-295 .
- [13] Manzocco, L., Calligaris, S., Da Pieve, S., Marzona, S., & Nicoli, M. C, 2012, Effect of monoglyceride-oil-water gels on white bread properties, *Food Research International*, 49(2), 778-782 .
- [14] Purhagen, J. K., Sjöö, M. E., & Eliasson, A.-C, 2011, Starch affecting anti-staling agents and their function in freestanding and pan-baked bread, *Food Hydrocolloids*, 25(7), 1656-1666 .
- [15] Ziobro, R., Witczak, T., Juszczak, L., & Korus, J, 2013, Supplementation of gluten-free bread with non-gluten proteins. Effect on dough rheological properties and bread characteristic, *Food Hydrocolloids*, 32(2), 213-220 .
- [16] Jackman, P., & Sun, D.-W, 2013, Recent advances in image processing using image texture features for food quality assessment, *Trends in food science & technology*, 29(1), 35-43 .
- [17] Fongaro, L., & Kvaal, K, 2013, Surface texture characterization of Italian pasta by means of univariate and multivariate feature

- production from *Bacillus* sp. RGR-14, *Process Biochemistry*, 39(12), 2115-2122.
- [34] Montgomery, D. C., 2013, *Design and Analysis of Experiments* (8 ed.). New York: Wiley
- [35] Martínez, M. M., Díaz, Á., & Gómez, M, 2014, Effect of different microstructural features of soluble and insoluble fibres on gluten-free dough rheology and bread-making, *Journal of Food Engineering*, 142, 49-56.
- [36] Chantaro, P., Devahastin, S., & Chiewchan, N, 2008, Production of antioxidant high dietary fiber powder from carrot peels, *LWT-Food Science and Technology*, 41(10), 1987-1994.
- [37] Baixauli, R., Sanz, T., Salvador, A., & Fiszman, S, 2008, Muffins with resistant starch: Baking performance in relation to the rheological properties of the batter, *Journal of Cereal Science*, 47(3), 502-509.
- [38] Girolami, A., Napolitano, F., Faraone, D., Di Bello, G., & Braghieri, A, 2014, Image analysis with the computer vision system and the consumer test in evaluating the appearance of Lucanian dry sausage, *Meat science*, 96(1), 610-616.
- [39] Kumar, N., & Kumar, K, 2011, Development of carrot pomace and wheat flour based cookies, *Journal of Pure and Applied Science and Technology*, 1(1), 5-11.
- Cybernetics, IEEE Transactions on*(6), 610-621.
- [28] Stone, H., Bleibaum, R., & Thomas, H. A, 2012, *Sensory evaluation practices*: Academic press.
- [29] Myers, R. H., Montgomery, D. C., & Anderson-Cook, C. M, 2009, *Response surface methodology: process and product optimization using designed experiments* (Vol. 705): John Wiley & Sons.
- [30] Pourfarzad, A., Mahdavian-Mehr, H., & Sedaghat, N, 2013, Coffee silverskin as a source of dietary fiber in bread-making: Optimization of chemical treatment using response surface methodology. *LWT-Food Science and Technology*, 50(2), 599-606.
- [31] Derringer, G, 1980, Simultaneous optimization of several response variables. *Journal of quality technology*, 12, 214-219.
- [32] Homayoonfal, M., Khodaiyan, F., & Mousavi, M, 2015, Modelling and optimising of physicochemical features of walnut-oil beverage emulsions by implementation of response surface methodology: Effect of preparation conditions on emulsion stability, *Food chemistry*, 174, 649-659.
- [33] Chauhan, B., & Gupta, R, 2004, Application of statistical experimental design for optimization of alkaline protease

## **Modeling the effects of Persian gum and carrot pomace powder addition on visual features of donut using response surface methodology**

**Nouri, M. <sup>1\*</sup>, Nasehi, B. <sup>2</sup>, Abdanan Mehdizadeh, S. <sup>3</sup>**

1. MSc graduated of Food Science and Technology, Ramin University of Agriculture and Natural Resources of Khuzestan
2. Associate professor of Food Science and Technology, Ramin University of Agriculture and Natural Resources of Khuzestan
3. Assistant professor of Bio system of Agricultural Engineering, Ramin University of Agriculture and Natural Resources of Khuzestan

**(Received: 2015/07/04 Accepted: 2015/10/05)**

In the present study, the effects of addition of Persian gum (PG) and carrot pomace powder (CPP) on formulation of donut were investigated in order to obtain a low-fat dietary fiber-enriched product with desired sensory and appearance properties. Response surface methodology (RSM) with a 5-level-3-factor central composite rotatable design (CCRD) was employed, where the independent variables were PG (0-1.5%), CPP (0-15%) and water (38-53%) while the dependent variables were surface texture properties, crust color values, crumb grain features and sensory characteristics of donut. Results showed that the roughness of the donuts surface increased by addition of CPP into formulation ( $p < 0.05$ ). It was found that CPP adversely affected the crumb grain properties of donut ( $p < 0.05$ ). As well, a significant negative quadratic effect of water addition and a significant interaction effect of CPP and water were observed on crumb grain properties of donut ( $p < 0.05$ ). With regard to samples color, L\* decreased while a\* increased as levels of CPP were increased and levels of water were decreased. Results of sensory evaluation, illustrated that CPP significantly decreased consumer acceptance scores ( $p < 0.05$ ). Furthermore, results of correlation analysis revealed that there were strong relationships between visual features of donuts and sensory attributes that indicated capability of machine vision to prediction of consumer acceptance. RSM described that donut with optimum formulation of 1.17% PG, 7.44% CPP and 48.29% water had considerably higher dietary fiber content, lower fat uptake and acceptable sensory attributes compared to control sample.

**Keywords:** Machine vision, Crumb grain, Surface texture, Dietary fiber, Donut

---

\* Corresponding Author E-Mail Address: mnouri1366@gmail.com