

گزارش یک مورد آبسه لوله‌ای تخمدانی پس از کورتاژ

دکتر زهرا بصیرت *

استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

سابقه و هدف: آبسه لوله‌ای تخمدان یکی از مراحل نهائی در روند عفونت حاد لگنی می‌باشد. پس از دستکاریهای رحمی، یا پس از اعمال جراحی اتفاق می‌افتد و بسیار نادر می‌باشد.

گزارش مورد: خانم ۳۵ ساله‌ای یک هفته پس از کورتاژ، با احساس فشار لگنی، درد زیر شکم و اسهال مراجعه نمود. در سونوگرافی انجام شده توده‌ای به اندازه $8,5 \times 7,5$ سانتیمتر گزارش شد، که با آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف آبسه لوله‌ای تخمدانی کاملاً بهبود یافت.

نتیجه‌گیری: در صورت وجود تب و احساس فشار لگنی پس از کورتاژ بایستی آبسه لگنی را در نظر داشت. تشخیص زودرس و درمان بموقع آبسه‌های لگنی باعث کاهش مرگ و میر و ناتوانی بیماران خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: سقط، عوارض، عفونت حاد لگنی، آبسه لوله‌ای تخمدانی.

مقدمه

خوب با دستور داروئی داکسی سایکلین ۱۰۰ میلی گرمی هر ۱۲ ساعت ترخیص شد. ۳۶ ساعت بعد دچار تب و لرز شد که در معاینه درجه حرارت ۳۹/۵ درجه سانتی گراد، تعداد ضربان نبض ۱۰۰ در دقیقه، تنفس ۳۰ در دقیقه بوده است. در معاینه حساسیت قسمت تحتانی شکم و رحم و ضمائم آن وجود داشت. در سونوگرافی شکمی یافته غیر طبیعی مشهود نبود و آثاری از نسج باقیمانده وجود نداشت. تب بیمار ۲۴ ساعت پس از شروع درمان وریدی، مترونیدازول ۵۰۰ میلی گرمی هر ۸ ساعت و جنتامایسین ۸۰ میلی گرمی هر ۸ ساعت و سفازولین ۱ گرم هر ۸ ساعت قطع شد. آنتی بیوتیکها به مدت ۷۲ ساعت ادامه یافت و با درمان خوراکی اوفلوکساسین ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت مرخص شد. پس از یک هفته بیمار به علت درد زیر شکم و احساس فشار لگنی و اسهال مراجعه نمود. درجه حرارت نرمال، در معاینه لگنی حساسیت شدید رحم و ضمائم رحمی و توده لگنی وجود داشت. در سونو گرافی شکمی انجام شده توده ای به اندازه ۸/۵ × ۷/۵ سانتی متر در مجاور رحم در سمت راست وجود داشت. در آزمایش خون محیطی لنفوسیت ۲۰٪، پلی مرفونوکلتر ۸۰٪، گلبول سفید ۱۰۳۰۰ بود.

بیمار با تشخیص آبسه لوله ای بستری شد. درمان وریدی با کلیندامایسین ۹۰۰ میلی گرمی هر ۸ ساعت و جنتامایسین ۸۰ میلی گرمی هر ۸ ساعت شروع شد و با سونوگرافی شکمی، آزمایش کامل خون و سدیمانتاسیون خون و اوره و کراتینین یک روز در میان پیگیری شد. آنتی بیوتیک وریدی تا ۱۴ روز ادامه یافت. در سونوگرافی انجام شده توده ای مشهود نبود. سپس بیمار ۱۴ روز آنتی بیوتیک خوراکی دریافت نمود. در خاتمه درمان حال عمومی بیمار خوب و در پیگیریهای بعدی تا چهار ماه، عارضه خاصی مشاهده نشد.

آبسه لوله ای تخمدانی یکی از مراحل انتهایی در روند عفونت حاد لگنی می باشد. این عارضه پس از دستکاریهای رحمی و اعمال جراحی گزارش شده است (۱ و ۲). ارگانسمهای دخیل در عفونت پس از سقط، ارگانسمهای هوازی و بیهوازی می باشند (۳). بیشترین میکروارگانسمها در آبسه های لوله ای تخمدانی گونه باکتریوئید، اشریشیاکلی، باکتریوئید فرازیلیس، پیتوکوکوک، پیتواستریتوکوک هستند (۴). بیماران با آبسه لوله ای - تخمدانی معمولاً با درد و در معاینه لگنی با توده یا حساسیت در ضمائم رحمی مراجعه می کنند. برای آبسه های پاره نشده درمان آنتی بیوتیکی مناسب که پوشش مناسبی بر میکروارگانسمهای بی هوازی داشته باشد توصیه می شود. در صورت عدم پاسخ به درمان طی ۷۲-۴۸ ساعت نیاز به درمان جراحی می باشد (۵). پارگی آبسه لوله ای تخمدانی به طور خودبخودی و یا بعد از معاینه دودستی رخ میدهد که می تواند به رکتوم، سیگموئید کولون و مثانه یا داخل شکم باز شود. در بین تمام عوارض عفونت حاد لگنی، پاره شدن داخل شکمی آبسه، خطرناکترین عارضه آن است که به علت شوک سپتیک و پریتونیت منتشر موجب مرگ و میر بیماران می شود. در ۸۸٪ موارد پارگی آبسه کشنده بوده و مرگ در مدت کمتر از ۹۰ ساعت اتفاق می افتد (۶). از آنجائیکه اکثر این بیماران جوان هستند و حفظ باروری در آنها با اهمیت است، لذا تشخیص به موقع و درمان مناسب با آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف و پاسخ به درمان طبی با حفظ رحم و تخمدانها موجب حفظ عملکرد باروری و کاهش ناتوانی بیماران خواهد شد.

گزارش مورد

بیمار خانم ۳۵ ساله، حاملگی سوم با سن حاملگی ۵ هفته، در اتاق عمل در شرایط استریل با بیهوشی عمومی در مرکز دیگری کورتاژ شد. چند ساعت بعد با حال عمومی

بحث

عوامل مستعد کننده ایجاد عفونت پس از سقط، سن حاملگی بالا (بیش از ۱۳-۱۲ هفته حاملگی)، عفونت کلامیدیا و گونوره درمان نشده، استفاده از روشهای القاء سقط بجای کورتاژ و استفاده از بیحسی موضعی بجای عمومی و وجود نسج باقیمانده می‌باشد (۳). احتمال تب پس از سقط به روش کورتاژ بستگی دارد. شیوع تب ۳۸ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر به مدت یک روز یا بیشتر پس از کورتاژ مکشی کمتر از ۱/۰۱٪، پس از اتساع و تخلیه رحم ۱/۵٪، اوره و پروستاگلاندین ۶/۳٪، و در سالیین هیپرتونیک ۵٪ است (۳). Thonneau و همکاران عوارض زودرس پس از سقط را ۱/۷٪ و عوارض دیررس را ۱/۲٪ گزارش نموده‌اند (۷).

در مطالعه Johansen و همکاران در سال ۲۰۰۱ که در ۷۶۰ بیمار عارضه‌دار شده پس از سقط انجام دادند، احتباس نسج ۶۲٪، عفونت در ۱۸٪، درد در ۱۷٪ و پارگی رحم در ۳٪ موارد دیده شد (۸).

در مطالعه Schmidt و همکاران در گزارش ۱۷ بیمار با آبسه لوله‌ای تخمدانی علامت بیماران درد و در معاینه لگنی وجود حساسیت یا توده لگنی بوده است (۵). برای آبسه‌های پاره نشده درمان آنتی‌بیوتیکی که پوشش مناسب بی‌هوازی داشته باشد انجام شد. در صورت عدم پاسخ طی ۴۸ ساعت درمان جراحی محافظه‌کارانه با حفظ عملکرد باروری و هورمونی توصیه شده است (۳). در مطالعه Varela و همکاران، از ۲۰ مورد آبسه لوله‌ای تخمدانی ۸۵٪ موارد تب در عرض ۴۸ ساعت با درمان آنتی‌بیوتیک قطع شد. ۹۰٪ نیاز به درمان جراحی داشتند که ۳۰٪ این موارد شامل برداشتن رحم و تخمدانهای دو طرف یا یکطرف بوده است (۹).

در مطالعه Gasola و همکاران در ۱۶ بیمار با آبسه لوله‌ای تخمدانی که به درمان طبی جواب نداده بودند درناژ از دیواره قدامی شکم در ۱۱ بیمار و از راه واژن در ۶ بیمار انجام شد. مدت زمان استفاده از کاتتر بین ۲۰-۱۰ روز بوده

است. تخلیه در ۱۵ بیمار موفقیت‌آمیز بوده است. در یک بیمار در آوردن رحم و تخمدانهای دو طرف انجام شد. یک مورد نیز به علت عود مجدد جراحی شد (۱۰). در مطالعه Vansonneuberg و همکاران در ۱۴ مورد با آبسه لگنی و تجمع مایع تخلیه با سوزن با راهنمایی سونوگرافی واژینال انجام شد و توصیه شده که درناژ با راهنمایی سونوگرافی واژینال یک جایگزین درناژ از راه پوست میباشد (۱۱). در مطالعه توسط Gaspi و همکاران اسپیراسیون آبسه لوله‌ای تخمدانی در ۱۰ بیمار که به درمان آنتی‌بیوتیکی جواب نداده بودند، به همراه تزریق آنتی‌بیوتیک به داخل حفره آبسه در درمان موفقیت‌آمیز بوده است (۱۲).

در مطالعه Landers و همکاران بر ۲۳۲ بیمار با آبسه لوله‌ای تخمدانی، پارگی آبسه در ۳٪ موارد اتفاق افتاد. ۱۷۵ بیمار با آنتی‌بیوتیک به تنهایی درمان شدند. ۵۷ بیمار نیاز به جراحی داشتند که در ناژ در ۵ نفر و برداشتن رحم و تخمدان یک طرف در ۱۹ نفر و برداشتن تخمدانهای دو طرف در ۳۳ بیمار انجام شد. در این مطالعه در ۶۸٪ بیماران تحت درمان با کلیندامایسین کاهش در اندازه توده دیده شد. در صورتیکه در بیماران بدون درمان با کلیندامایسین در ۳۶٪ موارد کاهش در اندازه توده مشاهده شد (۴).

در مطالعه Roberts و همکاران در بررسی بر روی ۸۳ بیمار با آبسه لوله‌ای تخمدانی، ۱۸ بیمار در ۲۴ ساعت اول هیستریکتومی شدند و در ۶۵ بیمار دیگر آنتی‌بیوتیک شروع شد، که در ۲۰ نفر از آنها به علت شکست درمان، جراحی انجام شد. در دو گروه درمان شده مرگ و میر و ناتوانی و زمان بستری در بیمارستان مورد مقایسه قرار گرفت، و توصیه شد که قدم اول درمان آبسه‌های لگنی، شروع آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف و در صورت لزوم، جراحی محافظه‌کارانه باشد (۱۳). Strizhakov و همکاران، جهت تشخیص و درمان توده‌های التهابی لگن سی تی اسکن را پیشنهاد کردند و در بیماران جوان با تخلیه آبسه تحت کنترل سی تی اسکن نیازی به انجام جراحی نبوده است (۱۴).

کورتاژ دچار تب، درد و احساس فشار لگنی و اسهال می‌شوند آبه لگنی را مدنظر داشته باشیم. تشخیص زودرس و درمان آن باعث کاهش مرگ و میر و ناتوانی بیماران خواهد شد.

Davey و همکاران یک مورد آبه لوله‌ای تخمدانی را در طی حاملگی و Franz و همکاران یک مورد آبه لوله‌ای تخمدانی اکتینومیکوزی همراه با IUD گزارش نمودند که منجر به برداشت رحم و تخمدانها شد (۱۶ و ۱۵). در این بیمار نیز با استفاده از آنتی بیوتیک وسیع الطیف بیمار کاملاً به درمان جواب داد. بنابراین توصیه می‌شود در بیمارانی که پس از

References

1. Pickering KD, Smith DO. Tubo ovarian abscess after Tubal ligation. West Indian Med J 1998; 47(3):13-4.
2. Mendez LE, Bhoola SM, Horowitz IR. Bilateral tubo ovarian abscesses four years after total abdominal hysterectomy. Infect Dis Obstet Gynecol 1998; 6(3): 138–40
3. Grimes DA. Management of abortion: in Rock JA, Thompson JD. Telinde's operative gynecology. 8 th ed, Philadelphia lippincott Company 1997; p: 494.
4. Landers DV, Sweet RI. Tubo ovarian abscess : contemporary approach to management . Rev infect Dis 1983; 5(5): 876 –84.
5. Schmidt E, Nehra P. Tubo ovarian abscess. A study of 17 patients Am Fam Physician 1998; 37 (4): 181.
6. Mark G. Martens Pelvic inflammatory disease. Telinde' s operative Gynecology. 8th ed, Philadelphia, Lippincott. company 1997; pp: 668 – 9.
7. Thonneau P, Fougey Ollas B, Ducot B, Boubilley D, Dif J, lalande M, Soulat C. Complication of abortion performed under local anesthesia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998; 8(1): 59 –63.
8. Johansen JK, Schmidt KL. Legal abortion. An analysis of factor Which can effect frequency of complication. Ugeskr laeger 2001; 12 163 (11): 1565 –9.
9. Varela R, Goncalves V, Tel H, Hormigo C, Tavares C. Tubo ovarian abscess. An analysis of 20 cases . Acta Med Post 1995; 8 (10): 537 – 42.
10. Gasola G, Vansonneuberg E, Dagostino HB, Harker CP, Varr Smith D. Percutaneous drainage of tubo ovarian abscesses. Radiology 1992; 182 (2): 349 – 402.
11. Vansonneuberg ED, Agostino HB, Gasola G. Drainage of pelvic abscesses fluid collections. Radiology 1991; 181 (1): 53 –6.
12. Gaspi B, Zabi Y, Bor Dayan Y, Appelman Z, Katz Z. Sonographically guided aspiration: An alternative therapy tubo ovarian abscess . Ultrasound Obstet Gynecol 1996; 7(6) 439 – 42.
13. Roberts W, Dockery JL. Operative and conservative treatment of tubo ovarian abscess due to pelvic inflammatory disease. South Med J 1984; 77(7): 860 – 3.
14. Strizhakov AN, Todua FL, Podzolkova NM, Karmazanovskii GO, Artiukhina MI. Use of computerized tomography in the diagnosis an treatment of suppurative inflammatory adnexal disease. Akush Ginekol (Mosk) 1989; (4): 15-18.
15. Davey MM, Guidozzi F. Ruptured tubo ovarian abscess late in pregnancy . A case report . S Afr Med J 1987; 71(2): 120 –1.
16. Franz HB, Strohmaier WL, Geppert Wechsel H. Infiltrating tubo ovarian abscess in IUD associated actinomycosis . Geburtshilfe Frauenheilkd 1992; 52 (8): 496 – 8.

* آدرس نویسنده مسئول: بابل، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دفتر گروه زنان و زایمان، تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۳۵۹۴-۷.