

اثر سیر و عصاره آن بر ممانعت از رشد سودوموناس آئروژینوزا

زهرا مولانا^{*}، زهرا شاهنده^۲

۱- عضو هیأت علمی دانشکده پرایپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل-۲- کارشناس ارشد میکروبیشناسی

سابقه و هدف: سیر یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که در طی هزاران سال جهت درمان و پیشگیری از امراض و عفونتهای مختلف استفاده می‌شد. سودوموناس آئروژینوزا مهمترین پاتوژن انسانی است که به چندین داروی ضد میکروبی مقاوم بوده و مشکلاتی را در درمان ایجاد می‌کند. مطالعه بمنظور تأثیر سیر و عصاره آن بر روی باکتری مذکور، انجام گردید.

مواد و روشها: ابتدا سوش‌های استاندارد و بالینی سودوموناس آئروژینوزا تهیه و بعد از آماده‌سازی قطعات سیر با وزنهای مختلف ۰,۵، ۱، ۱,۵ و ۲ گرم (بصورت تازه، منجمد و حرارت دیده) و همچنین تهیه سوسپانسیون میکروبی با کدورتی مطابق با محلول ۰,۵ مک فارلند، باکتری روی محیط مولرهیتون آکار، کشت و قطعات سیر نیز بر روی آن قرار داده و اتوگذاری شد. همینظر عصاره کلروفرمی سیر با غلظت های ml mg/ ۷۰، ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰ بروش Nathan agar Well diffusion بر روی باکتری اثر داده شد و نیز MIC عصاره مذکور مورد آزمایش قرار گرفت. در انتها آنتی‌بیوگرام بروش دیسک دیفوژن بر روی سویه های مزبور، انجام شد.

افته‌ها: عصاره کلروفرمی سیر با غلظت ۴۰mg/ml بر روی سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا اثر باکتریسیدال و با غلظت ۳۵ mg/ml اثر باکتریوستاتیک بر سویه‌های استاندارد و بالینی و غلظت ۵۰ mg/ml هاله‌ای به قطر ۱۵ mm معادل هاله عدم رشد در اطراف دیسک ۱۰ میکروگرمی جنتامايسین داشته است. قطعات سیر با وزنهای مختلف سبب مهار رشد باکتری شده، بویژه هاله عدم رشد در اطراف قطعات منجمد، بطرز مشهودی بزرگتر بود. ولی قطعات حرارت دیده، کمترین تأثیر را بر روی سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا داشته است.

نتیجه‌گیری: عصاره کلروفرمی سیر با غلظت ۵۰mg/ ml قادر است. هاله عدم رشدی معادل دیسک ۱۰ میکروگرمی جنتامايسین ایجاد کند و از آنجائیکه قطعات سیر بویژه در حالت انجمام نیز می‌تواند رشد سودوموناس آئروژینوزا را مهار نمایند، توصیه می‌گردد تحقیقات بیشتری در ارتباط با غلظت مؤثره عصاره (آلیسین) بر روی پاتوژنها و نیز استفاده از عصاره بصورت پماد، کرم و صابون جهت ضد عفونی زخمها میکروبی بویژه سودومونایی انجام گیرد.

واژه‌های کلیدی: سیر، عصاره‌های گیاهی، سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیک.

خارجی، عفونت چشم، عفونت متعاقب ضربه، استئومیلیت، اندوکاردیت و عفونت راه تنفسی شود(۶).

این باکتری با سیل گرم منفی، متحرک با یک یا چند تاژک قطبی و هوازی اجباری می‌باشد که به چندین داروی ضد میکروبی مقاوم است، بنابراین بهنگام از بین رفتن فلور طبیعی بدن بر اثر تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها، رشد کرده، غلبه یافته و مشکلاتی را در درمان فراهم می‌سازد(۷). عوارض نامطلوب برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها و پیدایش مقاومت در باکتریها بر اثر استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های رایج، توجه محققان را به استفاده از فرآورده‌های طبیعی جلب کرده است(۹).

در بررسی Tsao و همکاران در سال ۲۰۰۱ بر روی سویه سودومonas آئروژینوزا مشخص گردید که روغن سیر و دی‌آلیل‌تری سولفید و دی‌آلیل تتراسولفید میتوانند بطور بالقوه برای پیشگیری و یا درمان عفونتهای بیمارستانی باکتریهای مقاوم به آنتی‌بیوتیک بکار رود(۱۰). از آنجاییکه گیاهان دارویی سالهای زیادی است که مورد استفاده قرار می‌گیرند(۲) و با توجه به اهمیت سودومonas آئروژینوزا و نیز خواص سیر، بر آن شدیدم تأثیر سیر و عصاره آن را بر روی باکتری مذکور بررسی نموده تا در صورت مشاهده مهار رشد، از آن در درمان بنحو مطلوب استفاده گردد.

مواد و روشها

در ابتدا سوش استاندارد لیوفیلیزه سودومonas آئروژینوزا 1074 PTCC از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهیه و مراحل کشت میکروبی آن بر روی محیط مولر هینتون آگار انجام گردید. همچنین میکروارگانیسم های بیمارستانی نیز جهت بررسی، از آزمایشگاه‌های میکروبشناسی بیمارستانهای تابعه دانشگاه تهیه شد. آزمایشها در سه مرحله اثر بازدارندگی فرمهای مختلف سیر، عصاره سیر و آنتی‌بیوگرام بر روی باکتری‌های مذکور انجام شد. لازم به ذکر است که جهت تمام مراحل از سوسپانسیون میکروبی که با محلول استاندارد ۰/۵ مک فارلند مقایسه شده بود، استفاده گردید(۸). در مرحله اول جهت بررسی اثر بازدارندگی از

مقدمه

سیر یکی از قدیمی‌ترین گیاهانی است که از دیرباز اثرات دارویی آن در درمان دردهایی نظیر ناراحتی‌های قلبی، سردرد، نیش زدگیها، دردهای انگلی و تومورها بکار رفته است. خاصیت ضد باکتریایی آن در سال ۱۸۵۸ توسط لویی پاستور گزارش داده شد(۲).

▣ هزینه انجام این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره ۱۳۷۹۲ از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تأمین شده است در زمانهای قدیم نیز از سیر برای پیشگیری از آلدگی اماكن به میکروب بیماری وبا، تیفوس، حصبه و... استفاده می‌کردند و حتی یکی از اطبای قدیم مصرف سیر را در موقع شیوع بیماریهای واگیردار بطور روزانه توصیه می‌نمود(۳). اثر ضد باکتری سیر به دلیل مواد مختلفی مانند آنین، اهونین، آلیسین و آلیستائین ۱و ۲ می‌باشد و بهمین دلیل بر ضد باکتریهای گرم مثبت و نیز باکتریهای گرم منفی، قارچها، انگلها و ویروسها بکار می‌رود(۴و ۵).

همچنین طبق تحقیقات بنظر می‌رسد اثر عصاره سیر بر روی باکتریهای گرم مثبت بیشتر از باکتریهای گرم منفی است(۶و ۷). بغير از اثر ضد میکروبی، سیر دارای اثرات متعدد دیگری از جمله اثر ضدالتهابی، خاصیت آنتی‌اکسیدان قوی و فعالیت حشره‌کشی بر علیه حشرات خانگی نیز می‌باشد(۱). سیر از خانواده زنبق، با نام علمی آلیوم ساتیوم است که اولین بار در سال ۱۸۴۴ توسط تئودور ورتایم شیمیدان آلمانی، مطالعاتی بر روی آن انجام شد. کشف کلیدی بعدی در شیمی سیر در سال ۱۹۴۴ توسط کاوالیتو و همکارانش بود که با استفاده از اتیل الکل به عنوان حلal از ۴ کیلوگرم سیر در دمای اتاق ، ۶ گرم روغن با خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی به فرمول O 2 S 10 H 6 C بدست آورد و آنرا آلیسین نامید(۴).

سودومonas آئروژینوزا مهمترین پاتوژن انسانی در گروه سودومonasها بوده که حالت تهاجمی داشته و عفونت را در بیمارانی با دفاع غیرطبیعی ایجاد می‌نماید و پاتوژن عمده بیمارستانی می‌باشد و می‌تواند سبب فولیکولیت، اوتیت گوش

۲۴ ساعت اتوگذاری و سپس بررسی گردید. آنتیبیوگرام به روش دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسک های آنتیبیوتیکی توبرامایسین، جنتامایسین، پیروفلوكسازین و آمیکاسین انجام شد(۱۲ و ۸).

همچنین تعیین MIC Tube - Dilution بروش (۱۲) با استفاده از محیط نوترینت براث استریل و عصاره سیر (غلاظت gr/۱۰۰ml ۷) و سوسپانسیون میکروبی انجام شد (غلاظت عصاره در لوله اول mg/ml ۳۵ و در لوله نهم ml ۰/۱۳۷ mg- و در لوله دهم صفر بوده است) پس از اتوگذاری در ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ ساعت، MIC مشاهده و گزارش گردید. جهت اطمینان از مشاهده چشمی نتایج حاصله، از هر لوله، یک لوب بر روی محیط مولر هیتون آگار استریل برد و پخش گردید و بعد از اتوگذاری ۲۴ ساعته در ۳۷ درجه سانتیگراد، بررسی شد. آزمایشات فوق برای سویه استاندارد و نیز سویه های بیمارستانی همین باکتری بطور مجزا انجام گردید.

یافته ها

عصاره سیر با غلاظت های مختلف بروش چاهک بر روی سویه های سودوموناس آئروژینورا غلاظت ۴۰ mg/ ml سبب ایجاد هاله عدم رشدی معادل ۱۴ mm در اطراف سوش استاندارد گردید، ولی در اطراف غلاظت های ۳۰، ۲۰mg/ml، ۱۰، ۵ هاله عدم رشدی مشاهده نشد. از سوی دیگر با افزایش غلاظت عصاره از ۴۰mg/ml به بالا، هاله عدم رشد در اطراف چاهک نیز افزایش یافت (جدول ۱).

رشد، سه فرم مختلف سیر (تازه، منجمد و حرارت دیده)، برشهای وزنی مختلف ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ گرم از قسمت مرکزی هر غده سیر (حتی الامکان با شکل یکسان) تهیه و بر روی پلیت مولر هیتون که از قبل باکتری مورد نظر بر روی آن کشت داده شده بود، قرار داده شد.

در مرحله دوم جهت بررسی اثر بازدارندگی عصاره سیر ابتدا از ۵ کیلوگرم سیر با استفاده از حلال کلروفرم عصاره گیری بعمل آمد و به منظور حذف حلال از دستگاه دوار تقطری در خلاء و حرارت ۳۵ درجه سانتیگراد استفاده گردید(۲) و در نهایت ۴ گرم عصاره که ماده ای روغنی، زرد رنگ و غلیظ با بوی تند سیر بود بدست آمد و در ۱۰۰ سی آب مقطر استریل حل شد (۴gr/۱۰۰ml). عصاره حاصله از فیلتر ۰/۲ میلی پور عبور داده شد و در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری گردید. همچنین جهت تهیه غلاظتهاي ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۶/۵ و ۷ گرم در ۱۰۰ سی آب فرمول C1V1 = C2V2 استفاده شد. سپس چاهک هایی با قطری معادل دیسک های آنتیبیوتیکی (۶ میلی متر) بر روی ژلوز ایجاد گردید (سه چاهک در هر پلیت با فاصله مناسب و کافی). سپس با سمپلر ۱۰۰ میکرولیتر از هر کدام از غلاظتها، در چاهک های یک پلیت تخلیه شد (روش Nathan Agar Well Diffusion) و همه پلیتها در اتو ۳۷ درجه سانتیگراد بمدت ۲۴ ساعت انکوبه شده (۱۱) و روز بعد قطر هاله عدم رشد با خطکش اندازه گیری گردید. جهت اطمینان بیشتر از نتایج، با سواب استریل از هر یک از هاله های عدم رشد در اطراف نمونه های مورد آزمایش برداشت شده و بر روی محیط مولر هیتون آگار استریل دیگری کشت و در ۳۷ درجه سانتیگراد

جدول ۱. تاثیر غلاظت های مختلف عصاره سیر به روش چاهک بر روی سودوموناس آئروژینورا

غلاظت عصاره بر حسب mg/ml	قطر هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر	در اطراف سوش استاندارد	در اطراف سویه های بالینی
۴۰	۱۴	۱۰	
۵۰	۱۵	۱۱	

۱۴

۱۶

۶۰

۱۴

۱۶

۷۰

جدول ۲. قطر هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر قطعات سیر تازه، منجمد و حرارت دیده

بر سویه های استاندارد و بالینی سودوموناس آئروژینوزا

سویه های بالینی				سویه استاندارد			وزن بر حسب گرم
سویر تازه	سویر منجمد	سویر حرارت دیده	سویر تازه	سویر منجمد	سویر حرارت دیده		
۱۹	۲۱	۰	۲۲	۳۱	۲۳	۰/۵	
۲۱	۲۵	۰	۲۶	۳۳	۲۷	۱	
۲۴	۲۶	۰	۲۶	۳۵	۲۶	۱/۵	
۲۸	۲۸	۰	۲۸	۳۶	۲۸	۲	

قطعات سیر تازه، منجمد و حرارت دیده در وزن های مختلف بر روی سویه های استاندارد و بالینی سودوموناس آئروژینوزا، سیر منجمد بیش از سیر تازه و حرارت دیده مؤثر بوده بطوریکه قطر هاله عدم رشد در اطراف قطعه $0/5$ گرمی سیر منجمد، $3/1$ میلی متر ولی در اطراف سیر تازه با همان وزن، $2/3$ میلی متر و در مورد سیر حرارت دیده، $2/2$ میلی متر بوده و با افزایش وزن قطعات سیر نیز قطر هاله عدم رشد بزرگتر گردید و همچنین سیر حرارت دیده در مقایسه با سیر تازه و منجمد کمترین تأثیر را بر باکتری ها داشت (جدول ۲). در تعیین MIC عصاره حاصله در سوشهای استاندارد و بالینی سودوموناس آئروژینوزا، کمترین غلظتی از عصاره در لوله، که رشد باکتری مشاهده نشد، غلظت 35mg/ml بود. این نتیجه با کشت مجدد سوسپانسیون های فوق الذکر بر روی محیط مولر هیبتون تأیید گردید. بنابراین بنظر می رسد با توجه به اثر باکتریسید عصاره با غلظت 40mg/ml ، 40mg/ml عصاره مذکور در محدوده $35-40\text{mg/ml}$ می باشد. در تست آنتی بیوگرام نیز سویه استاندارد به جنتاماکسین و سیپروفلوکساسین حساسیت به توبرامامیسین و آمیکاسین مقاومت نشان داد. اما در بررسی سویه های بالینی نتایج متفاوتی بدست آمد بطوریکه یک سویه بطور کامل به همه دیسکها و لی سویه های دیگر فقط به آمیکاسین و سیپروفلوکساسین حساس بودند.

بحث

با استفاده از روش چاهک و تأثیر عصاره سیر بر روی سودوموناس آئروژینوزا، حداقل غلظت باکتریسیدال 40mg/ml با قطر هاله عدم رشد برای سویه استاندارد 14mm و برای سویه های بالینی بطور متوسط 10mm بوده است. با افزایش غلظت عصاره به میزان $ml/50\text{mg}$ و $ml/60\text{mg}$ ، قطر هاله عدم رشد افزایش یافت ولی در غلظت $ml/70\text{mg}$ هاله عدم رشدی با قطر معادل غلظت $ml/60\text{mg}$ بدست آمد و این موضوع در مورد سویه های بالینی هم بهمین صورت بوده است. MIC بدست آمده برای سودوموناس آئروژینوزا با روش Tube - dillution برای سویه استاندارد و سویه های بالینی $ml/35\text{mg}$ بوده است.

در تحقیق انجام شده توسط صادقیان و همکاران تأثیر عصاره سیر به روش پرکولیشن اصلاح شده و سوکسله بر روی شیگلا بیانگر آن است که MBC عصاره بر روی باکتریهای مزبور با غلظتی معادل $ml/1000-250\text{mg}$ و MIC جهت عصاره الکلی معادل $ml/250\text{mg}$ و برای آبی $ml/500-1000\text{mg}$ بوده است (۱۵). در حالیکه در این تحقیق حداقل غلظت کشته باکتریها جهت سودوموناس آئروژینوزا $ml/40\text{mg}$ و $ml/40\text{mg}$ عصاره، $ml/35\text{mg}$ بدست آمد. تفاوت حاصله در میزان MIC و نیز حداقل غلظت کشته در دو تحقیق احتمالاً بدلیل تفاوت در روش عصاره گیری بوده است (۱۶). همچنین اثر سیر بر روی میکرووارگانیسم های مختلف نیز با هم متفاوت می باشد بطوریکه حتی با بکار گیری روش یکسان، تأثیر عصاره بر روی باکتریهای مختلف، یکسان نخواهد بود از جمله در پژوهش انجام شده توسط Arora و همکاران در سال ۱۹۹۹ نیز استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در عرض یکساعت ولی سالمونلاتیفی در عرض ۳ ساعت بر اثر مجاورت با عصاره سیر کشته شدند (۶). در تحقیق Dankert و همکاران، اثر مهار رشد عصاره

سیر، پیاز و موسیر بطريقه آگار ديفيوژن تست بر روی تعدادی از باكتريها و مخمرها، از جمله سودومonas آتروژينوزا و استافيلوكوكوس آرئوس بررسی گردید. مطابق اين تحقيق همه ارگانيسما بوسيله عصاره سير مهار شدند ولی غلظت بالايي از عصاره سير داراي اثر باكتريوسيد بر روی سودومonas آتروژينوزا بود^(۵) که موافق تحقيق ما بود.

در تحقيق Lastovica و همكاران در ارتباط با اثر آليسين بر كمپيلوباكتر و هليکوباكتر، عصاره آبي سير بر طبق روش تغيير يافته Fromtling and Bulmer تهيه شده و سپس عصاره آبي با غلظت معادل ۵۰mg/ml با روش Nathan agar well diffusion چاهک هاي بقطري ۱۰۰mm ميكروليلتر تلقيح شد. همه نمونهها بطور متوسط با قطر ۲۱mm حساسيت نشان دادند^(۱۱). از آنجايي که در تحقيق ما هم روش مذكور بكار رفته و با توجه به اينکه آليسين (جزء موثر سير) در حالهای آلى بيشتر از آب محلول است^(۱) بنابراین در تحقيق ما عصاره كلروفرمي سير با غلظت كمتری مؤثر بوده است.

در تحقيق قرچه بيدختي و همكاران عصاره كلروفرمي سير با اثر ضد ميكروبی بالا بر روی سودومonas آتروژينوزا گزارش شد و اثر عصاره مذكور به روش ديسك با استفاده از ديسك ۱۶۰۰ ميكروگرمی از عصاره با ديسك ۱۰ ميكروگرمی جنتامايسين مقاييسه گردید و اثر ديسك حاوي عصاره سير كمتر از جنتامايسين بوده است^(۱) که طبق اين مطالعه نيز غلظت بالاتری از عصاره يعني ۵۰mg/ml می تواند همان تأثير ديسك جنتامايسين را داشته باشد.

مقاييسه اثر سير تازه بر روی سويه استاندارد و باليني نشانگر آن است که سير تازه داراي اثر مهار رشد بر روی سويه استاندارد می باشد ولی هيچگونه تأثيری بر روی سويه های باليني نداشته است. اين موضوع احتمالاً بدليل آن است که سويه های جدا شده از بيماران نسبت به آنتىبيوتิก های مختلف، ژنهای مقاومت نسبت به ترکيباتي مشابه عصاره سير را از طرق مختلفی مثل دريافت پلاسميد و يا ترانسپوزون كسب كرده اند^(۷).

مقاييسه تأثير سير منجمد بر روی سويه های مذكور بيانگر آن است که قطعات مورد نظر اثر مهار كننده رشد داشته و با توجه به قطر هاله روي سويه استاندارد، تأثير آن واضح تر و بيشتر بوده است و اين موضوع بدليل حفظ بهتر و طولاني تر خاصيت باكتريسيdal آليسين در حرارت های زير صفر درجه سانتيگراد بوده و همچنین در سير منجمد در حين ذوب شدن، عصاره سير، براحتي در محيط كشت پخش شده و اثر باكتريسيdal آن ظاهر گردد^(۱۹و۱۸).

تأثير قطعات حرارت دиде سير بر روی انوع استاندارد و باليني سودومonas آتروژينوزا بصورت هاله کاهش رشد ملاحظه گردید و با توجه به حساس بودن آليسين به حرارت بالا و اينکه بسرعت توسيط حرارت تجزيء می شود میتوان اينگونه استنباط کرد که کاهش تأثير سير حرارت دиде بر روی باكتري ناشی از تجزيء ماده مؤثره موجود در آن يعني آليسين بوده است^(۱۸و۲).

در تحقيق Chen و همكاران نيز فعالیت ضد باكتريالي سير بر اثر حرارت دیدن، کاهش يافته است^(۱۹). قطر هاله عدم رشد با ۱۰۰ ميكروليلتر از غلظت ۵۰mg/ml عصاره سير با قطر هاله عدم رشد ديسك ۱۰ ميكروگرمی از جنتامايسين و توبرامايسين مطابقت می كند و در واقع قدرت عصاره سير با غلظت ۵۰mg/ml معادل با قدرت دو آنتىبيوتيك فوق الذكر می باشد.

تقدير و تشکر

بدينوسيله از معاونت محترم پژوهشی، کتابخانه دانشکده پردازشکی دانشگاه و همچنین آقایان مهندس مرادي، و دکتر صمدی و خانم فرزينوش که در اجرای اين مطالعه ما را ياري نموده اند، صميماهه تشکر و قدردانی می گردد.

منابع

۱. قرچه بيدختي ح، ابراهيمي اول ع. بررسی اثرات ضد باكتري و ضد قارچی عصاره های مختلف سیاهدانه، زرد چوبه و سير، مشهد، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد (دکتراي حرفه اي)، ۱۳۷۱؛ ص: ۱۱-۱۸ و ۷۷-۸ و ۱۱۰-۱۱.

۲. ایمانی فولادی ع، ستاری م، قاضی سعیدی ک. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره کلروفرمی سیر (آلیسین) بر روی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (حساس و مقاوم)، تهران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۷۶؛ ص: ۲۶-۳۰ و ۳۲-۵ و ۳۷-۸ و ۴۵-۶.

۳. زرگری ع. گیاهان دارویی، جلد چهارم، چاپ ششم، ۱۳۷۶؛ ص: ۶۲۰.

۴. صابری نجفی م. بررسی اثر عصاره کلروفرمی حاوی آلیسین سیر بر توکسین زایی شیگلاهای انترپاتوژن، تهران، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۷۵؛ ص: ۲۰.

5. Dankert J, Tromp TF, De Vries H, Klasen HJ. Antimicrobial activity of crude juices of Allium ascalonicum, Allium cepa and Allium sativum. *Medizinische Microbiologie und parasitologie* 1979; 245(1-2):229-39.

6. Arora DS, Kaur J. Antimicrobial activity of spices. *Int J Antimicrobial Agent* 1999; 12(3):257-62.

۷. نوروزی ج. میکروبیولوژی جاوتز ۱۹۹۸، موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان، اباصالح، ۱۳۷۸؛ ص: ۸۰ - ۲۷۸.

8. Forbes Betty A, Sahm Danie LF, Weissfeld Alice S, Balley and Scott S. *Diagnostic Microbiology*, 10th ed, Mosby 1998; pp: 448-55.

۹. حسامی ش، ستاری م، بهزادیان نژاد ق. بررسی سیر بر روی سودوموناس آنروژینوزا به کمک میکروسکوپ الکترونی سومین کنگره سراسری میکروبیولوژی ایران، همدان ۱-۳ شهریور ۱۳۷۹. ص: ۱۱۵.

10. Tsao S, Yin M. Invitro activity of garlic oil and four diallyl sulphides against antibiotic-resistant pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. *J Antimic Chemo* 2001; 47(5): 665-70.

11. Lastovica AJ, Dewet PM, Rode H, Sidler D. Allicin a possible answer to antibiotic resistant campylobacter diarrhoeal infection, *Arch Dis Child* 1999; 81:278 .

۱۲. نادری نسب ن، ناظم م، راشد ط. باکتری شناسی آزمایشگاهی، مشهد، بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۷۰؛ ص: ۶۶ - ۲۵۲.

13. Adetumbi MA, Lau BH, Allium sativum (garlic). A natural antibiotic (Review), *Med Hypotheses* 1983; 12(3):227-37.

14. Lampe Johanna W. Health effects of vegetables and fruit: assessing mechanisms of action in human experimental studies. *Am J Clin Nutr* 1999; 70 (3): 475-90.

۱۵. صادقیان ع، قزوینی ک، حریرزاده گ. بررسی اثرات سیر بر روی شیگلا و مقایسه آن با جنتامايسین، خلاصه مقالات چهارمین کنگره میکروبیشناسی با گرایش باکتری شناسی، ۱۵ الی ۱۷ آبان، تهران، ۱۳۸۰؛ ص: ۱۹.

16. Sumiysoshi H. New Pharmacological activities of garlic and constituents. (Review) . *Nippon Yakurigaku Zasshi-Folia Pharmacologica Japonica*. 110 suppl 1997; 1: 93-7.

۱۷. تصاعدی س، جلیل وند یوسفی، قلعه گلاب ن، آسمار م. بررسی اثر ضد باکتری سیر در پیشگیری و درمان سالمونلوز ، خلاصه مقالات هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمیسری ایران ۱۴ الی ۱۶ مهرماه بالسیر ۱۳۷۷؛ ص: ۹-۸۰.

18. Hawley Gessner G. The condensed chemical dictionary, 10th ed, by van Nostrand Reinhold Co Inc 1991; p: 33.

19. Chen HC, Chang TJ. Antibacterial properties of some spice plants before and after heat treatment, *J Microbiol Immunol* 1985; 18(3): 190-5.

* آدرس نویسنده مسئول: پایان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پراینژشکی، تلفن: ۰۱۱-۲۲۴۹۵۹۱.