

فشارخون طبیعی در کودکان ۷-۱۱ ساله زاهدان

دکتر غلامرضا سلیمانی^{۱*}، دکتر نورمحمد نوری^۱، طاهره بربری^۲

۱- استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - ۲- کارشناس ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان

سابقه و هدف: فشار خون بر اساس، سن، جنس، قد و وزن تغییر می‌کند و استفاده از استانداردها جهت تفسیر آن ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین میزان فشار خون طبیعی در کودکان ۷-۱۱ ساله زاهدان و مقایسه آن با استانداردها انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه پس از کسب مجوزهای قانونی و دریافت اطلاعات لازم از اداره کل آموزش و پرورش زاهدان بر روی ۱۵۰۰ دانش آموز که با روش نمونه گیری خوش ای از میان مدارس ابتدایی مناطق مختلف زاهدان انتخاب شده بودند، انجام شد. از این تعداد ۷۵۰ دانش آموز پسر و ۷۵۰ نفر دختر بودند که از هر پایه تحصیلی ۱۵۰ نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. پس از اندازه گیری قد و وزن و بعد از برقراری آرامش و رفع اضطراب دانش آموزان اندازه گیری فشار خون با کافهای مناسب جهت هر فرد در ۲ نوبت جداگانه و به فاصله ۲ هفته انجام می‌شد.

یافته‌ها: میانگین قد پسران ۷-۱۱ ساله به ترتیب سن ۱۲۰,۶، ۱۱۶، ۱۲۷، ۱۳۱,۶ و ۱۳۶ و در دختران به ترتیب ۱۱۷، ۱۲۱,۵، ۱۲۶,۵، ۱۳۲,۸ و ۱۳۶,۶ سانتیمتر بوده است و میانگین وزن در پسران به ترتیب سن ۱۹,۵، ۲۱,۲، ۲۳,۵ و ۲۵,۹ و در دختران به ترتیب ۱۹، ۲۰/۲، ۲۲/۵ و ۲۶/۱ و ۲۹/۲ کیلوگرم بوده است. میانگین فشار خون سیستولیک در پسران به ترتیب سن ۹۹,۵، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۲ و ۱۰۵/۳ و در دختران به ترتیب ۱۰۱، ۱۰۱,۲، ۱۰۲، ۱۰۳,۵ و ۱۰۶,۵ میلیمتر جیوه و میانگین فشار خون دیاستولیک در پسران به ترتیب سن ۷۰,۱، ۷۰,۷ و ۷۰,۷ و در دختران به ترتیب ۷۰,۱، ۷۰,۷ و ۷۰,۷ بدست آمد. جهت تخمین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بر حسب قد و وزن از معادله رگرسیون خطی و برای تعیین همبستگی بین فشار خون، قد و وزن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مشخص گردید این متغیرها با هم ارتباط مستقیم دارند.

نتیجه‌گیری: فشار خون سیستولیک در این منطقه تقریباً در حد قابل مقایسه با استانداردها می‌باشد در حالیکه فشار خون دیاستولیک به نسبت بالاتر و قد و وزن کودکان نیز بهوضوح کمتر از مقدار استاندارد برای هر صدک است.

واژه‌های کلیدی: فشارخون، سیستول، دیاستول، کودکان.

مقدمه

سیستول که بیشترین نیروی اعمال شده از طرف خون بر واحد سطح عروق است و دیاستول که حداقل نیروی وارد شده از جانب خون بر واحد سطح عروق می‌باشد(۱). فشار خون محدوده طبیعی عبارت از فشار

فشار خون عبارت از نیرویی است که از جانب خون بر واحد سطح عروق اعمال می‌شود و معمولاً واحد اندازه گیری آن میلیمتر جیوه است(۱). فشار خون دو قسمت دارد

مختلف زاهدان انتخاب شده بودند، انجام گرفت. از این تعداد ۷۵۰ نفر دانش آموز پسر و ۷۵۰ نفر دیگر دختر بودند که جهت هر پایه تحصیلی از اول تا پنجم دبستان ۱۵۰ نفر بطور تصادفی پسر و ۱۵۰ نفر دختر انتخاب شدند. این دانش آموزان از کودکان سالم هر مدرسه انتخاب شده و کودکانیکه سابقه بیماری قلبی عروقی، کلیوی و آندوکرین داشتند از مطالعه حذف گردیدند. عمدتاً بعداز ظهرها پس از برقراری آرامش و رفع اضطراب دانش آموزان، اندازه گیری فشارخون با کافهای مناسب جهت هر فرد صورت می‌گرفت. برای هر فرد، اندازه گیری فشارخون در ۲ نوبت جداگانه و به فاصله تقریبی ۲ هفته انجام می‌شد. پس از اندازه گیری و ثبت اندازه فشارخون، وزن و قد پسران و دختران، داده‌ها توسط نرم افزار Minitab و به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته‌ها

تجزیه و تحلیل توصیفی، شاخص‌هایی نظیر میانگین، میانه،٪۹۰ وسطی داده‌ها،٪۷۵٪۲۵ اول به همراه انحراف معیار و همچنین خطای معيار حاصل از نمونه گیری برای همه گروههای سنی اعم از دختر و پسر بدست آمد و سپس بر اساس اعداد و ارقام مرتب شده، صدکهای ۹۰ و ۹۵ که در مبحث اندازه گیری فشارخون از اهمیت بسزایی برخوردار است بصورت جداگانه محاسبه شد. میانگین شاخص‌های توصیفی قد، وزن و فشارخون در کودکان ۱۱-۷ ساله زاهدان در جدول (۱) آورده شده است. ترسیم خط روند کلی و نمایش تغییرات مربوط به اندازه‌های فشارخون در صدکهای ۵۰ و ۷۵ و ۹۰ و ۹۵ نیز در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده است.

سیستولیک و دیاستولیک زیر نو دمین پرسانتایل بر اساس قد، سن و جنس است(۳و۲). با افزایش سن، توده قلب نیز بزرگ شده و موجب افزایش فشار خون می‌گردد(۱). از آنجاییکه فشار خون سیستولیک بیشتر از دیاستولیک تغییر می‌کند فشار نیز افزایش می‌یابد(۲و۱). با افزایش سن الاستیته جدار عروق و مقاومت آن تغییر کرده و با تغییر مقاومت سرخرگی نیروی انقباضی بطن چپ افزایش پیدا کرده و مقدار بیشتری خون داخل آئورت می‌گردد که این امر برون ده قلب را افزایش می‌دهد(۲و۱). Behrman و Laroia نشان دادند که تغییرات فشارخون متناسب با سن تغییر می‌کند، در این مطالعات دما نیز یکی از عوامل محیطی مهمی بود که می‌توانست تغییرات فشارخون را تحت تأثیر قرار دهد(۵و۴).

Chan در مطالعه‌ای بر روی ۲۰۷۳ دانش آموز سینین ۱۴-۵ سال در هندستان نشان داد که تغییرات فشارخون بچه‌های سینین دبستان علاوه بر اینکه به سن واپسی است تحت تأثیر عوامل تغذیه‌ای و اقلیمی نیز می‌باشد(۶). در بررسی بر روی کودکان سینین ۱۲-۶ ساله مالزیایی مشاهده گردید که ارتباط قابل توجهی بین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با افزایش قد، وزن و BMI وجود دارد(۵). با توجه به گزارشات متعدد بر آن شدیم تا میزان فشارخون طبیعی را در کودکان ۱۱-۷ ساله شهر زاهدان تعیین کنیم و اطلاعات حاصل را با استانداردها مقایسه کنیم.

مواد و روشها

این مطالعه پس از کسب مجوزهای قانونی و دریافت اطلاعات لازم از اداره کل آموزش و پرورش شهرستان زاهدان، بر روی ۱۵۰۰ دانش آموز که با روش نمونه گیری خوش‌ای از میان مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی مناطق

جدول ۱. میانگین قد، وزن و فشارخون در کودکان ۱۱-۷ ساله شهرستان زاهدان سال ۱۳۸۰

سن (سال)	جنس		دختر	پسر
	دیاستولیک	سیستولیک		
۷	۷۰	۱۰۱	۱۹	۱۱۷
۱۱۶	۱۹/۵	۹۹/۵	۶۸/۵	۹۹/۵


۱۲۰/۶	۲۱/۲	۱۰۰	۶۸/۸	۱۲۱/۵	۲۰/۲	۱۰۱/۲	۷۰/۱	۸
۱۲۷	۲۲/۵	۱۰۲	۷۰/۷	۱۲۶/۵	۲۲/۵	۱۰۲	۷۱/۵	۹
۱۳۱/۶	۲۵/۹	۱۰۲/۱	۷۰/۷	۱۳۲/۸	۲۶/۱	۱۰۳/۵	۷۱/۶	۱۰
۱۳۶	۲۸	۱۰۵/۳	۷۰/۷	۱۳۶/۶	۲۹/۲	۱۰۶/۵	۷۲/۷	۱۱

سیستولیک و وزن $0/39$ ، بین فشار دیاستولیک و قد $0/3$ و بین فشار دیاستولیک و وزن $0/3$ بوده است. معادله جهت تخمین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بر حسب قد و وزن کودک که از روی معادله رگرسیون خطی چند متغیره بدست آمده برای کودکان ۱۰ ساله پسر بصورت (وزن) $+0/538$ $+0/460$ $+0/70$ $= ۵۵$ فشار خون سیستولیک (وزن) $(قد)$ $+0/281$ $+0/134$ $+0/840$ $= ۴۵$ فشارخون دیاستولیک است. بنابراین طبق معادله رگرسیون خطی چند متغیره می‌توان میزان فشار خون طبیعی را در کودکان بر اساس قد و وزن در پرستایل‌های مختلف محاسبه نمود. مثلاً محاسبه فشار خون طبیعی در کودکان ۷-۱۱ ساله بر اساس نوادمین پرستایل به صورت 105 و $107/2$ $(80/7)$ و $107/2$ $(82/5)$ و 110 و $110/5$ و 115 و $115/5$ و $126/5$ و $126/5$ است. برای کل کودکان ۷-۱۱ ساله میانگین‌های بدست آمده با ضریب اطمینان 95% محاسبه شده است. بعنوان مثال فشارخون سیستولیک پسران ۷ سال با انحراف معیار تقریباً 8 و خطای نمونه $94/64$ ٪ بین $98/1$ و $100/7$ قرار دارد.


بحث

در این مطالعه محدوده سنی کودکان، ۷-۱۱ سال برای اندازه گیری قد، وزن و فشارخون بوده است که با مطالعات Chan,Khan و همکاران (۱۹۹۴، ۲۰۰۰) که در کودکان سنین مدرسه در پاکستان و مالزی انجام شده است همخوانی دارد (۶۷/۶). متوسط وزن و قد کودکان در این مطالعه بین $10-25$ پرستایل بوده است که در سایر گزارشات متوسط وزن (کیلوگرم) و قد (سانتیمتر) برای کودکان ۷-۱۱ سال به ترتیب $(22/9)$ و $(22/9)$ ، $(25/1)$ ، $(27/3)$ ، $(28/3)$ ، $(135/2)$ ، $(137/5)$ ، $(31/4)$ و $(35/3)$ و $(143/5)$ است (۴).

در این مطالعه متوسط فشارخون سیستولیک بر اساس قد با سایر گزارشات همخوانی کامل دارد، اما متوسط فشار



نمودار ۱. اندازه گیری فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در پسران ۷-۱۱ ساله زاهدان براساس سن در شهر زاهدان ۱۳۸۰



نمودار ۲. اندازه گیری فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در دختران ۷-۱۱ ساله زاهدان براساس سن در شهر زاهدان ۱۳۸۰

مسیر کلی و خط گرایش بدست آمده با اطلاعات معتبر و استاندارد از یافته های مهم این تحقیق می باشد. ضریب همبستگی پرسون نشان داد که بین فشارخون، قد و وزن، ارتباط مستقیم وجود داشته و بر روی یکدیگر تأثیر می گذارند.

در کودکان ۱۰ ساله پسر ضریب همبستگی بین قد و وزن $0/76$ ، بین فشار خون سیستولیک و قد $0/37$ ، بین فشار

به این نکته نیز باید توجه نمود که در نوادمین پرستایل در جنس پسر و دختر تغییرات فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، قد و وزن در سنین ۷-۱۱ سال با پنجاهمین پرستایل برای فشار خون و بیست و پنجمین پرستایل برای قد و وزن هماهنگی دارد (۵۰ و ۳۰). با توجه به یافته های این مطالعه مشخص شد که فشار خون سیستولیک با تغییر جزئی مشابه پژوهش های دیگران بوده است. اما فشار خون دیاستولیک کمی بالاتر از فشارخون دیاستولیک در سایر مطالعات بود ولی وزن و قد کودکان کاهاش قابل توجهی را نسبت به سایر گزارشات نشان می دهد بطوریکه وزن و قد کودکان ما، بین دهمین تا بیست و پنجمین صدک مطالعات دیگران است (۴) که شاید دلیل آن سوء تغذیه حاکم در این منطقه از کشورمان باشد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از کلیه معلمین بهداشت و دانش آموزان شهر زاهدان که در انجام این مطالعه ما را یاری کردند قدردانی می شود.

دیاستولیک در این پژوهش در کودکان ۷-۱۱ ساله به ترتیب (۷۵ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۳ و ۸۵) میلیمتر جیوه بوده، در حالیکه در سایر مطالعات متوسط فشار دیاستولیک در این سنین (۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹) بوده است (۲۳ و ۲۰). در این بررسی میان تغییرات وزن، قد و فشارخون در سالهای مختلف اختلاف معنی دار وجود داشت. یافته های این مطالعه قسمتی از نتایج Chadha, Laroia و همکاران (۱۹۹۵-۱۹۹۹) را که بر روی ۱۰۲۱۵ دانش آموز پسر و دختر سنین ۵-۱۴ ساله هند انجام شده است تأیید می کند، این پژوهشگران افزایش قد و وزن را دلیل افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در گروههای سنی مورد مطالعه عنوان می کنند (۵۰ و ۵۹).

همچنین نتیجه این بررسی نشان می دهد که حتی در محدوده سنی ۷-۱۱ سال بدبناهی افزایش توده بدن، قد و وزن، تغییرات فشارخون با افزایش سن محسوس و قابل اندازه گیری است که احتمالاً ناشی از پاسخ جبرانی توده بطن جهت پمپاژ مناسب خون بداخل عروق جهت رفع نیازهای بدن می باشد (۱۰).

References

1. Guyton AC, Hall JE: Text book of medical physiology, 9th ed, W.B Saunders Co, Philadelphia 1996; pp: 161-293.
2. Allen HD, Gutgesell HP, Clauk EB, et al: Moss and Adams' heart disease in infants, children and adolescents, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer Co, Philadelphia 2001; pp: 1400-11.
3. Martin Barratt MB, Ellis DA, William EH. Pediatric nephrology, 4th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer Co 1998; pp: 959-1050.
4. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB: Nelson textbook of pediatrics, 16th ed, W.B. Saunders Co. Philadelphia 2000; pp: 43-50.
5. Laroia D, sharma M, Diwedi V, et al: Profile of blood pressure in normal school children. Indian Pediatric J 1995; 26(6): 531-6.
6. Chan PW, Cheong B, Nadarajan BH, et al: Blood pressure values in healthy Malaysian children age 6-12 years, Med J Malaysia 2000; 55 (4): 506-9.
7. Khan TH, Mohmud Z, Tasawar Z, et al. Blood pressure distribution in school age population of quette pakistan, Antropolo Anz1994 ; 52(3): 231-8.
8. Wang X, Wang B, Zhang F, et al. Blood pressure at age 3-24 years in a rural community in Anhui; Chia, Ann Epidemiol 1998; 8(8): 504-12.
9. Chadha SL, Tandon R, Shekhawat S, et al: An epidemiological study of blood pressure in school children (5-14 years) in Dehli Indian Heart J 1999; 51 (2):178-82.
10. Shahraki MR, Sanadgol H, Sepehri GR. Measurment and comparison of blood pressure among boy students in primary schools, Tabib E Shargh J 1999; (2): 69-72.

* آدرس نویسنده مسئول: زاهدان، خیابان آزادی، بیمارستان علی اصغر(ع)، بخش اطفال، تلفن: ۰۵۴۱-۳۲۲۹۶۸۱-۹.