

مقایسه سطوح هورمونی پایه در افراد با علت مشخص و نامشخص

زهرا بصیرت^{*}، کریم الله حاجیان^۱، فاطمه بصیرت^۲

۱- استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل-۲- استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل-۳- پژوهش عمومی

سابقه و هدف: سقط راجعه به حداقل ۲ سقط پیاپی در سه ماهه اول بارداری گفته می‌شود. به دلیل واپسته بودن حاملگی به تغییرات اندوکرین سیکل قاعده‌گی، اختلالات آن نیز می‌تواند در پیامد حاملگی موثر باشد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه تغییرات هورمونی با موارد سقط راجعه است.

مواد و روشها: مطالعه به صورت مورد-شاهدی بر روی ۹۲ بیمار با سقط راجعه مراجعه کننده به مرکز نازی فاطمه زهرا (س) انجام شد. از تمام بیماران هیستروسالپنگوگرافی، کاربوبتیپ والدین، سونوگرافی واژینال، اندازه گیری آنتی بادی آنتی فسفولیپید، آنتی بادی آنتی کاربیولیپین، تاریخچه و معاینه فیزیکی، جهت ارزیابی علل احتمالی سقط راجعه انجام شد. سپس سطوح هورمونی (LH,FSH,TSH,Prolactin) در دو گروه با علت مشخص و نامشخص اندازه گیری و با هم مقایسه شد.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد ۴۱-۴۸/۵ سال (۲۹-۲۶/۵ سال) و میانگین تعداد سقط ۱/۱±۰/۵ و میانگین مدت ازدواج ۴/۵±۰/۵ سال (۱-۲۰ سال) بود. میانگین هورمون‌ها در دو گروه با علت مشخص و نامشخص مقایسه شد، که TSH در گروه با علت نامشخص پائین تر بوده است به ترتیب ۱/۸±۰/۱ و ۱/۰±۰/۲ (p=۰/۰۰۴). پرولاکتین در بیماران با سقط مکرر همراه با تخدمان پلی کیستیک بالاتر بوده است (p=۰/۰۵).

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، توصیه می‌شود اختلال عملکرد تیروئید و هیپرپرولاکتینیسم به عنوان یکی از علل احتمالی سقط راجعه در نظر گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: سقط راجعه، از دست دادن مکرر حاملگی، سطح هورمونی پایه، هورمون محرك تیروئید، پرولاکتین.

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نهم، شماره ۳، مرداد - شهریور ۱۳۸۶، صفحه ۲۰-۲۶

آن تجربه‌ای بسیار نامید کننده برای بیمار و پژوهش می‌باشد. فقط

مقدمه

در کمتر از ۵۰٪ موارد سقط راجعه، علت شناخته شده ای وجود دارد

سقط راجعه به معنی سه سقط پی در پی، در سه ماه اول

(۱). بارداری گفته می‌شود (۲). بعضی ها حداقل ۲ سقط پیاپی را سقط

راجعه تلقی می‌کنند (۳). با وجود اینکه، فقط ۱٪ زوجها مبتلا به

(۱). در مطالعه انجام شده توسط Diejomaoh و همکاران علل
عمده سقط، آنومالی رحم (۲/۲٪)، کروموزومی (۲/۲٪)، آنتی بادی

سقط مکرر می‌شوند، به علت نامشخص بودن اثر درمان و اتیولوژی

انجام آزمایشات، بر اساس وجود یا عدم وجود علتی برای سقط به دو گروه ۳۵ نفری (سقط راجعه با علت مشخص) و ۵۷ نفری (سقط راجعه بدون علت مشخص) تقسیم شدند. افراد بطور متوسط ۳ تا ۶ ماه پس از سقط، جهت درمان مراجعه کرده و وارد مطالعه شدند. سقط راجعه به صورت حداقل ۲ بار ختم خودبخودی حاملگی زیر ۲۰ هفته تعریف شد. همچنین کلیه افراد هر دو گروه سابقه حاملگی نرمال نداشتند. در تمامی افراد جهت بررسی علت سقط، هیستروپالنگوگرافی در روز ۹-۱۱ سیکل قاعدگی جهت بررسی وضعیت ساختمانی رحم، کاریوتیپ والدین جهت بررسی اختلالات کروموزومی (با روش کشت خون و بررسی میکروسکوپی)، اندازه گیری آنتی بادی آنتی فسفولیپید و آنتی بادی آنتی کاردیولیپین (کیت ارگانتک شرکت ماینس آلمان)، ارزیابی هورمونی در روز سوم سیکل قاعدگی به روش Radio Immuno Assay توسط کیت کاوشیار، به صورت ارزیابی سطوح هورمون لوتئینیزه کننده (LH)، هورمون محرک فولیکولی (FSH)، هورمون محرک تیروئید (TSH) و پرولاکتین (PRL) در یک آزمایشگاه انجام شد. همچنان پرسشنامه ای شامل: سن، مدت ازدواج، تعداد حاملگی، سن حاملگی ها در هر سقط، آنومالی رحم، اختلالات کروموزومی، تخدمان پلی کیستیک، عفونت، ارتباط فامیلی، آنتی بادی آنتی کاردیولیپین، آنتی بادی آنتی فسفولیپید و سطح هورمونی TSH و پرولاکتین در روز سوم سیکل قاعدگی از هر بیمار تکمیل گردید.

ارتباط فامیلی مشت ب صورت وابستگی فامیلی درجه ۳ و تخدمان پلی کیستیک براساس وجود ۱۰ کیست یا بیشتر با قطر ۲-۸ میلی متر در یک سطح و افزایش دانسیتی استرومای تخدمان در سونوگرافی روز سوم سیکل قاعدگی، تعریف شد^(۶). عفونت به صورت ابتلا به کوریوآمنیونیت در بارداری با توجه به وجود تب و حساسیت رحم در لمس و شواهد آزمایشگاهی موجود، در نظر گرفته شد^(۷).

اختلالات آناتومیک نیز آنومالی های ساختمانی رحم مرتبط با سقط تعریف شد^(۳). موارد سقط راجعه که دارای حداقل یکی از علل سقط راجعه شامل اختلالات آناتومیک، اختلالات کروموزومی،

آنتی فسفولیپید (۳۳/۳٪)، تخدمان پلی کیستیک (PCO) عفونت ها و علل متفرقه (۲۱/۲٪) بوده و ۳۵/۶٪ علل ناشناخته داشته اند^(۳). به دلیل وابسته بودن حاملگی نرمال به تغییرات اندوکربنولوژیک سیکل قاعدگی، تغییرات اندوکرین، احتمالاً در عاقبت حاملگی موثر هستند. این تغییرات شامل عدم کفايت فاز لوتنال، بیماری تیروئید، هیپرپرولاکتینی و کاهش ذخیره تخدمانی است. افزایش LH موجب پری زودرس اووسیت و عدم هماهنگی در بلوغ اندومتر می شود. همچنین بیشتر بیماران با LH بالا، ویژگیهای PCO^۱ را دارند و بیمارانی چاق با افزایش سطح آندروژن می باشند. با اینکه این موضوع بسیار بحث انگیز است، احتمالاً افزایش آندروژن بر آندومتر اثرات معکوس دارد که در سقط های مکرر دخیل می باشد. ارتباط هیپوتیروئیدی و هیپرپرولاکتینی با سقط مکرر هنوز هم بسیار مطرح است. اخیراً سعی شده است که فاکتورهای نمایانگر ذخیره تخدمانی (FSH روز سوم و استرادیول روز سوم) را با از دست دادن مکرر حاملگی مرتبط سازند^(۴).

در مطالعه Troust که روی ۵۷ زن با سقط راجعه^(۵) مورد با علت نامشخص و ۲۱ مورد با علت مشخص انجام شد، دریافتند که زنان با سقط راجعه بدون علت مشخص، سطوح بالاتری از FSH سرم روز ۳ و استرادیول در مقایسه با زنان گروه با علت مشخص داشتند. بنابراین کاهش ذخیره تخدمانی ممکن است در سقط راجعه دخیل بوده و باید به عنوان یکی از علل، در پیگیری موارد سقط راجعه مدنظر قرار گیرد^(۵).

چون شناختن موارد سقط مرتبط با اختلالات هورمونی می تواند مادر را تابع درمان اندوکرینی جهت پیشگیری از سقط های آینده نماید. لذا برآن شدیم تا سطح هورمونی پایه را در بیماران با سقط راجعه ارزیابی کنیم.

مواد و روشها

مطالعه حاضر به روش مورد - شاهدی (Case-control) بر روی ۹۲ زن مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) بابل که دارای سقط راجعه بودند، انجام شد. بیماران پس از ویزیت اولیه و

¹ Polycystic ovary

² Recurrent abortion

(۱۰۰)۹۲	(۹۶/۸)۸۹	(۳/۲)۳	عفونت
(۱۰۰)۹۲	(۸۹)۸۲	(۱۱)۱۰	ارتباط فامیلی
(۱۰۰)۹۲	(۸۸)۸۱	(۱۲)۱۱	آنٹی کارديو لیپتين و آنتی فسفولیپید آنتی بادی
<hr/>			

میانگین هورمون ها در کل افراد مورد مطالعه در مورد FSH، LH، TSH، PRL و APL کمتر از 10mIU/l و در مورد چربی کنین $16\pm 4/3$ بوده که همگی در محدوده نرمال آزمایشات بودند. میانگین هورمون ها به تفکیک علت مشخص و نامشخص در جدول ۲، به تفکیک علل در جدول ۳ نشان داده شد.

جدول ۲. سطح هورمونها (میانگین \pm انحراف معیار) به تفکیک
علت مشخص و نامشخص

p-value	Mean \pm SD	علت سقط
انواع هورمونها		
FSH		
۰/۶۱۹	۶/۲ \pm ۳/۵	مشخص
	۶/۷ \pm ۵/۳	نامشخص
LH		
۰/۴۶۴	۷/۸ \pm ۵/۵	مشخص
	۷/۱ \pm ۴/۴	نامشخص
TSH		
۰/۰۰۴	۲/۳ \pm ۱/۸	مشخص
	۱/۵ \pm ۱/۰	نامشخص
PRL		
۰/۵۳۵	۱۷/۴ \pm ۱۳/۸	مشخص
	۱۵/۹ \pm ۱۱/۱	نامشخص

توزیع فراوانی نسبی وضعیت غیر طبیعی هورمونهای LH و PRL به تفکیک علل مختلف سقط ارزیابی شد که

تخمدان پلی کیستیک، ارتباط فامیلی، اختلالات ایمونولوژیک بوده سقط راجعه با علت مشخص تعریف شد.

سطوح نرمال آزمایشات به صورت FSH: $2/5-13\text{nmol/lit}$ ، TSH: $0/3-5/1\text{nmol/lit}$ ، LH: $1/4-13\text{nmol/lit}$ ، APL: $3/2-25/3\text{Nmol/lit}$ تعريف شد، سطح هورمونی پایه روز سوم سیکل از 15mIU/L قاعده‌گی در دو گروه سقط راجعه با علت مشخص و نامشخص مورد مقایسه قرار گرفت.

داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای داده‌های کیفی، از تست χ^2 و تست دقیق فیشر استفاده شد و مقایسه میانگین سطح هورمون ها در گروه‌های مختلف، با استفاده از آزمون t در دو گروه مستقل انجام گرفت.

یافته‌ها

۹۲ مورد بیمار با سقط راجعه شامل (۳۵٪) مورد با علت مشخص و (۵۷٪) با علت نامشخص که به مرکز ناباروری فاطمه زهراء (س) مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. فراوانی و درصد علل مرتبط با سقط در جدول ۱ نشان داده شد. ۵ نفر دارای سن زیر ۲۰ سال (۰/۵٪)، ۶۲ نفر سن ۲۰-۳۴ سال (۷۱/۳٪) و ۲۰ نفر سن ۳۵ سال و بیشتر (۲۲٪) داشته اند و در ۵ مورد سن نامشخص داشته اند. میانگین سنی گروه مورد مطالعه $29/2\pm 6/5$ (۱۸-۴۶ سال)، میانگین مدت ازدواج $5/5\pm 4/2$ (۱۰-۲۰ سال) و میانگین تعداد سقط $2/5\pm 1/1$ (۲-۸ عدد) بوده است.

جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد علل مرتبط با سقط راجعه در افراد مورد مطالعه

علل مرتبط با سقط	جمع	وجود دارد	وجود ندارد	تعداد(%)	تعداد(%)
آنومالی رحم	(۱۰/۸)۱۰	(۸۹/۲)۸۲	(۱۰۰)۹۲	(۸۹/۲)	(۹۶/۸)
اختلالات کروموزومی	(۸/۷)۸	(۹۱/۳)۸۴	(۱۰۰)۹۲	(۹۱/۳)	(۸۹)
تخمدان پلی کیستیک	(۱۷)۱۶	(۸۳)۷۶	(۱۰۰)۹۲	(۸۳)	(۸۹)

همچنین در افراد با علل ایمونولوژیک، سطح TSH بطور معنی داری پایین تر بوده است ($p=0.034$). (p<0.05).

جدول ۳. سطوح هورمون ها به تفکیک علل در افراد با سقط راجعه با علت مشخص

PRL Mean±SD	TSH Mean±SD	LH Mean±SD	FSH Mean±SD	هرمون ها علت سقط
آنومالی رحم				
۱۵/۱±۴/۵	۲/۵±۱/۴	۷/۴±۵/۸	۶/۹±۴/۹	دارد
۱۶/۴±۱۲/۸	۱/۷±۱/۴	۷/۴±۴/۸	۶/۵±۴/۷	ندارد
اختلال کروموزوم				
۱۸/۱±۲۰/۱	۱/۶±۱/۲	۸/۸±۷/۵	۵/۶±۳/۸	دارد
۱۵/۹±۱۰/۹	۱/۸±۱/۴	۷/۱±۴/۵	۶/۶±۴/۹	ندارد
تخمدان پلی کیستیک				
۱۸/۰±۱۴/۲	۱/۸±۱/۲	۹/۳±۵/۲	۶/۱±۳/۴	دارد
۱۵/۶±۱۱/۹	۲/۲±۱/۲	۷/۱±۴/۷	۶/۵±۴/۹	ندارد
عفونت				
۲/۵±۵/۹	۲/۷±۱/۴	۳/۸±۱/۲	۶/۰±۴/۸	دارد
۱۶/۲±۱۲/۱	۱/۹±۱/۴	۷/۴±۴/۸	۶/۴±۴/۵	ندارد
سابقه فامیلی				
۱۳/۳±۴/۹	۲/۲±۱/۵	۸/۶±۵/۴	۶/۲±۳/۴	دارد
۱۶/۶±۱۲/۶	۱/۸±۱/۴	۷/۲±۴/۸	۶/۵±۴/۸	ندارد
اختلال ایمونولوژیک				
۱۲/۸±۵/۹	*۲/۸±۲/۸	۵/۹±۴/۵	۶/۴±۴/۰	دارد
۱۶/۴±۱۳/۲	۱/۷±۱/۳	۷/۸±۵/۱	۶/۷±۰/۵	ندارد

در مطالعه Nardo و همکاران میانگین سنی گروه مورد مطالعه، ۳۲ سال و میانگین تعداد سقط ۴ عدد بوده است (۸). در مطالعه Clifford و همکاران، میانگین سنی ۳۲/۹ سال و میانگین تعداد سقط ۴ عدد بوده است (۹).

($p=0.034$) *

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر آزمایشات هورمونی شامل FSH و TSH و PRL در روز سوم قاعده‌گی در دو گروه سقط راجعه با علت مشخص و بدون علت مشخص، اندازه گیری و مقایسه شد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۱-۴۸ (۲۹/۲±۶/۵ سال) و میانگین تعداد سقط ۱/۱ (۲/۵±۰/۸ سقط) بوده است.

در مطالعه حاضر آزمایشات هورمونی شامل FSH، LH، FSH و PRL در روز سوم قاعده‌گی در دو گروه سقط راجعه با علت مشخص و بدون علت مشخص، اندازه گیری و مقایسه شد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۱-۴۸ (۲۹/۲±۶/۵ سال) و میانگین تعداد سقط ۱/۱ (۲/۵±۰/۸ سقط) بوده است.

سقط راجعه مرتبط دانسته و شناختن این موارد را کمکی جهت تابعیت بیماران برای درمان اندوکرینی لازم، فرض کردند (۱۰). در مطالعه Gurbuz و همکاران، FSH، LH، DHEAS و Prostaglandins در گروه سقط راجعه بدون علت مشخص به طور واضحی بالاتر از گروه با علت مشخص بوده است و همچنین TSH و تستوسترون در دو گروه مشابه بوده است. در نتیجه گیری انجام شده، اختلالات اندوکرینی فاز فولیکولار را در سقط راجعه دخیل ندانسته اند (۱۴).

در مطالعه Nardo و همکاران، هیچ ارتباطی بین PCO و افزایش ترشح LH، تستوسترون بالا و BMI با پیش آگهی حاملگی در خانم های با سقط راجعه بدون علت یافت نشد (۸). در مطالعه Troust و همکاران، زنان با سقط راجعه بدون علت مشخص، شیوع بالاتری از افزایش FSH سرم در روز ۳ و استرادیول در مقایسه با گروه کنترل (سقط راجعه با علت مشخص) داشته اند. بنابراین دخالت کاهش ذخیره تخمدانی در سقط راجعه را ممکن و آن را به عنوان یکی از پیگیری های لازم در موارد سقط راجعه دانسته اند (۵). Tulppala و همکاران دریافتند که حضور PCO نمی تواند سقط را پیش بینی کند، اما PCO و هیپرآندروژنیسم می تواند با سقط راجعه مرتبط باشد (۱۵).

نتایج مطالعه Li و همکاران، حاکی از عدم وجود ارتباط میان سقط راجعه و هیپرپرولاکتینیمی و عملکرد غیر طبیعی تیروئید بوده است. اما اختلالات انdometriوم و اندوکرین، در یک چهارم خانم های با سقط راجعه بدون علت مشخص وجود داشته است (۱۶). در مطالعه حاضر سطح هورمونهای FSH، LH، TSH و پرولاکتین در علل مختلف مرتبط با سقط بررسی شد که در افراد با علل ایمونولوژیک، سطح TSH بطور معنی داری پائین تر بوده است ($p=0.034$).

Kutteh و همکاران، دریافتند که آنتی بادی آنتی تیروئید به عنوان یک اتو آنتی بادی، می تواند بیانگر فعالیت اتوایمیون و وجود ارتباط با افزایش خطر ختم حاملگی و بیماریهای تیروئید بعد از زایمان باشد. در این مطالعه آنتی بادی آنتی تیروئید، در زنان با سقط راجعه شایع تر بوده است (۱۷).

است (عو۱۰). با توجه به میانگین سنی در مطالعه حاضر پائین تر بودن آن ممکن است به علت پائین تر بودن سن ازدواج در منطقه مورد مطالعه باشد. در مطالعه حاضر درصد آنومالی رحم (۸/۱۰)، اختلالات کروموزومی (۷/۸)، PCO (۲/۳)، عفونت (۲/۳)، ارتباط خانوادگی (۱۱٪) و فاکتورهای ایمونولوژیک (۱۲٪) بوده و ۶۲٪ علت ناشناخته داشتند. در مطالعه انجام شده توسط Diejomaoh و همکاران علل عمده سقط شامل آنومالی رحم (۲/۲٪)، کروموزومی (۳/۳٪)، آنتی بادی آنتی فسفولیپید (۲/۲٪)، عفونت ها و علل متفرقه (۲/۲٪) بوده و ۳۵/۶٪ علل ناشناخته داشته اند (۳). در مطالعه Clifford و همکاران، ۵٪ بیماران، CO داشتند و آنتی بادی آنتی فسفولیپید در ۱۴٪ زنان یافت شد و اختلال کروموزومی در ۳/۶٪ بیماران وجود داشت (۹). در مطالعه Berkane (۱۱٪) و Balasch (۵٪) بیماران سقط با علت مشخص داشتند. در مطالعه Rai و همکاران، PCO در ۷/۴٪ مورد و در مطالعه Lidell و همکاران، PCO در ۳۶٪ موارد وجود داشته است (۱۲). در مطالعه Christiansen و همکاران، ۱۰٪ اختلالات ساختمانی رحم، ۱۰٪ اختلالات اندوکرینی و ۱۵٪ آنتی بادی آنتی فسفولیپید داشته اند (۱۳). با توجه به مطالعات مذکور، علت یابی و شناخت علل موجود مرتبط با سقط در افراد با سقط راجعه، کمک شایانی در رفع علل و در نتیجه بهبود پیش آگهی حاملگی دارد. در مطالعه حاضر، میانگین هورمون ها در افراد با سقط راجعه در محدوده نرمال می باشد و در مقایسه هورمونی انجام شده بین دو گروه سقط راجعه با علت مشخص و نامشخص، فقط TSH در گروه نامشخص پائین تر بوده است ($p=0.004$).

در مطالعه Christiansen و همکاران، ۲٪ زنان با از دست دادن حاملگی در تریمستر دوم، هیپوتیروئید بودند. بنابراین پیشنهاد شد در تمام زنان با سقط، عملکرد تیروئید آنها بررسی شود (۱۳). در مطالعه Bussen و همکاران، که در دو گروه، سقط راجعه خودبخودی در مقایسه با زنان نولی گراوید با نازابی فاکتور مردانه یا لوله ای - انجام شد. پرولاکتین و آندوسترونیدیون در گروه سقط راجعه بالاتر از گروه شاهد (علیرغم وجود در محدوده نرمال)، و TSH در دو گروه مشابه بوده است. که یافته های فوق را با علت

لوთال به درجات مختلف بوده است. میزان پرولاکتین را با عملکرد لوთال در اوایل حاملگی مرتبط دانسته اند (۱۹). در مطالعه Ando و همکاران هیپرپرولاکتینمی به عنوان یکی از علل سقط راجعه (با علت نامشخص) بوده است. بیماران با اختلالات هیپرپرولاکتینمی بدون اختلال عملکرد جسم زرد، با برومکریپتین تحت درمان قرار گرفته و این درمان کمک موثری در نگهداری حاملگی داشته است (۲۰). یافته های این مطالعه، نشان داد که اختلالات عملکردی تیروئید و هیپرپرولاکتینمی باید به عنوان یک اختلال اندوکرین در افراد با سقط راجعه در نظر گرفته شود.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از همکاری پرسنل محترم مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) بابل تقدیر و تشکر می گردد.

در مطالعه Lazaru آنتی بادی تیروئید پراکسیداز در٪ ۱۰ خانم ها در سن حاملگی ۱۴ هفته وجود داشته است، که آنرا با افزایش شکست حاملگی، افزایش شیوع اختلال عملکرد تیروئید و افزایش احتمال تیروئیدیت بعد از زایمان مرتبط دانسته اند. یافته ها بیانگر وجود هیپوتیروئیدیسم (شامل هیپوتیروئیدی تحت بالینی) در حدود ۲/۵٪ حاملگی ها بوده، که به عنوان یک علت نازابی نیز شناخته شده است (۱۸). لذا هیپوتیروئیدیسم از علل احتمالی سقط می باشد، که پیشنهاد می شود در بیماران با سقط راجعه، عنوان یکی از تست های ارزیابی در نظر گرفته شود. در بررسی توزیع فراوانی علل مختلف سقط، برحسب وضعیت غیرطبیعی بودن آزمایشات هورمونی، هیپرپرولاکتینمی در افراد با PCO مشاهده شد ($p<0.05$). در مطالعه Gu یافته ها بیانگر اثر هیپرپرولاکتینمی و هیپرپرولاکتینمی روی بلوغ غیرطبیعی فولیکول و یا نقص عمل

References

- Berkane N, Verstatete L, Uzan S. Recurrent miscarriage. Rev Prat 2003; 53(17): 1906-12.
- Faure GC, Bene MC, Rsrarbarino Monnier P. Recurrent pregnancy loss: which immunological laboratory test? Gynecol Obstet Fertil 2003; 31(9): 786-8.
- Diejomaoh MF, AL-Azemi M, Jirous J. The etiology and pattern of recurrent pregnancy loss. J Obstet Gynaecol 2002; 22(1): 62-7.
- Daniel JS, Joseph A. Recurrent pregnancy loss, In. Berek JS, Rinehart RD, Adams Hillard PJ. Novak's gynecology, 13rd ed, USA, Lippincott Williams & Wilkins Co 2005; 2: 1072-4.
- Trout SW, Seifer DB. Do women with unexplained recurrent pregnancy loss have higher day 3 serum FSH and estradiol values. Fertil Steril 2000; 74(2): 335-7.
- Rai R, Backos M, Rushworth F, Regan L. Polycystic ovaries and recurrent miscarriage- a reappraisal. Hum Reprod 2000; 15(3): 612-5.
- Hill JA. Recurrent pregnancy loss, In Rayan KJ: Berkowitz RL, Barbieri RL, Dunaif A. Kistner's gynecology and women's health, 7th ed, London, Mosby Co 1999; pp: 396-422.
- Nardo LG, Rai R, Backos M, EL Gaddal S, Regan L. High serum luteinizing hormone and testosterone concentration do not predict pregnancy outcome in women with recurrent miscarriage. Fertil Steril 2002; 77(2): 348-52.

9. Clifford K, Rai R, Watson H, Regan L. An informative protocol for the investigation of recurrent miscarriage: preliminary experience of 500 consecutive cases. *Hum Reprod* 1994; 9(70): 1328-32.
10. Bussen S, Sutterlin M, Steck T. Endocrine abnormalities during the follicular phase in women with recurrent spontaneous abortion. *Hum Reprod* 1999; 14(1): 18-20.
11. Balasch J. Antiphospholipid antibodies: a major advance in the management of recurrent abortion. *Autoimmun Rev* 2004; 3(3): 228-33.
12. Liddlle HS, Sowden K, Farquhar CM. Recurrent miscarriage: screening for polycystic ovaries and subsequent pregnancy outcome. *Aust N Z J Obstet Gynaeol* 1997; 37(4): 402-6.
13. Christiansen OB, Nybo Andersen AM, Bosch E, et al. Evidence-based investigations and treatments of recurrent pregnancy loss. *Fertil Steril* 2005; 83(4): 821-39.
14. Gurbuz B, Yalti S, Ozden S, Ficicioglu C. High basal estradiol level and FSH/ LH ratio in unexplained recurrent pregnancy loss. *Arch Gynecol Obstet* 2004; 270(1): 37-9.
15. Tulppala M, Stenman UH, Cacciatore B, Ylikorkala B. Polycystic ovaries and levels of gonadotrophines and androgens in recurrent miscarriage. Prospective study in 50 women. *Br J Obstet Gynaeol* 1993; 100(4): 348-52.
16. Li TC, Spuijbroek MD, Tuckerman E, Anstie B, Loxley M, Laird S. Endocrinological and endometrial factors in recurrent miscarriage. *BJOG* 2000; 107(12): 1471-9.
17. Kutteh WH, Yetman DL, Carr AC, Beck LA, Scott RT. Increased prevalence of antithyroid antibodies identified in women with recurrent pregnancy loss but not in women undergoing assisted reproduction. *Fertil Steril* 1999; 71(50): 843-8.
18. Lazaru S, John H. Thyroid disorders associated with pregnancy: etiology diagnosis, and management (Miscellaneous article). *Treat Endocrinol* 2005; 4(1): 31-41.
19. Gu F. Effect of serum prolactin levels on luteal function in patients with recurrent abortions. *Zhonghua Fu Chan Keza Zhi* 1993; 28(1): 34-7, 60.
20. Ando N, Gorai I, Hirabuki T, Onose R, Hirahara F, Minaguchi H. Prolaction disorders in patients with habitual abortion. *Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi* 1992; 44(6): 650-6.

* آدرس نویسنده مسئول: بابل، بیمارستان شهید یحیی نژاد، گروه زنان و زایمان، تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۳۵۹۴-۷.

zahra_basirat@yahoo.com

Archive of SID