

## تعیین فراوانی اختلال فعالیت جنسی در زنان متاهل و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر بابل (۱۳۸۵)

فاطمه باکوویی\*، شبنم امیدوار، فاطمه نصیری<sup>۱</sup>

۱- عضو هیأت علمی گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

**سابقه و هدف:** اختلال فعالیت جنسی در زنان بسیار شایع و دارای اتیولوژی متعددی است که بطور وسیع بر کیفیت زندگی، اعتماد به نفس، خلق و خوی و ارتباط با همسر تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی اختلال فعالیت جنسی زنان متاهل شهر بابل و برخی فاکتورهای مرتبط با آن انجام گرفت.

**مواد و روشها:** مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۳۱۸ زن متاهل واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب از طریق پرسشنامه انجام شد. واحدهای مورد پژوهش بر اساس جمع کل نمرات پرسشنامه استاندارد FSI در سه گروه نرمال، اختلال خفیف و شدید قرار گرفتند.

**یافته ها:** متوسط سن زنان مورد مطالعه ۲۸ سال بود. ۸۰/۸٪ زنان مورد مطالعه در گروه نرمال، ۱۳/۲٪ در گروه اختلال فعالیت جنسی خفیف و ۶٪ در گروه اختلال شدید قرار داشتند. در واقع ۱۹/۲٪ از زنان دارای اختلال فعالیت جنسی (FSD) بودند. که بیشترین شیوع برحسب هر یک از موارد به ترتیب، اختلال در تمایل (۴۸/۴٪)، اختلال در تحریک (۴۰/۳٪)، درد حین نزدیکی (۱۹/۸٪)، اختلال در ارگاسم (۱۸/۶٪)، مشکل در خیس شدن واژن (۱۲٪) و اختلال در رضایت جنسی (۱۱/۳٪) بود. یافته ها نشان دادند که اختلال فعالیت جنسی با تحصیلات زن، شغل همسر، وضعیت درآمد، تعداد فرزندان، روش پیشگیری از بارداری، بیماری مزمن و تعداد فعالیت جنسی ارتباط معنی داری داشت.

**بحث و نتیجه گیری:** با توجه به شیوع اختلال فعالیت جنسی در زنان و عوامل مرتبط با آن باید مراکز مشاوره و آموزشی برای شناسایی این زنان و نیازهای آنان برای افزایش ارتقاء کیفیت زندگی شان در نظر گرفته شود.

**واژه های کلیدی:** اختلال فعالیت جنسی، زنان متاهل، فاکتورهای مرتبط.

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نهم، شماره ۴، مهر - آبان ۱۳۸۶، صفحه ۵۹-۶۴

### مقدمه

روانی، مشکلات طبی اخیر و وضعیت هورمونی قرار می گیرد (۴). اختلال فعالیت جنسی در زنان بسیار شایع و در هر شرایط سنی، فرهنگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی بروز می کند و بطور وسیع بر کیفیت زندگی، اعتماد به نفس، خلق و خوی و ارتباط با همسر تاثیر می گذارد (۵-۷). اتیولوژی اختلالات جنسی متعدد است و ناشی از تعامل فاکتورهای بیولوژیکی، روانی و اجتماعی است (۸). مطالعات اپیدمیولوژیکی در ایالت متحده و سوئد نشان دادند که تقریباً ۴۰٪ زنان با سن ۱۸-۳۵ سال از زندگی جنسی خود شاکی □ هزینه انجام این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره ۱۷۲۱۰۸۲۴۴۰ از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بابل تامین شده است.

فعالیت جنسی در انسان در عین غریزی بودن، بسیار حیاتی است و مفاهیم و مضامین مذهبی، عرفانی، تاریخی و ... را در بطن خود جای داده است (۱). در طول تاریخ، انسان حداقل به منظور بقاء نسل ملزم و نیازمند به نزدیکی و آمیزش جنسی بوده است (۲). فعالیت جنسی یکی از مهمترین موضوعات زندگی برای زنان و مردان است. که در واقع یک فرایند فوق العاده پیچیده است. چرخه پاسخ جنسی در زنان به واسطه فعل و انفعالات پیچیده عوامل روحی، محیطی و فیزیولوژیکی است (۳). فعالیت جنسی تحت تاثیر خود فرد، روابط اولیه، خانواده، اجتماع و فرهنگ، پیچیدگی محیط، تاریخچه جنسی خود و همسر، ارتباطات گذشته، وضعیت سلامت

مانند (روان گردان، ضد تشنج...)، دوری از همسر به دلایل مختلف و داشتن دو همسر وارد مطالعه نشدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بود که براساس مطالعه کتب و مقالات متعدد و همچنین با توجه به پرسشنامه استاندارد شاخص فعالیت جنسی زنان (FSI) تدوین شد و اعتبار و روائی آن توسط چند تن از اعضا هیئت علمی مجرب در زمینه روانپزشکی، زنان و مامائی مورد تایید قرار گرفت. این پرسشنامه شامل دو بخش: ۱- سوالات مربوط به مشخصات پایه و عوامل مورد بررسی ۲- سوالات مربوط به اختلال فعالیت جنسی بود. نمرات هر یک از سوالات از صفر (عدم مشکل) تا ۴ (حداکثر مشکل) بود و جمع کل نمرات از صفر تا ۴۸ طراحی شده بود. واحدهای مورد پژوهش بر اساس جمع کل نمرات به سه گروه تقسیم شدند. زنان با نمرات ۰-۲۴ در گروه نرمال (بدون مشکل)، زنان با نمرات ۲۵-۳۶ در گروه حد مرزی (اختلال خفیف) و زنان با نمرات ۳۷-۴۸ در گروه اختلال شدید قرار گرفتند (۲۰). اطلاعات بدست آمده به صورت جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی تنظیم شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های آماری  $X^2$  و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### یافته ها

در این مطالعه ۳۱۸ زن ۵۳-۱۸ ساله با متوسط سن ۲۸ سال مورد بررسی قرار گرفتند. ۸۰/۸٪ زنان مورد مطالعه در گروه نرمال، ۱۳/۲٪ در گروه اختلال فعالیت جنسی خفیف و ۶٪ در گروه اختلال فعالیت جنسی شدید قرار گرفتند. در واقع ۱۹/۲٪ از زنان دارای اختلال فعالیت جنسی (FSD) بودند (جدول ۱).

جدول ۱. توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش

برحسب حیطه های مختلف فعالیت جنسی

فعالیت جنسی	گروه	نرمال	اختلال خفیف	اختلال شدید
تعداد(٪)	تعداد(٪)	تعداد(٪)	تعداد(٪)	تعداد(٪)
تمایل	۱۶۴ (۵۱/۶)	۱۵۳ (۴۸/۱)	۱ (۰/۳)	
تحریک	۱۹۰ (۵۹/۷)	۱۰۹ (۳۴/۳)	۱۹ (۶/۱)	
خیسی واژن	۲۸۰ (۸۸/۱)	۲۰ (۶/۳)	۱۸ (۵/۷)	
ارگاسم	۲۵۹ (۸۱/۴)	۴۱ (۱۲/۹)	۱۸ (۵/۷)	
درد حین نزدیکی	۲۵۵ (۸۰/۲)	۲۵ (۷/۹)	۳۸ (۱۱/۹)	
رضایت	۲۸۲ (۸۸/۷)	۳۶ (۱۱/۳)	-	
جمع	۲۵۷ (۸۰/۸)	۴۲ (۱۳/۲)	۱۹ (۶/۱)	

می باشند (۹). شیوع اختلالات جنسی در زنان براساس داده ها ۵۵-۲۲٪ (متوسط ۳۰٪) است (۱۱ و ۱۰). نتایج مطالعه انجام شده بر ۲۳۰ زن متاهل ۷۰-۱۸ ساله در مالزی نشان داد که شیوع FSD ۲۹/۶٪ بود که میزان اختلال در هر یک از حیطه ها به ترتیب ۶۷/۸٪ درد حین نزدیکی، ۶۰/۹٪ اختلال در تحریک، ۵۹/۱٪ اختلال در ارگاسم، ۵۲/۲٪ عدم رضایت، ۵۰/۴٪ اختلال در خیس شدن واژن بود (۱۲). تحقیق دیگری بر روی زنان ۸۰-۲۰ ساله استرالیایی با متوسط سن ۴۳ سال نیز شیوع FSD را در هر یک از حیطه ها، ۳۹٪ اختلال در ارگاسم، ۳۵٪ اختلال در تحریک، ۲۲٪ اختلال در تمایل و ۱۲/۸٪ درد حین نزدیکی گزارش کرد (۱۳). غیر از سن، ریسک فاکتورهای دیگری از جمله افزایش فشارخون، دیابت، هیپر لیپیدمی، بیماری قلبی و بی اختیاری ادراری نیز ارتباط قوی با اختلال جنسی دارد (۱۴-۱۶).

یافته ها همچنین نشان دادند که اختلالات جنسی با سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، بیماری مزمن، مولتی پاریتی و وضعیت منوپوز ارتباط معنی داری دارند (۱۷). علیرغم شیوع بالای اختلال جنسی در زنان، توجه کمی به آن شده است و عده کمی از این زنان برای درمان پزشکی آن مراجعه می کنند. فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در مراجعه این افراد برای درمان دخیل است. بیماران دارای اختلالات جنسی معمولاً این مسئله را پنهان می کنند و یا سعی در حل مشکل در منزل می نمایند، در نتیجه این طیف از علایم ناگفته می ماند و عدم درمان مناسب آن موجب مزمن شدن علایم، ایجاد اختلالات روانی و در نهایت سلب آرامش و آسایش از زوجین می گردد (۱۸). زنان مبتلا به اختلال فعالیت جنسی دچار علایم ناپایداری خلقی، اعتماد به نفس پایین، اضطراب، خویشتن گرایی و احساس گناه می شوند (۱۹). با توجه به مطالعات محدود در جامعه ما، این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلال فعالیت جنسی زنان و فاکتورهای مرتبط با آن انجام شد.

### مواد و روشها

مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۳۱۸ زن متاهل واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب برای دریافت خدمات بهداشتی انجام شد. افرادی که مبتلا به بیماری جسمی و روانی شناخته شده (بیماری قلبی، ربوی، دیابت...)، مصرف هر نوع داروی خاص که ممکن است بر روی فعالیت جنسی تاثیر گذارند

تعداد نزدیکی بار ۱-۲	۲۳۴ (۷۹/۳)	۴۲ (۱۴/۲)	۱۹ (۶/۴)
-------------------------	------------	-----------	----------

یافته ها نشان دادند که شیوع اختلالات جنسی با سطح تحصیلات فرد، وضعیت اشتغال همسر، در آمد، تعداد فرزندان، روشهای پیشگیری از بارداری، ابتلا به بیماری خاص و تعداد نزدیکی ارتباط داشته است. اما با سن و وضعیت اشتغال فرد، تحصیلات همسر و مدت ازدواج ارتباط معنی داری نداشت (جدول ۲).

### بحث و نتیجه گیری

بیشترین شیوع مشکل فعالیت جنسی زنان برحسب هر یک از حیطة ها به ترتیب، اختلال در تمایل، اختلال در تحریک، درد حین نزدیکی، اختلال در ارگاسم، مشکل در خیس شدن واژن و اختلال در رضایت جنسی بود. در مطالعه ای بر روی زنان اتربشی میزان شیوع FSD برحسب هر یک از حیطة ها، ۲۳٪ اختلال در تمایل، ۳۵٪ اختلال در تحریک، ۳۹٪ اختلال در ارگاسم و ۱۲/۸٪ درد حین نزدیکی گزارش شد (۲۱). نتایج تحقیقی در ترکیه شیوع FSD را ۴۸/۳٪ نشان داد که ۴۸/۳٪ اختلال در تمایل، ۳۵/۹٪ اختلال در تحریک، ۴۰/۹٪ اختلال در لوبریکانت، ۴۲/۷٪ اختلال در ارگاسم، ۴۵٪ عدم رضایت جنسی و ۴۲/۹٪ درد حین نزدیکی بیان شد (۲۲). شیوع FSD در مطالعه ای در تهران نیز ۳۱/۵٪ گزارش شد. در این پژوهش و همچنین مطالعه ای دیگر در آمریکا بیشترین اختلال فعالیت جنسی، اختلال در حیطة تمایل و تحریک بود که مشابه نتیجه تحقیق ما می باشند (۲۳ و ۲۴).

نتایج بررسی حاضر نشان داد که شیوع اختلال فعالیت جنسی با افزایش سن، بیشتر می شود. در واقع در زنان زیر ۲۵ سال کمترین شیوع اختلال دیده شد هرچند این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود، در حالیکه در سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه، این ارتباط معنی دار گزارش شد (۲۱ و ۲۳-۲۵). Cayan و همکاران طی مطالعه ای در ترکیه بر روی ۱۷۹ زن گزارش کردند که شیوع FSD از ۲۲٪ در زنان ۲۷-۱۸ ساله به ۶۶٪ در زنان ۵۷-۴۸ ساله افزایش یافته است که این افزایش ممکن است به علت همراه بودن بیماریهای مزمن در سنین بالاتر و همچنین یائسگی باشد (۱۷). البته در مطالعه ما تعداد بسیار کمی از زنان مورد بررسی در سنین بالای ۴۵ سال بودند و همچنین تعداد زنان یائسه در این مطالعه محدود بود، که برای بررسی ارتباط سن و یائسگی با اختلال فعالیت جنسی

### جدول ۲. توزیع فراوانی مطلق و نسبی اختلال فعالیت جنسی

واحدهای مورد پژوهش برحسب متغیرهای مورد بررسی

متغیر	گروه	نرمال تعداد(٪)	اختلال خفیف تعداد(٪)	اختلال شدید تعداد(٪)
سن	<۲۰	۸ (۸۸/۹)	۱ (۱۱/۱)	-
	۲۰-۲۴	۶۷ (۸۸/۲)	۶ (۷/۹)	۳ (۳/۹)
	۲۵-۲۹	۷۲ (۷۵)	۱۸ (۱۸/۸)	۶ (۶/۳)
	۳۰-۳۴	۷۳ (۸۲)	۷ (۷/۹)	۹ (۱۰/۱)
	≥۳۵	۳۷ (۳۷/۱)	۱۰ (۲۰/۸)	۱ (۲/۱)
سطح تحصیلات	خواندن و نوشتن	۲۷ (۸۴/۴)	۳ (۹/۴)	۲ (۶/۳)
	راهنمایی	۵۶ (۷۲/۷)	۱۳ (۱۶/۹)	۸ (۱۰/۴)
	دیپلم	۱۱۳ (۸۴/۳)	۱۶ (۱۱/۹)	۵ (۳/۷)
	فوق دیپلم	۵۲ (۵۰)	۷ (۵)	-
لیسانس	۵۲ (۸۸/۱)	۳ (۵/۱)	۴ (۶/۸)	
تحصیلات همسر	راهنمایی	۵۸ (۷۷/۳)	۱۰ (۱۳/۳)	۷ (۹/۳)
	دیپلم	۸۰ (۸۱/۶)	۱۴ (۱۴/۳)	۴ (۴/۱)
	فوق دیپلم	۲۵ (۸۰/۶)	۵ (۱۶/۱)	۱ (۳/۲)
	لیسانس	۵۸ (۸۴/۱)	۷ (۱۰/۱)	۴ (۵/۸)
وضعیت اشتغال	بیکار	۲۱۲ (۷۹/۷)	۹ (۱۴/۷)	۱۵ (۵/۶)
	شاغل	۴۲ (۸۹/۴)	۳ (۶/۴)	۲ (۴/۳)
	اشتغال همسر	۸ (۱۰۰)	-	-
درآمد	کارمند	۷۲ (۸۶/۷)	۶ (۷/۲)	۵ (۶)
	کارگر	۴۳ (۷۰/۵)	۱۴ (۲۳)	۴ (۶/۶)
	آزاد	۱۸ (۷۹/۸)	۲۲ (۱۴/۹)	۸ (۵/۴)
	خوب	۵۰ (۸۴/۷)	۶ (۱۰/۲)	۳ (۵/۱)
	متوسط	۱۷۶ (۸۲/۶)	۳۰ (۱۴/۱)	۷ (۳/۳)
ضعیف	۲۱ (۶۳/۶)	۳ (۹/۱)	۹ (۲۷/۳)	
مدت ازدواج (سال)	<۵	۱۰۳ (۸۱/۱)	۱۹ (۱۵)	۵ (۳/۹)
	۵-۹	۵۳ (۸۰/۳)	۹ (۱۳/۶)	۴ (۶/۱)
	≥۱۰	۱۰۱ (۸۰/۸)	۱۴ (۱۱/۲)	۱۰ (۸)
تعداد فرزندان	۱-۲	۱۹۴ (۸۱/۲)	۳۴ (۱۴/۲)	۱۱ (۴/۶)
	۳-۴	۳۴ (۷۲/۳)	۶ (۱۲/۸)	۷ (۱۴/۹)
	≥۵	۲۹ (۹۰/۶)	۲ (۶/۳)	۱ (۳/۱)
روش پیشگیری از بارداری	طبیعی	۳۴ (۶۴/۲)	۱۹ (۳۵/۸)	-
	قرص	۶۷ (۷۷/۹)	۱۹ (۲۲/۱)	-
	IUD	۲۰ (۹۵/۲)	۱ (۴/۸)	-
	کاندوم	۱۰۹ (۹۷/۳)	۳ (۲/۷)	-
	بستن لوله ها	۲۷ (۶۰)	-	۱۸ (۴۰)
ابتلا به بیماریهای خاص	واجد بیماری	۲ (۹/۱)	۱ (۴/۵)	۱۹ (۸۶/۴)
	بدون بیماری	۲۴۱ (۸۵/۸)	۴۰ (۱۴/۲)	-

جراحی لگنی و جراحی واژینال نیز می تواند به علت اختلال آناتومی و نوروواسکولاری که ایجاد می نماید منجر به اختلال فعالیت جنسی شود (۲۸ و ۳۰). البته سفری نژاد به عدم چنین ارتباطی در تحقیق خود اشاره کرد (۲۴).

در مطالعه حاضر اختلال فعالیت جنسی در زنان واجد بیماری مزمن بطور معنی داری بیشتر بود، که می تواند ناشی از مشکلات فیزیکی و روانی همراه با بیماریهای مزمن باشد و بر ارتباط جنسی آنها با همسرشان اختلال ایجاد کند. مطالعه ای در امریکا نیز به بیماری قلبی و عروقی، دیابت، افسردگی و اختلال سیستم ادراری به عنوان ریسک فاکتورهای اختلال فعالیت جنسی اشاره کرده است (۳۱). البته Hisasue و همکاران به عدم چنین ارتباطی اشاره کرده اند (۲۱). در این تحقیق بیشترین اختلال فعالیت جنسی در زنانی بود که ۲-۱ بار نزدیکی جنسی در هفته داشتند و شاید وجود اختلال فعالیت جنسی در آنها به علت نزدیکی جنسی کمتر آنها بوده است. مطالعات دیگری نیز عنوان کردند که افراد مبتلا به اختلال فعالیت جنسی دارای مقاربت کمتری می باشند (۲۱ و ۲۳).

با توجه به شیوع اختلال فعالیت جنسی در زنان و عوامل مرتبط با آن متاسفانه مراکز بسیار کمی برای بررسی و مشاوره زنان وجود دارد، لذا آموزش و مشاوره مسایل جنسی باید به عنوان یکی از مراقبتهای بهداشتی زنان محسوب گردد که این مسئله می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی آنها نقش موثری ایفا نماید.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، همکاری کارشناسان محترم پژوهشی و همکاران محترم درمانگاههای منتخب تشکر و قدردانی می شود.

قابل ملاحظه نبود. در این مطالعه اختلال فعالیت جنسی با سطح تحصیلات زن ارتباط معنی داری بود، که مشابه تحقیقات صورت گرفته در سایر نقاط می باشد (۱۷ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷)، اما با سطح تحصیلات همسر ارتباط معنی دار نبود. در رابطه با اختلال فعالیت جنسی با وضعیت اشتغال زنان اختلاف معنی دار نبود ولی بیشترین اختلال فعالیت جنسی در زنانی بود که همسرانشان کارگر بوده اند و از لحاظ آماری نیز معنی دار بود. در برخی از مطالعات به استرس شغلی، فعالیت فیزیکی و خستگی جسمی و روحی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای کاهش لذت در فعالیت جنسی و FSD اشاره شده است (۲۶ و ۲۸). در مطالعه حاضر شیوع اختلال فعالیت جنسی در زنان با سطح درآمد ضعیف بطور معنی داری بیشتر می باشد. در یک بررسی اپیدمیولوژیکی دیگر نیز گزارش شد که میزان اختلال فعالیت جنسی در خانواده های با سطح درآمد پایین بیشتر می باشد (۲۶). در ارتباط با روش پیشگیری از بارداری، زنانی که از روش طبیعی استفاده می کردند دارای بیشترین اختلال فعالیت جنسی و زنانی که از IUD و کاندوم استفاده می کردند کمترین میزان اختلال دیده شد که این مشابه یافته های بدست آمده از مطالعات دیگر محققین می باشد (۲۴ و ۲۶ و ۲۹). شاید یکی از دلایل آن باشد که استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری موجب رهایی از ترس حامله شدن و در نتیجه افزایش رضایت جنسی گردد.

در این بررسی اختلال فعالیت جنسی در زنانی که از قرص ضدبارداری استفاده می کردند نسبت به روش کاندوم و IUD بیشتر بود که این امر می تواند به علت یکی از عوارض قرصهای پیشگیری از بارداری باشد که سبب کاهش تمایل جنسی می شود (۳). در این مطالعه حداکثر میزان اختلال فعالیت جنسی در زنانی بود که تحت توبکتومی قرار گرفتند. بررسی های دیگر نیز عنوان کردند که

\*\*\*\*\*

### منابع

۱. کهن زاد ش. پیرامون ناتوانی جنسی در مرد، چاپ اول، تهران، انتشارات دانش ۱۳۷۳؛ ص: ۹.
2. Philips NA. Female sexual dysfunction: evaluation and treatment. Am Fam Physician 2000; 62(1): 127-36, 141-2.
۳. برک ج. بیماریهای زنان نواک. بیگ وند ش، فریدیان د، ملک اعلائی م (مترجمین)، چاپ اول، انتشارات نسل فردا ۱۳۸۲؛ ص: ۱۸۷ و ۲۰۵.
4. Fourcroy JL. Female sexual dysfunction: potential for pharmacotherapy. Drugs 2003; 63(14): 1445-57.
5. Morley JE, Kaiser FE. Female sexuality. Med Clin North Am 2003; 87(5): 1077-90.
6. Abarbanel J, Rabinerson D. Sexual dysfunction in women. Harefuah 2004; 143(6): 426-31, 461, 462.

7. Anastasiadis AG, Davis AR, Salomon L, Burchardt M, Shabsign R. Hormonal factors in female sexual dysfunction. *Curr Opin Urol* 2002; 12(6): 503-7.
8. Barton D, Joubert L. Psychosocial aspects of sexual disorders. *Aust Fam Physician* 2000; 29(6): 527-31.
9. Segraves RT. Emerging therapies for female sexual dysfunction. *Expert Opin Emerg Drugs* 2003; 8(2): 515-22.
10. Goldstein I. Female sexual arousal disorder: new insights. *Int J Impot Res* 2000; 12(4): 152-7.
11. Heiman JR. Sexual dysfunction: overview of prevalence, etiological factors, and treatments. *J Sex Res* 2002; 39(1): 73-8.
12. Sidi H, Puteh SE, Abdullah N, Midin M. The prevalence of sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in Malaysian women. *The journal of sexual medicine* 2007; 4(2): 311-21.
13. Ponholzer A, Roehlich M, Racz U, Temml C, Madersbacher S. Female sexual dysfunction in a healthy Austrian cohort: prevalence and risk factors. *Eur Urol* 2005; 47(3): 366-75.
14. Kadri N, McHichi Alami KH, McHakra Tahiri S. Sexual dysfunction in women: a population based epidemiological study. *Arch Women Ment Health* 2002; 5(2): 59-63.
15. Salonia A, Munarriz RM, Naspro R, et al. Women sexual dysfunction: a pathophysiological review. *BJU Int* 2004; 93(8): 1156-64.
16. Davis SR. Androgens and female sexuality. *J Gend Specif Med* 2000; 3(1): 36-40.
17. Cayan S, Akbay E, Bozlu M, et al. The prevalence of female sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in Turkish women. *Urol Int* 2004; 72(1): 52-70.
۱۸. رحیم زاده آ، ناظمی ع، علیزاده ز. بررسی تاثیر هیستروکتومی در بروز اختلالات جنسی در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت سنج. *مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان*، ۱۳۸۰؛ ۶(۲۲): ۴۱-۶.
19. Nicolosi A, Glasser DB, Kims G, et al. Sexual behavior and dysfunction and help-seeking pattern in adults aged 40-80 years in the urban population of Asian countries. *BJU Int* 2005; 95(4): 609-14.
20. Roodsari A, Khademi A, Akbari E, et al. Female sexual dysfunction in married medical students. *MJM* 2005; 8(2): 104-8.
21. Hisasue S, Kumamoto Y, Sato Y, et al. Prevalence of female sexual dysfunction symptom and its relationship to quality of life: a Japanese female cohort study. *Urology* 2005; 65(1): 143-8.
22. Oksuz E, Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women. *J Urol* 2006; 175(2): 654-8.
23. Rosen R, Brown C, Heiman J, et al. The female sexual function index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. *J Sex Marital Ther* 2000; 26(2): 191-208.
24. Safarinejad MR. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. *Int J Impot Res* 2006; 18(4): 382-95.
25. Shokrollahi P, Mirmohamadi M, Mehrabi F, Babaei G. Prevalence of sexual dysfunction in women seeking services at family planning centers in Tehran. *J Sex Marital Ther* 1999; 25(3): 211-5.

26. Asghari Roodsari A, Khademi A, Akbari E, et al. Female sexual dysfunction in married medical students. *MJM* 2005; 8(2): 104-8.
27. Elnashar AM, El Dien Ibrahim M, El Desoky MM, Ali OM, El Sayd Mohamed Hassan M. Female sexual dysfunction in Lower Egypt. *BJOG* 2007; 14(2): 201-6.
28. Bronner G. Female sexual function and chronic disease. *Harefuah* 2006; 145(2): 114-6, 165-6.
29. Sidi H, Puteh SE, Abdullah N, Midin M. The prevalence of sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in Malaysian women. *J Sex Med* 2007; 4(2): 311-21.
30. Tunuguntla HS, Gousse AE. Female sexual dysfunction following vaginal surgery: a review. *J Urol* 2006; 175(2): 439-46.
31. Camacho ME, Reyes Ortiz CA. Sexual dysfunction in the elderly: age or disease? *Int J Impot Res* 2005; 17(1): 52-6.

Archive of SID