

مقادیر پروتئین قام بzac قبل و بعد از حرکت ارتوودنستیک دندانها

ولی الله آرش^{*}، سلیمان محبوب^۱، محمود حاجی احمدی^۲، طاهره پادکانه^۳

۱- استادیار گروه ارتوودنسی دانشگاه علوم پزشکی بابل-۲- دانشیار گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳- عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل-۳- دندانپزشک عمومی

سابقه و هدف: استرس های مکانیکال باعث تغییر غلظت پروتئین های ترشحی در سطوح موضوعی استخوان و حفره دهان می شود. شناسایی این پروتئین ها و نقش آنها در حرکت دندان یا تشخیص تخریب نسجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه به منظور بررسی تغییر غلظت این پروتئین ها در بzac کامل افراد تحت درمان ارتوودنسی با دستگاه ثابت انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی بzac ۴ بیمار جوان و نوجوان که در هر دو فک نیاز به درمان ارتوودنسی ثابت داشتند، انجام شد. از همه افراد قبل از درمان، یک روز بعد و یک هفته بعد از قراردادن جدا کننده ها (Separators) نمونه بzac تهیه شد. سپس مقادیر پروتئین به روش اسپکترو فوتومتری اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها: میانگین مقادیر پروتئین تام قبل، یک روز و یک هفته بعد از قرارگیری جدا کننده بترتیب: ۱۲۵/۱، ۱۲۷/۳ و ۱۲۱/۶ میلی گرم در دسی لیتر بود. در حقیقت مقادیر پروتئین تام در روز پس از قرارگیری جدا کننده ها افزایش یافت و پس از آن در روز هفتم به مقادیر اویله نزدیکتر شده بود (۰/۰۰۱۰). ارتباطی بین جنس و تغییرات مقادیر پروتئین تام دیده نشد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، نیروهای ارتوودنستیک باعث افزایش غلظت پروتئین تام در بzac کامل افراد تحت درمان ارتوودنسی می گردند. بنابراین شاید بتوان با آنالیز بzac بعضی از شاخص های جدید پروتئینی آزاد شده به دنبال اعمال نیرو را شناسایی و ارتباط آن را با اثر درمانی ارتوودنسی بررسی کرد.

واژه های کلیدی: پروتئین تام، آلبومین، بzac کامل، حرکت دندان.

دریافت: ۱۹/۱۲/۸۶، ارسال: ۱۹/۱۲/۸۷، پذیرش: ۱۹/۱۲/۸۷

مقدمه

بzac توسط رژیم غذایی، تغییرات هورمونی و سرمی به میزان بسیار اندکی تغییر می کند (۱)، اما با افزایش سن، عفونت و بیماریهای سیستمیک تغییرات بارزی نشان می دهد (۲). اعمال نیرو در درمان های ارتوودنسی سبب پاسخ سلول های پریودنشیوم می شود و در این مورد طریقه اعمال نیرو اهمیت چندانی ندارد، بلکه فعالیت سلولها بر مبنای فشار و کشش و تغییرات جریان خون موجود در محیط مهم است (۳). این نیروها نوعی مکانیسم تحریک خارجی هستند که پاسخ های بیولوژیک را برمی انگیزند (۴). ملکول های

هزینه انجام این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره ۱۳۸۲۳۷۱۳۸

از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بابل تأمین شده است.

درمان ارتوودنسی غلظت پروتئین های ترشحی را در سطوح موضوعی استخوان و حفره دهان تغییر می دهد. اما اثرات سیستمیک اعمال نیرو به خوبی شناخته نشده است (۵). پاسخ سیستمیک به کاربرد موضعی نیروی ارتوودنسی، ۲۴ ساعت پس از اعمال آن، قادر به افزایش ظهور Fosprotein در مغز قدامی رتها (۶) یا باعث حضور فسفو پروتئین های عاج در سرم و شیار مایع لثه ای که نشانه تحلیل ریشه است، می باشد (۷). این پاسخ سیستمیک ممکن است در سنتز پروتئین های ترشحی بzac کامل نیز منعکس شود (۸). بzac کامل حاوی بzac ترشح شده از غدد اصلی و فرعی بzacی، مایع شیار لثه ای و سایر ترکیبات موجود در محیط دهان است (۹). ترکیب

موج ۵۴۰ نانومتر ثبت گردید. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون Paired t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و $p < 0.05$ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

میزان پروتئین تام بزاق بین سه نوبت نمونه‌گیری از ۴۰ بیمار به ترتیب قبل از قرار دادن جدا کننده $5\pm 46/5$ ، $127/3\pm 46/5$ ، یک روز بعد از قراردادن جدا کننده $135/1\pm 46/5$ و هفت روز بعد از قرار دادن جدا کننده $131/6\pm 44/7$ میلی گرم بر دسی لیتر بود ($p < 0.001$). مقادیر پروتئین تام بزاق ۲۶ ساعت پس از قرار دادن جدا کننده افزایش داشت و پس از آن در روز هفتم به مقادیر اولیه قبل از جایگذاری جدا کننده نزدیکتر شده بود، اما در مجموع بالاتر از مقادیر اولیه بود.

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه حرکت ارتوڈنتیک دندان باعث افزایش غلظت پروتئین تام در بزاق شده است. اکثر مطالعات انجام شده در زمینه فعالیت آنزیمها و مدیاتورهای شیمیایی آزاد شده طی حرکات ارتوڈنتیک دندانی نیز افزایش سطوح ترکیبات بیوشیمیایی را بخصوص در روز اول بعد از اعمال نیرو در سرم، موضع و مایع شیار لته ای نشان می‌دهند (۳-۱۰). این ترکیبات بیشتر از دسته مواد پروتئینی و آنزیمی هستند. با توجه به اینکه سطح این ترکیبات پروتئینی در مایع شیار لته، سطوح موضعی استخوان و سرم افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود مقادیر پروتئین توتال نیز افزایش قابل توجهی نشان دهد. در تحقیق Lowney و همکاران در مورد مقادیر پروتئین تام در مایع شیار لته (۱۳) و مطالعه Bruce در مورد تغییرات مقادیر پروتئین تام در بزاق و مایع شیار لته یک روز پس از قرارگیری جداکننده ها و دستگاهها، مقادیر پروتئین تام افزایش نشان داد. اما اختلاف آن با قبل از اعمال نیرو از نظر آماری معنی‌دار نبود (۱) که برخلاف یافته‌های این مطالعه می‌باشد. ممکن است افزایش حجم نمونه‌ها و نیز افزایش زمان مطالعه و نمونه‌گیری در سه نوبت دلیلی برای معنی دار شدن این تغییرات آماری در تحقیق حاضر در زمینه تغییر پروتئین تام باشد. دلیل دیگر، افزایش کلی جریان مایع شیار لته‌ای است که در پاسخ به التهاب موضعی حاصل از اعمال نیروهای ارتوڈنتیک ایجاد می‌شود. این افزایش جریان مایع شیار لته ای

بیوشیمیایی مختلفی از جمله مولکول‌های پروتئینی نظیر آنزیم‌ها و سیتوکاین‌ها با اعمال نیرو تغییر می‌کنند (۱۱-۸). Umatsu و همکارش افزایش مقادیر برخی پروتئین‌ها را در مایع شیار لته ای گزارش کردند (۱۲). Burke و همکارش نیز تغییرات مقادیر پروتئین‌های ترشحی در بزاق را گزارش نمودند (۱). به منظور بررسی تغییرات مقدار پروتئین تام در بزاق بدنبال اعمال نیرو، این مطالعه صورت گرفت.

مواد و روشها

این مطالعه تجربی بر روی ۴۰ فرد با وضعیت سلامت خوب در محدوده سنی نوجوان و جوان (۱۲-۲۵ سال) با میانگین سنی ۱۷/۵ سال و تقریباً با عادات غذایی مشابه که هیچ دارویی دریافت نمی‌کردند و شرایط پریودنتال و بهداشت دهانی خوبی داشته و برای درمان ارتودننسی مراجعه کردند، انجام شد. از ۴۰ نفر (۱۳ نفر مذکور و ۲۷ نفر مؤنث) خواسته شد تا هنگام نمونه‌گیری دو بار دهانشان را با آب بشویند و دو تا سه جرعه آب بنوشند تا از آلوگی نمونه‌ها با ترشحات تنفسی جلوگیری شود. پس از آن از بیمار خواسته شد که حدود ۲ml از بزاقش را بدون اینکه فعالانه بخواهد بزاقش ترشح شود، در لوله آزمایش بریزد. سپس با قرار دادن جداکننده‌ها نیروی ارتوڈنتیک به دندانها در هر چهار کوادران اعمال شد. ۲۶ ساعت بعد از جایگذاری جدا کننده و نیز بعد از گذشت هفت روز مجدداً تحت همان شرایط، نمونه دوم و سوم از بزاق تهیه شد. مرحله نمونه‌گیری از بیماران مختلف در طی ۱۰ ماه ادامه یافت و در ماه مبارک رمضان نمونه‌گیری بعمل نیامد. نمونه‌ها به آزمایشگاه بیوشیمی دانشکدة پزشکی انتقال داده شدند و در فریزر -20°C - نگهداری شدند. هنگام انجام آزمایشات، نمونه‌ها از فریزر خارج شده و به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها در 3500 rpm (Clement 2000) شدند و ۱۵ دقیقه در دمای آزمایشگاه سانتریفیوژ (Clement 2000) شدند و پس از رسوب مواد نامحلول، مایع رویی توسط سمپلر به دقت خارج شده و به میکروتیوب های ایندوفر یک بار مصرف منتقل گردید. غلظت پروتئین تام به روش تغییر یافته بایوره (Biuret) اندازه گیری شد. جذب نوری نمونه‌ها در مقابل بلانک و استاندارد کیت‌ها و در دستگاه اسپکتروفوتومتر Cecil 1020 خوانده شد. میزان جذب نوری برای پروتئین تام بدليل ایجاد کمپلکس رنگی آبی مایل به بنفش از طریق اتصال پروتئین‌ها به محلول قلیایی مس در طول

اگرچه به نظر می رسد که هنوز مایع شیار لثه ای از ارزش و اعتبار بیشتری نسبت به بزاق برخوردار باشد، اما شناسایی پروتئین ها و آنزیم های اختصاصی در بزاق به دلیل دسترسی بهتر و راحتتر را نمی توان نادیده گرفت.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از اعضا محترم شورای پژوهشی دانشگاه بدليل تصویب طرح و خانم آقاجانی به دلیل همکاری در تهیه نمونه ها تقدیر و تشکر می گردد.

می تواند پروتئین ها را رفیق کند و در نتیجه در غلظت آنها تغییرات کمی ایجاد نماید (۱). اما در مورد بزاق تصور می شود افزایش یا کاهش و بطور کلی تغییر غلظت پروتئین ها بیشتر تحت تأثیر عوامل سیستمیک باشد و تأثیرات موضعی تنها در آن قسمت از بزاق کامل که حاوی مایع شیار لثه ای است مشاهده شود. آنالیز پروتئین های ترشحی در بزاق کامل می تواند شاخص جدیدی برای بررسی اثر درمان ارتودنی و تغییرات بیوشیمیایی متعاقب آن باشد. مطالعات بیشتری لازم است تا ارتباط نزدیکتر بین حرکت ارتوdontیک دندانها و تغییرات مولکولی حاصل از آن در بزاق کامل قابل استناد باشد.

References

- Burke JC, Evans CA, Crosby TR, Mednieks MI. Expression of secretory proteins in oral fluid after orthodontic tooth movement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 121(3): 310-15.
- Yamashiro T, Satoh K, Nakagawa K, Moriyama H, Yagi T, Takada K. Expression of Fos protein in the rat forebrain following experimental tooth movement. J Dent Res 1988; 77(11): 1920-5.
- James M, Neelanjani P. Dentine phosphoproteins in gingival curricular Flind during root resorption. Eur Orthod 2004; 26: 25-30.
- Fergusen DB, Shuttleworth A, Wittaker DK. Oral bioscience, 1st ed, Edinburgh, Churchill Living Stone 1999; pp: 117, 125, 133, 135, 136, 148.
- Yarta A, Akyuz S, Koc L, Erdem H, Emekli N. Salivary sialic acid, protein, salivary flow rate, pH, buffering capacity and caries indices in subjects with Down's syndrome. J Dent 1999; 27(2): 115-18.
- Proffit WR, Fields HW. Contemporary Orthodontics, 3rd ed, ST Louis, Mosby Co 2000; pp: 9, 12: 297, 301-304, 306, 308, 392.
- Ren Y, Maltha JC, Kuijpers Jagtman AM. Optimum force magnitude for orthodontic tooth movement: a systematic literature review. Angle Orthod 2003; 73(1): 86-92.
- Perinetti G, Paolantonio M, Tripodi D. Alkaline phosphatase activity in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122(5): 548-56.
- Perinetti G, Paolantonio M, D' Archivio D, et al. Aspartate amino transferase activity in gingival crevicular fluid during orthodontic treatment. J Periodontal 2003; 74(2): 145-52.
- Serra E, Perinetti G. Lactate dehydrogenase activity in gingival crevicular fluid during orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124(2): 206-11.
- Alhashimi N, Frithiof L, Brudrik P. Orthodontic tooth movement and de novo synthesis of proinflammatory cytokines. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119(3): 307-12.

12. Uematsu S, Mogi M. Interleukin (IL)- 1 beta, IL-6, tumor necrosis factor-alpha, epidermal growth factor and 2-microglobulin levels are elevated in gingival cervical fluid during human orthodontic tooth movement. *J Dent Res* 1996; 75(1): 562-7.
13. Lowney J, Norton A, Shafer DM, Rossomando EF. Orthodontic force increase tumor necrosis factor alpha in the human gingival sulcus. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 1995; 108(5): 519-24.

Archive of SID

AMOUNTS OF SALIVARY TOTAL PROTEIN BEFORE AND AFTER ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT

V. Arash (DDs)^{1*}, S. Mahjoub (PhD)², M. Haji Ahmadi (MSc)³, T. Padganeh (DDs)⁴

1. *Assistant Professor of Orthodontics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, vali_arash1344@yahoo.com,

2. Associate Professor of Biochemistry & Biophysics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, 3. Academic

Member of Social Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, 4. Dentist

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Mechanical stress alters the secretory proteins concentration at the local level in bone and the oral cavity. Recognition of these proteins and their roles in teeth movement or tissue destruction diagnosis is very important. The aim of this study was to evaluate the changes of total protein concentration in whole saliva (WS) before and after orthodontic tooth movement.

METHODS: This experimental study was done on 40 adolescent and young patients who were in need of orthodontic treatment for both jaws. Samples of W.S. were collected once before the placement of orthodontic separators, and 1 day and 1 week after the placement of orthodontic separators. Total protein concentration was measured by spectrophotometric method.

FINDINGS: Total protein concentration before the placement of orthodontic separators, 1 day and 1 week after were 127.3, 135.1, 131.6 (mg/dl). Total protein concentration elevated after initial tooth movement (one day after the placement of orthodontic separators) and then, tended to the pretreatment levels at the 7th day, but it didn't exactly return to it ($p<0.001$). It was not found a correlation between total protein alterations and sex.

CONCLUSION: According to the results of this study, the application of force and the placement of separators increase the total protein in whole saliva. Therefore it may be possible that some of the new released protein index due to forcing is recognizable with analysis of saliva and its relationship with the effect of orthodontic treatment can be studied.

KEY WORDS: Total protein, Albumin, Wholes saliva, Tooth movement.

Journal of Babol University of Medical Sciences 2008; 10(2): 7-11

Received: March 9th 2008, Revised: May 7th 2008, Accepted: July 9th 2008