

## فراوانی بیماری های مزمن شایع در سالمندان شهر امیرکلا بابل (۱۳۸۵-۶)

سیدرضا حسینی<sup>۱</sup>، علی ذبیحی<sup>۲</sup>، سجاد سوادکوهی<sup>۲</sup>، علی بیژنی<sup>۲</sup>

۱- استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۲- عضو هیأت علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳- پزشک عمومی

**سابقه و هدف:** با افزایش امید به زندگی و بهبود مراقبت های بهداشتی - درمانی، جمعیت سالمندان بطور روزافزون در حال افزایش است. همچنین بررسی مشکلات سالمندان به منظور مدیریت و برنامه ریزی برای این قشر جامعه از اولویت های بهداشتی کشور می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیماریهای مزمن، بعنوان یکی از مشکلات با اهمیت، در سالمندان شهر امیرکلا می باشد.

**مواد و روشها:** این مطالعه مقطعی بر روی ۱۰۱۷ نفر از سالمندان شهر امیرکلا از میان حدود ۲۰۰۰ نفر افراد بالای ۶۰ سال که به روش نمونه گیری خوش ای انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای شامل ۳۲ سوال در دو بخش اطلاعات دموگرافیک و بیماری های مزمن، توسط افراد آموزش دیده و با پرسش از سالمندان و یا افراد مطلع خانواده جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تست های آماری مورد استفاده شامل مجذور کای و t-test بوده و  $p < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

**یافته ها:** از افراد مورد مطالعه، ۶۰۳ نفر (۵۹٪) مرد و ۴۱۴ نفر (۴۱٪) زن بودند. میانگین سن افراد در این بررسی  $70.7 \pm 6.9$  سال بوده است. در این بررسی فراوانی بیماری های قلبی و عروقی (۲۹٪)، مشکلات گوارشی (۲۸٪)، فشارخون بالا (۲۳٪)، دیابت (۲۲٪)، مشکلات عضلانی - اسکلتی (۲۲٪)، کلیه و مجرای ادرار (۱۶٪)، مشکلات ریوی (۱۲٪)، سکته مغزی (۴٪) بوده و سایر بیماری ها شیوع کمتری داشتند. فراوانی بیماری های قلبی - عروقی، فشارخون بالا، دیابت و بیماری های روانی در بین زنان سالمند و بیماری های ریوی و عضلانی - اسکلتی در بین مردان شایعتر بود. از افراد مورد مطالعه  $82\%$  حداقل یک بیماری و  $44\%$  بیش از دو بیماری همزمان داشتند. میانگین تعداد بیماری بازای هر شخص در این مطالعه  $2.2 \pm 2.6$  بود.

**نتیجه گیری:** با توجه به یافته های این پژوهش و بالا بودن درصد فراوانی بیماری های مزمن بیوژن بیماری های فشارخون بالا و دیابت در سالمندان، بایستی غربالگری و پایش این بیماری ها مورد توجه قرار گیرد.

**واژه های کلیدی:** سالمندان، بیماری های مزمن، وضعیت سلامتی، امیرکلا.

دربافت: ۸۷/۱۲/۵، ارسال جهت اصلاح: ۸۷/۱/۲۰، پذیرش: ۸۷/۴/۱۹

### مقدمه

سالمندان جهان از ۳۵۰ میلیون نفر در سال ۱۹۷۵ به یک میلیارد و یک صد میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید و میزان رشد جمعیت سالمندان به مرتب سریعتر از رشد کل جمعیت جهان است که بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند (۳). با افزایش سن احتمال ابتلا به یک یا چند بیماری مزمن افزایش می یابد بطوریکه اغلب افراد مسن بالای ۶۰ سال حداقل به یک

هزینه انجام این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره ۱۷۹۱۸۱۱۴۶۹ از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بابل تأمین شده است.

هر چند سالمندی فرآیند مداومی در زندگی انسان است ولی اینکه دقیقاً از چه سنی آغاز می شود و چه وقت می توان فردی را سالخورده تلقی نمود، دقیقاً مشخص نمی باشد. بطور قراردادی افراد ۶۰ سال و بالاتر به عنوان سالمندان یک کشور شناخته می شوند و در بعضی منابع دیگر، ۶۵ سالگی به عنوان مرز مشخص کننده در نظر گرفته شده است (۱). پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن ۲۱ به شمار می آید (۲). بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، جمعیت

بسته و بلي خير بود. در رابطه با روش تشخيص بیماری، تنها به بیماری های از قبل تشخیص داده شده که توسط افراد سالمند بیان می شد اکتفا گردید. ابتدا با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی شماره ۱ و ۲ امیرکلا، لیست سالمندان بالای ۶۰ سال تهیه گردید. سپس پرسشنامه ها توسط ۴ گروه دو نفره از دانشجویان پزشکی و پرستاری از قبل آموزش داده شده و با مراجعه خانه به خانه و به صورت مصاحبه با فرد سالمند یا در صورت لزوم از نزدیکان مطلع سالمند تکمیل گردید. سپس این پرسشنامه ها کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمونهای آماری مورد استفاده شامل محدود کاری و  $t$ -test بود و معنی دار در نظر گرفته شد.

### یافته ها

در این بررسی ۱۰۱۷ فرد سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد ۶۰۳ نفر (۵۹/۳٪) مرد و ۴۱۴ نفر (۴۰/۷٪) زن بودند. بیشتر سالمدان (۵۵٪) در گروه سنی ۶۵ تا ۷۵ سال قرار داشتند و کمتر از ۱٪ سالمدان بالای ۸۵ سال بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۶/۷±۰/۷ سال بود (دامنه ۹-۶۰). از نظر وضعیت اشتغال، ۳۷/۲٪ سالمدان شاغل، ۳۶/۸٪ خانه دار، ۱۴/۹٪ بیکار و ۱۱/۱٪ بازنشسته بودند. در این بررسی ۶۶/۴٪ سالمدان امیرکلا بی سواد و بیش از ۲۲/۸٪ آنها تحصیلات ابتدایی داشتند. از نظر وضعیت تأهل، ۷۹/۹ نفر (۷۸/۶٪) متاهل، ۲۱۲ نفر (۲۰/۸٪) همسر فوت شده، ۵ نفر (۰/۰٪) مطلقه و ۱ نفر (۰/۱٪) ازدواج نکرده وجود داشتند.

در این بررسی فراوانی بیماری های قلبی و عروقی (۲۹/۶٪)، مشکلات گوارشی (۲۸/۵٪)، فشارخون بالا (۲۳/۹٪)، دیابت (۲۳/۴٪)، مشکلات عضلانی - اسکلتی (۲۲٪)، کلیه و مجرای ادرار (۱۶/۶٪)، مشکلات ریوی (۱۲/۸٪)، سکته مغزی (۴/۹٪) بود (جدول شماره ۱). فراوانی بیماری های قلبی - عروقی، فشارخون بالا (p=۰/۰۷)، دیابت (p=۰/۰۰۱) و بیماری های روانی (p=۰/۰۰۱) در بین زنان سالمند و بیماری های ریوی (p=۰/۰۱۵)، اسکلتی عضلانی و کلیه و مجرای ادراری (p=۰/۰۰۱) در بین مردان شایعتر بود. از افراد مورد مطالعه ۸۳٪ وجود حداقل یک بیماری را گزارش کردند و ۴۴/۴٪ از آنها بیش از دو بیماری بطور همزمان داشتند. میانگین تعداد بیماری بازای هر شخص ۲/۶±۲/۲ بود که این میزان در زنان (۲/۴±۲/۱) بود و طور معنی داری بیشتر از مردان (۲/۷±۲/۳) بود. ۲۵٪ سالمدان تحت پوشش هیچ بیمه ای نبودند.

بیماری مزمن مبتلا می باشدند (۴). تقریباً ۸۰ درصد سالمندان مبتلا به یک بیماری مزمن بوده ، بطوریکه آنها را نسبت به دیگران آسیب‌پذیرتر می گرداند (۵-۶). در دوران سالمندی بیماری های قلبی و عروقی، سکته مغزی، سلطان ها، دیابت، بیماری های اسکلتی عضلانی و بیماری های روانی شایعتر می باشد (۶). در مطالعه Woo و همکاران بر روی سالمدان کره جنوبی، شایعترین بیماری های مزمن شامل پرفشاری خون، آرتربیت و دیابت بود و در زنان استئوپورز و آرتربیت بیشتر دیده شد و ۴۶/۸٪ سالمدان بیش از دو بیماری بطور همزمان داشتند (۷). مطالعه ای که در گیلان توسط سیام بر روی ۱۷۰ نفر در یک آسایشگاه سالمدان صورت گرفت، بیماری های گوارشی و ریوی در مردان و بیماری های قلبی و عروقی در زنان شایعتر بود (۸). سالمدان بیشترین مصرف کنندگان خدمات بهداشتی - درمانی در یک کشور بوده و روز به روز به میزان این تقاضا افزوده می شود. مسائل بهداشتی سالمدان از مسائل جوانان و میانسالان کاملاً متفاوت بوده و هزینه های درمانی آنها نیز دو برابر این هزینه ها در جوانان می باشد (۹). همچنین متوسط مصرف دارو در سالمدان بیشتر از سایر گروه ها می باشد (۱۰). در ایران بدليل ساختار جمعیتی، هنوز مشکلات سالمندی بصورت جدی خودش را نشان نداده اما بزودی بروز خواهد نمود. لذا با شناخت وضعیت سلامت و بیماری دوران سالمندی می توان برنامه ریزی جامعی جهت طراحی تسهیلات مراقبت های بهداشتی درمانی انجام داد. این مطالعه با هدف شناخت فراوانی بیماری های مزمن در سالمدان شهر امیرکلا صورت گرفت.

### مواد و روشها

این مطالعه مقطعی بر روی سالمدان شهر امیرکلا انجام شد. امیرکلا (امیر شهر) شهر کوچکی است با جمعیت شهری حدود ۲۵۰۰۰ نفر که بین شهرستان بابل و بابلسر قرار داشته و حدود ۲۰۰۰ نفر (۵۳/۵٪ مرد و ۴۶/۵٪ زن)، افراد بالای ۶۰ سال در این شهر زندگی می کنند که حدود ۱۰۱۷ نفر از آنها از طریق نمونه‌گیری خوش ای وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد (۱۱) همراه با مصاحبه صورت گرفت. پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ سوال در دو بخش بود که قسمت اول شامل ۵ سوال در زمینه مشخصات دموگرافیک افراد و قسمت دوم حاوی ۲۷ سوال در رابطه با بیماری های مزمن در قالب سوالات

## جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد بیماری‌های مزمن بر اساس سن و جنس در بین سالمندان شهر امیرکلا در سال ۸۵-۸۶

کلی	کلی		۸۵ به بالا		۷۵-۸۴		۶۵-۷۴		۶۰-۶۴		سن جنس متغیرها
	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	
(۲۳/۹)۲۴۳	(۲۶/۸)۱۱۱	(۲۱/۹)۱۳۲	(۳۷/۴)۱۰	(۱۷/۲)۵	(۲۰/۹)۲۱	(۲۷/۳)۴۰۱	(۲۴/۸)۵۶	(۲۰/۸)۷۰	(۳۳/۳)۲۴	(۱۸/۷)۱۷	فشارخون بالا
(۲۹/۶)۳۰۱	(۳۰/۸)۱۲۷	(۲۸/۸)۱۷۴	(۴۰/۹)۱۲	(۴۱/۴)۱۳	(۳۵/۵)۲۹	(۳۶/۲)۵۴	(۲۹/۶)۶۸	(۲۷/۸)۹۲	(۲۴/۷)۱۸	(۱۶/۵)۱۵	- بیماری‌های قلبی - عروقی
(۴/۹)۵۰	(۵/۶)۲۳	(۴/۵)۲۷	(۹/۱)۳	(۱۷/۲)۵	(۷/۱)۵	(۷/۷)۱۰	(۵/۷)۱۳	(۲/۷)۹	(۲/۷)۲	(۳/۳)۳	سکته مغزی
(۲۲/۱)۲۲۵	(۲۰/۹)۸۷	(۲۳)۱۳۸	(۱۳/۶)۴	(۳۷/۹)۱۱	(۲۶/۸)۲۲	(۳۲/۲)۴۸	(۱۸/۷)۴۳	(۲۰/۷)۶۹	(۲۴/۷)۱۸	(۱۲/۱)۱۱	مشکلات عضلانی اسکلتی
(۱۲/۸)۱۳۰	(۹/۷)۴۰	(۱۴/۹)۹۰	(۲۲/۷)۶	(۲۴/۱)۷	(۱۴/۶)۱۲	(۱۵/۴)۲۳	(۸/۷)۲۰	(۱۴/۴)۴۷	(۱۴/۳)۱۳	(۱۴/۳)۱۳	مشکلات ریوی
(۲۸/۵)۲۹۰	(۲۸/۲)۱۱۷	(۲۸/۸)۱۷۳	(۵۰)۱	(۴۴/۸)۱۳	(۳۴/۱)۲۸	(۳۵/۵)۵۳	(۲۶/۱)۶۰	(۲۵/۴)۸۵	(۲۳/۳)۱۷	(۲۴/۲)۲۲	مشکلات گوارشی
(۷)۷۱	(۷)۲۹	(۷)۴۲	(۲۲/۷)۶	(۳/۴)۱	(۱۳/۴)۱۱	(۱۴/۱)۲۱	(۵/۲)۱۲	(۵/۱)۱۷	(۱/۴)۱	(۳/۳)۳	بی اختیاری ادراری
(۷/۳)۲۳	(۷/۷)۱۱	(۷)۱۲	(۱۳/۶)۴	(۰)۰	(۳/۷)۳	(۵/۴)۸	(۲/۲)۵	(۰/۹)۳	(۰)۰	(۱۴/۱)۱	مشکلات کنترل روده ای
(۱/۷)۱۷	(۱/۷)۷	(۱/۷)۱۰	(۴/۵)۱	(۳/۴)۱	(۲/۴)۲	(۳/۴)۵	(۱/۷)۴	(۰/۳)۱	(۰)۰	(۳/۳)۳	سرطان
(۶/۵)۶۶	(۱۵)۶۲	(۰/۷)۴	(۴/۵)۱	(۰)۰	(۲۵/۹)۲۱	(۰/۷)۱	(۱۶/۵)۳۸	(۰/۹)۳	(۱۲/۳)۹	(۰)۰	مشکلات پستانی
(۱۶/۶)۱۶۹	(۸/۷)۳۶	(۲۴)۱۳۳	(۹/۱)۳	(۱۷/۲)۵	(۹/۸)۸	(۲۴/۲)۳۶	(۹/۱)۲۱	(۲۴/۳)۸۱	(۷/۸)۷	(۱۲/۱)۱۱	کلیه و مجاری ادراری
(۳/۶)۳۷	(۴/۱)۱۷	(۳/۳)۲۰	(۱۳/۶)۴	(۳/۴)۱	(۲/۴)۲	(۴)۶	(۴/۳)۱۰	(۳)۱۰	(۲/۷)۲	(۳/۳)۳	کبد و کیسه صفراء
(۴/۹)۵۰	(۵/۳)۲۲	(۴/۶)۲۸	(۹/۱)۳	(۳/۴)۱	(۹/۸)۸	(۵/۴)۸	(۳/۵)۸	(۴/۸)۱۶	(۳/۴)۳	(۳/۳)۳	سردردهای مزمن
(۲/۷)۲۷	(۳/۴)۱۴	(۲/۲)۱۳	(۴/۵)۱	(۰)۰	(۳/۷)۳	(۰/۷)۱	(۳/۵)۸	(۳/۳)۱۱	(۲/۷)۲	(۱/۱)۱	صرع و تشنجات
(۹/۹)۱۰۰	(۱۴/۷)۶۰	(۷/۸)۴۰	(۹/۱)۳	(۰)۰	(۱۴/۶)۱۲	(۷/۷)۱۰	(۱۳/۵)۳۱	(۶)۲۰	(۱۹/۲)۱۴	(۱۲/۱)۱۱	بیماری‌های روانی و افسردگی
(۲۳/۴)۲۴۸	(۲۰/۸)۱۲۸	(۱۸/۴)۱۱۰	(۳۶/۴)۱۱	(۱۳/۸)۴	(۳۲/۲)۱۹	(۲۸/۹)۴۲	(۳۰/۹)۷۱	(۱۸)۶۰	(۳۰/۶)۲۲	(۴)۴	دیابت
(۱۶/۱)۱۶۴	(۱۷/۲)۷۱	(۱۰/۴)۹۳	(۳۱/۸)۹	(۱۰/۳)۳	(۱۸/۳)۱۵	(۱۷/۴)۲۶	(۱۸/۳)۴۲	(۴/۴)۱۵	(۸/۲)۶	(۴)۴	هر نوع شکنندگی
(۵/۴)۵۵	(۷/۸)۲۸	(۴/۵)۲۷	(۰)۰	(۳/۴)۱	(۱۱)۹	(۷/۴)۱۱	(۷/۴)۱۷	(۲/۲)۷	(۲/۷)۲	(۲/۲)۲	مشکلات تیزروئید
(۱۲/۱)۱۲۲	(۱۴/۸)۶۲	(۱۰/۳)۶۰	(۲۷/۳)۸	(۱۳/۸)۴	(۲۴/۴)۲۰	(۱۹/۵)۲۸	(۱۲/۲)۲۷	(۷/۲)۲۳	(۹/۶)۷	(۵/۵)۴	مشکلات چشمی
(۱۴/۱)۱۴۱	(۱۰/۷)۴۵	(۱۷/۴)۹۶	(۲۲/۷)۷	(۴۱/۴)۱۲	(۳/۱)۲	(۲۶/۲)۳۹	(۹/۶)۲۳	(۱۲/۶)۴۰	(۴/۱)۳	(۶)۵	مشکلات گوش

میزان ارائه شده در مطالعه‌ای است که مؤسسه ABS استرالیا اعلام کرده است (۱۷). در یک مطالعه مشابه، مشکلات ریوی در ۱۰/۸ سالمندان (۱۴) و در مطالعه دیگر در ۵/۸ درصد زنان و ۱۰/۹ درصد مردان گزارش گردید (۱۱). در این مطالعه فراوانی سکته‌های مغزی در سالمندان ۴/۹ درصد بوده است؛ در حالیکه در مطالعه مشابه دیگر حدود ۳ درصد بوده است (۱۷).

مشکلات اسکلتی عضلانی در ۲۲/۱ درصد سالمندان امیرکلا (۲۰/۹) درصد زنان و ۲۳ درصد مردان) دیده شد. مشکلات اسکلتی عضلانی در دو مطالعه جدأگانه که در تهران (۱۴) و گیلان (۱۱) انجام گرفت به ترتیب ۲۹ درصد و ۲۲/۵ درصد گزارش گردید. در مطالعات مشابه دیگر، این نسبت ۱۴/۶٪ و ۶۳/۵ درصد بوده است (۹ و ۱۷). در مطالعه حاضر ۲/۷ درصد سالمندان سابقه تشنج و یا صرع را ذکر کردند که بیشتر از نتایج بررسی Faught و همکارانش می‌باشد که آمار یک درصد را گزارش کردند (۲۰). مشکلات کنترل ادراری در ۷ درصد سالمندان امیرکلا دیده شد و این میزان در مردان و زنان برابر (۷٪) بود. در مطالعه‌ای Yoshida (۱۳/۴٪) مردان و ۲۳/۳٪ زنان سالمند دچار بی اختیاری ادراری بودند (۲۱). در سال از بی اختیاری ادراری شاکی بودند (۲۲). در ارتباط با سرطان، ۲/۳ کل سالمندان امیرکلا (۲٪) مردان و ۲/۷٪ زنان) دچار سرطان بودند. در مطالعه Feldman و همکاران (۱۲٪) مردان و ۱۱٪ زنان بالای ۷۰ سال سابقه سرطان داشتند که سرطان پروستات در مردان و سرطان پستان در زنان شایعترین بودند (۲۳).

فراوانی بیماریهای روحی و روانی از قبل تشخیص داده شده در بین سالمندان بالای ۶۰ سال امیرکلا ۹/۹٪ (در مردان ۶/۸٪ و در زنان ۱۴/۶٪) بوده است. در حدود ۲۱٪ سالمندان امیرکلا احساس غمگینی و افسردگی داشتند. در مطالعه سیام ۳۸/۸٪ خانمهای و ۳۱/۷۶٪ آقایان سالمند دچار بیماریهای روحی و روانی بودند (۱۱). در مطالعه جفتایی و همکاران ۲۱/۲٪ سالمندان دچار یکی از مشکلات افسردگی، اضطراب و یا بی حوصله گی بودند (۲۴). در مطالعه صادقی و همکاران نیز ۱۶/۸٪ سالمندان افسردگی خفیف و ۱۴/۷٪ افسردگی اساسی و ۴۳٪ دچار دماسن بودند (۲۵). همچنین در بررسی رهگذر و همکاران ۲۲/۴٪ سالمندان احساس افسردگی و ۲۳/۵٪ اساس اضطراب و دلشوره داشتند (۲۶). در مطالعه Ubina Toriju (۱۹/۷٪) سالمندان از علائم افسردگی رنج

## بحث و نتیجه گیری

در این بررسی ۲۹/۶ درصد از سالمندان (۳۰/۸٪ زنان و ۲۸/۸٪ مردان) دچار مشکل قلبی و عروقی بودند. در مطالعه سیام ۲۵/۸٪ زنها و ۱۸/۸٪ مردها دچار مشکلات قلبی- عروقی بودند (۱۱). در مطالعه توتوونچی ۳۷/۲٪ سالمندان دچار این مشکل بودند (۱۴). در مطالعات دیگر درصد فراوانی‌های کاملاً متفاوتی دیده می‌شود. در مطالعه Issa و همکارانش ۸۹/۹٪ (۱۵)، در مطالعه Australian Bureau Almirall ۱۱٪ (۱۶) و در مطالعه مؤسسه of Statistics(ABS) استرالیا ۱۰٪ گزارش شده است (۱۷). با توجه به اینکه بیماری‌های قلبی عروقی شایعترین علت مرگ در کشورمان می‌باشد، افزایش آکاهی عمومی در زمینه عوامل خطر این بیماری‌ها و اصلاح آنها می‌تواند در کاهش این بیماری‌ها در دوران سالمندی نقش مهمی داشته باشد.

در این مطالعه فراوانی فشارخون بالا در میان سالمندان شهر امیرکلا در حدود ۲۴ درصد (۲۲٪ مردان و ۲۷٪ زنان) بوده است. در مطالعات مشابه دیگر شیوع پرفشاری خون ۴۱/۵٪ (۴۸٪) (۹)، ۴۰٪ (۴۰٪) (۱۷)، ۶۲٪ (۱۸) بوده است. در بررسی عزیزی و همکاران، ۴۷٪ سالمندان (۵۲٪ زنان و ۴۲٪ مردان) فشار خون بالا داشتند (۱۹). علت کمتر بودن درصد فراوانی فشارخون بالا در بین سالمندان امیرکلا در مقایسه با مطالعات دیگر شاید بدلیل مراجعه کمتر یا عدم دسترسی این افراد به پزشک یا سیستم بهداشتی و نیز غربالگری ضعیف فشار خون در بین سالمندان امیرکلا باشد. در مطالعه حاضر ۲۳/۴ درصد افراد سالمند (۳۰/۸٪ درصد زنان و ۱۸/۴٪ درصد مردان) مبتلا به دیابت بودند. در مطالعات مشابه دیگر شیوع بیماری دیابت ۱۵/۶٪ (۱۴)، ۱۴٪ (۱۶) و ۲۶/۳٪ (۱۵) بوده است. در مطالعه مؤسسه ABS، در سال ۲۰۰۳، ۱۰/۶٪ سالمندان (۱۰/۲٪ مردان و ۱۱/۳٪ زنان) دچار دیابت بودند (۱۷). بالا بودن فراوانی دیابت در بین سالمندان امیرکلا شاید بدلیل شیوع بیشتر دیابت در گذشته بین سالمندان این منطقه و یا تشخیص اشتباه دیابت در گذشته باشد. بر اساس نتایج این پژوهش ۲۸/۵٪ سالمندان (۲۸/۸٪ مردان و ۲۸/۲٪ زنان) دارای مشکلات گوارشی بودند که بیشتر از نتایج بدست آمده توسط Parkash (۴/۷٪) (۹)، سیام (۱۷/۶٪) (۴/۷٪) (۹)، سیام (۱۷/۶٪) (۱۴٪) (۱۴٪) مردها) (۱۱) و کمتر از یافته‌های توتوونچی (۴۶٪) (۱۴٪) می‌باشد. از نظر بیماریهای ریوی ۱۴/۹٪ (۱۲/۸٪ مردان و ۹/۷٪ زنان) سالمندان امیرکلا دچار مشکلات ریوی بودند که کمتر از

با توجه به یافته های این پژوهش و بالا بودن درصد فراوانی بیماری های مزمن بیوژه بیماری های فشارخون بالا و دیابت در سالمندان، بایستی غربالگری و پایش این بیماری ها مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر افزایش روزافرون جمعیت سالمندان، ضرورت تشکیل مراکز دولتی جهت پایش مداوم وضعیت سالمندان و ارزیابی مشکلات آنها را نشان می دهد تا با هماهنگی سازمان های مرتبط در بهبود وضعیت سالمندان اقدامات ضروری را انجام دهند.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بدليل تصویب این طرح و نیز از کارکنان محترم مراکز بهداشتی درمانی شماره ۲۹۱ امیرکلا (خانمه آل مهدی، والا و باباجانی) و همچنین خانم مهدیزاده، آقایان عرب و حسینزاده دانشجویان پرستاری و همچنین آقای فرشید جعفرزاده که در جمع آوری اطلاعات کمک کردن و نیز از مردم شریف امیرکلا تشکر و قدردانی می شود.

می برندند که تنها ۵ درصد آنها افسردگی بالینی تشخیص داده شده داشتند (۲۷). در مطالعات مشابه دیگر میزان ابتلا به علائم افسردگی در سالمندان ۵/۹٪ (۲۸)، ۴/۱٪ (۲۹) و ۱/۳٪ (۳۰) بوده است. در این بررسی ۸۳٪ از افراد مورد مطالعه حداقل یک بیماری را گزارش کردند در حالیکه این میزان در سایر مطالعات ۷۸٪ (۱۰)، ۶/۸٪ (۳۱) و ۶/۸٪ (۳۲) گزارش گردید. تفاوت های نژادی، اقتصادی اجتماعی، سیستم های مراقبت های بهداشتی، پرسشنامه های استفاده شده و نیز تفاوت در جمعیت های مورد مطالعه قرار گرفته (۶۰ ساله و بالاتر یا ۶۵ سال و بالاتر) می تواند دلایل این اختلاف ها باشد.

با بررسی وضعیت بیمه سالمندان امیرکلا مشخص شد که ۲۵ درصد آنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمانی نمی باشند که این میزان به مراتب کمتر از مطالعه ای است که جنتایی و همکارانش انجام دادند که در آن مطالعه ۵۹٪ سالمندان تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمانی نبودند (۳۴).



### References

1. Moodi M, Sharifzadeh Gh, Mehrjoofard H, et al. Study of the aged living in the aged residences in Birjand. Kashan University of Medical Sciences, National Congress of Geriatrics and Gerontology 23-25 Oct 2007, Kashan/Iran; pp: 83.
2. Mohtasham Amiri Z, Farazmand A, Toloei M. Causes of patient's hospitalization in Guilan university hospitals. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(42): 28-32.
3. Haji Jafari M. Prevalence of common chronic diseases in pensioners of Imam Khomeini relief committee in Kashan, from Feb to May 2007; pp: 43.
4. Aldrich N, Benson WF. Disaster preparedness and the chronic disease needs of vulnerable older adults. Prev Chronic Dis 2008; 5(1): A27.
5. Prakash R, Choudhary SK, Singh SU. A study of morbidity pattern among geriatric population in an urban area of Udaipur Rajasthan. Indian J Community Med 2004; 29(1): 35- 40.
6. Woo Ek, Han C, Jo SA, et al. Morbidity and related factors among elderly people in South Korea: results from the Ansan Geriatric (AGE) cohort study. BMC Public Health 2007; 7: 10.
7. Sayam Sh. Study of situation of elderly residents in Guilan elderly nursing home. J Guilan Univ Med Sci 2001; 10(39-40): 119-26.
8. Wu LF. Comprehensive geriatric assessment and nursing practice. Hu Li Za Zhi 2007; 54(6): 61-6.
9. Canadian study of health and ageing-3 screening questionnaire. www.csha.ca. 18/08/2008.

10. Tootoonchi P. Chronic diseases and senile changes in the elderly population, Tehran, Iran. Payesh, J Iran Inst Health Sci Res 2004; 3(3): 219-25 .
11. The health of older people. Australia . ABS .2003 NHS. www.abs.gov.au. 10/11/2004.
12. Brindel P, Hanon O, Dartigues JF, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the elderly: the Three City study. J Hypertens 2006; 24(1): 51-8.
13. Azizi F, Emami H, Salehi P, Ghanbarian A, Mirmiran P, Mirbolooki M. Cardiovascular risk factors in the elderly: Tehran lipid and glucose study (TLGS). Iranian J Endocrinol Metab 2003; 17(5): 3-14.
14. Almirall J, Vaqueiro M, Anton E, et al. Prevalence of chronic kidney disease in community-dwelling elderly and associated cardiovascular risk factors. Nefrologia 2005; 25(6): 655-62.
15. Issa MM, Fenter TC, Black L, Grogg AL, Kruep EJ. An assessment of the diagnosed prevalence of diseases in men 50 years of age or older. Am J Manag Care 2006; 12(4): 83-9.
16. Faught E. Epidemiology and drug treatment of epilepsy in elderly people. Drugs Aging 1999; 15(4): 255-69.
17. Yoshida Y, Kim H, Iwasa H, et al. Prevalence and characteristics of urinary incontinence in community-dwelling-elderly as determined by comprehensive health examination and interview for the prevention of geriatric syndrome and bed-ridden state. Nippon Ronen Igakkai Zasshi 2007; 44(1): 83-9.
18. Schumacher S. Epidemiology and etiology of urinary incontinence in the elderly. Urologe 2007; 46(4): 357-8, 360-2.
19. Feldman AR, Kessler L, Myers MH, Naughton MD. The prevalence of cancer. Estimates based on the connecticut tumor registry. N Engl J Med 1986; 315(22): 1394-7.
20. Joghatai MT, Asadi MH. The state of elderly people and the necessity of paying attention to their needs. Hakim Res J 1999; 1(2): 1-6.
21. Sadeghi M, Kazemi HR. Prevalence of Dementia and depression among residents of elderly nursing homes in Tehran province. Q J Andeesheh va Raftar 2004; 9(36): 49-55.
22. Rahgozar M, Mohammadi MR. Elders' depression, anxiety and apprehension. Hakim Res J 1999; 2(2): 103-13.
23. Urbina Torija JR, Flores Mayor JM, García Salazar MP, Torres Buisan L, Torrubias Fernandez RM. Depressive symptoms in the elderly. Prevalence and associated factors. Gac Sanit 2007; 21(1): 37-42.
24. Kaneko Y, Motohashi Y, Sasaki H, Yamaji M. Prevalence of depressive symptoms and related risk factors for depressive symptoms among elderly persons living in a rural Japanese community: a cross-sectional study. Community Ment Health J 2007; 43(6): 583-90.
25. Van't Veer Tazelaar PJ, Van Marwijk HW, Jansen AP, et al. Depression in old age (75+), the PIKO study. J Affect Disord 2008; 106(3): 295-9.
26. Pan A, Franco OH, Wang YF, Yu ZJ, Ye XW, Lin X. Prevalence and geographic disparity of depressive symptoms among middle-aged and elderly in China. J Affect Disord 2008; 105(1-3): 167-75.
27. Tung HJ. Ethnic distribution of self-reported chronic diseases among the elderly in Taiwan. Physical and Psychological Barriers to Research 2004; 2(4): 202-11.

28. Clausen T, Romøren TI, Ferreira M, Kristensen P, Inqstand B, Holmboe Ottesen G. Chronic diseases and health inequalities in older persons in Botswana (southern Africa): a national survey. *J Nutr Health Aging* 2005; 9(6): 455-61.
29. Purty AJ, Bazroy J, Kar M, Vasudevan K, Veliath A, Panda P. Morbidity pattern among the elderly population in the rural area of Tamil Nadu, India. *Turk J Med Sci* 2006; 36: 45-50.
30. Cigolle CT, Langa KM, Kabato MU, et al. Geriatric conditions and disability: The health and retirement study. *Ann Intern Med* 2007; 147(3): 156-64.
31. Hoffman C, Rice D, Sung HY. Persons with chronic conditions. Their prevalence and costs. *JAMA* 1996; 276(18): 1473-9.
32. Wolff JL, Starfield B, Anderson G. Prevalence, expenditures and complications of multiple chronic conditions in the elderly. *Arch Intern Med* 2002; 162(20): 2269-76.

## PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES IN ELDERLY POPULATION IN AMIRKOLA (2006-2007)

**S.R. Hosseini (MD)<sup>1\*</sup>, A. Zabihi (MSc)<sup>2</sup>, S. Savadkohi (GP)<sup>3</sup>, A. Bijani (GP)<sup>3</sup>**

1. \* Assistant Professor of Social Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, [hosseinim46@yahoo.com](mailto:hosseinim46@yahoo.com),  
2. Academic Member of Nursing, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, 3.General Practitioner

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** With increasing hope for life and improving health cares, elderly population is increasing. Survey into problems of elderly people is one of the health care priorities in Iran in order to manage and develop a care plan for this population. The aim of this study was to determine the chronic diseases of elderly people in Amirkola, Babol, Iran.

**METHODS:** This cross-sectional study was performed on 1017 people (of 2000) aged over 60 years in Amirkola that were selected by cluster sampling. Data were collected using questionnaire included 32 questions about demographic characteristics and chronic diseases. Questionnaires filled out by trained questioners with interviewing old people and their family. Data were analyzed by chi square and t-test. P<0.05 was considered significant.

**FINDINGS:** In this study, 603 (59.3%) were male and 414 (40.7%) were female. Mean age of the elderly population was  $70.7 \pm 6.9$  years. Frequency of chronic diseases was cardiovascular diseases (CVD) (29.6%), digestive disorders (28.5%), hypertension (HTN) (23.9%), diabetes mellitus (DM) (23.4%), musculoskeletal diseases (22%), kidney and urinary tract (16.6%), pulmonary diseases (12.8%), cerebrovascular accident (4.9%) and the frequency of other diseases was less. Frequency of CVD, HTN, DM and psychiatric diseases in female population were more than males and pulmonary and musculoskeletal diseases in male population were more than female population. From studied cases, 83% afflicted with at least one disease and 44.4% afflicted with more than two diseases synchronously. Mean of disease numbers for every person was  $2.6 \pm 2.2$ .

**CONCLUSION:** Considering the results of this study and high frequency percentage of chronic diseases especially HTN, DM in old people, consideration should be given to screening for these diseases.

**KEY WORDS:** *Elderly, Chronic disease, Health status, Amirkola.*

*Journal of Babol University of Medical Sciences 2008; 10(2): 68-75.*

*Received: February 23<sup>rd</sup> 2007, Revised: April 8<sup>th</sup> 2008, Accepted: May 7<sup>th</sup> 2008*