

## مقایسه میزان توده استخوانی در زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباتریپلوری با زنان سالم

علی اکبر آب روش (MD)<sup>۱</sup>، جواد شکری شیروانی (MD)<sup>۲\*</sup>، علی بیژنی (MD)<sup>۳</sup>، بهزاد حیدری (MD)<sup>۴</sup>، انسیه شفیق (MD)<sup>۵</sup>

- ۱- دانشگاه علوم پزشکی بابل
- ۲- گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
- ۳- مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل
- ۴- گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دریافت: ۹۰/۵/۹، اصلاح: ۸۹/۹/۱۷، پذیرش: ۹۰/۲/۷

### خلاصه

**سابقه و هدف:** استئوپروز و شکستگی های ناشی از آن، علل مهم ناتوانی در زنان خصوصاً در سنین سالمندی است. شناسایی عوامل بروز استئوپروز و اصلاح آنها در پیشگیری شکستگی موثر می باشد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباتریپلوری و کاهش دانسیته استخوان در زنان انجام شد.

**مواد و روشها:** این مطالعه مقطعی بر روی ۴۲ بیمار زن که بعلت علائم دیسپیسی تحت گاستروسکوپی تشخیصی قرار گرفته و تشخیص گاستریت مزمن بعلت هلیکوباتریپلوری با انجام بیوسپی و روتی هلیکوباتریپلوری در نمونه بافتی با آزمایش سروولوزی تأیید شده بود با ۵۲ شاهد زن بدون علائم گوارشی انجام شد. افراد تحت مطالعه از نظر دانسیته استخوان مورد بررسی قرار گرفتند. دانسیته استخوان در ناحیه فقرات کمری (Femoral neck BMD grm/cm<sup>2</sup>) و استخوان ران (Spine BMD grm/cm<sup>2</sup>) در کل بیماران دو گروه و نیز در بیماران و شاهدان بر حسب سن مورد مقایسه قرار گرفت.

**یافته ها:** میانگین سنی بیماران ۵۱/۶±۶/۵ سال و شاهدان ۵۱/۷±۶/۵ سال بود. میانگین دانسیته فقرات کمری و استخوان ران در دو گروه تفاوتی نداشت. در افراد کمتر از ۵۰ سال سطح دانسیته فقرات کمری در بیماران کمتر از شاهدان و سطح دانسیته استخوان ران بیشتر از شاهدان بود. اختلاف معنی داری بین دانسیته استخوانها در گروه مورد و شاهد به تفکیک سنی زیر ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا نیز دیده نشد اما دانسیته فقرات کمری در بیماران کمتر از ۵۰ سال بطور معنی داری کمتر از بیماران ۵۰ سال به بالا بود ( $p=0.17$ ). در شاهدان نیز این اختلاف دیده نشد.

**نتیجه گیری:** یافته های این مطالعه نشان داد که التهاب ناشی از عفونت هلیکوباتریپلوری بر دانسیته استخوان ناحیه ران اثر منفی ندارد. اما ممکن است بر دانسیته فقرات کمری در زنان کمتر از ۵۰ سال اثرات منفی داشته باشد. مطالعات بیشتر با تعداد نمونه زیادتر برای تأیید یافته های فوق لازم است.

**واژه های کلیدی:** گاستریت مزمن، هلیکوباتریپلوری، دانسیته استخوان.

### مقدمه

واکنش التهابی از طریق آزاد کردن سیتوکینهای التهابی، تولید استخوان سازی (Bone formation) را کاهش و جذب استخوانی (Bone resorption) را افزایش می دهد (۱-۳). با توجه به اینکه مهار واکنش التهابی می تواند بر شدت کاهش توده استخوان اثر کند. لذا شناسائی محل واکنش التهابی و اثبات ارتباط آن

استئوپروز یک عامل مهم شکستگی استخوان در سالمندان خصوصاً زنان و ناتوانی متعاقب آن می باشد. شناسایی عوامل بروز استئوپروز و اصلاح آنها می تواند در پیشگیری شکستگی موثر باشد. در بین عوامل متعددی که در بروز و استئوپروز و تداوم کاهش توده استخوانی دخالت دارند، التهاب اهمیت زیادی دارد.

□ این مقاله حاصل پایان نامه دکتر علی اکبر آب روش دستیار رشته داخلی و طرح تحقیقاتی به شماره ۷۵۲۲۱۲ دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.  
\* مسئول مقاله:

e-mail:javadshokri@gmail.com

آدرس: بابل، بیمارستان آیت الله روحانی، گروه داخلی، تلفن: ۰۱۱-۲۲۳۸۳۰۱-۳

مقایسه میزان توده استخوانی در زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از؛ علی اکبر آب روش و همکاران

غیر استروئیدی NSAID در یک ماه گذشته، مصرف داروهای هورمونی موثر بر متابولیسم استخوان مثل هورمون درمانی جایگزینی، بیس فسفونات، کلسیم، Vit D، فلوراید و کلسیتونین در یکساله اخیر، استعمال دخانیات، استفاده از الكل و رژیم گیاهخواری مطلق وارد مطالعه نشدند. گروه شاهد از میان زنان بدون علائم گوارشی و سن بیش از ۴۰ سال انتخاب شدند و همه معیارهای خروج در مورد شاهدان نیز در نظر گرفته شد.

اطلاعات با استفاده از معاینه بالینی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ثبت گردید. در حین گاستروسکوپی در صورت وجود علائم التهاب متوسط و شدید مثل ادم، اروئن دو نمونه بیوپسی از آتر معده تهیه شده و جهت بررسی هیستولوژی به واحد پاتولوژی فرستاده شد. وجود عفونت HP با رویت باکتری در نمونه بافتی تایید شد. همچنین با انجام آزمایش سرولوژی سطح سرمی آتنی بادی از نوع ELISA با روش IgG (در ۲۷ بیمار) اندازه گیری شد. دانسیته استخوان Bone mineral density (BMD) بیماران و شاهدان از طریق سنجش Dual energy X- ray absorptiometry (DXA) با استفاده از دانسیتمتر lexxos (L1-L5) ساخت فرانسه مدل ۲۰۰۷ تایید گردید. BMD نواحی فقرات کمری (Femoral neck و گردن ران) اندازه گیری شد و بصورت gr/cm<sup>2</sup>, نشان داده شد.

در آنالیز آماری دانسیته استخوان ناحیه هیپ و فقرات کمری بین کل بیماران دو گروه و نیز در افراد بالاتر و پائین تر از ۵۰ سال دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. علاوه بر این زنان پائین تر از ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا در هر دو گروه مطالعه با هم مقایسه شدند تا اثر سن بر سطح BMD بررسی شود. مقایسه دو گروه با استفاده از آزمونهای، تست دقیق فیشر، Mann- Whitney U Test و T-Test انجام و  $p < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

## یافته ها

در این مطالعه ۴۲ نفر بیمار با میانگین سنی  $51/6 \pm 9$  سال و ۵۲ شاهد با میانگین سنی  $51/7 \pm 6/4$  سال بررسی شدند. میانگین سن پاکسگی در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب  $46/7 \pm 7$  و  $46/2 \pm 7$  سال بود. افراد دو گروه از نظر سن، سن پاکسگی، وزن، قد و BMI اختلاف معنی داری نداشتند (جدول ۱). در مقایسه کل بیماران و شاهدان دو گروه از نظر سطح BMD در دو ناحیه ران و فقرات کمری تفاوتی نشان ندادند اما در افراد کمتر از ۵۰ سال سطح spine Femoral neck BMDgrm/cm<sup>2</sup> در بیماران کمتر از شاهدان و سطح BMD gr/cm<sup>2</sup> بیشتر از شاهدان بود. به هر حال در هر دو حالت تفاوت معنی داری وجود نداشت. در افراد ۵۰ سال به بالا سطح BMD در هر دو ناحیه ران و فقرات کمری در گروه بیماران کمتر از شاهدان بود اما تفاوت از این نظر آماری معنی دار نبود (جدول ۲).

سطح Femoral neck BMD grm/cm<sup>2</sup> در افراد پائین تر از ۵۰ سال کمتر از افراد بالاتر از ۵۰ سال بود اما این اختلاف معنی دار نبود. اما در بیماران کمتر از ۵۰ سال BMD در ناحیه فقرات بطور معنی داری از بیماران ۵۰ سال به بالا کمتر بود ( $p = 0.017$ ). در حالیکه چنین تفاوت معنی داری در شاهدان دیده نشد (جدول ۳).

با کاهش توده استخوانی اهمیت زیادی دارد. ارتباط بین التهاب در سیستم گوارش و کاهش توده استخوان در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی رود نشان داده شده است (۳).

گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباتریلوری (Helico Bacter pylori) HP) التهاب مزمن مخاط معده است که منجر به فراخوانی سلولهای التهابی شده و سیتوکینهای التهابی را در مخاط معده و همچنین در شیره معده افزایش می دهد. در گاستریت مزمن ناشی از عفونت طولانی مدت، با آزادسازی سیتوکین های از قبل ۲-IL-8, IL-α, INF-γ از مخاط معده ورود آنها به جریان خون در میترالیزاسیون استخوان اختلال ایجاد می شود. علاوه بر این عفونت HP با ایجاد پاسخ هومورال مخاطی و سیستمیک و ارتضای سلولهای التهابی مزمن در لامینا پروپریای معده موجب تحریک سیستم ایمنی می شود (۴-۶).

شیوع گاستریت مزمن ناشی از HP در کشورهای در حال توسعه بالا بوده و در منطقه مازندران ۷۸٪ می باشد (۷). از طرفی استئوپروروز نیز در زنان و در سنین بعد از پاکسگی افزایش چشمگیری دارد و علاوه بر این شروع استئوپنی در ایران از ۴۰ سالگی و بعد از آن در زنان نشان داده شده است (۸)، عفونت HP مهمترین عامل عفونی در جهان است که بیش از نصف جمعیت زمین را آلوده کرده است. ارتباط این باکتری با گاستریت مزمن و کانسر معده، ثابت شده است. عفونت HP سبب ایجاد پاسخ سلولی مزمن التهابی در مخاط معده که بعلت ایجاد می شود، محدود به معده باقی نمی ماند بلکه به بافتها و اعضاء خارج از سیستم گوارش نیز گسترش می یابد و با بیماریهای متعدد آندکریبی مانند تیروئیدیت اتو ایمیون، دیابت، دیس لیپیدمی، چاقی، استئوپروروز و پرکاری اولیه پاراتیروئید ارتباط دارد (۹).

با توجه به شیوع بالای گاستریت مزمن ناشی از HP در منطقه مازندران بررسی ارتباط بین گاستریت مزمن ناشی از HP که یک عفونت مزمن است با کاهش توده استخوانی در زنان این ناحیه جغرافیائی منطقی بنظر می رسد. لذا این مطالعه به منظور بررسی میزان توده استخوان در زنان مبتلا به گاستریت مزمن علامت دار ناشی از HP که نیاز به گاسترسکوپی داشته اند و مقایسه آن با شاهدان بدون علائم گوارشی گاستریت انجام شده است.

## مواد و روشها

این مطالعه مقطعی طی ۲ سال بر روی بیمارانیکه بدلایل مختلفی مثل سوء هاضمه به واحد آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی بابل مراجعه کرده و شرایط آندوسکوپی را داشتند، انجام شد. داشتن سن بیشتر از ۴۰ سال، وجود گاستریت شدید (دم - التهاب - آسیب مخاطی) در آندوسکوپی با تایید هستیولوژی گاستریت نیز برای ورود به مطالعه ضروری بود. افراد دارای سابقه شکستگی، هیپوگنادیسم، سابقه افورکتومی، وجود بیماریهای مزمن مثل روماتوئید آرتیت، سیستمیک لوپوس اریتمatosus، بیماریهای التهابی روده، دیابت ملیتوس، پازه، اسپوندیلیت آنکیلوزان، بیماریهای موثر بر متabolیسم استخوان مثل بیماری مزمن کبدی، کلیوی، تیروئید، پاراتیروئید و بیماریهای عضلانی اسکلتی، سابقه کانسر شناخته شده، بیماری سوء جذب، بی حرکتی طی ۳ ماه گذشته، مصرف آتنی بیوتیکهای موثر بر HP طی ۲ ماه اخیر، مصرف داروهای ضد التهابی

در بیماران در مقایسه با شاهدان بر حسب ناحیه مورد اندازه گیری تفاوت داشت و فقرات کمری و در بیماران بیش از ۵۰ سال در مقایسه با بیماران جوانتر از ۵۰ سال به سطح معنی دار رسیده است. در حالیکه مقایسه BMD در ناحیه گردن ران گرچه در بیماران کمتر از شاهدان بود اما این تفاوت معنی دار نبود. کاهش دانسیته در افراد بالاتر از ۵۰ سال در مقایسه با کمتر از ۵۰ سال فقط در بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباترپیلوری به سطح معنی دار رسید، لذا ممکن است بتوان نتیجه گیری کرد که عفونت هلیکوباترپیلوری احتمالاً در افراد بالاتر از ۵۰ سال سبب کاهش دانسیته می‌گردد که در ناحیه ستون فقرات واضح تر و معنی دار است.

در زمینه ارتباط عفونت هلیکوباترپیلوری با کاهش دانسیته استخوان مطالعات اندکی صورت گرفته و لذا اطلاعات موجود در منابع علمی کم است. از این رو چگونگی ارتباط عفونت هلیکوباترپیلوری در معده با برخی اسناد پژوهش نامشخص است. در یک مطالعه از زنان یائسه با میانگین سنی ۶۱/۷ سال، که در آنان گاستروسکوپی و دانسیتومتری انجام شده است، شیوع استئوپروز ۳۶٪ و شیوع عفونت هلیکوباترپیلوری در بیماران با و بدون استئوپروز معادل ۵۵٪ و ۷۵٪ می‌باشد. در این مطالعه بین استئوپروز و عفونت هلیکوباترپیلوری ارتباطی گزارش گردید. در این مطالعه دیگر از ۸۵ زن با میانگین سنی ۵۵/۲ سال تحت دیده نشد (۱۰). در یک مطالعه دیگر از ۱۳۸ زن با میانگین سنی ۴۱/۷ سال گاستروسکوپی و سپس دانسیتومتری، عفونت هلیکوباترپیلوری جزو ریسک فاکتور استئوپروز تشخیص داده نشد (۱۱).

در یک مطالعه دیگر که مردان مبتلا به استئوپروز و شاهدان بدون استئوپروز از نظر شیوع آنتی بادی ضد هلیکوباترپیلوری در سرم مقایسه شدند. شیوع افراد دارای آنتی بادی در سرم بین افراد با و بدون استئوپروز تفاوت نداشت، اما در افراد با تست مشیة *Cag-A positive* هلیکوباترپیلوری سطح استر ادیول سرم بطور معنی داری کمتر و مارکرهای جذب استخوان بطور غیر معنی داری بیشتر از افرادی بود که دارای *Cag-A negative* هلیکوباترپیلوری بودند یا افرادی که آلوگری نداشتند. در این مطالعه احتمال داده شد که عفونت ناشی از *Cag-A positive* هلیکوباترپیلوری ممکن است ریسک فاکتور استئوپوروز در مردان باشد (۱۲).

همانطور که در بیماران مبتلا به التهاب سیستمیک مانند آرتربیت روماتوئید که از دست رفت توده استخوان به کاهش استخوان سازی و افزایش تخریب استخوان نسبت داده شده است (۱۳). در بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباترپیلوری نیز آزاد شدن سیتوکینهای شان داده شده است که می‌توانند مانند بیماریهای سیستمیک مانند آرتربیت روماتوئید یا بیماریهای التهابی روده ای بر توده استخوان اثر بگذارد. علاوه بر این نشان داده که بعلت بروز پلی مورفیسم در افراد مبتلا به عفونت هلیکوباترپیلوری، تنوع در نوع و در سطح سیتوکینهای نیز بوجود می‌آید که در پاسخ بدن در مقابل هلیکوباترپیلوری تاثیر IL-1B، IL-6, IL-8, TNF-A, IL-1 تولید می‌شود که در جمعیت های کشورهای غربی و آسیائی ریسک سرطان معده را افزایش می‌دهد (۱۴).

علاوه بر التهاب، مکانیسمهای دیگری چون محدودیت رژیم غذائی در بیماران مبتلا به دیسپرسی، وجود احتمالی اختلال جذب بعلت کاهش اسیدیته معده در بیماران مبتلا به گاستریت مزمن آتروفیک بعلت هلیکوباترپیلوری (۱۳) نیز در بروز کاهش دانسیته استخوان یا استئوپروز موثر باشند. در این مطالعه ممکن

جدول شماره ۱. مقایسه زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباترپیلوری و شاهدان مطالعه از نظر سن، وزن، قد و BMI

متغیر	گروه	بیمار	شاهد	pvalue
				Mean±SD
سن(سال)	سن(سال)	۵۱/۶۴±۹/۲۲	۵۱/۷۷±۶/۴۵	.۰/۹۳۸
قد(سانتی متر)	قد(سانتی متر)	۱۵۶/۲۶±۶/۱۷	۱۵۶/۴±۵/۱۹	.۰/۸۶۵
وزن	وزن	۶۵/۸۶±۱۰/۵۳	۶۸/۲۷±۹/۷۱	.۰/۲۵۲
(kg/m2)BMI	(kg/m2)BMI	۲۷/۸۱±۴/۰۸	۲۷/۰۲±۴/۴۱	.۰/۳۶۶

جدول شماره ۲. نتایج BMD مهره های کمر و لگن در گروههای زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباترپیلوری و شاهدان به تفکیک سن

بیماران	گروه	بیمار	شاهد	pvalue
				Mean±SD
زیر ۵۰ سال	مهره های کمری	۱/۰۹±۰/۱۸۴	۰/۹۴۵±۰/۱۳۸	.۰/۲۰۱
۵۰ سال به بالا	گردن فمور	۰/۸۰۴±۰/۱۰۸	۰/۸۰۳±۰/۱۱۰	.۰/۹۴۵
مهره های کمری	مهره های کمری	۰/۹۶۲±۰/۱۶۲	۰/۹۹۷±۰/۱۵۱	.۰/۵۳۱
گردن فمور	گردن فمور	۰/۸۷۱±۰/۰۸۰	۰/۸۲۱±۰/۱۱۸	.۰/۱۸۵
کل	مهره های کمری	۰/۸۷۰±۰/۱۸۹	۰/۹۱۵±۰/۱۲۲	.۰/۲۸۶
گردن فمور	گردن فمور	۰/۷۷۱±۰/۱۰۶	۰/۷۹۲±۰/۱۰۶	.۰/۴۴۳

جدول شماره ۳. مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان لگن در زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباترپیلوری و شاهدان با سن بالاتر و کمتر از ۵۰ سال

متغیر	گروه	۵۰ سال به بالا	۵۰ سال	زیر ۵۰ سال	pvalue
					Mean±SD
BMD استخوان لگن	بیماران	۰/۸۶±۰/۱۴	۰/۹۷±۰/۱۱	۰/۹۷±۰/۱۲	.۰/۱۰
BMD استخوان لگن	شاهدان	۰/۹۲±۰/۱۰	۱±۰/۱۲	۰/۹۲±۰/۱۳	.۰/۱۳
Mehrheh های کمری BMD	بیماران	۰/۸۵±۰/۱۸	۰/۹۶±۰/۱۶	۰/۹۶±۰/۱۵	.۰/۰۷
Mehrheh های کمری BMD	شاهدان	۰/۹۲±۰/۱۲	۰/۹۷±۰/۱۵	۰/۹۷±۰/۱۴	.۰/۹۳

### بحث و نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد که در زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباترپیلوری توده استخوان کاهش می‌یابد. در این مطالعه کاهش BMD

مقایسه میزان توده استخوانی در زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از؛ علی اکبر آب روش و همکاران

تولید آنتی بادی علیه هلیکوباتریپیلوری نشانه پاسخ سیستم ایمنی بدن بوده، اینکه میزان آنتی بادی تولید شده تاچه حد شدت التهاب را بیان می کند و افزایش تیتر ان چقدر با میزان تولید واسطه های التهابی همیستگی دارد مشخص نمی باشد و آیا افزایش تیتر IgG ضد هلیکوباتریپیلوری با کاهش دانسیته استخوان ارتباطی داردیا نه؟ بررسی نشده است. با توجه به این مطالعه التهاب ناشی از عفونت هلیکوباتریپیلوری بر دانسیته استخوان ران اثرات منفی نداشت، اما ممکن است بر دانسیته فقرات کمری در زنان کمتر از ۵۰ سال اثرات منفی داشته باشد.

پیشنهاد می شود مطالعه با تعداد نمونه بیشتری انجام شود.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل بدليل حمایت مالی از تحقیق و از آقای دکتر حاجی قربان نورالدینی جهت انجام دانسیتومتری تقدیر و تشکر بعمل می آید.

است به علت تعداد کم نمونه اختلاف واقعی نشان داده نشده باشد و ممکن است با تعداد نمونه بیشتر بتوان این اختلاف رانشان داد. با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباتریپیلوری در جامعه احتمال مثبت بودن هلیکوباتریپیلوری را در شاهدان نمی توان رد کرد. لذا نسبت قابل ملاحظه ای از گروه شاهد احتمالاً مبتلا به عفونت هستند به همین جهت در این مطالعه تفاوت واقعی BMD بین بیماران و شاهدان باید بیش از ارقامی باشد که مشاهده شده است. از طرف دیگر توجه به نقاط قوت این مطالعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه علاوه بر یافته ماکروسکوپی التهاب در جین گستروسوکپی، وجود التهاب مزمن با رویت باکتری هلیکوباتریپیلوری در مخاط معده با آزمایش میکروسپیک نمونه بافتی نیز تائید شده است. در حالیکه نشان دادن التهاب و آلدگی به هلیکوباتریپیلوری از طریق سروولوژی نمی تواند نشان دهنده وضعیت فعلی التهاب باشد و بر اساس آنتی بادی سرم نمی توان شدت التهاب را بیش بینی کرد. علاوه بر این مطالعه سروولوژی با نواعصی مثل مثبت یا منفی کاذب همراه می باشد و شدت التهاب و عدم وجود هلیکوباتریپیلوری را پس از ریشه کنی مشخص نمی کند (۱۵).

## Bone Mineral Density (BMD) in Women with Helicobacter Pylori (HP) Induced Chronic Gastritis in Comparison with Healthy Women

A.A. Abravesh (MD)<sup>1</sup>, J. Shokri Shirvani (MD)<sup>2\*</sup>, A. Bijani (MD)<sup>3</sup>, B. Heidari (MD)<sup>2</sup>,  
E. Shafiq (MD)<sup>4</sup>

1. Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2. Department of Internal Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3. Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Amirkola hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4. Department of Pathology, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

J Babol Univ Med Sci; 13(4); Jul 2011

Received: Jul 31<sup>st</sup> 2010, Revised: Dec 8<sup>th</sup> 2010, Accepted: Apr 27<sup>th</sup> 2011.

### ABSTRACT

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Osteoporosis and bone fracture consequence to it is an important cause of disability particularly in the elderly women. Identifying the causes of osteoporosis and its treatment is important in fracture prevention. The present study was performed to determine the relationship between helicobactor pylori infection (HP) and ostoporosis in the women.

**METHODS:** In this cross sectional study, forty-two women with clinical features of dyspepsia due to HP- induced chronic gastritis confirmed by gastroscopy and biopsy were compared with 52 healthy control women without dyspepsia. Bone mineral density (BMD) was assessed by dual energy x-ray absorptiometry (DXA). Femoral neck BMD gr/cm<sup>2</sup> and spine BMD gr/m<sup>2</sup> were compared between whole number of two groups as well as between patients and controls according to age.

**FINDINGS:** The mean age of patients and controls were 51.6± 9.2 and 51.7± 6.5 years, respectively. There were no significant differences in mean spine and femoral neck BMD between the whole numbers of patients and controls. But in groups aged <50 years spine BMD in patients was nonsignificantly lower than controls and femoral neck BMD was higher than controls. There were not significant differences in mean spine and femoral neck BMD between patients and controls aged >50 and <50 years. Comparison of individuals aged >/=50 years with those aged < 50 years demonstrated a significant difference only in patients for spine BMD ( $p=0.017$ ) but not in the controls.

**CONCLUSION:** These findings indicate that HP-induced inflammation has no adverse effect over femoral neck BMD but has negative effect on spine BMD in women aged >/=50 years. Further studies with larger samples are needed to confirm these findings.

**KEY WORDS:** *Chronic gastritis, Helicobacter pylori, Bone mineral density.*

---

\*Corresponding Author;

Address: Department of Internal Medicine, Ayatollah Roohani Hospital, Babol, Iran

Tel: +98 111 2238301-3

E-mail: javadshokri@gmail.com

## References

1. Romas E, Gillespie MT. Inflammation induced bone loss. Can it be prevented? *Rheum Dis Clin North Am* 2006; 32(4):759-73.
2. Compston JE, Judd D, Crawley EO, et al. Osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease. *Gut* 1987;28(4):410-5.
3. Pigot F, Roux C, Chaussade S, et al. Low bone mineral density in patients with inflammatory bowel disease. *Dig Dis Sci* 1992;37(9):1396-403.
4. Crabtree JE. Gastric mucosal inflammatory responses to Helicobacter Pylori. *Aliment Pharmacol Ther* 1996;10 Suppl 1:29-37.
5. Guiraldes E, DuarteI, Pena A, et al. Proinflammatory cytokine expression in gastric tissue from children with Helicobacter Pylori associated gastritis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2001;33(2):127-32.
6. Fan XG, Chua A, Fan XJ, Keeling PW. Increased gastric production of interleukin -8 and tumour necrosis factor in patients with Helicobacter Pylori infection. *J Clin Pathol* 1995;48(2):133-6.
7. Ghadimi R, Taheri H, Suzuki S, et al. Host and environmental factors for gastric cancer in Babol, the Caspian sea coast, Iran. *Eur J Cancer Prev* 2007;16(3):192-5.
8. Larijani B, Hossein-Nezhad A, Mojtabaei A, et al. Normative data of bone mineral density in healthy population of Tehran, Iran: a cross sectional study. *BMC Musculoskeletal Disord* 2005;6:38.
9. Papamichael KX, Papaioannou G, Karga H, Roussos A, Mantzaris GJ. Helicobacter pylori infection and endocrine disorders: is there a link? *World J Gastroenterol* 2009;15(22):2701-7.
10. Kakehasi AM, Mendes CM, Coelho LG, Castro LP, Barbosa AJ. The presence of Helicobacter pylori in postmenopausal women is not a factor to the decrease of bone mineral density. *Arq Gastroenterol* 2007;44(3):266-70.
11. Kakehasi AM, Rodrigues CB, Carvalho AV, Barbosa AJ. Chronic gastritis and bone mineral density in women. *Dig Dis Sci* 2009;54(4):819-24.
12. Figura N, Gennari L, Merlotti D, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in male patients with osteoporosis and controls. *Dig Dis Sci* 2005;50(5):847-52.
13. Mundy GR. Osteoporosis and inflammation. *Nutr Rev* 2007;65(12 Pt 2):S147-51.
14. Sugimoto M, Yamaoka Y, Furuta T. Influence of interleukin polymorphisms on development of gastric cancer and peptic ulcer. *World J Gastroenterol* 2010;16(10):1188-200.
15. Feldman M, Cryer B, Lee E, Peterson WL. Role of seroconversion in confirming cure of Helicobacter pylori infection. *JAMA* 1998;280(4):363-5.