

## کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژیک قبل و بعد از شیمی درمانی

روزیتا رضایی (MSc)\*<sup>۱</sup>، سوسن ساعت ساز (MSc)<sup>۱</sup>، فاطمه حاجی حسینی (MSc)<sup>۱</sup>، سید حمید شریف نیا (MSc)<sup>۱</sup>، رقیه نظری (MSc)<sup>۱</sup>

- دانشکده پرستاری حضرت زینب آمل، دانشگاه علوم پزشکی بابل

دریافت: ۸۹/۴/۶، اصلاح: ۸۹/۷/۱۴، پذیرش: ۸۹/۹/۱۷

### خلاصه

**سابقه و هدف:** کانسرهای ژنیکولوژیک از مباحث مهم انکولوژی و پزشکی اجتماعی هستند. به کمک سنجش کیفیت زندگی مبتلایان به کانسر می توان میزان تاثیر درمان و مداخلات حمایتی را در این بیماران ارزیابی نمود. لذا این مطالعه به منظور بررسی کیفیت زندگی و زیر گروههای آن در بیماران مبتلا به کانسر های ژنیکولوژیک قبل و بعد از شیمی درمانی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

**مواد و روشها:** این مطالعه مقطعی بر روی ۵۴ نفر از بیماران مبتلا به کانسر ژنیکولوژیک که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات بوسیله دو پرسشنامه دموگرافیک و FACT-G جهت سنجش کیفیت زندگی از طریق مصاحبه حضوری قبل از درمان و ۳ ماه پس از درمان بدست آمد و کیفیت زندگی در ۴ زیر گروه سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی، خانوادگی، سلامت عاطفی و سلامت عملکردی ارزیابی شد. حداقل نمره صفر و حداکثر نمره کیفیت کلی زندگی ۱۰۸ می باشد.

**یافته ها:** میانگین سنی بیماران  $۵۴/۷۰ \pm ۸/۰$  سال بود. میانگین نمره سلامت جسمانی، اجتماعی-خانوادگی، عاطفی، عملکردی و کیفیت کلی زندگی بعد از درمان  $۷۱/۶۸ \pm ۱۶/۳$  نسبت به قبل از درمان  $۶۱/۶۹ \pm ۱۸/۴$  با اتر بود ( $P=0.001$ ). بین سن بیماران و کیفیت کلی زندگی بعد از درمان ارتباط وجود داشت ( $P=0.001$ ). بین وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، وضعیت اقتصادی و نوع کانسر با کیفیت زندگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

**نتیجه گیری:** نتایج مطالعه نشان داد که درمان با شیمی درمانی سبب بهبود کلی کیفیت زندگی در کانسر های ژنیکولوژیک می شود. درک این نکته توسط بیمار می تواند باعث پذیرش بهتر درمان های کانسر گردد.

**واژه های کلیدی:** کیفیت زندگی، پرسشنامه FACT-G، سرطان های دستگاه تناسلی زنان.

### مقدمه

کانسرهای ژنیکولوژیک در آمریکا را تشکیل می دهد (۳). امروزه درمان کانسر پیشرفته شامل درمان ترکیبی جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی است (۴-۶). درد، استفراغ، مشکلات خواب، خستگی، ترس زیاد و اضطراب ناشی از رادیوتراپی، شیمی درمانی، جراحی و درمانهای هورمونی اثرات زیادی بر روی سلامت فیزیکی و روانی فرد می گذاردند (۷-۹) تنگی واژن، تغییر در عملکرد روده ها، مثانه و تخدمان، میل به خود کشی و علائم منیوز و اختلال عملکرد جنسی می توانند منجر به درک منفی از کیفیت زندگی شوند (۱۰-۱۲). همچنین مشکلات خانه و

کانسرهای ژنیکولوژیک از مباحث بسیار مهم انکولوژی و پزشکی اجتماعی هستند که علت  $۱/۳$  کل کانسرها در خانم ها می باشدند (۱). در آمریکا هر ساله حدود ۸۰۰۰۰ مورد جدید از کانسر های ژنیکولوژی تشخیص داده می شود (۲). در این بین کانسر مهاجم سرویکس نسبتاً غیر شایع است و میزان پایین بروز آن را می توان به تاثیر بیماریابی از طریق پاپ اسمیر نسبت داد. با وجود این در سال ۲۰۰۹ میلادی در آمریکا ۱۱۳۰۰ مورد جدید از سرطان مهاجم سرویکس شناسایی شد. کانسر آندومتر شایعترین بدخیمی دستگاه تناسلی زنان است و تقریباً نیمی از

■ این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ۶۸۳۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.  
\* مسئول مقاله:

آدرس: آمل، خیابان طالب آملی، دانشکده پرستاری حضرت زینب، دانشگاه علوم بابل، تلفن: ۰۱۲۱-۲۲۲۱۹۱۹  
e-mail:R.Rezaei@mubabol.ac.ir

پژوهشی اجتماعی قلمداد شده و از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری برای سیاست گزاران بهداشت و درمان تلقی می‌گردد. با این وجود تحقیقات کمی جهت رسیدن به این اهداف در کشور ما وجود دارد. لذا این مطالعه به منظور تعیین کیفیت زندگی و جزای آن در بیماران مبتلا به کانسرهای ژنیکولوژی قبیل و بعد از شیمی درمانی انجام شده است.

## مواد و روشها

این مطالعه مقطعی بر روی ۵۴ نفر از بیماران مبتلا به کانسر ژنیکولوژیک که از مرداد ماه سال ۱۳۸۶ لغایت مرداد ماه سال ۱۳۸۷ برای اولین بار به مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر مراجعه کرده و در این مرکز تحت شیمی درمانی قرار گرفته، انجام شد. بر اساس روش نمونه گیری مبتنی بر هدف ۶۲ بیمار با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه شامل تشخیص قطعی کانسر ژنیکولوژیک بر اساس پاسخ پاتولوژی، رضایت شفاخی بیمار برای شرکت در مطالعه و امکان دسترسی به بیمار ۳ ماه بعد از اقدام درمانی حجم نمونه مورد نظر را تشکیل دادند که ۸ نفر با توجه به معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم دسترسی به بیمار بعد از اقدام درمانی، وجود بیماریهای مزمن همراه مانند دیابت، اختلالات شناخته شده روانی و ... از مطالعه خارج شدند. اطلاعات لازم توسط دو پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک با ۱۳ سؤوال شامل سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال، ارگان درگیر، stage بیماری، نوع درمان و ... پرسشنامه FACT-G(v.4) که برای ارزیابی کیفیت زندگی در مبتلایان به کانسر طراحی شده و با شرایط فرهنگی- اجتماعی ایران مطابقت داده شده است و شامل ۲۷ سوال است (۲۳)، از طریق مصاحبه حضوری و چهره به چهره قبل از درمان و ۳ ماه پس از درمان (با حداقل تأخیر و تسریع یک هفته ای) تکمیل گردید. پرسشنامه FACT-G به راحتی قابل درک بوده و در زمان کوتاهی (۱۰-۱۵ دقیقه) قابل پر کردن می باشد و روابی و پایابی آن در کار آزمایی های بالینی سنجیده شده و به زبانهای متعددی نیز ترجمه شده است و آلفا کرونباخ آن ۰/۸۹ و ذکر شده است (۱۹ و ۲۰). براساس پرسشنامه FACT-G سوالات مربوط به کیفیت زندگی در ۴ زیرگروه، سلامت جسمانی (PWB) با سوالاتی نظری من از عوارض جانبی درمان (نیز می برم، من درد دارم و ...)، سلامت اجتماعی-خانوادگی (SFWB) با سوالاتی از قبیل من از حمایت عاطفی خانواده و دوستانم بخوردارم و ...، سلامت عاطفی (EWB) با سوالاتی نظری احساس می کنم غمگینم، من از مردن می ترسم و ... و سلامت عملکردی (FWB) با سوالاتی از قبیل من توانایی کار کردن را دارم، من خوب می خواهم و ... تقسیم شده است. بر اساس پرسشنامه به گزینه "به هیچ وجه"، نمره صفر؛ به گزینه "خیلی کم"، نمره یک؛ به گزینه "کمی"، نمره دو؛ به گزینه "زياد"، نمره ۳ و به "خیلی زياد"، نمره ۴ تعلق گرفت. حداقل نمره ممکن برای همه زیر گروهها صفر می باشد. در زیر گروههای BSFW، PWB، FWB حداقل نمره ممکن ۲۸ و در زیر گروه EWB حداقل نمره ممکن ۲۴ می باشد. در مورد کیفیت کلی زندگی حداقل نمره ممکن صفر و حداقل نمره ممکن ۱۰۸ می باشد (۲۴).

اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تست چفت شده و آزمون آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل و  $0.05 < p < 0.10$  معنی دار تلقی گردید.

محیط کار و آینده نامعلوم نیز می توانند باعث از بین رفتن سلامت اجتماعی و عاطفی فرد شوند و خود زنان با کانسر ژنیکولوژی گزارش کردنده که مشکلات روحی - روانی زیادی را به علت تشخیص و درمان بیماری دارند و تغییرات Von کیفیت زندگی جزو اولین پیامد درمان بیماری در آنهاست (۲۸). Gruenigen و همکاران در تحقیق خود اعلام کردنده که بیماران با کانسر Arriba کاشه در ابعاد جسمی، عملکردی و روانی کیفیت زندگی را دارند (۱۳). همکاران نیز در تحقیق خود بیان نمودند که کانسر تخدمان و درمانهای آن اثرات معنی داری بر روی کیفیت زندگی و زیر گروههای جسمی و عملکردی آن می گذارند (۱۴). Miller در مطالعه خود گزارش کرد که کیفیت زندگی در بیماران با کانسر ژنیکولوژی، بعد از درمان بهتر شده و تفاوت آماری معنی داری بین بیماران با افراد سالم وجود ندارد (۴). همچنین Chan و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی بعد از شیمی درمانی بهبود یافته است (۱۵). و همکاران در مطالعه دیگری نیز به این نتیجه رسیدند که کیفیت کلی زندگی بعد از کامل شدن درمان بهبود می یابد (۱۶). مطالعات دیگری هم نشان داده اند که در طی درمان فعال، کیفیت زندگی ممکن است دچار نقصان شود ولی در طول زمان بهبود و ارتقا آن وجود دارد (۱۷ و ۱۸).

از آنجایی که کیفیت زندگی یک مورد اساسی و مهم برای بیماران با بیماریهای تهدید کننده حیات است، مراقبت های حمایتی جهت شناخت بهتر مشکلات روحی و کیفیت زندگی این بیماران باید جزء روتین بررسی بیماران با کانسر باشد (۷). در مطالعه ۵۷٪ بیماران اعلام نمودند که جهت مقابله و تطابق با مشکلات روحی - روانی نیاز به کمک و حمایت دارند و همه بیماران خواهان داشتن یک کیفیت زندگی خیلی خوب و مراقبت های بهداشتی همه جانبه و کلی می باشند و اگر مراقبت های پرستاری این جنبه مهم را نادیده بگیرد غیر استاندارد است (۱۹).

بررسی و شناخت کیفیت زندگی جهت ارزیابی تاثیر درمانهای کانسر بسیار کمک کننده است (۱۹). از طریق بررسی کیفیت زندگی، تیم های مراقبت بهداشتی قادر خواهند بود ارتباط بین کیفیت زندگی و رژیم های درمانی و عوارض بیماری را برای بیماران با انواع کانسر ژنیکولوژی مشخص نمایند (۲۰). مطالعات ثابت کردنده که آموزش ، مشاوره و حمایت از بیماران در سراسر زمان درمان به آنان کمک می کند تا خود را با شرایط جدید وفق دهنده که این امر منجر به تغییرات قابل توجهی در کیفیت زندگی بیماران می شود (۲۱). کاهش علائم بالینی کانسر نیز می تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی بیمار داشته باشد که این امر از طریق مراقبتها پرستاری خوب امکان پذیر است. پرستاران نقش کلیدی و مهمی در شناسایی و درمان عوارض کانسر دارند. کاهش عوارض و نشانه های کانسر می تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی بیماران بگذارد (۹). آموزش پرستاری به بیمار در این رابطه که کیفیت کلی زندگی بعد از کامل شدن درمان بهبود خواهد یافت می تواند موجب پذیرش بهتر درمان های کانسر توسط بیمار گردد. همچنین لازم است تا بررسی رفتار فرد قبل و بعد از درمان جهت شناخت اثرات ناشی از درمان انجام شود و مداخلات پرستاری جهت افزایش کیفیت زندگی و درک بهتر درمان توصیه می شود (۲۲).

امروزه تعیین کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کانسر ژنیکولوژیک، میزان رضایت و نوع توقعات آنان از سیستم درمانی و برنامه ریزی و تخصیص منابع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات یکی از موضوعات مهم طب جامعه نگر و

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سلطان های ژنیکولوژیک؛ رزیتا رضایی و همکاران

اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. بین نوع کانسر با کیفیت کلی زندگی قبل و بعد از درمان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

### جدول شماره ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی قبل و بعد از درمان در بیماران مبتلا به کانسرهای ژنیکولوژیک به تفکیک نوع کانسر

pvalue	میانگین نمره		کیفیت زندگی قبل از درمان	کیفیت زندگی بعد از درمان	انواع کانسر
	Mean±SD	Mean±SD			
.0/.1	74/7±16	64/1±19/5	تخدمان		
.0/.2	71/5±17/3	61±19/4	سرمیکس		
NS	69/6±13/7	58/6±16/9	اندومتر		
NS	63/9±21/1	60/4±17/9	ولو و وازن		

### بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه میانگین نمره کیفیت کلی زندگی ۳ ماه بعد از درمان بالاتر از قبل از درمان بود. Miller در مطالعه خود که بر اساس پرسشنامه Fact- G انجام داده بود اعلام کرد در بیماران با کانسر ژنیکولوژی، بعد از درمان کیفیت زندگی بهتر بوده و تفاوت آماری معنی داری بین بیماران با افراد سالم وجود ندارد (۴) و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی Chan و همکاران در مطالعه خود به این شیوه یافت شده است (۱۵). همچنین بعد از شیوه درمانی بهبود یافته و این بهبود تا ۱۲ ماه ادامه یافت (۱۶). همچنین Chan و همکاران در مطالعه دیگری که بر روی ۱۴۴ بیمار مبتلا به کانسر ژنیکولوژی تازه تشخیص داده شده قبیل و بعد از درمان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کیفیت کلی زندگی بعد از کامل شدن درمان بهبود می یابد (۱۶). مطالعات دیگری هم نشان دادند که در طی درمان فعل، کیفیت زندگی ممکن است دچار نقصان شود ولی در طول زمان بهبود و ارتقاء آن وجود دارد (۱۷ و ۱۸). نتایج مطالعه Tahmasebi و همکاران نیز با مطالعه ما همخوانی دارد (۲۳). نتایج مطالعه ما همچنین نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی در بیماران با کانسر تخدمان و سرمیکس بعد از درمان به طور معنی داری بالاتر از قبل از درمان بود. Von Gruenigne و همکاران و Lorusso و همکاران نیز در مطالعات خود اعلام کردند که بیماران با کانسر تخدمان کاهش در ابعاد جسمی، عملکردی و روانی کیفیت زندگی دارند که بعد از درمان بهبود در کیفیت زندگی ایجاد گردید (۱۳ و ۲۴).

نتایج مطالعه ما نشان داد که بین سن بیماران و سلامت عملکردی، عاطفی، اجتماعی و کیفیت کلی زندگی بعد از درمان همبستگی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه سن فرد بالا می رود کیفیت زندگی پایین می آید. این نتیجه با مطالعه Tahmasebi و همکاران همخوانی دارد (۲۳)، احتمالاً به این دلیل است که هر دو مطالعه در ایران انجام شده و به طور کلی در کشور ما افزایش سن درک فرد را از سلامت و بیماری دچار تغییرات زیادی می کند. در حالی که Miller در مطالعه خود بیان کرد که میانگین نمره کیفیت زندگی در بیماران مسن تر بالاتر بود ( $p=0/.06$ ) و سن پایین با کاهش کیفیت زندگی حتی بعد از کامل شدن درمان همراه بود اگر چه سلامت خانوادگی - اجتماعی بیماران مسن

### یافته ها

در افراد تحت مطالعه حداقل سن ۲۰ و حداقل سن ۸۷ سال با میانگین سنی  $54/7\pm13/8$  بود. ۵ نفر (٪۹/۳) مجرد، ۳۷ نفر (٪۶۸/۵) متاهل و ۱۲ نفر (٪۲۲/۲) همسر فوت شده بودند. همچنین ۳ نفر (٪۵/۶) سابقه بارداری نداشتند و ۱۱ نفر (٪۱۸/۵) یک یا دو بارداری و ۴۱ نفر (٪۷۵/۹) سه بارداری یا بیشتر داشتند. ۱۱ نفر (٪۲۰/۴) مبتلا به کانسر آندومتر، ۱۷ نفر (٪۳۱/۵) مبتلا به کانسر سروپیکس، ۲۱ نفر (٪۳۸/۹) مبتلا به کانسر تخدمان و ۵ نفر (٪۹/۳) مبتلا به کانسر ولو و وازن بودند. بین سن بیماران و کیفیت کلی زندگی قبل از درمان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت ( $p=0/.06$ ) در حالی که بین سن و کیفیت کلی زندگی بعد از درمان همبستگی معکوس وجود داشت ( $p=0/.001$  و  $p=0/.42$ ). یعنی هر چه سن افراد بالا می رفت کیفیت زندگی پایین می آمد. بین سن و سلامت عملکردی قبل از درمان ( $p=0/.02$  و  $p=0/.03$ ) و بعد از درمان ( $p=0/.004$  و  $p=0/.007$ )، سن و سلامت عاطفی بعد از درمان ( $p=0/.004$  و  $p=0/.03$ ) ارتباط آماری معکوس وجود داشت. به عبارت دیگر در رابطه با کلیه زیر گروههای کیفیت زندگی ارتباط سن معکوس بود و هر چه سن بالاتر می رفت سلامت عاطفی، اجتماعی، عملکردی و کیفیت کلی زندگی پایین تر می آمد. بین وضعیت تا هل و کیفیت کلی زندگی هم قبل و هم بعد از درمان ارتباط آماری معنی دار نبود. بین وضعیت تحصیلات، اشتغال، وضعیت اقتصادی و کیفیت کلی زندگی هم قبل و هم بعد از درمان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. میانگین نمره تمام زیر گروههای کیفیت زندگی ۳ ماه بعد از درمان به طور معنی داری بالاتر از قبل از درمان بود (جدول ۱).

### جدول شماره ۱: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی و زیر گروههای آن قبل و بعد از درمان در بیماران مبتلا به کانسر های ژنیکولوژیک قبل و بعد از شیوه درمانی

pvalue	میانگین و انحراف معیار		کیفیت زندگی قبل از درمان	کیفیت زندگی بعد از درمان	بعاد
	Mean±SD	Mean±SD			
.0/.01	16/93±5/42	14/76±5/95	سلامت جسمانی		
.0/.03	22/12±5/49	18/47±7/23	سلامت اجتماعی - خانوادگی		
.0/.01	15/57±4/98	13/74±4/97	سلامت عاطفی		
.0/.02	17/0/5±5/19	14/72±5/85	سلامت عملکردی		
.0/.01	21/68±16/38	61/69±18/48	کیفیت زندگی		

میانگین نمره کیفیت زندگی بعد از درمان در مبتلایان به کانسر های تخدمان و سرمیکس به طور معنی داری بالاتر از قبل از درمان بود (جدول ۲). نتایج نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با سلامت اجتماعی قبل از درمان ( $F=5/4$  و  $p=0/.07$ ) و بعد از درمان ( $F=7/3$  و  $p=0/.02$ ) ارتباط آماری معنی دار وجود دارد که آزمون تعقیبی شفه این اختلاف را بین گروه با درآمد ۲۰۰ هزار، ۵۰۰ - ۲۰۰ هزار تومن نشان داد. در مبتلایان به Stage I میانگین سلامت عملکردی (۰/۰۳)، جسمانی (۰/۰۱) و کیفیت کلی زندگی (۰/۰۱) بعد از درمان نسبت به میانگین قبل از درمان بود که این

پیشرفت‌هه در بهبود زیر گروههای کیفیت زندگی وجود نداشت (۲۰ و ۲۱). علت این نامخوانی احتمالاً به این دلیل است که اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه ما در Stage پایین مراجعه کرده بودند که شاید دلیلی بر احساس سلامت جسمی توسط این افراد باشد. در مطالعه Nair بیماران با مرحله پایین تر بیماری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی داشتند (۲۶).

یافته های مطالعه ما نشان داد که بین نوع کانسر و کیفیت کلی زندگی قبل و بعد از درمان تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. در حالی که Miller در نتایج خود بیان می کند که بیماران با کانسر تخدمان به طور معنی داری نمرات پایین تری در زیر گروه سلامت عملکردی، عاطفی و کیفیت کلی زندگی داشتند (۴). مطالعه Bradley و همکاران نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین بیماران با کانسر آندومتر و سرویکس در رابطه با کیفیت کلی زندگی و زیر گروههای آن وجود نداشت (۱). در بین اعضای تیم بهداشتی پرستاران نقش بسیار مهمی در آموزش، مشاوره و حمایت از بیماران و کاهش و کنترل عوارض جانبی داروها و بیماری در نتیجه کم کردن تأثیرات سوء آنها بر روی جنبه های مختلف کیفیت زندگی بیماران دارند و از این طریق می توانند در جهت پیشبرد کیفیت زندگی مطلوب به این بیماران کمک نمایند.

به امید اینکه نتایج این مطالعه بتواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزی و تخصیص منابع به منظور بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به کانسرهای ژنیکولوژیک و همچنین کسب اطلاعات دقیق و بهینه سازی سیستم خدمتی، درمانی و حمایتی این قشر خاص به کار رود. البته با توجه به وسعت سرزمنی ما و تفاوت‌های قومی و فرهنگی و عدم یکنواختی توزیع امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی حتی جهت تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق به سایر نقاط کشور نیاز به یک مطالعه وسیعتر می باشد. Sun و همکاران نیز توصیه می کنند مطالعات دیگری جهت شناخت زنان در معرض خطر اختلالات شدید کیفیت زندگی انجام شده و بر اساس آنها مداخلات موثر جهت کمک به این بیماران طرح شود (۶).

اگرچه مطالعه ما نشان داد که کیفیت زندگی در بیماران با کانسر ژنیکولوژی بعد از درمان بهتر از قبیل از درمان می شود و با توجه به مطالعی که در رابطه با تعمیم نتایج بیان شد، به منظور تکمیل پژوهش های مرتبط با موضوع پیشنهاد می شود تحقیق جامعتری در مورد ارتباط متغیر های ذکر شده با کیفیت زندگی بعد از درمان و کارآیی غربالگری و تشخیص کانسرهای ژنیکولوژی به ویژه سرویکس و تخدمان در مراکز و مناطق مختلف کشور انجام شود تا بنوان نتایج آن را با دقت پیشتری در سطح جامعه تعمیم داد.

## تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به جهت حمایت مالی از این تحقیق و پرسنل زحمتکش مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر آقای درزی، خانمها باقرزاده، نبی بخشی و رجب زاده و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی آمل خانمها صادقی و اسفندیاری که در امر مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها همکاری نمودند، قدردانی می گردد.

پایین تر بود (۴). در برخی مطالعات گزارش شده که بین سن و کیفیت زندگی ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد (۲۰ و ۲۱).

یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین کیفیت کلی زندگی با وضعیت تا هل بیماران وجود ندارد که این نتیجه با نتایج مطالعه Tahmasebi و Bradley همچنین بین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی قبل و بعد از درمان ارتباط آماری معنی داری یافت نشد. Bradley و همکاران در مطالعه خود اعلام کردند که وضعیت ازدواج، سن، تحصیلات، نژاد، مذهب و درآمد ارتباط آماری معنی داری با کیفیت زندگی ندارند (۱). در حالی که یافته های مطالعه Miller و همکاران نشان داد که در بیماران با تحصیلات زیر دیبرستان کاهش معنی داری در نمره کلی کیفیت زندگی وجود دارد (۴) چرا که تحصیلات پایین با کاهش حمایت محیط اجتماعی، نداشتن آگاهی در رابطه با درمان و سلامتی و وضعیت نامناسب بهداشتی در ارتباط است (۲۵).

نتایج نشان داد که میانگین نمره سلامت عاطفی، عملکردی، جسمانی و اجتماعی بعد از درمان به طور معنی داری بالاتر از قبل از درمان بود. یافته های مطالعه Chan و همکاران نشان داد، با اینکه در شروع درمان وضعیت بیماران از نظر عملکردی بدتر شده بود ولی ۳ ماه پس از درمان وضعیت سلامت عملکردیشان ارتقاء و بهبود پیدا کرده بود (۱۵). یافته های مطالعه ای که با هدف ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران با کانسر تخدمان که تحت جراحی و شیمی درمانی قرار گرفتند، نشان داد که ۳ ماه بعد از درمان زیر گروه فیزیکی کاهش پیدا کرد و ۶ ماه بعد از درمان سلامت فیزیکی و عملکردی نسبت به ۳ ماه بعد از درمان افزایش پیدا کرد ولی تغییری در زیر گروههای روانی و اجتماعی مطالعه ما با (۲۲). این عدم همچوانی در وضعیت سلامت عاطفی و اجتماعی مطالعه ما با مطالعات دیگر را می توان به فرهنگ و وضعیت های خانوادگی و اجتماعی متفاوت در کشورهای مختلف نسبت داد که ممکن است بر روی درک فرد و کیفیت زندگی وی تأثیرات مختلف داشته باشد. در مطالعه Tahmasebi و همکاران نیز میانگین نمره سلامت اجتماعی - خانوادگی، روانی و عملکردی ۳ ماه بعد از درمان بالاتر از قبل از درمان بود در حالی که میانگین نمره سلامت جسمانی ۳ ماه پس از درمان بایین تر از قبل از درمان بود (۲۳). در مطالعه Miller و همکاران نیز نمرات زیر گروه سلامت عاطفی و عملکردی بعد از درمان نسبت به قبل از درمان بالاتر بود. در حالی که نمرات زیر گروه سلامت جسمانی بعد از درمان کاهش یافته بود (۴). بهتر شدن وضعیت اجتماعی و خانوادگی بیماران احتمالاً به این علت می باشد که بستری شدن بیمار در بیمارستان و انجام درمانهای مختلف، اهمیت وی را نزد خانواده و دوستان افزوده و موجب افزایش حمایت آنها از بیمار شده است.

در این مطالعه در مبتلایان به Stage I میانگین نمره سلامت عملکردی، جسمانی و کیفیت کلی زندگی بعد از درمان نسبت به قبل از درمان به طور معنی داری بالاتر بود که این نتیجه با نتایج مطالعات Lutgendorf و همکاران، Greimel و همکاران و Bradley و همکاران تناقض دارد. آنها در گزارش خود می نویسند تفاوت آماری معنی داری بین مرحله پایین بیماری و مرحله

## Quality of Life in Gynecologic Cancer Patients before and after Chemotherapy

R. Rezaei (MSc) \*<sup>1</sup>, S. Saatsaz (MSc)<sup>1</sup>, F. Haji Hosseini (MSc)<sup>1</sup>, S.H. Sharifnia (MSc)<sup>1</sup>,  
R. Nazari (MSc)<sup>1</sup>

1. Department of Nursing & Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

J Babol Univ Med Sci; 13(4); Jul 2011

Received: Jun 27<sup>th</sup> 2010, Revised: Oct 6<sup>th</sup> 2010, Accepted: Dec 8<sup>th</sup> 2010.

### ABSTRACT

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Gynecology cancer is one of the most important issues in oncology and social medicine. Quality of life assessment in gynecologic cancer patients helps to evaluate the effect of treatment and supportive interventions in these patients. The aim of this study was to assess the quality of life and its subscales in gynecologic cancer patients before and after chemotherapy and its related factors.

**METHODS:** This cross-sectional study was performed on 54 gynecologic cancer patients who were selected with proposal sampling. Data were collected with demographic and FACT-G questionnaires in individual interview before and 3 months after chemotherapy for quality of life evaluation. The quality of life was evaluated in four subgroups: physical, socio-familial, emotional and functional health. The minimum and maximum score of overall quality of life was 0 and 108, respectively.

**FINDINGS:** The mean age of patients was  $54.70 \pm 13.80$  years. The mean of physical, socio-familial, emotional, functional health and overall quality of life before treatment ( $61.69 \pm 18.48$ ) was higher than after treatment ( $71.68 \pm 16.38$ ) ( $p < 0.05$ ). There was a relationship between age and overall quality of life after treatment ( $r = -0.42$ ,  $p = 0.001$ ). There was no significant difference between quality of life and marital status, education, job, economic status and type of cancer.

**CONCLUSION:** Complete duration of chemotherapy treatment can cause the overall improvement of quality of life in gynecologic cancer patients. Patient perception of this leads to better acceptance of cancer treatment.

**KEY WORDS:** *Quality of life, FACT - G questionnaire, Gynecologic cancer.*

\*Corresponding Author;

Address: Hazrat Zeinab Nursing Faculty, Babol University of Medical Sciences, Taleb Amoli St., Amol, Iran

Tel: +98 121 2221919

E-mail: r.rezaei@mubabol.ac.ir

## References

1. Bradley S, Rose S, Lutgendorf S, Costanzo E, Anderson B. Quality of life and mental health in cervical and endometrial cancer survivors. *Gynecol Oncol* 2006;100(3):479-86.
2. Audette C, Waterman J. The sexual health of women after gynecologic malignancy. *J Midwifery Womens Health* 2010; 55(4):357-62.
3. Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical surgical nursing. 12th ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins 2010; pp: 1456-7.
4. Miller BE, Pittman B, Case D, McQuellon RP. Quality of life after treatment for gynecologic malignancies: a pilot study in an outpatient clinic. *Gynecol Oncol* 2002;87(2):178-84.
5. Vaz AF, Pinto-Neto AM, Conde DM, Costa-Paiva L, Morais SS, Esteves SB. Quality of life and acute toxicity of radiotherapy in women with gynecologic cancer: a prospective longitudinal study. *Arch Gynecol Obstet* 2008; 278(3):215-23.
6. Sun CC, Ramirez PT, Bodurka DC. Quality of life for patients with epithelial ovarian cancer. *Nat Clin Pract Oncol* 2007;4(1):18-29.
7. Penson RT, Wenzel LB, Vergote I, Cella D. Quality of life considerations in gynecologic cancer. *Int J Gynecol Obstet* 2006;95(Suppl 1):247-57.
8. Reis N, Beji NK, Coskun A. Quality of life and sexual functioning in gynecological cancer patients: results from quantitative and qualitative data. *Eur J Oncol Nurs* 2010;14(2):137-46.
9. Tabano M, Condosta D, Coons M. Symptoms affecting quality of life in women with gynecologic cancer. *Semin Oncol Nurs* 2002;18(3):223-30.
10. Frumovitz M, Sun CC, Schover LR, et al. Quality of life and sexual functioning in cervical cancer survivors. *J Clin Oncol* 2005;23(30):7428-36.
11. Ell K, Sanchez K, Vourlekis B, et al. Depression, correlates of depression, and receipt of depression care among low-income women with breast or gynecologic cancer. *J Clin Oncol* 2005;23(13):3052-60.
12. Hawighorst-Knapstein S, Fusshoeller C, Franz C, et al. The impact of treatment for genital cancer on quality of life and body image-results of a prospective longitudinal 10-year study. *Gynecol Oncol* 2004;94(2):398-403.
13. Von Gruenigen VE, Huang HQ, Gil KM, et al. A comparison of quality-of-life domains and clinical factors in ovarian cancer patients: a gynecologic oncology group study. *J Pain Symptom Manage* 2010;39(5):839-46.
14. Arriba LN, Fader AN, Frasure HE, Von Gruenigen VE. A review of issues surrounding quality of life among women with ovarian cancer. *Gynecol Oncol* 2010;119(2):390-9.
15. Chan YM, Ng TY, Ngan HY, Wong LC. Quality of life in women treated with neoadjuvant chemotherapy for advanced ovarian cancer: a prospective longitudinal study. *Gynecol Oncol* 2003;88(1):9-16.
16. Chan YM, Ngan HY, Li BY, et al. A longitudinal study on quality of life after gynecologic cancer treatment. *Gynecol Oncol* 2001;83(1):10-19.
17. Lutgendorf SK, Anderson B, Ullrich P, et al. Quality of life and mood in women with gynecology cancer: a one year prospective study. *Cancer* 2002;94(1):131-40.
18. Caffo O, Amichetti M, Mussari S, et al. Physical side effects and quality of life during postoperative radiotherapy for uterine cancer. Prospective evaluation by a diary card. *Gynecol Oncol* 2003;88(3):270-6.
19. McQuellon RP, Thaler HT, Cella D, Moore DH. Quality of life (QOL) outcome from a randomized trial of cisplatin versus cisplatin plus paclitaxel in advanced cervical cancer. A gynecologic oncology group study. *Gynecol Oncol* 2006;101(2):296-4.
20. Greimel E, Thiel I, Peintinger F, Cegnar I, Pongratz E. Prospective assessment of quality of life of female cancer patients. *Gynecol Oncol* 2002;85:140-7.

21. Lorusso D, Mainenti S, Ferrandina G, Scambia G. Assessment of factors that contribute to decreased quality of life in gynecologic oncology group ovarian cancer trials. *Expert Rev Anticancer Ther* 2010;10(7):987-91.
22. Von Gruenigen VE, Frasure HE, Jenison EL, Hopkins MP, Gil KM. Longitudinal assessment of quality of life and lifestyle in newly diagnosed ovarian cancer patients: the role of surgery and chemotherapy. *Gynecol Oncol* 2006;103(1):120-6.
23. Tahmasebi M, Yarandi F, Eftekhar Z, Montazeri A, Namazi H. Quality of life in gynecologic cancer patients. *Asian Pac J Cancer Prev* 2007; 8(4):591-2.
24. Lorusso D, Mainenti S, Ferrandina G, Scambia G. Assessment of factors that contribute to decreased quality of life in gynecologic oncology group ovarian cancer trials. *Expert Rev Anticancer Ther* 2010;10(7):987-91.
25. Wu AW. Quality-of-life assessment in clinical research. Application in diverse populations. *Med Care* 2000;38(9 Suppl):130-5.
26. Nair MG. Quality of life in cancer of cervix patients. *Int Psychopharmacol* 2000;15(Suppl 3):47-9.