

## مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمنیال مردان نابارور با سمن هیپروویسکوز و غیر هیپروویسکوز

عیسی طهماسب پور مرزونی (PhD)<sup>۱</sup>، سید غلامعلی جورسرایی (PhD)<sup>۲\*</sup>، مهدی پورامیر (PhD)<sup>۳</sup>، باصلت حسین زاده کلاغر (PhD)<sup>۴</sup>

- باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری حضرت فاطمه زهرا(س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل
- گروه بیوشیمی و بیوفزیک، دانشگاه علوم پزشکی بابل.
- گروه زیست شناسی سلوی و مولکولی، دانشگاه مازندران

دریافت: ۹۱/۴/۱۴، اصلاح: ۹۱/۲/۱۳، پذیرش: ۹۰/۱۱/۳۰

### خلاصه

**سابقه و هدف:** فاکتورهای متعددی بر توانایی بارورسازی اسperm تاثیر می‌گذارند. سمن هیپروویسکوزیته یکی از دلایل ایدیوباتیک اختلال در حیات و عملکرد اسperm می‌باشد. احتمال می‌بود یکی از دلایل تاثیر هیپروویسکوز بر روی عملکرد اسperm، کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی مایع سمنیال باشد. لذا این مطالعه به منظور مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمنیال مردان هیپروویسکوز با غیرهیپروویسکوز انجام شد.

**مواد و روشها:** این مطالعه مقطعی بر روی نمونه سمن از مردان نابارور هیپروویسکوز ( $n=22$ ) و غیر هیپروویسکوز ( $n=25$ )، مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری فاطمه‌الزهرا (ص) بابل انجام شد. پس از تعیین ویسکوزیته سمن با اندازه‌گیری روش کشش سطحی سمن، پارامترهای اسperm (شامل حجم، تعداد، حرکت و مورفولوژی طبیعی) با استفاده از روش‌های میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفتند. فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمنیال تمام نمونه‌ها به روش FRAP اندازه‌گیری و مقایسه شدند.

**یافته‌ها:** میانگین پارامترهای اسperm، شامل تعداد ( $29 \pm 32 \pm 25 / 35$ )، حرکت ( $11 \pm 9 / 19 \pm 9.5 \pm 30$ )، حرکت ( $46 \pm 41 \pm 26 / 29$ ،  $46 \pm 41 \pm 26 / 29$ ،  $46 \pm 41 \pm 26 / 29$ ) و مورفولوژی طبیعی ( $52 \pm 15 / 41 \pm 15 / 41$ ) بود (به ترتیب با  $p < 0.001$ ،  $p < 0.001$  و  $p < 0.001$ ). همچنین میانگین غلظت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمنیال گروه هیپروویسکوز ( $1230 \pm 352 \mu\text{mol/l}$ ) به طور معنی داری کمتر از گروه غیرهیپروویسکوز ( $1710 \pm 458 \mu\text{mol/l}$ ) بود (آمد  $p < 0.01$ ).

**نتیجه گیری:** نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که بین فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمنیال و کیفیت پارامترهای اسpermی، ارتباط نزدیکی وجود دارد. کاهش فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمنیال مردان هیپروویسکوز احتمالاً یکی از مکانیسم‌های دخیل در کاهش کیفیت اسpermی در این افراد می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** سمن هیپروویسکوز، آنتی اکسیدان مایع سمنیال، ناباروری.

### مقدمه

می‌باشد، همچنین انواعی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی (نظیر آنزیم‌های کاتالاز، سوبراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و ردوکتاز) و غیر آنزیمی (شامل ویتامین‌های A، E، C، A، E، C) در مایع سمنیال وجود دارند که نقش مهمی در جمع آوری و خشی سازی این گونه رادیکالهای آزاد دارند (۴-۸). به این مجموعه آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (Total Antioxidant Capacity, TAC) در مایع سمنیال گویند که بیان کننده فعالیت آنتی اکسیدانهای آن می‌باشد (۴). از آنجایی که آنتی اکسیدانهای نقش اصلی در دفاع از سلولها علیه رادیکالهای آزاد دارند، لذا این احتمال وجود دارد که کاهش فعالیت آنتی اکسیدانهای تام مایع سمنیال با کاهش کیفیت سلولهای اسperm مرتبط باشد. هیپروویسکوز شرایطی است که سمن مردان، تغییر شده و حالت چسبندگی پیدا می‌کند. به طوری که این حالت مانع از حرکت

(Reactive Oxygen Species, ROS) (شامل  $\text{H}_2\text{O}_2$ ،  $\text{OH}^-$  و  $\text{O}_2^-$ ) ترکیبات واکنش پذیری هستند که به علت داشتن یک یا چند الکترون جفت نشده، قادرند با انواعی از ماکرومولکولهای زیستی، به ویژه لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک (DNA)، واکنش داده و با اکسید نمودن آنها منجر به ایجاد وضعیت استرس اکسیداتیو در سلولها گردد (۹-۱۰). منشاء اصلی تولید رادیکالهای آزاد در مایع سمنیال مردان، سلولهای سفید، سلولهای اپی تیالی و اسpermهای غیر طبیعی یا نابالغ می‌باشند (۳). بنابراین هر عاملی که منجر به افزایش در تعداد سلولهای سفید یا اسperm های نابالغ سمن (semen) گردد، به طور غیرمستقیم سبب افزایش سطح رادیکالهای آزاد و توانایی باروری می‌شود. اما اثر پاتولوژیک رادیکالهای آزاد بستگی به حضور یا عدم حضور آنتی اکسیدانها دارد. در واقع به همان نسبتی که مایع سمنیال مردان دارای انواعی از رادیکالهای آزاد

□ این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌باشد.

email: alijorsara@yahoo.com

\* مسئول مقاله: بابل، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری حضرت فاطمه زهرا(س)، تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۷۴۸۸۱-۲.

## مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمتیال مردان نابارور؛ عیسی طهماسب پور مرزوئی و همکاران

روان تبدیل گرددن، پس از انجام آزمایش های روتین (شامل حجم، pH و میزان ویسکوزیته سمن)، حدود ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه های مایع سمن برای بررسی میکروسکوپی حرکت و تعداد اسپرم، بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) (۱۶) و مورفولوژی اسپرم، بر اساس قانون کروگر (Kruger) (۱۷)، مورد بررسی قرار گرفتند. نحوه تشخیص اسپرم های طبیعی و غیرطبیعی با استفاده از روش رنگ آمیزی اتوژن و تشخیص میکروسکوپی انجام گردید. با شمارش تصادفی ۱۰۰ اسپرم در زمینه های مختلف میکروسکوپی، درصد اسپرم های طبیعی و غیرطبیعی ثبت گردید. ویسکوزیته سمن با قرار دادن انتهای یک همزن شیشه ای به داخل نمونه و اندازه گیری طول کشنش آن محاسبه گردید (۱۳). نمونه هایی با طول کشنش کمتر از ۲ سانتی متر از لحاظ ویسکوزیته طبیعی هستند، در حالی که نمونه هایی با طول کشنش بیشتر از ۲ سانتی متر به عنوان هیپرولیپید معرفی شدند. باقیمانده نمونه های ارزالی سریعاً در دمای ۲۰-درجه سانتیگراد ذخیره شدند تا برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانهای تام مورد بررسی قرار گیرند.

**روش FRAP:** فعالیت آنتی اکسیدانهای تام مایع سمتیال با استفاده از روش (Ferric Reducing of Antioxidants Power) FRAP اولین بار توسط Benize در سال ۱۹۹۶ ابداع گردید، اندازه گیری شد (۱۸). نمونه های ارزال در دور rpm ۱۴۰۰۰ در دمای ۴ درجه به مدت ۷ دقیقه سانتریفوژ شدند. سپس محلول رویی (مایع سمتیال) از رسوب برداشته شده و نمونه ها ۱۰ بار با آب مقطر رقیق شدند (۱۰۰ میکرولیتر نمونه سمتیال با ۹۰۰ میکرولیتر آب مقطر) تا سریعاً برای اندازه گیری آنتی اکسیدانهای مورد بررسی قرار گیرند. برای اندازه گیری TAC یا ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، محلول های ۱۰ mM pH=۳/۶ mM با FRAP شامل بافر استات (TPTZ ۲۴۶-تری-۲-پیریدیل-۵-تری آرین) و ۲۰ mM کلرید آهن II ترتیب با نسبت ۱:۱:۱:۱:۰، آماده گردید. محلول استاندارد استفاده شده شامل محلول FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O با غلظت های ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکرومولار بود. به هر لوله آزمایش (استه به تعداد نمونه ها) حدود ۱/۵ میلی لیتر از محلول FRAP اضافه و سپس به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در حمام آب گرم نگه داشته شد. سپس حدود ۵۰ میکرولیتر از نمونه های رقیق شده به لوله آزمایش اضافه شد (رنگ محلول فوراً آبی شد) و مجدداً در حمام آب گرم به مدت ۱۰ دقیقه گرم گردید و بعد از این مدت، لوله ها از حمام خارج شدند و با صفر کردن دستگاه توسط محلول FRAP، جذب نمونه ها در طول موج ۵۹۳ نانومتر خوانده شد و سپس غلظت نمونه ها از روی استانداردها محاسبه گردید.

**آنالیزهای آماری:** نمودار استانداردها توسط نرم افزار Excel رسم و سپس غلظت نمونه ها بر اساس آن بدست آمدند. مقایسه غلظت تمام پارامترها بین مردان نابارور هیپرولیپید و غیر هیپرولیپید توسط آزمون T-Test مورد آنالیز قرار گرفت و  $p<0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

## یافته ها

میانگین تعداد اسپرم در سمن مردان هیپرولیپید (۳۵/۳۵±۲۵/۳۵) به طور معنی داری کمتر از مردان غیرهیپرولیپید (۲۹/۲۹±۲۶/۴۶) بود ( $p=0.02$ ). همچنین میانگین درصد اسپرم های متحرک در گروه هیپرولیپید کمتر از  $۳۰/۹۵±۱۹/۱۱$  درصد) به طور معنی داری از گروه غیر هیپرولیپید بود.

سریع یا طبیعی اسپرم ها می گردد (۹-۱۲). تحقیقات اخیر نشان دادند که کیفیت پارامترهای اسپرمی در مردان هیپرولیپید کمتر می باشد، اما مکانیسم واقعی آن هنوز به خوبی شناخته شده است (۱۳). برخی از تحقیقات نشان دادند که غلظت رادیکالهای آزاد از جمله رادیکالهای آزاد اسپرمین در مایع سمتیال مردان هیپرولیپید کمتر می باشد، اما بیشتر می باشد (۱۳). با توجه به تحقیقات صورت گرفته، احتمالی روی که افزایش رادیکالهای آزاد در مایع سمتیال مردان هیپرولیپید به خاطر تجمع سلولهای سفید و اسپرم های نابالغ یا غیرطبیعی باشد. افزایش غلظت اسپرم های نابالغ و غیرطبیعی نه تنها خود منشاء رادیکالهای آزاد محسوب می شوند بلکه از طریق سیگنالهایی سبب فراخواندن سلولهای سفید به آن ناحیه می شوند تا مورد هضم واقع شوند. این امر سبب افزایش سلولهای سفید و لذا افزایش رادیکالهای آزاد نیز می گردد (۱۴ و ۱۵).

به نظر می رسد که شرایط هیپرولیپید احتمالاً سبب کاهش سطح آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمتیال می گردد. این امر می تواند منجر به تجمع رادیکالهای آزاد در مایع سمتیال و تشدید اثرات پاتولوژیکی آنها بر روی اسپرم ها گردد. تنها مطالعه ای که مرتبط با این موضوع صورت گرفته تحقیق Siciliano و همکارانش می باشد که برای اولین بار نشان دادن سطح فعالیت انزیم آنتی اکسیدانی (Superoxide Dismutase، SOD) در مایع سمتیال گروه هیپرولیپید کمتر می باشد (۱۳). از آنجایی که اثر شرایط هیپرولیپیدیت بر روی کیفیت اسپرم و خطر ناباروری حاصل از آن تا حدود زیادی اثبات شده است، اما مکانیسمی که در آن شرایط هیپرولیپید با روی عملکرد و توانایی بارورسازی اسپرم تاثیر منفی می گذارد به خوبی شناخته نشده است. بنابراین با شناخت مکانیسم های احتمالی آن می توان تا حدود زیادی راه حلی برای درمان شرایط هیپرولیپید و جلوگیری از اثرات آن را بر روی عملکرد اسپرم پیدا نمود. احتمال می روی که یکی از مکانیسمهای اثر منفی آن بر روی کاهش کیفیت اسپرم در مردان نابارور، تا حدودی به خاطر کاهش سطح آنتی اکسیدانهای مایع سمتیال باشد.

لذا به دلیل اهمیت این موضوع و نقش آنتی اکسیدانهای تام در حیات و عملکرد اسپرم، این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانها تام در مایع سمتیال مردان هیپرولیپید با غیرهیپرولیپید انجام پذیرفت.

## مواد و روشها

**جمعیت نمونه ها:** در این مطالعه مقطعی، تعداد ۴۷ نمونه سمن از مردان نابارور هیپرولیپید (n=۲۲) و نابارور غیر هیپرولیپید (n=۲۵)، استان مازندران و استان همچو را میانگین سنی ۳/۴۵±۲۹ سال (۲۲ تا ۳۶ سال)، در طول سال ۱۳۸۷-۸۸ از مرکز باروری و ناباروری فاطمه‌الهرا (س) بابل جمع آوری شدند. قبل از جمع آوری، پرسشنامه ای به بیماران داده شد. بیمارانی که دارای سابقه هر گونه استعمال دخانیات، مصرف داروی خاص و بیماری های موثر به ویژه واپیکوسل بودند، وارد مطالعه نشدند. نمونه ها بعد از ۲ تا ۳ روز دوری از آمیزش در همان مراکز باروری و ناباروری در ظرف های استریل جمع آوری و سپس از لحاظ کیفیت پارامترهای اسپرم مورد آنالیز قرار گرفتند.

**آنالیز پارامترهای اسپرم:** نمونه های جمع آوری شده حدود نیم الى یک ساعت در دمای ۳۷ درجه انکوبه شدند تا از شکل آگلولینه به صورت مایع

می دهند (۲). به همین خاطر سیستم آنتی اکسیدانی مایع سیمنال به عنوان مهمترین سد دفاعی اسپرم ها محسوب می شود و با جمع آوری رادیکالهای آزاد، کاهش سطح آنتی اکسیدانهای مایع سیمنال گردد منجر به اختلال در تعادل آنتی اکسیدانها و رادیکالهای آزاد شده و بر روی عملکرد اسپرم اثرات مخرب اعمال می کند. هیبرویسکوز از جمله فاکتورهایی می باشد که بر روی عملکرد طبیعی اسپرم ها به ویژه حرکت آنها تاثیر مفی گذاشته و مانع از بارورسازی تخمک ها می شود. مطالعات متعددی حاکی از آن است که شرایط هیبرویسکوز، باعث تاثیر مفی بر روی کیفیت پارامترهای اسپرمی می شود، ولی مکانیسم واقعی آن هنوز به خوبی شناخته شده نیست (۹-۱۲).

به نظر می رسد که شرایط هیپرولوکوزیت به مهار حرک اسپرم، سبب تجمع آنها در مایع سمن می شود. از آنجایی که سلولهای سفید و اسپرم های نابالغ و غیر طبیعی به عنوان مهمترین منشاء رادیکالهای آزاد در سمن مردان محسوب می شوند، بنابراین تجمع سلولهای سفید تا حدود زیادی این واقعیت را توجیه می کند، که افزایش رادیکالهای آزاد سبب کاهش غلظت موثر آنتی اکسیدانها شده و شرایط را برای اثرات پاتولوژیک آنها فرآهم می نماید (۲۱). بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته و تحقیق حاضر، این احتمال وجود دارد که یکی از مکانیسم های احتمالی اثر شرایط هیپرولوکوز بر روی کیفیت و عملکرد اسپرم، از طریق کاهش سطح آنتی اکسیدان های مایع سمینال واسطه گردد. با کاهش سطح آنتی اکسیدانهای مایع سمینال، تأثیر پاتولوژیک رادیکالهای آزاد فرآهم شده و رادیکالهای آزاد با آسیب به پروتئین ها (از جمله پروتئین های غشایی اسپرم)، قندها (از جمله قند ریبوز در DNA) و لیپید های غشایی سبب اختلال در حرکت، مورفوЛОژی و توانایی بارورسازی اسپرم ها شوند (۲۲-۲۴). لذا کاهش سطح آنتی اکسیدانهای مایع سمینال شاید جوابگوی یکی از دلایل کاهش کیفیت اسپرم و توانایی بارورسازی اسپرم باشد.

نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت پارامترهای اسپرم در مردان نایابرور هیپروویسکوز در مقایسه با مردان نایابرور، بدون شرایط هیپروویسکوز به طور معنی داری کمتر بود که می‌توان دلیل آن را به کاهش فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در پی افزایش شدت استرس اکسیداتیو در سمن افراد هیپروویسکوز نسبت داد. با توجه به اینکه یکی از مکانیسم های احتمالی که در آن شرایط، هیپروویسکوز بر روی توانایی باروری مردان تاثیر می‌گذارد از طریق کاهش سطح آنتی اکسیدانهای مایع سمتیال و در پی آن افزایش اثرات پاتولوژیکی رادیکالهای آزاد می‌باشد، بررسی غلظت یا فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمتیال مردان، مخصوصاً مردان هیپروویسکوز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می‌گردد که مردان با سمن هیپروویسکوز برای افزایش توانایی بارورسازی اسپرم در دوران آمیزش از آنتی اکسیدانهای، زیاده، استفاده ننمایند.

تقدیر و تشکر

بدينوسيله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاههای مازندران و علوم پژوهشی بابل و همچنین از کلیه کارشناسان مرکز ناباروری حضرت فاطمه زهرا (س) بابل که تکریزی به ما در جمع آوری و آنالیز پارامترهای اسپرمی نمودند تشکر و قدردانی، می، شود.

(میکرومولار در لیتر) بود (۰/۱۰ < p). میانگین درصد اسپرم هایی با مورفولوژی طبیعی در مردان با سمن هیپروویسکوز (۵/۲۳±۰/۲۳) درصد به طور معنی داری (۰/۰۰۱ < p) کمتر از مردان با سمن غیر هیپروویسکوز (۱۶/۱۶±۰/۳۷) درصد بوده است (جدول ۱). نتیجه حاصل از مقایسه اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در دو گروه، نشان داد که میانگین فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمتیمال مردان نایاور غیر هیپروویسکوز (۶۷/۴۵±۰/۳۱) ۱۷۱۰ میکرومولار در لیتر) به طور معنی داری بیشتر از مردان با سمن هیپروویسکوز (۰/۰۵±۰/۲۵) ۱۲۳۰ میکرومولار در لیتر) بود (۰/۱۰ < p).

## جدول ۱. مقایسه کیفیت پارامترهای اسپرمی بین دو گروه هیپر ویسکوز و غیر هیپر ویسکوز

pvalue	نابارور	نابارور	پارامترهای اسپرم
-	۲۵	۲۲	تعداد نمونه
۱	۲۹ ± ۳/۳۷	۲۹ ± ۳/۶۱	سن (سال)
۰/۰۷	۴/۰ ± ۱/۴۱	۳/۲۵ ± ۱/۳۷	حجم انتزال (ملی لیتر)
۰/۰۲	۴۶/۸۰ ± ۲۶/۲۹	۲۹/۳۲ ± ۲۵/۳۵	تعداد اسپرم (۱۰ <sup>۶</sup> × در هر میلی لیتر)
۰/۰۶	۱۸۹/۹ ± ۱۱۵/۶۲	۹۹/۲۳ ± ۹۹/۲۹	تعداد کل اسپرم (۱۰ <sup>۶</sup> )
۰/۰۰۱	۵۲/۸ ± ۱۵/۴۱	۳۰/۹۵ ± ۱۹/۱۱	درصد اسپرم های متخرک (%)
۰/۰۰۱	۷/۵۶ ± ۳/۱۶	۴/۲۳ ± ۲/۵	درصد اسپرم هایی با مورفولوژی طبیعی (%)

بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق، فعالیت آنتی اکسیدانها در افراد هیپرولیپیدمیکوز به طور چشمگیری در مقایسه با بیماران غیرهیپرولیپیدمیکوز کاهش نشان داد. این موضوع احتمالاً کاهش کیفیت اسپرم در مردان هیپرولیپیدمیکوز را می‌تواند توجیه نماید. چون بین کاهش سطح آنتی اکسیدانها و کیفیت اسپرم یک ارتباط مثبت معنی دار وجود دارد (۱۳). مطالعات محدودی این شرایط را مورد مطالعه قرار دادند. برای اولین بار، Siciliano و همکارانش سطح برخی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی به ویژه سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز و سطح آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی به خصوص فلز روی را در مابین سمتیان حدود ۱۲۰ بیمار با شرایط هیپرولیپیدمیکوز، غیرهیپرولیپیدمیکوز، اندازه گیری و مقایسه کردند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که نه تنها کیفیت پارامترهای اسپرمی در مردان هیپرولیپیدمیکوز در مقایسه با افراد غیرهیپرولیپیدمیکوز کمتر بود، بلکه سطح آنتی اکسیدانها، به ویژه آنزیم SOD، در مابین سمتیان گروه هیپرولیپیدمیکوز به طور چشمگیری در مقایسه با گروه غیرهیپرولیپیدمیکوز کمتر بود (۱۳). نتایج مطالعه ما نیز تا حدود زیادی قابل مقایسه با مطالعه آنها می‌باشد.

از آنجایی که حدود ۸۰٪ از لبیدهای غشایی سلولهای اسپرم از نوع اسیدهای چرب غیر اشباع با پیوندهای چندگانه می‌باشند، در مقایسه با سایر سلولهای بدن، حساسیت بیشتری نسبت به اثرات پاتولوژیک ناشی از رادیکالهای آزاد دارند (۲). از طرفی چون سلولهای اسپرم در طول تقسیم میوز، حجم عمدۀ ای از سیتوپلاسم خود را از دست می‌دهند لذا بخش زیادی از سیستم‌های دفاعی سیتوپلاسمی خود (به ویژه آنتی اسیدهای آنزیمی و غیر آنزیمی) را از دست

## Comparison of Seminal Plasma Total Antioxidant Capacity in Human Semen with Hyperviscosity and Non-Hyperviscosity

**E. Tahmasbpour Marzony (PhD)<sup>1</sup>, S.G.A. Jorsaraei (PhD)<sup>2\*</sup>, M. Pouramir (PhD)<sup>3</sup>,  
A. Hosseinzadeh Colagar (PhD)<sup>4</sup>**

1. Young Research Club, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

2. Fatemeh Zahra Infertility and Health Reproductive Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3. Department of Biochemistry and Biophysics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

4. Department of Cellular and Molecular Biology, Faculty of Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran

**J Babol Univ Med Sci; 14(6); Nov 2012; pp: 39-44**

**Received: Feb 19<sup>th</sup> 2012, Revised: May 2<sup>nd</sup> 2012, Accepted: Jul 4<sup>th</sup> 2012.**

### **ABSTRACT**

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Several factors have influence on sperm fertilization, between them semen hyperviscosity is one of the idiopathic factors involved in sperm viability and function deficiency. Probably, decrease in human seminal antioxidants is one of the negative effects of hyperviscosity on sperm function. The aim of this study was to compare the total antioxidant activity (TAC) in seminal plasma of infertile patients with hyperviscosity and non-hyperviscosity.

**METHODS:** In this cross sectional study, 47 semen samples were provided from infertile patients with hyperviscosity ( $n=22$ ) and without hyperviscosity ( $n=25$ ) at Fatemeh Zahra Infertility and Health Reproductive Research Center. After determine the semen hyperviscosity by measuring the length of the thread on withdrawal of the rod, sperm parameters (volume, sperm counts, motility and normal morphology) were evaluated on microscopic examination. TAC was measured in all samples by FRAP method and compared.

**FINDINGS:** The mean of sperm parameters including: counts ( $29.32 \pm 25.35$ ), motility ( $30.95 \pm 19.11$ ) and normal morphology ( $4.23 \pm 2.5$ ) in patients with hyperviscosity were significantly lower than those in non-hyperviscosity patients (counts  $46.80 \pm 26.29$ , motility ( $52.8 \pm 15.41$ ) and normal morphology ( $7.56 \pm 3.16$ )) ( $p<0.02$ ,  $p<0.001$  and  $p<0.001$ , respectively). The mean of TAC in seminal plasma of non-hyperviscosity patients ( $1710.31 \pm 458.67 \mu\text{mol/l}$ ) was significantly higher than that of hyperviscosity group ( $1230.25 \pm 352 \mu\text{mol/l}$ ) ( $p<0.01$ ).

**CONCLUSION:** Our results showed that there is a positive significant correlation between TAC and sperm parameters quality. Decrease in TAC concentration in seminal plasma of patients with hyperviscosity is one of the probability mechanisms for sperm parameters abnormality.

**KEY WORDS:** *Semen hyperviscosity, Seminal antioxidants, Infertility.*

\* Corresponding Author;

Address: Fatemeh Zahra Infertility and Health Reproductive Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran  
Tel: +98 111 2274881-2

E-mail: alijorsara@yahoo.com

## References

1. Church DF, Pryor WA. Free radical chemistry of cigarette smoke and its toxicological implications. *Environ Health Perspect* 1985;64:111-26.
2. Agarwal A, Prabakaran SA. Mechanism, measurement and prevention of oxidative stress in male reproductive physiology. *Indian J Exp Biol* 2005;43:963-74.
3. Agarwal A, Saleh RA. Role of oxidants in male infertility: Rationale, significance, and treatment. *Urol Clin North Am* 2002;29(4):817-27.
4. Agarwal A, Prabakaran S, Allamaneni SS. Relationship between oxidative stress, varicocele and infertility. *Reprod Biomed Online* 2006;12(5):630-3.
5. Hosseinzadeh Kolagar A, Pouramir M, Tahmasbpour Marzouni I. Seminal plasma total antioxidants capacity of the infertile smoker and nonsmoker men. *Shahid Chamran Univ J Sci* 2008;19(Section B):124-31. [in Persian]
6. Colagar AH, Marzony ET, Chaichi MJ. Zinc levels in seminal plasma are associated with sperm quality in fertile and infertile men. *Nutr Res* 2009;29(2):82-8.
7. Colagar AH, Marzony ET. Ascorbic acid in human seminal plasma: determination and its relationship to sperm quality. *J Clin Biochem Nutr* 2009;45(2):144-9.
8. Hosseinzadeh Colagar A, Pouamir M, Tahmasbpour Marzony E, Jorsaraee SGA. Relationship between seminal malondialdehyde levels and sperm quality in fertile and infertile men. *Braz Arch Biol Technol* 2009;52(6):1387-92.
9. Gonzales GF, Kortebani G, Mazzolli AB. Hyperviscosity and hypofunction of the seminal vesicles. *Arch Androl* 1993;30(1):63-8.
10. Mendeluk GR, Blanco AM, Bregni C. Viscosity of human seminal fluid: role of lysozyme. *Arch Androl* 1997;38(1):7-11.
11. Mendeluk GR, Munuce MJ, Carizza C, Sardi M, Bregni C. Sperm motility and ATP content in seminal hyperviscosity. *Arch Androl* 1997;39(3):223-7.
12. Mendeluk GR, Gonzalez Flecha FL, Castello PR, Bregni C. Factors involved in the biochemical etiology of human seminal plasma hyperviscosity. *J Androl* 2000;21(2):262-7.
13. Siciliano L, Tarantino P, Longobardi F, Rago V, Destefano C, Carpino A. Impaired seminal antioxidant capacity in human semen with hyperviscosity or oligoasthenozoospermia. *J Androl* 2001;22(5):798-803.
14. Aitken RJ, Baker MA. Oxidative stress, sperm survival and fertility control. *Mol Cell Endocrinol* 2006;250(1-2):66-9.
15. Agarwal A, Saleh RA. Role of oxidants in male infertility: rationale, significance, and treatment. *Urol Clin North Am* 2002;29(4):616-27.
16. Esteves SC, Zini A, Aziz N, Alvarez JG, Sabanegh ES Jr, Agarwal A. Critical appraisal of World Health Organization's new reference values for human semen characteristics and effect on diagnosis and treatment of subfertile men. *Urology* 2012;79(1):16-22.
17. Kruger TF, Menkveld R, Stander FS, et al. Sperm morphologic features as a prognostic factor in in vitro fertilization. *Fertil Steril* 1986;46(6):1118-23.
18. Benzie IF. Lipid peroxidation: a review of causes, consequences, measurement and dietary influences. *Int J Food Sci Nutr* 1996;47(3):233-62.
19. Saleh RA, Agarwal A. Oxidative stress and male infertility: from research bench to clinical practice. *J Androl* 2002;23(6):737-52.
20. Sikka SC. Role of oxidative stress and antioxidants in andrology and assisted reproductive technology. *J Androl* 2004;25(1):5-18.
21. Fujii J, Iuchi Y, Matsuki S, Ishii T. Cooperative function of antioxidant and redox systems against oxidative stress in male reproductive tissues. *J Androl* 2003;5(3):231-42.

22. Saleh RA, Agarwal A, Nada EA, et al. Negative effects of increased sperm DNA damage in relation to seminal oxidative stress in men with idiopathic and male factor infertility. *Fertil Steril* 2003;79(Suppl 3):1597-605.
23. Shi YC, Sun HM, Shang XJ, Zhu PY, Huang YF. Total antioxidant capacity of seminal plasma in fertile and infertile men. *Zhonghua Nan Ke Xue* 2005;11(12):915-17.
24. Shi YC, Shang XJ, Wang XL, Huang YF. Correlation of total antioxidant capacity in seminal plasma with sperm motility of infertile men. *Zhonghua Nan Ke Xue* 2006;12(8):703-5.

Archive of SID