

ارزیابی نقش کمبودهای عناصر خون ساز در اتیولوژی آفت‌های راجعه دهانی

نادر نوابی (DDS)*^۱، محمدرضا زارعی (DDS)^۱، فریده فلسفی (PhD)^۲، بهنام صادقی (PhD)^۳

۱- گروه بیماریهای دهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دریافت: ۹۱/۵/۱، اصلاح: ۹۱/۶/۸، پذیرش: ۹۱/۸/۱۷

خلاصه

سابقه و هدف: در زمینه نقش کمبود عناصر خونی در ایجاد زخم‌های آفتی دهان مطالعات زیادی انجام گرفته که نتایج متناقضی در پی داشته است. این تحقیق به منظور جستجوی نقش اتیولوژیک فاکتورهای خونی آهن، فولیک اسید و ویتامین ب ۱۲ در آفت دهانی عود کننده انجام شده است.

مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش مرور ساختار یافته و متأنالیز صورت گرفته است. پس از تعیین دقیق سوال پژوهشی بانک های اطلاعاتی، با کلید واژه های مربوطه در بازه زمانی مورد نظر مورد جستجو قرار گرفت. پس از بررسی مقالات یافت شده، ۲۴ مقاله وارد مطالعه گردید و با چک لیست های معتر بر ارزیابی کیفیت قرار گرفت. سپس اطلاعات مورد نیاز از مطالعات استخراج و طبقه بندی شد و در انتها متأنالیز برای هر طبقه انجام شد.

یافته ها: متأنالیز انجام شده نشان داد که شیوع کمبود سطح خونی فربین، فولات سرم، فولات گلبولهای قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامین ۱۲ در بیماران مبتلا به آفت معمی دار است ($P < 0.01$). در مطالعات مداخله ای نسبت بهبودی زخم‌های آفتی دهان پس از تجویز آهن معنی دار بوده است ($P < 0.01$).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، فاکتورهای خونی (فربین، فولات سرم، فولات گلبولهای قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامین ۱۲) در بروز و عود زخم‌های آفتی نقش قابل توجهی دارند و تجویز مکمل آهن برای بیماران مبتلا به زخم‌های آفتی سودمند می باشد.

واژه های کلیدی: عناصر خون ساز، متأنالیز، آفت های راجعه.

مقدمه

به علت سوزش ضایعات دچار اختلال در تکلم و تقدیمه میشوند که این امر کیفیت زندگی آنان را کاهش میدهد (۵). از جمله موارد مهم مطرح شده در زمینه اتیولوژی RAS، آبرنمالیتی هماتولوژیک است چنانکه در ۱۰-۲۰ درصد از بیماران، این آبرنمالیتی ها به صورت کاهش آهن سرم یا فربین، کاهش فولات و ویتامین ۱۲ سرم گزارش شده است (۶-۹). البته مطالعات مختلف، نتایج متغیری را گزارش کرده اند و این نظریه بین صاحبنظران مورد اختلاف نظر می باشد (۱۰). به عبارت دیگر، مطالعاتی وجود دارد که نتایج آنها هر گونه نقش اتیولوژیک فاکتورهای خونی را در این زمینه رد میکنند (۱۱). لازم به ذکر است که تجربیات متخصصان بیماریهای دهان در طی سالها مدواوی بیماران نشان می دهد که درخواست روتین آزمایشات خونی و تعیین سطوح خونی و سرمی این فاکتورها برای بیماران نتیجه قابل قبولی را در بر نداشته است (۱۲). از آنجا که در حال حاضر رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد نشان می دهد که مطالعات مرور ساختار

آفت‌های عود کننده دهانی (Recurrent Aphthous Stomatitis, RAS) از شایترین مشکلاتی هستند که کلینیسین ها با آن روبرو میشوند (۱۲) و شیوع آن در افراد با سطوح اجتماعی بالاتر بیشتر گزارش شده است (۱۳). آفتها ممکن است در بچه ها یا بالغین دیده شود و ببهود هر کدام از ضایعات مربوط به آن حدود ۱ تا ۴ هفته طول می کشد. نمای کلینیکی به صورت زخم‌های کوچک گرد یا بیضی با حاشیه مشخص، هاله قرمز رنگ و زمینه زرد یا خاکستری می باشد (۱۴). تشخیص RAS بر مبنای علایم کلینیکی است و شایترین فرم آن آفت مینور می باشد (۱۵). اتیولوژی RAS به طور کلی دقیقاً مشخص نیست و مطالعات مختلف عواملی از قبیل توارث، استرس، قطع کشیدن سیگار، سیکل قاعدگی، آلرژیهای غذایی، اختلالات سیستم ایمنی و ترومما را نام برده اند (۱۶-۲۰). از آنجاییکه در اکثر بیماران اتیولوژی RAS به طور دقیق مشخص نمی باشد، درمان این بیماری نیز مشکل است (۲۱). همچنین بیماران در زمان عود بیماری

■ این مقاله حاصل پایان نامه فریده فلسفی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.

*مسئول مقاله:

ادres: کرمان خیابان سفا، دانشکده دندانپزشکی، بخش بیماریهای دهان، تلفن: ۰۳۴۱-۲۱۱۸۰۷۱

در این مرحله بحث مقالات یافت شده بررسی شد تا مقالاتی که شاید در جستجوی الکترونیکی یافت نشده اند، پیدا شوند. فایلهای متنی اطلاعات جستجو شده از بانکهای اطلاعاتی ذکر شده به نرم افزار EndNote وارد شد. این نرم افزار امکان جستجوی رکوردهای تکراری را دارد. در حذف رکوردهای تکراری، هر رکورد بصورت غیراتوماتیک نیز بررسی شد تا رکوردی به اشتباہ حذف نگردد. سپس تمامی رکوردها به صورت دستی بررسی گردید تا رکوردهای تکراری ای که از نظر سال، نویسنده یا عنوان شباهت نداشتند، یافت شوند. حذف مقالات غیرمرتبط در سه مرحله عنوان، خلاصه و متن اصلی انجام شد. در مرحله اول عنوان همه مقالات خوانده شد و مقالاتی که بطور واضح به تحقیق وابسته نبودند از لیست مقالات حذف شدند. بخش اول این قسمت از حذف با کمک جستجوی کلید واژه های کاملاً بی ارتباط با تحقیق در EndNote انجام شد. در بخش دوم از حذف بر پایه عنوان، عنوان تک مقالات باقیمانده بصورت غیراتوماتیک بررسی شد و مقالات کاملاً نامرتبط با تحقیق حذف شدند. در مرحله دوم حذف، مرحله خلاصه مقالات باقیمانده مطالعه و مطالعات نامرتبط حذف گردید. در مرحله سوم حذف، متن کامل مقالات باقیمانده از مرحله قبل بررسی شد و مقالات شده توسط دیگر نیز حذف شدند. برای این منظور از چک لیستهای ارایه شده توسط www.equator-network.org استفاده شد.

اطلاعات لازم جهت انجام متانالیز از مقالات انتخاب شده استخراج شد. اطلاعات هر مقاله بصورت مجزا در نرم افزار Excel وارد شد.

داده های این فایل شامل نام نویسنده اصلی مقاله و سال انتشار، امتیاز ارزیابی کیفیت، نوع مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری، فاکتورهای خونی مورد اندازه گیری، سن (دامنه، میانگین)، نسبت مرد و زن، تعداد بیماران بر حسب طبقه بندی انواع آفت دهانی، میزان خونی فاکتور موردنظر (دامنه، میانگین، انحراف میار)، تعداد و درصد بیماران با کمود سطح خونی فاکتورها بود. اطلاعات استخراج شده بر اساس نوع مطالعه، فاکتور خونی مورد مطالعه و تجویز درمانهای جایگزینی گروه بندی شد. مطالعات گروه های مختلف بر اساس شاخص های شیوع، تفاوت میانگین ها و نسبت شانس یکسان سازی و متانالیز هر یک به تفکیک فاکتور مورد مطالعه بطور جداگانه انجام شد. برآورد شاخص کلی با استفاده از مدل ثابت (Fixed) و تصادفی (Random) (محاسبه و نمودار ایناشت Forrest plot) متانالیز رسم گردید. برای ارزیابی میزان ناهمگونی (هتروژنیتی) بین مطالعات از آزمون مجدد کای با سطح معنی داری I-squared آن ضریب Q برآورد هتروژنیتی محاسبه گردید. همچنین در مطالعات مداخله ای، نسبت شانس بھبود (Odds Ratio=OR) همراه با محاسبه برای تک فاکتور های خونی محاسبه گردید. جهت ارزیابی عامل یا عوامل ایجاد کننده ناهمگونی با استفاده از مدل متارگرسیون سال انجام و انتشار مطالعه، کیفیت مطالعات واحد شرایط، مدت زمان ابتلا به بیماری و شدت بیماری به عنوان عوامل محتمل ایجاد کننده ناهمگونی در مدل وارد شدند.

برای انجام محاسبات مذکور نرم افزار Stata version 11 مورد استفاده قرار گرفت.

یافته و متأنالیز میتواند در حل مشکلات بالینی موثر باشد و نظر به بالا بودن شیوع آفت بین جوامع مختلف اگر بتوان با انجام چنین مطالعه ای به نظری قطعی در این مورد رسید، به اقتصاد جامعه و رفع درد مبتلایان، بسیار کمک خواهد نمود. با وجود اینکه تحقیقات متعددی در مورد نقش فاکتورهای خونی در اتیولوژی آفت دهانی عود کننده صورت گرفته است ولی تا زمان انجام این تحقیق هیچ مقاله موروزی، مرور ساختار یافته و یا متأنالیزی به چاپ نرسیده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر فاکتورهای خونی آهن، ویتمین ب ۱۲ و اسید فولیک در آفت دهانی عود کننده، بررسی وجود هتروژنیتی در مطالعات انجام گرفته است تا با استفاده عوامل موثر در تولید هتروژنیتی در نتایج مطالعات انجام گرفته است تا با استفاده حداقل از اطلاعات موجود و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده جهت اطلاع پزشکان و دندانپزشکان، بهترین تصمیم برای بیماران گرفته شود.

مواد و روشها

برای جستجوی منابع از بانکهای اطلاعاتی Pubmed، OvidSP، ScienceDirect، Scopus، Chochrane Library، Springer journals and BMJ journals collection، Jama archives and journals، Oxford journals protocols استفاده شد. محدوده زمانی انتخاب شده برای جستجو از ابتدای ژانویه سال ۱۸۵۰ تا انتهای اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی بود. جهت افزایش حساسیت جستجو محدودیت زبانی اعمال نشد. همچنین کلید واژه های عام برای هر جزء سوال پژوهش انتخاب شد (جدول ۱). برای افزایش حساسیت جستجو برای هر کلمه، مترادف کلمات هم در جستجو وارد شدند. پس از جستجوی کلید واژه های مرتبط با متغیر مستقل، آنها با دستور OR با یکدیگر ترکیب شدند. مشابه همین جستجو برای کلید واژه های مرتبط با متغیر وابسته انجام شد. سپس نتیجه این جستجوها با دستور AND با یکدیگر ترکیب شد. نتیجه نهایی بصورت فایل متی برای ورود به نرم افزار EndNote ذخیره شد.

جدول ۱. کلید واژه های مورد استفاده در جستجو

RAS	Folic acid	Iron	Vitamin B12
Aphthous	Folic acid	Iron	Vitamin B12
Stomatitides			
Aphthous	Vitamin M	Ferritin	Cyanocobalamin
Stomatitis			
Aphthous Ulcer*	Pteroylglutamic Acid	Hemosiderin	Cobalamin*
Aphthae	Folate	Isoferritin	Eritron
Canker Sore*	Folvite		
Periadenitis	Folacin		
Mucosa Necrotica			
Recurrents			

در آن سطح خونی این فاکتورها میان بیماران و افراد سالم مقایسه شده بود و ۳ مطالعه نیز از نوع مداخله ای بود که در آن میزان بهبود بیماران مبتلا متعاقب تجویز مکملهای مربوطه ارزیابی شده بود. البته تعدادی از مطالعات مورد شاهدی در بیماران آفتنی درمان چایگرینی فاکتورها را انجام داده بودند که این مطالعات، دسته بندی و جداگانه آنالیز شدند. در مطالعات مقطعی، آنالیز انجام شده نشان میدهد که شیوع کمبود سطح خونی فریتین، فولات سرم، فولات گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامین B12 در بیماران مبتلا به آفت معنی دار بوده است ($P < 0.01$). ضمن اینکه بین مطالعات، هتروژنیتی وجود داشته است ($Q = 7/9885$) برای کمبود فریتین، ($Q = 43/564$) برای کمبود فولات سرم، ($Q = 9/4$) برای کمبود فولات گلوبولهای قرمز، ($Q = 13/842$) برای کمبود هموگلوبین، ($Q = 18/308$) برای کمبود آهن سرم و ($Q = 62/589$) برای کمبود ویتامین B12. در مطالعات مورد شاهدی، آنالیز انجام شده، آنالیز تفاوت میانگین سطح خونی فریتین، فولات سرم، فولات گلوبول های قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامین B12 بود. برآورد کلی تفاوت میانگین سطح خونی تمامی این المانها بین گروههای مورد و شاهد بررسی شده معنی دار بوده است ($P < 0.01$). ضمن این که بین مطالعات هتروژنیتی فوق العاده ای برای تمامی این المانها وجود داشته است ($Q = 9793/327$) برای سطح خونی فریتین، ($Q = 7877/708$) برای سطح سرمی فولات، ($Q = 11/811$) برای سطح خونی فولات، ($Q = 229/560$) برای سطح هموگلوبین، ($Q = 1711/145$) برای سطح سرمی آهن و ($Q = 366/257$) برای سطح خونی ویتامین B12 بود. در مطالعات مداخله ای آنالیز انجام شده، آنالیز نسبت شانس بهبودی با فریتین، فولات سرم، فولات گلوبولهای قرمز، هموگلوبین و ویتامین B12 معنی دار نبوده است (جدول ۳). اما در برآورد کلی نسبت شانس بهبودی با آهن نسبت شانس تجمعی $1/767$ می باشد که از نظر آماری معنی دار است ($P < 0.01$) (نمودار اینشت ۱).

تجویز آهن در ۷ مطالعه مورد شاهدی انجام شده و در ۳ مطالعه مداخله ای به جای آهن از تجویز سایر المانها استفاده گردیده است. هتروژنیتی بین مطالعات وجود دارد ($Q = 16/51$) و 63% این معنی داری مربوط به هتروژنیتی می باشد ($I^2 = 63\%$). نتایج مدلهای متارگرسیونی در دو گروه مطالعات مقطعی و مورد-شاهدی نشان داد که هیچ یک از عوامل مورد بررسی توجیه کننده ایجاد ناهمگونی در بین مطالعات نیست.

یافته ها

در این پژوهش در مرحله جستجوی بانکهای اطلاعاتی ۴۳۷۸ رکورد یافت و به نرم افزار EndNote وارد گردید. سپس بر مبنای جستجوی "نویسنده، سال و عنوان" با حذف نمودن رکوردهای تکراری، ۲۷۶ رکورد باقی ماند. در مرحله حذف بر مبنای عنوان مطالعات ابتدا حذف به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار Endnote صورت گرفت و سپس با بررسی غیر اتوماتیک عنوان تک تک مقالات باقیمانده، بقیه مطالعات غیر مرتبط نیز حذف گردید. در ادامه خلاصه تمامی ۵۴۱ مقاله باقیمانده مطالعه شد و با حذف مطالعات غیر مرتبط با موضوع تحقیق، ۱۸۶ مقاله برای ادامه تحقیق باقی ماند. در مرحله بعد، متن کامل مطالعات باقیمانده از مرحله قبل مطالعه شد و با حذف مقالات غیر مرتبط ۳۳ مقاله باقی ماند. در مرحله جستجوی دستی و در جین بررسی منابع ۳۳ مقاله مذکور، دو مقاله دیگر پیدا شد که در جستجوی منابع پیدا نشده بودند و بنظر میرسید که با موضوع تحقیق در ارتباط می باشند. این ۲ مطالعه به ۳۳ مقاله قبلی اضافه شد. اطلاعات لازم جهت انجام متانالیز از ۳۵ مقاله انتخاب شده استخراج شد. از بین ۳۵ مقاله ۴ مقاله گزارش مورد بود که به علت حجم نمونه کم وارد متأنالیز نمی گردید و ۷ مقاله فاقد اطلاعات گزارش شده مورد نیاز در قسمت نتایج آن بود. بدین ترتیب در نهایت ۲۴ مقاله جهت انجام متانالیز انتخاب شد (جدول ۲).

جدول ۲. روند انتخاب ۲۴ مطالعه وارد شده به مرور ساختار یافته از میان ۴۳۷۸ مطالعه جمع آوری شده از بانکهای اطلاعاتی

مرحله	تعداد مقالات	حذف شده
	رکوردهای تکراری	
۱۶۰۲	۲۲۳۵	رکوردهای غیر مرتبط بر حسب عنوان
۳۵۵	۱۵۳	رکوردهای غیر مرتبط بر حسب خلاصه مقاله
۱۱		رکوردهای غیر مرتبط بر حسب متن کامل مقاله
		رکوردهای غیر قابل قبول پس از جستجوی دستی و ارزیابی نوع مطالعات


از این ۲۴ مطالعه، ۶ مطالعه از نوع مقطعی بود که در آن شیوع کمبود فاکتورهای خونی مختلف بررسی شده بود، ۱۵ مطالعه از نوع مورد شاهدی بود که

جدول ۳. برآورد کلی نسبت شانس (OR) بهبودی با (اسید فولیک، ویتامین B12 و آهن) و آزمون هتروژنیتی کای دو

I Squared	Heterogeneity chi-squared	95% CI		Pooled OR	شاخص هماتولوژیک
		Upper	Lower		
%۵۳/۷	۱۶/۵۱ $P = .011*$	۴/۱۸۲	۰/۷۴۷	۱/۷۶۷	آهن
%۰	۱/۹۶ $P = .581$	۱۱/۱۱۶	۱/۰۰۴	۳/۳۴۱	B12 ویتامین
%۵۵/۳	۲/۲۳ $P = .135$	۵۳/۴۴۴	۱/۹۰۳	۱۰/۰۸۴	اسید فولیک

% برای هر سه شاخص برابر ۱۰۰ درصد محاسبه شده است.

I-squared (variation in OR attributable to heterogeneity) ; OR= odds ratio; CI= confidence interval; * = significant



نمودار ۱. اثباشت شناسی بهبود بیماران متعاقب نجویز مکمل آهن

بحث و نتیجه گیری

ساقه حضور ضایعات در ۳ تا ۱۲ ماه گذشته، عود ضایعات به صورت ۲ تا ۳ ماه یکبار و در بعضی مطالعات عدم مصرف سیگار بوده است. همچنین در مطالعه ای که Field و همکاران بر روی کودکان انجام داده بودند، شرط ورود به مطالعه دارا بودن سن بین ۷ تا ۱۶ سال بوده است (۲۲).

مطالعات وارد شده به مرور ساختار یافته حاضر سطح خونی فاکتورهای مختلفی را در مبتلایان به زخمهای آفتی دهان بررسی کرده اند. از این میان، میزان هموگلوبین پایین در مطالعات Porter, Field, Safadi و Tyldesley, Rogers, Huchtheon و Huctheon در مطالعات Porter و Field و میزان فولات پایین در مطالعات Field پایین در مطالعات Rogers و Tyldesley گزارش شده است در حالیکه میزان ویتامین B12 در کلیه مطالعات مذکور از سطح پایینی در بیماران مبتلا به آفتهای دهان برخوردار بوده است (۲۵-۲۶ و ۲۹). این مساله نشان دهنده نقش اتیولوژیک احتمالی مربوط به عناصر خویشوار در بروز زخمهای آفتی دهان می باشد که با نتایج حاصل شده از مطالعه حاضر همخوانی دارد زیرا علیرغم وجود هتروژئیتی بین مطالعات موردن بررسی، کاهش تمامی فاکتورهای خونی فریتین، فولات سرم، فولات گلبول قرمز، هموگلوبین، آهن سرم و ویتامین B در مطالعه حاضر از نظر آماری معنی دار بوده است و با توجه به تعداد مناسب مطالعات مقطعی (۶ مطالعه) و مورد شاهدی (۱۵ مطالعه) و حجم نمونه مناسب (میانگین حجم نمونه برابر ۱۶۳ نفر برای مطالعات مقطعی و ۱۲۶ نفر برای مطالعات موردن شاهدی) پیش بینی می شود که شیوع کمبود این فاکتورهای خونی در بیماران دچار آفت بیشتر از سایرین است.

از میان مطالعات وارد شده به مرور ساختار یافته مطالعات (Field, Challacombe, Compilato, Volkov, Hucheon, Rogers و Porter) به صورت کارآزمایی بالینی درمان های جایگزین کننده فاکتورهای خونی را برای بیماران مبتلا به آفتهای دهان تجویز نموده اند

مطالعه حاضر اولین مرور ساختار یافته برای جستجوی ارتباط میان زخمهای آفتی دهان و کمبود یکسری از فاکتورهای خونی محسوب می شود. در مسیر دست یابی به ۲۴ مقاله نهایی مورد بررسی از جمله علل عدم حذف مقلالات می توان به بررسی نمودن بیماران دچار بیماریهای سیستمیک مانند سوء جذب و نیز بررسی ایندکس های تعذیبه ای اشاره نمود (۱۵-۱۳). در حالی که مطالعات مد نظر تحقیق حاضر، مطالعاتی بوده اند که به صورت مستقیم نقش اتیولوژیک فاکتورهای خونی را در این زمینه بررسی کرده باشند. در بین مطالعات باقیمانده نیز ۳ مطالعه Wray و همکاران و Barnadas و Graykowski و همکاران علی رغم مرتبط بودن با زمینه مطالعه به علت عدم دسترسی به اطلاعات کامل مطالعه، وارد مرور ساختار یافته نشدند (۱۸-۱۶).

از میان مطالعاتی که بعد از سال ۲۰۰۰ منتشر شده بودند ۲۵٪ کل مطالعات در سال ۲۰۰۹ منتشر شده بودند. این مساله نشان می دهد که در سالهای اخیر نتایج متقاض مطالعات در مورد نقش اتیولوژیک فاکتورهای خونی بیش از پیش توجه محققان را به خود جلب نموده است. میانگین حجم نمونه مطالعات وارد شده به مرور ساختار یافته ۱۷۳ نفر بود که ۶۶ درصد مطالعات حجم نمونه کمتر از این میزان داشتند. در میان مطالعاتی که حجم نمونه آنها از میانگین حجم نمونه کل بالاتر بود Wray و همکاران، Challacombe و همکاران کمبود (فریتین) و Mطالعه Burgan و همکاران ویتامین B را فاکتور موثری در بروز آفت معرفی نموده اند (۲۱-۱۹). این مساله نشان می دهد که مطالعاتی که به علت حجم نمونه زیاد قابلیت مطابقت با جامعه و شمول عام بیشتری دارند، تاثیر چندانی را برای نقش کمبود فاکتورهای خونی مذکور در بروز زخمهای آفتی دهان قائل نشده اند. مطالعات وارد شده به متانالیز حاضر به معیارهای خروج بیشتر از معیارهای ورود اهمیت داده اند (۷۰٪ معیار خروج در مقابل ۲۹٪ معیار ورود). معیارهای خروج عمدها "عبارت از وجود بیماری های سیستمیک (۷۰٪ مطالعات) مانند سندروم بهمت و بیماری سلیاک بوده در حالیکه معیارهای ورود عبارت از

پایین بودن سطح کیفی مطالعات و کم بودن کارآزمایی های بالینی تصادفی در این زمینه اشاره نمود.

محدودیت دسترسی به اینترنت از جمله محدودیت های مرور ساختار یافته حاضر بود که به لحاظ پر اهمیت بودن مطالعات مرور ساختار یافته پیشنهاد می گردد که برای محققانی که مطالعاتی از این دست انجام می دهند دسترسی بیشتری به منابع الکترونیک فراهم گردد. همچنین بایستی در این زمینه کارآزمایی های بالینی تصادفی بیشتری انجام گردد تا نقش این فاکتورها در بروز یا تشدید ضایعات آفته دهان با دقت بیشتری ارزیابی گردد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تقدیر و تشکر می گردد.

(۲۷و۲۶و۲۵و۲۴و۲۳و۲۰و۱۹و۱۶و۱۵و۱۴و۱۳و۱۲و۱۱). درصد این مطالعات بهبود چشمگیر بیماری را با درمانهای مذکور گزارش نموده اند. این نتایج نشان می دهد که اتمالاً فاکتورهای خونی در بروز یا تسیید ضایعات آفته یا افزایش عود آنها نقش داردند که با نتایج حاصل از متأنالیز حاضر تهها در مورد نقش مشتبه درمان با آهن در این بیماران سازگار است. شناس بهبودی زخمهای آفته دهان متعاقب تجویز Olson، Challacombe، Wray، Compilato و Borhan Mojabi، Piskin، Barnadas گردیده است (۲۹و۲۸و۲۶و۲۰و۱۶و۱۵و۱۴) اما در مورد مکانیزم نقش درمانی این جایگزین ها و از جمله آهن هنوز ابهاماتی وجود دارد لذا با توجه به عوارض جانبی محتمل ناشی از تجویز مکملهایی مانند آهن با دوزهای بالا بنظر می رسد انجام مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است تا بتوان با قطعیت از تاثیر تجویز مکمل آهن در بیماران مبتلا به آفتهای دهانی صحبت نمود. در مورد معنی دار نشنون نقش درمانی سایر فاکتورهای خونی در مطالعه حاضر میتوان به علی چون

Assessment the Role of Hematologic Agent Deficiencies in the Etiology of Recurrent Aphthous Stomatitis

N. Navabi (DDS)^{1*}, M.R. Zarei (DDS)¹, F. Falsafi (DDS)², B. Sadeghi (PhD)³

1. Department of Oral Medicine, Kerman Dental School, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2. Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3. Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

J Babol Univ Med Sci; 15(3); May 2013; pp: 88-95

Received: Jul 22nd 2012, Revised: Aug 29th 2012, Accepted: Oct 31st 2012.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: There are several studies related to the role of the hematologic agents in the etiology of recurrent aphthous stomatitis (RAS) which results have controversies. This study was carried out to investigate the etiologic role of iron, folic acid and vitamin B12 in RAS.

METHODS: In this systematic review and meta analysis study, databases were searched with specific keywords in mentioned period of time after determining research question. At the end, 24 articles were identified and included in this study. All studies were critically appraised. Data were extracted and stratified and meta-analysis was done for all extracted data.

FINDINGS: Meta analysis showed that prevalence of low level of hematinic agents (ferritin, serum iron, hemoglobin, serum folate, RBC folate and vitamin B12) in patients with RAS was significant ($p<0.1$). In interventional studies, healing of RAS after prescription of iron supplement was significant ($p<0.1$)

CONCLUSION: Based on the gained results, hematologic deficiencies of ferritin, serum iron, hemoglobin, serum folate, RBC folate and vitamin B12 have a notable role in the etiology and recurrence of aphthous ulcers and ordering iron supplements for RAS patients is beneficial.

KEY WORDS: *Hematologic agents, Meta analysis, Recurrent Aphtha .*

*Corresponding Author;

Address: Department of Oral Medicine, Kerman Dental School, Shafa St., Kerman, Iran

Tel: +98 341 2118071

E-mail: N_navabi@kmu.ac.ir

References

- Seifi S, Motallebnejad M, Maliji Gh, Bijani A, Farnia S. Vascular endothelial growth factor in unstimulated saliva of the patients with minor aphtha. *J Babol Univ Med Sci* 2012;14(5):64-9. [in Persian]
- Porter S, Flint S, Scully C, Keith O. Recurrent aphthous stomatitis: the efficacy of replacement therapy in patients with underlying haematinic deficiencies. *Ann Dent* 1992;51(2):14-6.
- Rabinovich OF, Babichenko II, Rabinovich IM, Koviazin VA, Vakhrushina EV. Immunomorphology of recurrent aphthous stomatitis. *Arkh Patol* 2012;74(2):23-5.
- Chattopadhyay A, Shetty KV. Recurrent aphthous stomatitis. *Otolaryngol Clin North Am* 2011;44(1):79-88.
- Chavan M, Jain H, Diwan N, Khedkar S, Shete A, Durkar S. Recurrent aphthous stomatitis: a review. *J Oral Pathol Med* 2012;41(8):577-83.
- Scully C, Gorsky M, Lozada-nur F. Aphthous ulcerations. *Dermatol Ther* 2002;15(3):185-205.
- Yaşar S, Yaşar B, Abut E, Aşiran Serdar Z. Clinical importance of celiac disease in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Turk J Gastroenterol* 2012;23(1):14-8.
- Lalla RV, Choquette LE, Feinn RS, et al. Multivitamin therapy for recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-masked, placebo-controlled trial. *J Am Dent Assoc* 2012;143(4):370-6.
- Rogers RS 3rd, Hutton KP. Screening for haematinic deficiencies in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Australas J Dermatol* 1986;27(3):98-103.
- Hunter IP, Ferguson MM, Scull C. Effects of dietary gluten elimination in patients with recurrent minor aphthous stomatitis and no detectable gluten enteropathy. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1993;75(5):595-8.
- Olson JA, Feinberg I, Silverman S, Abrams D, Greenspan JS. Serum vitamin B12, folate and iron levels in recurrent aphthous ulceration. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1982;54(5):517-20.
- Saluja R, Kale A, Hallikerimath S. Determination of levels of salivary IgA subclasses in patients with minor recurrent aphthous ulcer. *J Oral Maxillofac Pathol* 2012;16(1):49-53.
- Broides A, Yerushalmi B, Levy R, et al. Imerslund-Grasbeck syndrome associated with recurrent aphthous stomatitis and defective neutrophil function. *J Pediatr Hematol Oncol* 2006;28(11):715-9.
- Ogura M, Yamamoto T, Morita M, Watanebe T. A case-control study on food intake of patients with recurrent aphthous stomatitis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2001;91(1):45-9.
- Kozlak ST, Walsh SJ, Lalla RV. Reduced dietary intake of vitamin B12 and folate in patients with recurrent aphthous stomatitis. *J Oral Pathol Med* 2010;39(5):420-3.
- Barnadas MA, Condomines J, de Moragas JM. Hematologic deficiencies in patients with recurrent oral aphthae. *Med Clin (Barc)* 1997;109(3): 85-7.
- Wray D, Ferguson MM, Hutcheon WA, Dagg JH. Nutritional deficiencies in recurrent aphthae. *J Oral Pathol* 1978;7(6):418-23.
- Graykowski EA, Drinnan A, Gier R, et al. Treatment of recurrent aphthous ulcerations. *J Oral Pathol Med* 1978;7:439-440.
- Wray D, Ferguson MM, Mason DK, Hutcheon AW, Dagg JH. Recurrent aphthae: Treatment with vitamin B12, folic acid, and iron. *Br Med J* 1975;2(5969):490-3.
- Challacombe SJ, Scully C, Keevil B, Lehner T. Serum ferritin in recurrent oral ulceration. *J Oral Pathol* 1983;12(4):290-9.
- Burgan SZ, Sawair FA, Amarin ZO. Hematologic status in patients with recurrent aphthous stomatitis in Jordan. *Saudi Med J* 2006;27(3):381- 4.
- Field EA, Rotter E, Speechley J, Tyldesley WR. Clinical and haematological assessment of children with recurrent aphthous ulceration. *Br Dent J* 1987; 163(1):19-22.

23. Hutcheon AW, Dagg JH, Mason DK, Wray D, Dagg JH, Ferguson MM, Luice NP. Clinical and haematological screening in recurrent aphthae. *Postgrad Med J* 1978;54(638):779-83.
24. Safadi RA. Prevalence of recurrent aphthous ulceration in Jordanian dental patients. *BMC Oral Health* 2009;9:31.
25. Tyldesley WR. Stomatitis and recurrent oral ulceration: is a full blood screen necessary? *Br J Oral Surg* 1983;21(1):27- 30.
26. Compilato D, Carroccio A, Calvino F, Di Fede G, Campisi G. Haematological deficiencies in patients with recurrent aphthosis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2010;24(6):667-73.
27. Volkov I, Rudoy I, Freud T, Sardal G, Naimer S, Peleg R, Press Y. Effectiveness of vitamin B12 in treating recurrent aphthous stomatitis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Am Board Fam Med* 2009;22(1):9-16.
28. Piskin S, Sayan C, Durukan N, Senol M. Serum iron, ferritin, folic acid, and vitamin B12 levels in recurrent aphthous stomatitis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2002;16(1):66-7.
29. Borhan Mojabi K, Mirzadeh MY, Esfehani M. Serum levels of ferritin, iron and total iron binding capacity in patients with recurrent aphthous stomatitis. *JQUMS* 2009;13(3):36-40. [in Persian]

Archive of SID