

شیوع کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا در رادیوگرافی پانورامیک

فریدا عابسی^{۱*}، علیرضا میرشکار (DDS)^۲، ندا بابایی (DDS)^۱، حسین حیدری (DDS)^۲، ایرج محمدزاده (MD)^۳

۱- مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲- دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳- مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل

دریافت: ۹۱/۴/۱۲، اصلاح: ۹۱/۶/۸، پذیرش: ۹۱/۸/۱۷

خلاصه

سابقه و هدف: کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا، یک نوع کیست کاذب مخاطی است که به ندرت با علائم و نشانه‌های بالینی همراه می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کیست احتباسی خوش خیم مخاطی سینوس فک بالا و برخی ریسک فاکتورهای مرتبط با آن می‌باشد.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۷۰۰ کلیشه پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در طول یکسال انجام شد و شیوع این ضایعه، محل آن و برخی از عوامل مانند جنسیت، ساقیه آرژی، ماه، سال و مصرف دخانیات بررسی شد.

یافته‌ها: شیوع کیست احتباسی (CI: ۵/۱-۸/۹٪) در مردان به طور معنی داری بالاتر بود ($p < 0.05$) همچنین ارتباط معنی داری بین داشتن آرژی فصلی و استعمال دخانیات با شیوع این کیست مشاهده شد ($p < 0.05$) ولی ارتباط معنی داری بین سال با شیوع کیست احتباسی خوش خیم مخاطی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کیست احتباسی در مردان شیوع بیشتری داشته و آرژی فصلی و استعمال دخانیات نیز در بروز آن نقش دارد.

واژه‌های کلیدی: کیست احتباسی خوش خیم مخاطی، رادیوگرافی پانورامیک، سینوس ماگزیلا.

مقدمه

همکارانش در سال ۱۳۸۴ در رشت انجام دادند. شیوع آن را ۱۴٪ و بیشتر در آقایان و کف سینوس این ضایعه را گزارش کردند (۴). در حالیکه Imanimoghaddam و همکارانش شیوع این ضایعه را در مشهد ۵٪ و بیشتر در کف سینوس مشاهده نمودند، همچنین بین وجود این کیست و ساقیه آرژی ارتباط معنی داری پیدا کردند (۵). در مطالعه ای که Rodrigues و همکارانش در بزرگ انجام دادند شیوع این ضایعه را ۱۹/۳٪ درصد ذکر کرده و ارتباط معنی داری بین این کیست و رطوبت نسبی هوا یا دمای محیط نیافتند (۶). از آنجاییکه دندانپزشکان از رادیوگرافی پانورامیک زیاد استفاده می‌کنند (۷)، اغلب با این ضایعه مواجه می‌شوند. بنابراین دانستن مشخصات و ویژگی های بالینی و رادیولوژی باعث تفسیر سریع، درست و طرح درمان صحیح تری برای بیمار می‌شود (۹). هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوع این ضایعه، محل آن و

یکی از یافته‌های تصادفی در کلیشه های پانورامیک، کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا (کیست کاذب احتباسی سینوس یا کیست خوش خیم مخاطی) در فک بالا می‌باشد (۱۰). این ضایعه عمدها در سینوس فک بالا و فاقد علامت می‌باشد. لذا به طور تصادفی در رادیوگرافی های سینوس یافت می‌شود. در تصاویر رادیوگرافی این ضایعه به صورت یک توده رادیوپاک صاف و گنبده Dome-shaped شکل (Dome-shaped) با حدودی مشخص و فاقد حاشیه کورتیکالی در کف یا در دیواره سینوس ماگزیلا (بندرت در سقف سینوس) ظاهر می‌شود (۲) (شکل-۱). اندازه آن از یک سانتی متر تا در برگیرنده کل سینوس متغیر است. موقعیکه کل سینوس را احاطه کند از عوارض آن می‌توان به احساس پری در سینوس، انسداد بینی و تخلیه از پشت بینی اشاره نمود. در مواردیکه همراه با علائم بالینی باشد این کیست نیاز به درمان دارد (۳ و ۲). در تحقیقی که Ghafari و

۱- این مقاله حاصل پایان نامه حسین حیدری دانشجوی دندانپزشکی و طرح تحقیقاتی به شماره ۸۹۲۹۹۳۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌باشد.

* مسئول مقاله:

ادرسن: بابل، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۹۱۴۰۸ - www.SIN.ir

داده ها پس از جمع آوری، وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ شده و با استفاده از آزمون های آماری T-test و Chi-square تجزیه و تحلیل و $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در این مطالعه از ۷۰۰ بیمار، ۲۹۵ نفر مرد با میانگین سنی $۳۶/۳ \pm ۱۳/۹۵$ سال و ۴۰۵ زن با میانگین سنی $۳۵/۳ \pm ۱۲/۹۹$ سال بودند که تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین سنی وجود نداشت. همچنین در این مطالعه ۱۷ نفر از بیماران (۱۲ مورد زن و ۵ مورد مرد) بیماری سیستمیک داشتند که بین جنسیت و وضعیت سلامتی افراد مورد مطالعه، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.

۶۷ مورد کیست کاذب احتیاسی دیده شد که ۴۵ عدد در کف سینوس ها و ۲۲ عدد در دیواره های سینوس ماگزیلا یافت شد. شیوه کیست کاذب احتیاسی در بین مردان مورد مطالعه به طور معنی داری بالاتر از خانم ها بود که این میزان به ترتیب برای خانمها و آقایان $۱۰/۸$ و $۱۰/۰۱$ ($p < 0.001$) می باشد. بطوریکه شیوه این ضایعه در مردان $۲/۵۷$ برابر خانم ها بوده است ($CI = ۴/۵۶ - ۴/۴۷$). $(CI = ۹/۵ - ۹/۴)$.

جدول ۱. فراوانی کیست کاذب احتیاسی در کلیشه های پانورامیک مورد بررسی به تفکیک جنسیت و مکان قرار گیری کیست


کف سینوس	دیواره های سینوس	تعداد(%)
زن		
(۰/۵)۲	(۲/۲)۹	سینوس راست
(۷/۱)۷	(۱/۵)۶	سینوس چپ
مرد		
(۱/۷)۵	(۵/۸)۱۷	سینوس راست
(۲/۷)۸	(۲/۷)۱۳	سینوس چپ

ارتباط معنی داری بین استعمال سیگار و داشتن آرژی با کیست کاذب احتیاسی مشاهده شد. (برای هر دو، $p < 0.001$) (جدول ۲).

جدول ۲. فراوانی کیست کاذب احتیاسی در کلیشه های مورد بررسی براساس استعمال سیگار و سابقه آرژی

P-value	کیست	عدم کیست	
استعمال سیگار			
<0.001	(۵۴/۵)۶	(۴۵/۵)۵	بلی
	(۹۳/۶)۵۴	(۶/۴)۴۴	خیر
آرژی			
<0.001	(۱۸/۸)۳	(۸۱/۳)۱۳	دارد
	(۹۴/۷)۶۴۸	(۵/۳)۳۶	ندارد

برخی از عوامل مانند جنسیت، سابقه آرژی، ماههای سال و استعمال دخانیات در کلیشه های پانورامیک مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل طی سال ۱۳۹۰ می باشد.




شکل ۱. تصویر شماتیک از کیست احتیاسی مخاطی سینوس ماگزیلا

مواد و روشها

این مطالعه مقطعی به روش غیر تصادفی آسان بر روی ۷۰۰ کلیشه پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال ۱۳۹۰ (از فوریه تا اسفند سال ۱۳۹۰) انجام شد. برای ثبت سن، جنسیت، ماه مراجعه، تاریخچه پزشکی افراد مراجعه کننده، چک لیستی تهیه گردید. در تاریخچه پزشکی وضعیت بیمار از نظر بیماری سیستمیک نظیر دیابت، بیماری قلبی عروقی و بیماریهای اندوکرینی که نیاز به مصرف دارو باشد، همچنین سابقه آرژی و استعمال سیگار مورد بررسی قرار گرفت.

در مورد کیست خوش خیم مخاطی، در صورت وجود یک طرفه یا دو طرفه بودن، محل استقرار آن در کف یا دیواره سینوس و همچنین تعداد آن در چک لیست ثبت گردید. تمامی رادیوگرافی های پانورامیک با استفاده از دستگاه Cranextom ساخت کشور فنلاند انجام شد. رادیوگرافی هایی در این مطالعه لحاظ شدند که فاقد خطاهای تکنیکی و تاریخخانه ای بودند.

دو مختصص رادیولوژی دهان، فک و صورت در اتاق تاریک و با استفاده از نگاتوسکوپ به بررسی تک تک تصاویر پرداختند. به طوریکه همzمان یک نظر واحد را اعلام نمودند. همچنین دور تا دور فیلم با اساس محل وجود کیست کاذب احتیاسی بر دیواره های سینوس و یا کف سینوس اطلاعات ثبت گردید. معیار تشخیص کیست کاذب احتیاسی بصورت یک توده رادیوپاک صاف و گنبدی شکل (Dome-shaped) با حدود مشخص و فاقد حاشیه کورتیکالی است که در کف یا در دیواره سینوس ماگزیلا دیده می شود (شکل ۲).



شکل ۲. کیست احتیاسی خوش خیم مخاطی به صورت توده ای رادیوپاک، با حدود گنبدی شکل و مشخص در کف سینوس راست بالا

کاذب احتیاسی در بین مردان و زنان تقریباً برابر گزارش شد (۱۶ و ۱۳٪). از بین ۶۷ ضایعه یافت شده در این مطالعه، تعداد موارد یافت شده در کف سینوس دو ImaniMoghaddam و Hemkaran و Ghafari و Hemkaran می باشد (۴ و ۵٪). در مطالعه Rupercht و Hemkaran در گیری سینوس سمت چپ مانگریلا کمی بیشتر از در گیری سینوس سمت راست بود به این صورت که ۵٪ از کیست کاذب احتیاسی های یافت شده در سینوس سمت چپ قرار داشتند (۱۶). اما Casamassimo و Hemkaran در گیری سینوس سمت راست را بیشتر از در گیری سینوس سمت چپ گزارش کرده اند (۵۵٪ موارد یافت شده) (۱۷). در مطالعه ImaniMoghaddam و Hemkaran ۶٪ کیست کاذب احتیاسی در سینوس سمت راست، ۳۶٪ آن ها در سینوس سمت چپ یافت شدند (۵). در مطالعه حاضر شیوع دو طرفه ضایعه نسبت به مطالعات دیگر بالاتر بود. در مطالعه Casamassimo و Hemkaran تعداد موارد یافت شده به صورت دو طرفه ۲ مورد (۸/۳٪) بود (۱۷) که این یافته در مطالعه Wang و Hemkaran ۵٪ موارد یافت شده بود (۱۸). نتایج نشان داد در افرادی که استعمال سیگار دارند بطور معنی داری شیوع کیست بیشتر دیده شده است. اما در مطالعه Carter و Hemkaranش و ImaniMoghaddam و Hemkaranش ارتباطی بین شیوع کیست و استعمال دخانیات مشاهده نشد (۱۹ و ۵٪). در این مطالعه تعداد سیگار مصرفی در روز لحظه نشد. شاید علت تفاوت دو مطالعه در دفعات سیگار مصرفی باشد.

در این مطالعه ارتباط معنی داری بین سابقه آلرژی و وجود کیست کاذب احتیاسی پیدا شد، که مشابه با مطالعه ImaniMoghaddam و Hemkaran بوده است (۵) اما Carter و Hemkaranش به عدم ارتباط بین ایندو اشاره نمودند (۱۹). بیشترین موارد یافت شده کیست کاذب احتیاسی در ماه های شهریور و مهر بود اما رابطه معنی داری بین تعداد کیست کاذب احتیاسی یافت شده و ماه های سال وجود نداشت که به نوعی در توافق با مطالعه Rodrigues و Hemkaranش می باشد، آنها بیشترین موارد ثبت شده کیست کاذب احتیاسی در ماه های سپتامبر (شهریور)، اکتبر (مهر) و نوامبر (آبان) بود (۶). تغییرات آب و هوا و همچنین افزایش آلرژی فعلی در این موقع از سال می تواند توجیهی چهت افزایش شیوع این کیست باشد.

در این مطالعه شیوع کیست احتیاسی مخاطی ۷٪ به دست آمد و در مردان در کف سینوس به طور معنی داری بالاتر بود. نتایج مطالعه نشان داد که کیست احتیاسی در مردان شیوع بیشتری داشته و آلرژی فعلی و استعمال دخانیات نیز در بروز آن نقش دارند. علی رغم شیوع کم این ضایعه، دندانپزشکان بایستی توجه خاصی به وجود این ضایعه هنگام بررسی ضایعات سینوس مانگریلا داشته باشند.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به جهت حمایتهای مادی و خانم مائده آقاجانی به جهت همکاری صمیمانه شان، تشکر و قدردانی می گردد.

فراوانی کیست کاذب احتیاسی یافت شده در کلیشه های پانورامیک به تتفیک ماه های مراجعه بیماران در جدول ۳ گزارش شده است. کیست کاذب احتیاسی های یافت شده در ماه های شهریور و مهر بیشتر از بقیه ماهها بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0.389$) (جدول ۳).

جدول ۳. فراوانی کیست کاذب احتیاسی های یافت شده به تتفیک ماه مراجعه بیماران

ماه سال	تعداد	مجموع	LW	LF	RW	RF	تعداد	مجموع	LW	LF	RW	RF	تعداد	مجموع	کلی	پانورامیک	
فوریه	۴۶	۴	۰	۱	۴	۰	۵	۱	۰	۱	۴	۰	۱۲	۸	۴	۴	۱۰۲
اردیبهشت	۱۰۲	۴	۰	۴	۰	۴	۱۰	۵	۲	۳	۵	۱	۱۳۶	۱۰	۵	۲	۲۱
خرداد	۱۳۶	۴	۰	۴	۰	۴	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۱۵	۲	۱	۰	۱۵
تیر	۲۱	۱	۰	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۲۰	۲	۱	۱	۲۰
مرداد	۲۰	۲	۰	۱	۰	۰	۱۵	۶	۳	۳	۹	۳	۹۰	۳	۳	۰	۹۰
شهریور	۹۰	۲	۰	۱	۰	۰	۴	۲	۰	۲	۰	۰	۹۳	۲	۰	۰	۹۳
مهر	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۳۹	۱	۰	۰	۳۹
آبان	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۲۸	۱	۰	۰	۲۸
آذر	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۲	۱	۰	۰	۴۶	۳	۲	۰	۴۶
دی	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۱	۰	۰	۵۴	۲	۰	۰	۵۴
بهمن	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسفند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

RF=right floor .RW=right Wall .LF=left floor .LW=left wall

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه شیوع کیست کاذب احتیاسی ۷٪ به دست آمد. Som و Hemkaran و Carrie شیوع این ضایعه را ۱۰٪ گزارش کردند (۱۱ و ۱۰٪) و Bhattacharyya و Hemkaran شیوع آن را ۱۲/۴٪ و Rodrigues و Hemkaran شیوع آن ۳/۱۹٪ گزارش کردند (۱۲ و ۶٪). Hemchinin Wood و Hemkaran شیوع آن ۱۲٪ اعلام کردند (۱۳). در مطالعه ای که در دانشکده دندانپزشکی مشهد صورت گرفت، شیوع این ضایعه ۵/۱٪ گزارش شد (۵). در مطالعه Ghafari و Hemkaran که در شهر رشت انجام شد، شیوع این ضایعه ۱۴٪ برآورد گردید (۴). بر اساس بررسی های صورت گرفته شیوع این ضایعه در محدوده ۲-۳ درصد گزارش شده است (۱۴ و ۱۳ و ۶٪). تفاوت در اعداد گزارش شده شاید به دلیل تفاوت در تعداد نمونه های مورد بررسی، مناطق مختلف آب و هوا و جغرافیایی باشد. در مطالعه حاضر شیوع این ضایعه در مردان ۲/۵ برابر خانم ها بود که این یافته موافق با مطالعه Allard و Hemkaran و White و Hemkaran می باشد (۱۵ و ۱۵٪). Hemchinin Ghafari و Hemkaran شیوع این ضایعه را در مردان بیشتر از Bohay کردند (۴). Hemchinin در مطالعه های Wood و Hemkaran، ImaniMoghaddam و Hemkaran، Rupercht و Hemkaran، Ghafari و Hemkaran مشاهده شیوع کیست

Prevalence of Mucous Retention Cysts of Maxillary Sinus in Panoramic Radiography

**F. Abesi (DDS)^{1*}, A. Mirshekar (DDS)², N. Babaee (DDS)¹, H. Heidari (DDS)²,
I. Mohammadzadeh (MD)³**

1. Dental Materials Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

2. Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3. Non Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

J Babol Univ Med Sci; 15(3); May 2013; pp: 103-107

Received: Jul 2nd 2012, Revised: Aug 29th 2012, Accepted: Nov 7th 2012.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Mucous retention cyst (MRC) of maxillary sinus is a kind of the mucus pseudocyst. It rarely causes any sign or symptom. The purpose of this study was to determine the prevalence and some associated risk factors of MRC.

METHODS: In this study, panoramic radiographs of 700 patients referring to oral and maxillofacial radiology department of dental school of Babol University of medical sciences were examined for one year and mucous retention cyst prevalence and some associated risk factors such as sex, site of occurrence, allergy, month and smoking habit were evaluated.

FINDINGS: The prevalence of this lesion was %7 (CI %95 5.1-8.9) and was significantly higher among men ($p<0.05$). Also there was significantly correlation between seasonal allergy and smoking with MRC ($p<0.05$) but there were no significantly correlation between month with MRC.

CONCLUSION: The results of this study showed that the prevalence of MRC was more in men. Seasonal allergy and smoking also can cause MRC.

KEY WORDS: *Mucous retention cyst, Panoramic radiography, Maxillary sinus.*

***Corresponding Author:**

Address: Faculty of Dentistry, Babol university of Medical Sciences, Babol, Iran

Tel: +98 111 2291408

E-mail: f_abesi@yahoo.com

References

1. Bohay RN, Gordon SC. The maxillary mucous retention cyst: a common incidental panoramic finding. *Oral Health* 1997;87(7):7-10.
2. White SC, Pharaoh MJ. *Oral radiology: principles and interpretation*. 6th ed. St. Louis: Mosby Co 2009; pp: 506-25.
3. Hadar T, Shvero J, Nageris BI, Yaniv E. Mucus retention cyst of the maxillary sinus: the endoscopic approach. *Br J Oral Maxillofac Surg* 2000;38(3):227-9.
4. Ghafari R, Dalili Z. Frequency of retention cyst of maxillary sinus in panoramic radiography. *J Guilan Univ Med Sci* 2007;15(60):79-83. [in Persian]
5. ImaniMoghaddam M, Bagherpour A, AhmadianYazd A, Qmarci N. Prevalence and some associated risk factors of maxillary sinus mucous retention cyst in panoramic view of patients referred to radiology department of Mashhad Dental School-Iran 2007. *J Mash Dent Sch* 2009;33(2):89-96.
6. Rodrigues CD, Freire GF, Silva LB, Fonseca da Silveira MM, Estrela C. Prevalence and risk factors of mucous retention cysts in a Brazilian population. *Dentomaxillofac Radiol* 2009;38(7):480-3.
7. Choi BR, Choi DH, Huh KH, et al. Clinical image quality evaluation for panoramic radiography in Korean dental clinics. *Imaging Sci Dent* 2012;42(3):183-90.
8. Kullman L, Joseph B. Quality of digital panoramic radiography in a newly established dental school. *Swed Dent J* 2006;30(4):165-70.
9. Maestre-Ferrín L, Galán-Gil S, Carrillo-García C, Peñarrocha-Diago M. Radiographic findings in the maxillary illary sinus: comparison of panoramic radiography with computed tomography. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2011;26(2):341-6.
10. Som PM, Curtin HD. *Head and neck imaging*. 4th ed. St. Louis: Mosby Co 2003; pp: 200-5, 214-5.
11. Carrie A, Bobb R. Mucoceles of the paranasal sinuses. 2000; [3 screens] Available at: URL: <http://www.bcm.edu/oto/grand/05252000>. Accessed April 26, 2008.
12. Bhattacharyya N. Do Maxillary sinus retention cysts reflect obstructive sinus phenomena? *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2000;126(11):1369-71.
13. Wood NK, Goaz PW. *Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions*. 5th ed. St. Louis: Mosby Co 1997; p: 470.
14. Beaumont C, Zafiropoulos GG, Rohmann K, Tatakis DN. Prevalence of maxillary sinus disease and abnormalities in patients scheduled for sinus lift procedures. *J Periodontol* 2005;76(3):461-7.
15. Allard RH, Van der Kwast W, Van der Waal I. Mucosal antral cysts. Review of the literature and report of a radiographic survey. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1981;51(1):2-9.
16. Ruprecht A, Batniji S, el-Newehi E. Mucous retention cyst of the maxillary sinus. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1986;62(6):728-31.
17. Casamassimo PS, Lilly GE. Mucosal cysts of the maxillary sinus: a clinical and radiographic study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1980;50(3):282-6.
18. Wang JH, Jang YJ, Lee BJ. Natural course of retention cysts of the maxillary sinus: Long-term follow-up results. *Laryngoscope* 2007;117(2):341-4.
19. Carter LC, Calamel A, Haller A, Aguirre A. Seasonal variation in maxillary antral pseudocysts in a general clinic population. *Dentomaxillofac Radiol* 1998; 27(1): 22-4.