

بررسی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان ۱۳۹۰-۹۱ ساله شهر بابل در سال

عفت خدادادی (DDS, MS)^۱، ثریا خفری (PhD)^۲

۱- گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲- گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

دریافت: ۹۱/۸/۲۸، اصلاح: ۹۱/۱۰/۱۷، پذیرش: ۹۲/۲/۱۱

خلاصه

سابقه و هدف: متدالوی تربین و مهم ترین مقیاس اپیدمیولوژیک برای سنجش پوسیدگی دندانی شاخص DMFT است، که به عنوان یک معیار مهم جهت نشان دادن وضعیت سلامت دهان و دندان استفاده می شود و نقش مهمی در تصمیم گیری های بهداشتی دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل می باشد تا در برنامه ریزی های بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۴۴۰ نفر از دانش آموزان ۱۲ ساله (از هر جنس ۲۲۰ نفر) مدارس دولتی شهر بابل که به روش نمونه گیری به صورت خوشše ای و تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام گردید. معاینه افراد روی صندلی معمولی، در نور طبیعی و با استفاده از آینه و سوند یکبار مصرف، توسط دانشجویان سال آخر دندانپزشکی صورت گرفت و اطلاعات بدست آمده در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. برای مشاهده هر دندان پوسیده، از دست رفته و پرشده در هر دندان مولر اول دائمی عدد ۱ داده شد. در پایان این اعداد برای به دست آوردن DMF6 هر فرد با هم جمع شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: میزان شاخص DMF6 از صفر تا ۴ متغیر بود و میانگین آن $1/59 \pm 2$ (۱/۸۴) به دست آمد در پسران (۱/۳۶) بود ($P=0.002$). هم چنین نتایج نشان داد که دندان های پوسیده $80/4\%$ (دختران ۱/۸۵٪ و پسران ۸/۸٪) دندان های کشیده شده $6/6\%$ (دختران ۴/۳٪ و پسران ۴/۴٪) و دندان های ترمیم شده $12/8\%$ (دختران ۶/۰٪ و پسران ۸/۲٪) از شاخص DMFT را تشکیل دادند که تفاوت بین دختران و پسران معنی دار بود ($P=0.008$). تعداد دندانهای مولر اول دائمی پوسیده در فک پائین بیشتر از فک بالا و در سمت راست بیشتر از سمت چپ بود.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شاخص DMFT6 در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل بالا می باشد. بتایراین برنامه ریزی در زمینه بهداشت دهان و دندان ضروری بنظر می رسد.

واژه های کلیدی: شاخص DMFT، دندان مولر، دانش آموزان، پوسیدگی دندان.

مقدمه

دهان و دندان استفاده می شود و نقش مهمی در تصمیم گیری های بهداشتی دارد. سازمان بهداشت جهانی، کودکان ۱۲ ساله را یکی از گروه های هدف می داند زیرا در این سن در اغلب کشورها کودکان در مدرسه حضور دارند و اکثر دندان های آن ها به جز دندان مولر سوم رویش یافته است (۲). با توجه به جوان بودن جمعیت کشور، برنامه ریزی برای پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان ضروری است، تخصیص قدم در این راه تهییه گزارش جامع از شاخص های سلامت دهان و دندان است (۳). از اهداف سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۱۰ این بود که میزان DMFT در کودکان ۱۲ ساله باید کمتر از یک باشد (۴). اهداف جدید این سازمان برای سلامت دهان در سال ۲۰۲۰ میلادی متمرکز بر استفاده از تجارب و ارزیابی اهداف قبلی و تأکید بر اهمیت سلامت دهان، به

پوسیدگی دندانی شایعترین بیماری مزمن می باشد که به دلیل مصرف مواد قندی و اثر میکرووارگانیسمها بر آنها و در نتیجه از بین رفتن نسج کاسیفیه دندان ایجاد می شود. امروزه با پیشرفت علم و فن آوری، مواد و تکنیکهای جدیدی برای جایگزینی نسج از دست رفته دندان ارائه شده اند. اما بدینهی است که هیچ کدام عملکرد بافت اولیه و طبیعی را ندارند و به این دلیل است که اصولی ترین راه، پیشگیری است (۱). متدالوی تربین و مهم ترین مقیاس اپیدمیولوژیک برای سنجش پوسیدگی دندانی شاخص DMFT است که در این شاخص تعداد دندان های دائمی (T=Teeth)، پوسیده (D=Decay)، از دست رفته به علت پوسیدگی (M=Missing) و یا ترمیم شده به علت پوسیدگی (F=Filling) گردند. این شاخص به عنوان یک معیار مهم جهت نشان دادن وضعیت سلامت

مولر اول دائمی ارزش یک داده شد. در پایان این اعداد برای به دست آوردن DMF6 هر فرد با هم جمع شدند. نتایج و ارقام حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS version 16 و آزمون Chi square و T-Test تجزیه و تحلیل شدند و $p < 0.05$ معنی دار تلقی گردید.

یافته ها

در این مطالعه ۴۴۰ دانش آموز ساله شرکت داشتند که ۲۲۰ نفر (۵۰%) از آن ها دختر بودند. میزان شاخص DMF6 از صفر تا ۴ متغیر بود و میانگین آن 1.59 ± 2 (دختران 1.36 و پسران 1.84) به دست آمد و در پسران به طور معنی داری بیشتر از دختران بود ($p = 0.002$) (جدول ۱). هم چنین نتایج نشان داد که دندان های پوسیده 40% (دختران 85% و پسران 88%) این شاخص را تشکیل دادند. دندان های کشیده شده 6% (دختران $4/3\%$ و پسران $8/4\%$) و دندان های ترمیم شده $12/8\%$ (دختران $10/6\%$ و پسران $22/8\%$) از شاخص DMFT را تشکیل دادند که تفاوت بین دختران و پسران معنی دار بود ($p = 0.008$).

جدول ۱: فراوانی و ضعیت DMFT مولر اول دائمی بر حسب جنس در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل در سال ۱۳۹۰

DMFT	دختر	پسر	جمع	تعداد(%)	تعداد(%)	تعداد(%)
(۱۷/۸)۲۸	(۲۴)۵۳	(۱۱/۳)۴۵	.			
(۹/۳)۴۱	(۸/۲)۱۸	(۱۰/۵)۳۳	۱			
(۳۸/۲)۱۶۸	(۳۲/۸)۷۲	(۴۳/۷)۹۶	۲			
(۱۰/۷)۴۷	(۹/۵)۲۱	(۱۱/۸)۲۶	۳			
(۲۴)۱۰۶	(۲۵/۵)۵۶	(۲۲/۷)۵۰	۴			
(۱۰۰)۴۴۰	(۱۰۰)۲۲۰	(۱۰۰)۲۲۰	جمع			

همچنین نتایج بررسی نشان داد که در دندانهای مولر اول دائمی سمت راست بیشتر از سمت چپ و فک بالا بیشتر از فک پائین پوسیدگی مشاهده گردید.

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه میانگین شاخص DMF6 برابر 1.59 ± 2 به دست آمد که با اهداف سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۱۰ فاصله زیادی دارد. در مطالعه Sadeghi در رفسنجان میانگین DMFT برابر 1.69 ± 1 بود و دختران پوسیدگی بیشتری داشتند (۱۰) که میانگین DMFT آنها از مطالعه ما بالاتر بود ولی در این مطالعه هم دختران پوسیدگی بیشتری داشتند اما در کل میانگین DMFT پسران بالاتر بود.

در این مطالعه دندان پوسیده (جزء DMFT) را تشکیل داد، در دندانهای مولر اول دائمی سمت راست بیشتر از سمت چپ و فک بالا بیشتر از فک پائین پوسیدگی مشاهده گردید که با مطالعه Ghasempour و

عنوان جزء اجتناب ناپذیر از سلامت عمومی است (۶). سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که هر کشور در صورت امکان به طور منظم هر ۵ سال یکبار بررسی دقیقی در مورد بهداشت دهان و دندان بعمل آورد (۷). نتایج مطالعه ای که با همکاری WHO و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، نشان داد که شاخص DMFT در ایران $1/67$ می باشد که نسبت به معیار WHO پایین تر بودند. مولرهای اول دائمی پوسیده ترین دندان ها بوده، دختران بالاتر نسبت به پسران داشتند و نیمی از دانش آموزان دندانهای خود را مسواک نمی زدند (۸).

Ghasempour و همکاران در بررسی بر روی وضعیت سلامتی مولرهای اول دائمی در کودکان دبستانی شهر قائم شهر به این نتیجه دست یافتند که از 2500 دندان مولر اول دائمی در 635 دانش آموز $11-45$ ساله، $45/1$ درصد دندان ها پوسیده بودند، دختران بیشتر از پسران پوسیدگی داشته و تعداد مولرهای اول دائمی در فک پائین بیشتر از فک بالا و در سمت چپ بیشتر از سمت راست بود (۹). Sadeghi در بررسی بر روی شیوه پوسیدگی مولر اول دائمی دانش آموزان 12 ساله شهر رفسنجان نشان داد که میانگین DMFT مولر اول دائمی $1/69 \pm 1$ بوده و دختران پوسیدگی بیشتری داشتند (۱۰). گزارش شاخص DMFT و اجزاء آن در جامعه بیان کننده میزان واقعی پوسیدگی دندان و اقدامات پیشگرانه انجام شده است (۲).

این تحقیق با هدف ارزیابی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان 12 ساله شهر بابل انجام گردید تا بتوان با بدست آوردن میزان DMFT در شهر بابل و با جمع آوری نتایج تحقیقات در شهرهای مختلف کشور را مشخص نموده و برای برنامه ریزی های بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار داد.

مواد و روشها

این مطالعه مقطعی بر روی دانش آموزان 12 ساله شهر بابل در سال $1390-91$ انجام شد. تکنیک گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه، معاینه و ثبت اطلاعات در فرم اطلاعاتی بود. تعداد نمونه های مورد مطالعه بر اساس مطالعات مشابه و اهداف WHO، 440 نفر (دختر و پسر، هر جنس 220 نفر) بر آورد گردید که از 14 مدرسه دولتی شهر بابل با روش نمونه گیری به صورت خوش ای و تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. بعد از تهیه فهرست مدارس و تعیین تعداد خوش ها 14 مدرسه انتخاب شد. از داخل هر خوش (مدرسه) به صورت تصادفی و با توجه به حجم نمونه، تعداد نمونه های مورد نیاز انتخاب و معاینه شدند. معاینه افراد در حالت نشسته روی صندلی معمولی و در نور طبیعی و با استفاده از آینه یکبار مصرف و سوند دندانپزشکی توسط دانشجویان سال آخر دندانپزشکی 30 نفر (صورت گرفت و اطلاعات بدست آمده در فرم اطلاعاتی ثبت گردید) جهت جلوگیری از خطأ در افراد معاینه کننده، یکسان سازی توسط یک فرد متخصص برای دانشجویان انجام گردید و برای تشخیص پوسیدگی از تعریف سازمان بهداشت جهانی استفاده شد (۱۱).

همچنین طی مصاحبه، اطلاعات زمینه ای شامل: نام و نام خانوادگی، سن کودک و نام مدرسه نیز برای هر فرد در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. در برای مشاهده هر یک از حالات پوسیدگی، از دست رفتگی و پر شدگی به هر دندان

فرهنگی در رابطه با اهمیت دندان بر سلامت عمومی و هزینه بالای خدمات دندانپزشکی به خصوص برای نگهداری دندان‌های دارای پوسیدگی وسیع باعث شده تا به تاچار این دندان‌ها کشیده شوند.

نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل بیش از اهداف سازمان بهداشت جهانی برای سال ۲۰۱۰ بوده و لزوم برنامه ریزی در زمینه بهداشت دهان و دندان را ایجاب می‌کند. بنابراین جهت ارتقاء بهداشت دهان و دندان بهتر است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

ترغیب دانش آموزان به استفاده از مسواک، نخ دندان و دهان شویه حاوی فلوراید؛ افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و والدین از طریق رسانه‌ها؛ بهره وری بیشتر از مراقبین بهداشتی در مدارس جهت آموزش حضوری بهداشت دهان و دندان؛ بهبود رژیم غذایی کودکان و تأکید بر کاهش مصرف مواد قندی؛ به کارگیری روش‌های پیشگیرانه از جمله فلوراید تراپی موضعی و فیشور سیلانت در مقاطع مختلف تحصیلی؛ افزودن فلوراید به آب آشامیدنی بر اساس میزان فلوراید طبیعی موجود در آب و دمای منطقه؛ تأکید بر مراجعه منظم کودکان به دندانپزشک هر ۶ ماه یک بار بر اساس وضعیت دندان کودک؛ معاینه و کنترل وضعیت دندانی توسط دندانپزشک و این که به موقع جهت درمان دندان‌های پوسیده اقدام شود.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از خانم دکتر یوسفی، مربي بخش جامعه نگر و خانم بذرافشان، پرستار بخش جامعه نگر به خاطر همکاری صمیمانه شان و همچنین از همکاری واحد بهداشتی آموزش و پژوهش شهرستان بابل و کلیه دانشجویان ورودی ۸۵ دانشکده دندانپزشکی بابل تشکر و قدردانی می‌گردد.

همکارانش همخوانی ندارد زیرا در بررسی آنها ۴۵/۱ درصد را دندانهای پوسیده تشکیل می‌دادند و فک پائین و سمت چپ پوسیدگی بیشتری داشتند (۹). از طرفی مطالعه ما با نظر Dean و همکارانش همخوانی زدن دندانهای پائین نسبت به بالا می‌دارند که این مطلب می‌تواند توجیه تعداد پوسیدگی بیشتر فک بالا در مطالعه ما باشد. همچنین Dean و همکارانش نشان دادند که طرف مخالف (سمت چپ) در افراد راست دست (بیشتر از طرف موافق در کودکان مسواک زده می‌شود (۱۲)) که این مسئله هم توضیح خوبی برای بیشتر بودن پوسیدگی سمت راست در مطالعه ما می‌باشد. با توجه به مسائل گفته شده در بالا لزوم مراقبت‌های پیشگیرانه مثل فیشور سیلانت تراپی، به کاربردن فلوراید موضعی و مراقبت‌های دقیق در خانه و نیاز به ارائه خدمات درمانی به خصوص در این گروه سنی مهم را ایجاد می‌نماید.

مطالعات انجام شده در ایران از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهند که در گروه سنی ۱۲ ساله در مناطق مختلف ایران میانگین شاخص DMFT از ۰/۷۷ تا ۰/۱۲٪ متغیر است (۱۳). دندان مولر اول دائمی یکی از مهمترین و کلیدی ترین دندان‌های است، رویش این دندان هنگامی صورت می‌گیرد که کودک قادر به رعایت بهداشت دهان و دندان خود نبوده و مصرف مواد قندی بسیار شایع است. علاوه بر آن بی توجهی والدین نسبت به رویش اولین دندان دائمی و عدم آگاهی آن‌ها که این دندان اولین دندان دائمی است، موجب شده که کودک قادر به اولین قدم، قربانی سهل انجاری جامعه در قبال بهداشت دهان و دندان باشد (۱۴). بنابراین آگاهی بخشیدن به آنها در خصوص اهمیت پیشگیری و درمان به موقع مانع از کشیدن دندان می‌گردد.

در این مطالعه دندان ترمیم شده (جزء F) ۱۲/۸٪ از شاخص DMF6 را تشکیل داد که نشان می‌دهد میزان دریافت خدمات درمانی بسیار اندک است. فقر

Epidemiological Evaluation of DMFT of First Permanent Molar in 12 Year Old Students of Babol City; Iran (2011-2012)

E. Khodadadi (DDS, MS)^{1*}, S. Khafri (PhD)²

1. Department of Pediatric Dentistry, Dental School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

2. Department of Social Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

J Babol Univ Med Sci; 15(5); Sep 2013; pp: 102-106

Received: May 18th 2012, Revised: Jan 6th 2013, Accepted: May 1st 2013.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The most common and important epidemiological index for the assessment of dental caries is the DMFT index. This index is an important factor for showing tooth and mouth health condition and has an important role in hygiene decisions. The aim of this study was to evaluate the DMFT index of first permanent molar in 12 years old students in Babol in order to be considered in health program planning.

METHODS: This cross sectional study was performed on 440 public school students aged 12 years old (220 girls and 220 boys) in Babol. They were selected using randomized multistage cluster sampling. Oral examination was carried out in sitting position and natural light and using dental mirror and explorer by senior dental students. Obtained data was recorded in the information form. For observing every decayed, missing and filling tooth in the first molar tooth number one is given. At the end these numbers were added together to achieve DMFT6.

FINDINGS: The amount of DMF6 was variable from 0 to 4 and its mean was 1.59 ± 2 . It was more significant in the boys than the girls ($p=0.002$). Also the results showed that caries teeth were 80.4% (85.1% girls and 68.8% boys), extracted teeth were 6.7% (4.3% girls and 8.4% boys) and filling teeth were 12.8% (10.6% girls and 22.8% boys) of DMFT index. The difference between girls and boys was significant ($p=0.008$). The number of decayed permanent first molar in the mandible was more than maxilla and on the right side was more than left.

CONCLUSION: The results of this study showed that DMFT6 is high in 12 year old students of Babol. So planning about the tooth and mouth health is recommended.

KEY WORDS: DMFT index, Molar, Student, Dental caries.

*Corresponding Author;

Address: Department of Pediatric Dentistry, Dental School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

Tel: +98 111 2291408-9

E-mail: dr_ekhodadadi@yahoo.com

References

- 1.Marthalier TM, Steiner M, Menghini G, Bandi A. Caries prevalence in Switzerland. *Int Dent J* 1994;44(4 Suppl 1):393-401.
- 2.World Health Organization. Oral health surveys- basic methods. 4th ed. Geneva: WHO 1997.
- 3.Mortazavi M. A review on dental caries in relation to community oriented studies. *J Dent Sch* 2001;18(4):333-8.
- 4.World Health Organization .WHO Assignment report. Geneva: WHO 1998.
- 5.Intercountry Workshop on Planning Community Based Preventive Oral Health Programs for Children. Beirut, Lebanon Nov 9-13, 1998.
- 6.Hobdell M, Petersen PE, Clarkson J, Johnson N. Global goals for oral health 2020. *Int Dent J* 2003;53(5):285-8.
- 7.Nithila A, Bourgeois D, Burmes DE, Nurтомаа H. WHO global oral bank. 1986-96: an overview of oral health surveys at 12- years of age. *Bull World Health Organ* 1998;76(3):237-44.
- 8.Seyedein SM, Zali MR, Golpaigani MV, Yazdani H, Nourhalouchi S. Oral health survey in 12 year old children in the Islamic Republic of Iran 1993-94. *East Mediterr Health J* 1998;4:338-42.
- 9.Ghasempour M, Seyyed M, Amini Y. Situation of the first permanent molar teeth in the primary schools students of Ghaemshahr, 2001. *J Babol Univ Med Sci* 2005;6(Suppl 3):40-4. [in Persian]
- 10.Sadeghi M. Prevalence and bilateral occurrence of first permanent molars caries in 12-year-old students. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects* 2007;1(2):86-92.
- 11.Mehrdad K. International indexes of epidemiology in dentistry, WHO suggestions. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences Publications 1987; pp: 25-47. [in Persian]
- 12.Dean JA, Avery DR, McDonald RE. Dentistry for the child and adolescent. 9th ed. Mosby: St. Louis 2011; p: 212.
- 13.Aghahosseini F, Enshaei M. DMFT evaluation of upper and lower first permanent molars in patients examined in oral medicine and diagnosis department at faculty of dentistry, Tehran University of medical sciences and health services (1997). *J Dent Med* 2002;14(4):50-9. [in Persian]
- 14.Meamar N, Ghazizadeh A, Mahmoodi Sh. DMFT (decayed, missing and filled teeth) index and related factors in 12-year- old school children in Sanandaj. *J Kurdistan Univ Med Sci* 2000;17(5):26-30.