

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بهار نارنج بر روند تکثیر سلول‌های بنیادی عصبی (In vitro آزمایشگاهی)

علیرضا عبدالانی پور^۱، بهشته شادمان^۲، فرشید سلیمی ننه کران^۱، رضا بنابی^۱، امیر نوریان^۱

- ۱- آزمایشگاه سلول‌های بنیادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
۲- باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دریافت: ۹۲/۹/۱۵، اصلاح: ۹۲/۱۰/۱۰، پذیرش: ۹۲/۱۲/۱۵

خلاصه

سابقه و هدف: یکی از مهم ترین مسائل در سلول درمانی استفاده از یک محرك مناسب برای افزایش سرعت تکثیر و رشد سلول‌های بنیادی در شرایط *In vitro* و *In vivo* می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بهار نارنج (*Citrus aurantium*) بر روی روند تکثیر و رشد سلول‌های بنیادی عصبی نوزاد موش صحرایی در شرایط آزمایشگاهی (*In vitro*) است.

مواد و روشها: سلول‌های بنیادی عصبی به روش مستقیم و با استفاده از هضم آنزیمی از هیپوکمپ مغز نوزاد ۳ روزه موش صحرایی استخراج شد. به منظور تعیین بهترین غلظت عصاره گل بهار نارنج، سلول‌ها به مدت ۴۸ ساعت با غلظت‌های ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم به ازای هر میلی لیتر محیط کشت تیمار شدند و میزان تکثیر سلولی با روش MTT بررسی گردید.

یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده، عصاره گل بهار نارنج تکثیر سلول‌های بنیادی عصبی را در مقایسه با گروه تیمار نشده افزایش می‌دهد. همچنین تاثیر عصاره گل بهار نارنج وابسته به غلظت آن دارد. نتایج این مطالعه نشان داد، سلول‌های تیمار شده با غلظت ۶۰۰ میکروگرم عصاره گل بهار نارنج به ازای هر میلی لیتر در محیط کشت بالاترین میانگین درصد تکثیر $(\pm ۰/۰۶ \pm ۰/۰۸)$ را نسبت به گروه کنترل $(\pm ۰/۰۵ \pm ۰/۰۲)$ دارد ($P < 0/05$).

نتیجه گیری: با توجه به تاثیر عصاره گل بهار نارنج بر روی روند تکثیر سلول‌های بنیادی عصبی در شرایط آزمایشگاهی، چنین به نظر می‌رسد که استفاده از این عصاره گیاهی جهت مقاصد سلول درمانی در بیماری‌های سیستم عصبی مانند ضایعات نخاعی در کلینیک سودمند است.

واژه‌های کلیدی: گل بهار نارنج، سلول‌های بنیادی عصبی، تکثیر سلولی، سلول درمانی.

مقدمه

داشته است. به دلیل پتانسیل بیولوژیکی سلول‌های بنیادی عصبی در ترمیم ضایعات عصبی، اخیراً توجه محققین در علوم زیستی و بالینی به این سلول‌ها معطوف گشته است (۱-۵). استفاده از این سلول‌ها در درمان آسیب طناب نخاعی در مدل‌های آزمایشگاهی تاییدی بر مناسب بودن این سلول‌ها در مقاصد کلینیکی می‌باشد (۶). همچنین سکته مغزی نیز یکی از عوامل منجر به مرگ و ناتوانی در انسانهاست که در حال حاضر هیچ درمان موثری نمی‌تواند عمل کرد نورولوژیکی از دست رفته را برگرداند (۷). مطالعات نشان داده که پیوند سلول‌های بنیادی می‌تواند منجر به ترمیم بافت مغزی در نواحی آسیب دیده و بهبود عملکرد مغزی شود (۸-۱۰). یکی از مهمترین مسائل در سلول درمانی استفاده از یک محرك مناسب برای افزایش سرعت تکثیر سلول‌های بنیادی عصبی در شرایط *Citrus aurantium* In vitro می‌باشد. یکی از گونه‌های *Citrus aurantium* است و به عنوان پرتقال ترش شناخته می‌شود. در طب سنتی ایران گلهای این گیاه در درمان بیماری‌های عصبی نظیر هیستری، تشنج و ضعف اعصاب استفاده

سلول‌های بنیادی عصبی توانایی متمایز شدن به اکثر سلول‌های مغزی را دارند و در بیماری‌های سیستم عصبی قادرند به نقاط آسیب دیده مهاجرت و در عمل ترمیم شرکت کنند (۱). در اطراف بطن‌ها لایه ای از سلول‌ها به نام آپاندیم وجود دارد که در اطراف این لایه سلول‌هایی با قدرت تکثیر و میتوز قابل رویت است این قابلیت تکثیر در اطراف بطن طرفی در مغز قدمای مشهود تر است لذا این منطقه را ساب گرانولوزا نیز می‌گویند. این سلول‌ها توانایی مهاجرت و خود تکثیری دارند و به آن‌ها سلول‌های بنیادی عصبی می‌گویند (۲). همچنین سلول‌های بنیادی عصبی را می‌توان از هیپوکمپ استخراج کرد (۳). تاکنون مطالعات زیادی بر روی سلول‌های بنیادی عصبی در گونه‌های مختلف انجام شده است در سال ۲۰۱۲ Liard و همکارانش توانستند سلول‌های بنیادی عصبی را که از اطراف بطن طرفی در مغز خوک استخراج شده را به صورت اتوگرفت پیوند نموده و نشان دادند که این سلول‌ها بیشتر به رده سلول عصبی تبدیل می‌شوند (۴). تحقیقات انجام شده به منظور کاربرد سلول‌های بنیادی عصبی در درمان بیماری‌های نورولوژیکی در طی چند سال اخیر پیشرفت چشم گیری

Citrus Aurantium تیمار سلول های بنیادی عصبی با عصاره

سلول های بنیادی عصبی ایزوله شده از هیبوکمپ نوزاد موش صحراجی در یک گروه کنترل و پنج گروه تیمار شده با عصاره مورد نظر در پیلتهای ۶۰ خانه با غلظتها ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۱۰۰، ۲۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ بدمت ۴۸ ساعت تیمار و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی های آماری دقیق ۴ تکرار و یک کنترل در نظر گرفته شد.

آزمون MTT: برای ارزیابی میزان تکثیر در سلول های بنیادی عصبی از روش 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) استفاده گردید. پس از ۴۸ ساعت تیمار با عصاره MTT هیدروالکلی گل بهار نارنج محیط کشت سلول ها با ۲۰ میکرولیتر محلول MTT (سیگما) با غلظت ۵ میلی گرم به ازای هر میلی لیتر که به صورت تازه تهیه شده بود، تجویض شد. بعد از ۴ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتیگراد محلول روی سلول ها به آهستگی حذف شد و کریستال های فورمازون ایجاد شده در اثر واکنش با MTT در ۱۰۰ میکرولیتر Dimethyl sulfoxide (DMSO) حل شد. پس از چند دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و حل شدن کامل کریستالها، جذب در ۵۷۰ نانومتر توسط دستگاه الایزا (BioTek) محاسبه شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 15.0 انجام گردید و تمامی داده ها به صورت SEM \pm ارائه شد. مقایسه آماری بین گروه ها با استفاده از آزمون Anova و آزمون تعقیبی Tukeys post hoc test تجزیه و تحلیل و $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج حاصل از کشت سلول های بنیادی عصبی: سلول ها وقتی در محیط مناسب کشت سلول بنیادی عصبی قرار گرفتند زوائد و استطاله هایی در سلول ایجاد گردید که گاهی چند برابر جسم سلولی مشاهده شد و با سلول های جانبی ارتیباط برقرار نمود. هسته ها کشیده تر بنظیر می رسید و سلول ها دوکی تر شده و در حالی که مرز بین سلول ها منظم تر و مشخص تر دیده شد. در روز اول ابتدا این سلول ها به صورت کلونی بودند که به کف بلیت چسبیده اند در روز دوم و سوم به مرور از حجم کلونی کاسته شد و سلولها کم پخش شدند و این در حالی بود که همچنان سلول ها قدرت تقسیم داشتند به این ترتیب تا حدودی ظاهر سلولها ویژگی های یک سلول شبه عصبی را بدست اوردنده که قدرت تقسیم داشتند. سلول های بنیادی عصبی بعد از ۷ روز کاملاً فلاسک را پر کردند و نمایی کشیده و دوکی شکل با زوائد سیتوپلاسمی به خود گرفتند (شکل ۱A و ۱B). این سلول ها قدرت تکثیر داشتند که برای اثبات عصبی بودن سلولهای NSCs و تعیین خلوص آنها در پاساز سوم از آنتی بادی Nestin استفاده گردید. در سلول هایی که پروتئین مربوطه وجود داشت به دلیل استفاده از آنتی بادی ثانویه کنزوکه به FITC سیتوپلاسمشان سبز رنگ دیده شد. برای تعیین درصد سلولهای مثبت، هسته سلول ها توسط اتیدیوم بروماید قرمز رنگ شدند (شکل ۱C و ۱D). میانگین درصد سلولهای مثبت برای پروتئین نستین $57 \pm 35\%$ ارزیابی شد.

نتایج MTT: مورفوگلوبولی سلول های بنیادی عصبی پس از تیمار با عصاره گیاهی تعییری نداشت. نتایج تست MTT نشان دهنده افزایش تکثیر سلول های بنیادی عصبی در گروه تیمار شده با عصاره گل بهار نارنج نسبت به گروه کنترل

می شود. همچنین این گیاه به عنوان آرام بخش، خواب آور، اشتها آور و بر طرف کننده تپش قلب شناخته شده است (۱۱). خواص آنتی باکتریال، آنتی فانگال و همچنین آنتی اکسیدانی این گیاه توسط محققین به اثبات رسیده است (۱۲). تاکنون هیچ گونه مطالعه ای درباره اثر بهار نارنج بر روی سلول های بنیادی عصبی صورت نگرفته است. در این مطالعه برای اولین بار تاثیر عصاره هیدروالکلی گل این گیاه بر روی تکثیر سلولهای بنیادی عصبی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها

جداسازی و کشت سلول های بنیادی عصبی: برای جداسازی سلول های بنیادی عصبی از نوزاد موش صحراجی نژاد Sprague استفاده گردید. مراقبت و نگهداری از موش ها مطابق با آینین نامه مصوب کار با حیوانات آزمایشگاهی تصویب شده در دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام گردید. بعد از بیهوشی کامل، بخش ساب گرانولوزا در هیبوکامپ از دنیمکره مغز جدا شده و پس از له کردن مکانیکی به میزان دو برابر بافت از آنزیم های Accutase و کلائز برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه به منظور هضم آنزیم استفاده گردید. به این ترتیب که در ۱۵ دقیقه ابتدایی تنها کلائناز و در ۱۵ دقیقه پایانی هر دو آنزیم به نمونه FBS اضافه گردید. در مرحله بعدی به منظور خشی کردن آنزیم ها از سرم basic FGF و کلائز برای مدت ۱۰ دقیقه در ۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ گردید. رسوب سلولی بدست آمده با محیط کشت DMEM/F12 حاوی فاکتورهای رشد Epidermal Growth Factor (bFGF) B27 Factor (EGF)، پنی سیلین استریوتومایسین یک درصد به همراه CO2 در انسکوپ با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و ۵ درصد سرم FBS در انکوباتور با این ترتیب کشت داده شد. محیط کشت سلول ها پس از ۲۴ ساعت تجویض شد و سلول های بنیادی عصبی که به کف فلاسک چسبیده بودند پس از رسیدن به تراکم ۷۰-۸۰ درصد با استفاده از تریپسین از کف فلاسک جدا و با نسبت ۱ به ۲ پاساز داده شدند. در این مطالعه از سلول های پاساز سوم استفاده گردید. تمامی مواد مورد استفاده از شرکت سیگما و اینویتروژن خریداری گردید (۱۳).

تهیه عصاره هیدروالکلی گل بهار نارنج: عصاره Aurantium به روش سوکسله تهیه و اثر غلظت های مختلف آن بر روی رشد و تکثیر دو رده سلولی بنیادی عصبی (NSCs) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور گیاه مورد نظر در فروردین ماه در شهر شیراز جمع آوری و در سایه و جریان هوا خشک و توسط آسیاب پودر شدند. از پودر تهیه شده برای عصاره گیری به روش سوکسله استفاده شد. بدین صورت که ۱۰۰ گرم از پودر آمده در کارتوشهایی که از کاغذ صافی معمولی با اندازه مناسب تهیه شده بود، ریخته شد. سپس کارتوشها را درون دستگاه سوکسله قرار داده و تقریباً به میزان ۳۰۰ میلی لیتر مخلوط مثانول و آب مقطرا به عنوان حلال به آن اضافه گردید. عصاره گیری به مدت ۱۲ ساعت ادامه یافت. عصاره بدست آمده به طرف های شیشه ای منتقل شده و به مدت ۲۴ ساعت بدون درپوش در آون درجه نگهداری شد تا حلال باقی مانده تا حد امکان تبخیر شود. سپس عصاره تهیه شده برای آزمایشها بعدی در یخچال نگهداری شد.

بحث و نتیجه گیری


نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تیمار سلول های بنیادی عصبی با عصاره هیدرولالکلی گل بهار نارنج برای مدت ۴۸ ساعت منجر به افزایش تکثیر سلول های بنیادی عصبی می شود. از آن جایی که هیچ گونه کار مشابهی تاکنون در ارتباط با تأثیر این عصاره بر روی سلول های بنیادی انجام نشده است بحث در این مورد تنها به نتایج این مطالعه محدود می شود. نستین که زیر مجموعه ای از اینترمیدیت فیلامنت هاست به طور کلی در حین تکامل سلول های عصبی ظاهر می شود در نتیجه در سلول های بنیادی عصبی نیز پروتئین نستین دیده می شود. این در حالی است که کاهش قابل توجهی در ظهور این پروتئین پس از تمایز سلولی به سمت انواع رده های سلولی بالغ وجود دارد (۱۴). بیان نستین در سلول های بنیادی عصبی ایزوله شده از هپیوکمپ در این مطالعه نیز تاییدی بر نتایج بدست آمده در مطالعات مشابه می باشد. ترکیبات تشکیل دهنده موجود در گل بهار نارنج حاکی از وجود آکالوئید، لینانول، لینانیل استات، مسیرین، لیمونن و لیمونوئید و درصد قابل توجهی از فلاونوئیدها می باشد (۱۵)، لینانول در حفاظت حیوان از حمله های صرعی القا شده در موش های سوری نقش موثری دارد (۱۶-۱۸). همچنین انسان این گیاه باعث اثرات ضد اضطرابی و شبیه ضد افسردگی در موش های سوری می شود. عامل موثر این فعالیت ها عمدتاً لیمونن موجود در گیاه شناخته شده است که از طریق گیرنده ۵-HT_{1A} اثر آرام بخشی خود را اعمال می کند (۱۷).

مطالعات دیگر نیز حاکی از اثر آرامش بخشی و ضد تشنیجی لیمونن در مدل های حیوانی می باشد (۱۶). اثرات ضد اضطرابی و آرام بخشی آن در مطالعات انسانی نیز تایید شده است (۱۹). میسرین یا بتا- میسرین موجود در گیاه یک ترکیب متوفپنی است که دارای اثرات ضد دردی، بلوه کنندگی کانال سدیمی و لذای (۲۰) و شل کننده عضلات (۲۲) می باشد. فلاونوئیدهای موجود در گیاهان تاثیرات فارماکولوژیک وسیعی از جمله ممانعت از اکسیداسیون لیپوپروتئین های با وزن مولکولی پایین، جلوگیری از تجمع پلاکت ها و همچنین پایداری سلول های ایمنی را دارا هستند. لذا در درمان ناراحتی های روانی، عفونت های ویروسی، تورم و آرژی استفاده می شوند (۲۲). از آن جایی که تاکنون هیچ بررسی مشابهی انجام نشده، در رابطه با نتیجه حاصل در این بررسی مقایسه بین نتایج این تحقیق و نمی توان بحث زیادی انجام داد و ارائه نظرات قطعی تر در مورد چگونگی حصول این نتیجه مستلزم انجام آزمایشات بیش تر از جمله بررسی اثر ترکیبات موجود در عصاره به صورت مجزا بر روی تکثیر سلول های بنیادی عصبی است. نتیجه گیری کلی از این تحقیق این است که عصاره هیدرولالکلی گل بهار نارنج دارای خاصیت میتوژنیک بوده و باعث افزایش روند تکثیر سلول های بنیادی عصبی در محیط *In vitro* می شود. تأثیر این عصاره بر روی تکثیر سلولی بستگی به غلظت آن در محیط کشت دارد. همچنین با انجام بررسی های بیشتر به کاربرد این گیاه در سلول درمانی بیماری های مخرب سیستم عصبی می توان امیدوار بود.



تقدیر و تشکر

بدینوسیله از حمایت های بی دریغ آقای دکتر سید سعید هاشمیان (معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) تشکر و قدردانی می گردد.

بود (شکل ۲). افزایش تکثیر وابسته به غلظت عصاره می باشد. افزایش غلظت عصاره بیش از ۶۰۰ میکروگرم در میلی لیتر باعث کاهش تعداد سلول می شود که می تواند به دلیل افزایش توکسیسیتی در محیط باشد. سلول های تیمار شده با ۵۷۰ غلظت ۶۰۰ میکروگرم ($P<0.05$) بالاترین میانگین رشد (جذب در ۵۷۰ نانومتر) را نشان داد که نسبت به گروه کنترل ($P=0.02$) اختلاف معنی داری را نشان می دهد (شکل ۲). نتایج آزمون MTT برای غلظت های را نشان می دهد ($P<0.05$) (شکل ۲). نتایج آزمون MTT برای غلظت های ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم به ترتیب 0.76 ± 0.04 ، 0.72 ± 0.04 ، 0.73 ± 0.05 و 0.74 ± 0.04 بدست آمد.



شکل ۱: تصاویر مربوط به سلول های بنیادی عصبی. تصویر A سلول های بنیادی عصبی را پس از یک روز نشان می دهد که به صورت کلونی های چسپیده به گف پلیت دیده می شود. تصویر B سلول های بنیادی عصبی را پس از یک هفته نشان می دهد. این سلول ها کف فلاسک را پر کرده و حالت کشیده و دوکی شکل می باشند. تصاویر C و D ایمونوستیتوشیمی از سلول های بنیادی عصبی به ترتیب فاز کنتراست و فلورسنت. رنگ سبز نشان دهنده آنتی بادی نستین و رنگ قرمز آتیدیوم برماید می باشد. بزرگنمایی ۲۰۰ برابر می باشد.



شکل ۲: (A) مقایسه سلولهای بنیادی عصبی در غلظت های مختلف با روش MTT: (A) نمودار نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار میان گروه کنترل و سلولهای بنیادی عصبی تیمار شده با غلظت $600 \mu\text{g/ml}$ می باشد. (B,C) میکروگرافهای سلولهای بنیادی عصبی قبل و بعد از تیمار با غلظت $600 \mu\text{g/ml}$ عصاره گل قاصدک. خطای (SEM)، نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار با گروه کنترل ($P<0.05$). بزرگنمایی تصاویر ۲۰۰ برابر می باشد.

In Vitro Evaluation of Hydroethanolic Extracts of Citrus Aurantium on Proliferative Rate of NSCs

A.R. Abdaniipour (PhD)^{1*}, B. Shadman (MSc)², F. Salimi Nanehkaran (PhD)¹,
R. Bonabi (MSc)¹, A. Norian (BSc)²

1. Stem Cells Research Laboratory, Faculty of Medicine, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2. Young Researchers and Elite Club, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

J Babol Univ Med Sci; 16(7); Jul 2014; pp: 36-40

Received: Dec 1st 2013, Revised: Jan 5th 2014, Accepted: Mar 6th 2014.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The use of an appropriate stimulus to speed up in vitro and in vivo stem cell proliferation and growth is the one of the most important issues in cell therapy. The aim of this study was in vitro evaluation of hydroethanolic extraction of citrus aurantium on proliferation and growth rates of neonate rat neural stem cells.

METHODS: Neural stem cells were isolated using enzymatic digestion from hippocampus region of 3 day old neonatal rat brain. To determine optimal concentration of citrus aurantium extraction, isolated neural stem cells were treated at 200, 400, 600, 800 and 1000 µg/ml for 48 h. Then cells proliferation rate were evaluated using MTT assay method.

FINDINGS: Citrus aurantium promoted neural stem cells proliferation compared to untreated cells. As well as the effect of aurantium extract is dose dependent. The result of this study showed that proliferative rate in treated cells with 600 µg/ml of Citrus aurantium extraction (0.81 ± 0.06) significantly is higher than control (untreated neural stem cells) group (0.59 ± 0.02). ($p < 0.05$)

CONCLUSION: Regarding the effect of Citrus aurantium extract on the proliferation rate of neural stem cells, the use of hydroethanolic extraction of Citrus aurantium can be useful for clinical purposes to cell replacement therapy of various neurodegenerative disorders such as spinal cord injury.

KEY WORDS: *Citrus aurantium, Neural stem cells, Cell proliferation, Cell therapy.*

Please cite this article as follows:

Abdaniipour AR, Shadman B, Salimi Nanehkaran F, Bonabi R, Norian A. In Vitro evaluation of hydroethanolic extracts of citrus aurantium on proliferative rate of NSCs. J Babol Univ Med Sci 2014;16(7): 36-40.

* Corresponding Author; A.R. Abdaniipour (PhD)

Address: Stem Cells Research Laboratory, Faculty of Medicine, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Basij Sq., Ardabil, Iran

Tel: + 98 451 7728020

E-mail: abdani.anatomy@yahoo.com

References

- 1.Hermann A, Gastl R, Liebau S, et al. Efficient generation of neural stem cell-like cells from adult human bone marrow stromal cells. *J Cell Sci* 2004; 117(19):4411-22.
- 2.Gritti A, Vescovi AL, Galli R. Adult neural stem cells: plasticity and developmental potential. *J Physiol Paris* 2002;96(1-2):81-90.
- 3.Seaberg R. M, van der Kooy D. Adult rodent neurogenic regions: the ventricular subependyma contains neural stem cells, but the dentate gyrus contains restricted progenitors. *J Neurosci* 2002;22(5):1784-93.
- 4.Liard O, Segura S, Sagui E, et al. Adult-brain-derived neural stem cells grafting into a vein bridge increases postlesional recovery and regeneration in a peripheral nerve of adult pig. *Stem Cells* 2012;2012:128732.
- 5.Trounson A, Thakar RG, Lomax G, Gibbons D. Clinical trials for stem cell therapies. *BMC Med* 2011;9:52.
- 6.Yanagisawa M, Yu RK. The expression and functions of glycoconjugates in neural stem cells. *Glycobiology* 2007;17(7):57-74.
- 7.Sharma HS. New perspectives for the treatment options in spinal cord injury. *Expert Opin Pharmacother* 2008;9(16):2773-800.
- 8.Zhu Y, Wan S, Zhan RY. Inducible pluripotent stem cells for the treatment of ischemic stroke: current status and problems. *Rev Neurosci* 2012;23(4):393-402.
- 9.Bhasin A, Padma Srivastava MV, Mohanty S, Bhatia R, Kumaran SS, Bose S. Stem cell therapy: a clinical trial of stroke. *Clin Neurol Neurosurg* 2012;115(7):1003-8.
- 10.Banerjee S, Williamson DA, Habib N, Chataway J: The potential benefit of stem cell therapy after stroke: an update. *Vasc Health Risk Manag* 2012;8:569-80.
- 11.LM Lopes C, Gonçalves e Sá C, de Almeida AA, et al. Sedative, anxiolytic and antidepressant activities of itrus limon (Burn) essential oil in mice. *Pharmazie* 2011;66(8):623-7.
- 12.Ammar AH, Bouajila J, Lebrihi A, Mathieu F, Romdhane M, Zagrouba F. Chemical composition and in vitro antimicrobial and antioxidant activities of Citrus aurantium l. flowers essential oil (Neroli oil). *Pak J Biol Sci* 2012;15(21):1034-40.
- 13.Waldron J, Lecanu L. Age and sex differences in neural stem cell transplantation: a descriptive study in rats. *Stem Cells Cloning* 2011;2011:25-37.
- 14.Zimmerman L, Parr B, Lendahl U, et al. Independent regulatory elements in the nestin gene direct transgene, expression to neural stem cells or muscle precursors. *Neuron* 1994;12(1):11-24.
- 15.Faturi CB, Leite RJ, Alves PB, Canton AC, Teixeira-Silva F. Anxiolytic-like effect of sweet orange aroma in Wistar rats. *Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry* 2010; 34(4):605-9.
- 16.Elisabetsky E, Brum LF, Souza DO. Anticonvulsant properties of linalool in glutamate-elated seizure models. *Phytomedicine* 1999;6(2):107-13.
- 17.Komiya M, Takeuchi T, Harada E. Lemon oil vapor causes an anti- stress effect via modulating the 5-HT and DA activities in mice. *Behav Brain Res* 2006;172(2):240-9.
- 18.Fukumoto S, Morishita A, Furutachi K, Terashima T, Nakayama T, Yokogoshi H. Effect of flavour components in lemon essential oil on physical or psychological stress. *Stress Health* 2008;24(1):3-12.
- 19.Sugawara Y, Hara C, Tamura K, et al. Sedative effect on humans of inhalation of essential oil of linalool. Sensory evaluation and physiological measurements using optically active linalool. *Anal Chim Acta* 1998;365(1-3): 293-9.
- 20.Haeseler G, Maue, D, Grosskreutz, J, et al. Voltage-dependent block of neuronal and skeletal muscle sodium channels by thymol and menthol. *Eur J Anaesthesiol* 2002;19(8):571-9.
- 21.Do Vale TG, Furtado EC, Santos JG Jr, Viana GS. Central effects of citral, myrcene and limonene, constituents of essential oil chemotype from Lippia Alba (Mill) n.e. Brown. *Phytomedicine* 2002;9(8):709-14.
22. Da Silva VA, de Freitas JC, Mattos AP, et al. Neurobehavioral study of the effect of beta-myrcene on rodents. *Braz J Med Biol Res* 1991;24(8):827-31.