

گزارش یک مورد پیج خوردگی کیست تخدمان و حاملگی خارج از رحم همزمان در ادنکس راست به دنبال حاملگی خودبخودی

نیره قمیان (MD)^۱، عاطفه علامتیان (MD)^۲، مریم غفاریان امید (MD)^۳

۱- مرکز تحقیقات نوزادان و مادران، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲- گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دریافت: ۹۶/۴/۲۸، اصلاح: ۹۶/۳/۲۰، پذیرش: ۹۶/۴/۲

خلاصه

سابقه و هدف: پیج خوردگی تخدمان در ۲/۲٪ و حاملگی خارج رحم در ۷٪ تمام حاملگی‌ها اتفاق می‌افتد که هر دو به عنوان اورژانس‌های ژنیکولوژی شناخته می‌شوند. وقوع همزمان این دو مورد نادر است. مطالعه حاضر گزارش یک مورد پیج خوردگی تخدمان و حاملگی خارج رحم همزمان می‌باشد.

گزارش مورد: بیمار خانم ۳۱ ساله بارداری سوم با سابقه دوار سقط می‌باشد که با سابقه رتارد قاعدگی ۶ هفته‌ای و خونریزی واژینال از یک روز قبل و درد شکمی کولیکی همراه با دنبوب تهوع و استفراغ مراجعه کرد. در سونوگرافی انجام شده کیست ۵۴×۶۰ میلیمتر در تخدمان راست و مایع آزاد متوسط در کلدوساک گزارش شد و سطح β HCG سرم بیشتر از ۱۰۰۰ بود. به علت تشدید درد شکم، لاپاراتومی اورژانس انجام شد که حاملگی خارج از رحم پاره شده آمپول لوله راست با خونریزی فعال و کیست ۶×۷ سانتیمتری همان سمت که دو دور پیج خوردگی داشت مشهود بود. پیج خوردگی باز و سالپیتکتومی راست و کیستکتومی انجام شد. بیمار ۴۸ ساعت پس از عمل جراحی با حال عمومی خوب و بدون عارضه مخصوص گردید و در طی ۶ هفته پیگیری پس از عمل نیز مشکلی نداشت.

نتیجه‌گیری: وقوع همزمان حاملگی خارج از رحم و پیج خوردگی تخدمان نادر می‌باشد، اما احتمال وقوع دارد. بنابراین تشخیص زودرس برای حفظ باروری آینده و تخدمان اهمیت دارد که با اقدام مناسب درمانی می‌توان از عوارض ناخواسته در این بیماران پیشگیری کرد.

واژه‌های کلیدی: حاملگی خارج از رحم، پیج خوردگی تخدمان، لاپاراتومی، حاملگی، کیست تخدمان.

مقدمه

پیج خوردگی همچنین یکی از علل جراحی‌های اورژانس زنان می‌باشد. و شیوه آن ۲/۷ درصد می‌باشد^(۱). پیج خوردگی تخدمان در زنان در تمامی سنین اتفاق می‌افتد^(۲). اما حاملگی خارج از رحم فقط در سنین باروری رخ می‌دهد وقوع همزمان پیج خوردگی و حاملگی خارج از رحم نادر می‌باشد^(۳). تاکنون فقط چند مورد از وقوع همزمان آن‌ها گزارش شده است^(۴). DiLuigi و همکاران برای اولین بار موردی از حاملگی اکتوپیک پاره شده با پیج خوردگی آدنکس در سمت مقابل را در خانم ۲۳ ساله پس از حاملگی خود به خود گزارش نمودند که در لاپاراتومی اورژانس انجام شده، پیج خوردگی آدنکس چپ و حاملگی اکتوپیک پاره شده سمت راست وجود داشت^(۵). Murat و همکاران مورد نادری از حاملگی گزارش نمودند که در لاپاراتومی انجام شده سالپیتکتومی راست و باز کردن پیج خوردگی تخدمان و کیستکتومی صورت گرفته بود^(۶). Mohapatra و همکاران موردی از پیج خوردگی آدنکس در یک خانم ۲۴ ساله با حاملگی هترووتوبیک را گزارش نمودند که پیج خوردگی آدنکس چپ و حاملگی اکتوپیک در همین سمت وجود داشت که سالپنکوآوفورکتومی انجام شده و حاملگی داخل رحم ادامه یافته بود^(۷). DeCherney و همکاران موردی از حاملگی آدنکس مقابله را در خانم ۳۱ ساله به دنبال اینداکشن اولویشن و تلقیح خوردگی آدنکس مقابل را در خانم ۳۱ ساله به دنبال اینداکشن اولویشن و تلقیح

حاملگی خارج از رحم و پیج خوردگی تخدمان هر دو از اورژانس‌های ژنیکولوژی می‌باشند^(۸) (۱) حاملگی خارج از رحم به لانه گرینی ساک حاملگی خارج از رحم اطلاق می‌شود^(۹). شیوه حاملگی خارج از رحم ۰/۲٪ از تمام حاملگی‌ها در ایالات متحده آمریکا می‌باشد. هنوز یکی از دلایل مورتالیتی زنان در سه ماهه اول، حاملگی خارج از رحم پروفوره می‌باشد^(۱۰). سنجش میزان ادراری و سرمی β HCG و سونوگرافی ترانس واژینال تشخیص سریع تر حاملگی اکتوپیک را امکان پذیر ساخته اند^(۱۱). آنatomی غیر طبیعی لوله فالوب زمینه ساز بسیاری از موارد حاملگی خارج از رحم می‌باشد^(۱۲). جراحی‌های صورت گرفته برای حاملگی لوله ای قبلی و عقیم سازی نیز جز عوامل خطر می‌باشند^(۱۳). سابقه بیماری التهاب لگن، تباروری، استفاده از تکنیک‌های کمک باروری جز سایر عوامل خطر حاملگی خارج از رحم می‌باشد^(۱۴). تظاهرات بالینی در صورت تاخیر در تشخیص با تریاد تاخیر در خونریزی قاعدگی، درد و خونریزی واژینال می‌باشد^(۱۵). ولی در حال حاضر با استفاده از سونوگرافی ترانس واژینال و تیزیاز β HCG تشخیص سریع تر امکان پذیر شده است^(۱۶). پیج خوردگی تخدمان ناشایع می‌باشد و به پیج خوردن کامل یا نسبی تخدمان حول پایه عروقی خود و انسداد جریان خون وریدی و شریانی اطلاق می‌شود^(۱۷). به طور شایع پیج خوردگی تخدمان با کیست یا تومور تخدمان همراهی دارد که در بیشتر موارد کیست ماقور، تراوتوم می‌باشد.

مسئول مقاله: دکتر نیره قمیان

ادرس: مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات نوزادان و مادران. تلفن: ۰۵۱-۳۸۵۳۸۵۹

E-mail: ghomiann@mums.ac.ir

پس از دو ساعت بستری درد بیمار تشید شد در سونوگرافی داپلر انجام شده جریان خون وریدی و شریانی در کیست تخدمان راست مشاهده نگردید با توجه به گزارش سونوگرافی داپلر و احتمال پیچ خورده‌ی کیست تخدمان بیمار تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت. پس از برش فان اشتیل حدود ۱۰۰ سی سی خون داخل شکم بود. حاملگی خارج از رحم پروفوره ۲ در ۳ سانتیمتری در ناحیه آمپول لوله راست در حال خونریزی فعال بود، که سالپیتکتومی راست انجام شد. کیست ۷×۶ سانتیمتری در تخدمان راست که دو دور پیچ خورده‌ی به دور پایه عروقی اینفادنیبولاپلوبیک داشت، مشاهده گردید که نکروز و گانگرن ایجاد نشده بود. ابتدا پیچ خورده‌ی باز و سپس کیستکتومی با حفظ تخدمان انجام شد. جواب پاتولوژی کیست جسم زرد همزمان با حاملگی خارج از رحم پاره شده بود. بیمار پس از ۴۸ ساعت بستری در بیمارستان با حال عمومی خوب و بدون مشکل خاص ترخیص گردید و در طی ۶ هفته پیگیری بعدی نیز عارضه خاصی نداشت.

بحث و نتیجه گیری

در این مورد گزارش شده حاملگی خارج از رحم و پیچ خورده‌ی تخدمان هر ۲ در یک طرف وجود داشت. در اکثر موارد گزارش شده در مقالات قبلی حاملگی اکتوپیک در یک سمت و پیچ خورده‌ی آدنکس در سمت مقابل وجود داشته است (۱-۳). ریسک فاکتورهای پیچ خورده‌ی تخدمان شامل توده تخدمانی و بزرگی کیست جسم زرد و تحریک بیش از حد تخدمان و بارداری می باشد(۴) در حقیقت ۱۲تا ۱۸ درصد از موارد پیچ خورده‌ی تخدمان در طی بارداری رخ می دهد.(۵) در اکثر مواردی که تا به حال گزارش شده است پیچ خورده‌ی تخدمان سمت راست غالب بوده است(۲).

دو تئوری در توضیح این مورد وجود دارد، اول اینکه تخدمان چپ به علت وجود سیگموئید قابلیت تحرک کمتری دارد و دوم اینکه تفاوت سیستم درناز وریدی در تخدمان وجود دارد(۳). پیچ خورده‌ی تخدمان دارای دو نوع کامل یا نسبی می باشد که تخدمان حول پایه عروقی خود پیچ می خورد. انسداد وریدی یا لغافیک ایجاد شده به استانز فلوی شریانی و در نهایت احتقان استرومای تخدمان همورازیک انفارکشن و گانگرن و نکروز منجر می شود(۶). علائم پیچ خورده‌ی غیر اختصاصی بوده و به طور کلاسیک در قسمت تحتانی شکم تندرنس در معاینه و علائم پریتونال وجود دارد(۷).

در بیماران با پیچ خورده‌ی درد شکم در ۱۰۰ درصد موارد استفراغ ۸۵ درصد موارد لکوسیتوز در ۵۶ درصد موارد و افزایش دمای بدن در ۱۸ درصد موارد وجود دارد(۱). مطالعات تصویربرداری می تواند کمک کننده باشد سونوگرافی داپلر در ۴۰ درصد موارد تشخیصی می باشد. این نوع سونوگرافی حساسیت کم ولی اختصاصیت بالا دارد. همه موارد با فقدان یا کاهش جریان در سیستم داپلر زمانی که با تشخیص پیچ خورده‌ی تحت لاپاراتومی قرار می گیرند به طور ۱۰۰ درصد پیچ خورده‌ی بوده اند. ولی پزشکان باستی این نکته را مدنظر داشته باشند که فقدان گزارش پیچ خورده‌ی در داپلر رد کننده آن نمی باشد(۲). تشخیص اصلی پیچ خورده‌ی تخدمان باستی بر اساس شک بالینی باشد(۱).

در گذشته رادیکال سالپنگوفورکتومی بدون بازکردن اولیه پیچ خورده‌ی انجام میشد که عدم انجام آن به علت ترس از آمبولی مواد نکروتیک از پدیکول پیچ خورده بود(۱۲). در طی سالهای اخیر هیچ موردی از حوادث ترومبوآمبولیک ناشی


داخل رحمی گزارش نمودند(۳). اکثر مواردی که حاملگی خارج از رحم همراه با پیچ خورده‌ی آدنکس گزارش شده پیچ خورده‌ی در آدنکس مقابله بوده است، در حالیکه در بیمار ما پیچ خورده‌ی آدنکس و حاملگی خارج از رحم در یک سمت بوده است(۳) در این جا به معرفی بیماری می پردازیم که در سن حاملگی ۶ هفته دچار حاملگی خارج از رحم پاره شده همزمان با پیچ خورده‌ی آدنکس به دنبال حاملگی خود بخود شده است که با تشخیص به موقع، اقدام مناسب جراحی شامل سالپیتکتومی و کیستکتومی برای بیمار انجام شد. هدف از این گزارش معرفی ۲ مورد اورژانس شکمی همزمان می باشد.

گزارش مورد

بیمار خانم ۳۱ ساله بارداری سوم با سابقه دو بار سقط با خونریزی واژینال در حد لکه بینی از ۲۴ ساعت قبل از مراجعته و درد شکمی در ناحیه LLQ از چند ساعت قبل، به بیمارستان مراجعه کرده بود سن حاملگی بر اساس تاریخ آخرین قاعده‌ی عهفتنه بود. درد شکم ابتدا به صورت کولیکی و به تدریج مداوم شده بود ۸ تهوع و استفراغ را دو نوبت ذکر می کرد، سرگیجه نداشت. سابقه دو نوبت سقط ۸ سال و ۷ سال قبل داشته و یک نوبت کورتاژ شده بود. علائم حیاتی در بد و ورود پایدار بوده PR=۹۰، T=۳۷، BP=۱۱۰/۷۰ و در معاینه شکم نرم تندرنس مختصر RLQ داشت. در معاینه دو دستی تندرنس حرکات سروپیکس وجود نداشت. خونریزی واژینال در حد لکه بینی در آزمایشات انجام شده mIU/ml HCT=۵۱×۱۱۰ mg/dl WBC=۱۰,۰۰۰ BCG=۱۴۶۸ میلیمتر اندومتریال لاین ۱۱ میلیمتر و ساک حاملگی در رحم وجود نداشت کیست حاوی خونریزی داخلی به ابعاد ۵۱×۶۰ میلیمتر در تخدمان راست و ساک حاملگی حاوی فتال بل در لوله همان سمت و مایع آزاد به میزان متوسط در کلدوساک خلفی وجود داشت (شکل ۱).



شکل ۱. کیست تخدمان راست همراه با حاملگی اکتوپیک لوله راست



شکل ۲. رحم همراه با تجمع مایع در کلدوساک خلفی

حامنگی اکتوپیک پاره شد با پیچ خوردن آدنکس در سمت مقابل را در خانم ۲۶ ساله گزارش نمودند که در لاپاراتومی انجام شده سالپیتکتومی راست و باز کردن پیچ خوردنی تخدمان و کیستکتومی صورت گرفته بود(۱). در بیمار ما برخلاف Mohapatra و همکاران موردی از پیچ خوردنی آدنکس در یک خانم ۲۴ ساله با حاملگی هتروتوبیک را گزارش نمودند که پیچ خوردنی آدنکس چپ و حاملگی اکتوپیک در همین سمت وجود داشت که سالپنگواؤوفورکتومی انجام شده و حاملگی داخل رحم ادامه یافته بود(۳).

در این مورد گزارش شده، همانند بیمار ما حاملگی اکتوپیک و پیچ خوردنی تخدمان هر دو در یک سمت بود. DeCherney و همکاران نیز موردی از حاملگی هتروتوبیک و پیچ خوردنی آدنکس مقابل را در خانم ۳۱ ساله به دنبال اینداکشن اولویشن و تلقیح داخل رحمی گزارش نمودند(۳). اکثر مواردی که حاملگی خارج از رحم همراه با پیچ خوردنی آدنکس گزارش شده پیچ خوردنی در آدنکس مقابل بوده است، در حالیکه در بیمارما پیچ خوردنی آدنکس و حاملگی خارج از رحم در یک سمت بوده است(۳). وقوع همزمان حاملگی خارج از رحم و پیچ خوردنی تخدمان نادر می باشد و هر دو اورژانس زنان می باشند. تشخیص زودرس برای حفظ باروری آینده و تخدمان اهمیت دارد و از بروز عوارض ناخواسته پیشگیری می نماید.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت حمایت از این تحقیق، همچنین از بیماری که اطلاعات خود را جهت نشر در مجله در اختیار ما قرار داده و پرسنل بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، تقدیر و تشکر می گردد.

از بازکردن پیچ خوردنی گزارش نشده است. در نتیجه در حال حاضر درمان نگهدارنده جهت حفظ قدرت باروری توصیه می شود. حتی برای تخدمان هایی که در ابتداء غیر قابل حیات به نظر می رستندو به رنگ بنشش یا سیاه تعییر رنگ پیدا کرده اند کیستکتومی و باز کردن پیچ خوردنی درمان اول محسوب می شوند در زنانی که تمایل به حفظ بارداری ندارند سالپنگواؤوفورکتومی توصیه می شود(۲). تقریباً ۲ درصد از تمام بارداری ها حاملگی خارج از رحم می باشد و همچنان یکی از دلایل عدمه مرگ در سه ماه اول بارداری می باشد تشخیص اولیه حاملگی خارج از رحم می تواند سخت باشد این تشخیص ابتدایی بر اساس معاینه بالینی و شرح حال و تیتراز β HCG و یافته های سونوگرافیک می باشد. تیتراز β HCG زیر ۱۵۰۰ در ترکیب با ترانس واژنیال سونوگرافی حساسیت ۱۰۰ درصد و اختصاصیت ۹۹ درصد دارد(۴).

در بیمار معرفی شده سابقه نازایی یکی از ریسک فاکتورهای حاملگی خارج از رحم می باشد در شرایط پایدار بیماران با تشخیص حاملگی خارج از رحم می توانند کاندید دریافت متواترکسات شوند و در شرایط غیر پایدار کاندید لاپاراسکوپی و لاپاراتومی می باشند(۱۱). همراهی حاملگی خارج از رحم و پیچ خوردنی تخدمان نادر می باشد(۱). ازانجاییکه تأخیر در تشخیص پیچ خوردنی می باشد منجر به از دست رفتن تخدمان و کم شدن قدرت باروری فرد شود بیمارانی که با علائم غیر اختصاصی مانند درد قسمت تحتانی شکم تهوع و لکوستیوز DiLuigi و همکاران یک مورد از حاملگی اکتوپیک پاره شده با پیچ خوردنی آدنکس در سمت مقابل را در خانم ۲۳ ساله پس از حاملگی خود به خود گزارش نمودند که در لاپاراتومی اورژانس انجام شده، پیچ خوردنی آدنکس چپ و حاملگی اکتوپیک پاره شده سمت راست وجود داشت(۲). پیچ خوردنی آدنکس در سمت راست معمولاً شایع تراست در بیمار ما نیز پیچ خوردنی آدنکس و حاملگی اکتوپیک نیز هر دو در سمت راست وجود داشت. Murat و همکاران نیز مورد نادری از

Report of a Case with Simultaneous Ovarian Cyst Torsion and Ectopic Pregnancy in the Right Adnexa after Spontaneous Pregnancy

N. Ghomian (MD)^{*1}, A. Alamatian (MD)², M. Gaffarian Omid (MD)²

1.Neonates and Mothers Research Center, Mashad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R.Iran

2.Department of Midwifery and gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R.Iran

J Babol Univ Med Sci; 19(8); Aug 2017; PP: 69-73

Received: Apr 22th 2017, Revised: Jun 10th 2017, Accepted: July 19th 2017.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Ovarian torsion and ectopic pregnancy occur in 2.7 and 2% of all pregnancies, respectively, and both are known as gynecologic emergencies. The simultaneous occurrence of these two cases is rare. This study reports a case with simultaneous ovarian torsion and ectopic pregnancy.

CASE REPORT: The patient is a 31-year-old woman with history of two abortions, who referred with a history of 6-week missed menstrual period and vaginal bleeding from one day before and abdominal colic pain accompanied by two occasions of nausea and vomiting. In ultrasonography, cyst was reported to be 54 × 60 mm in right ovary and moderate free fluid was found in cul de sac, while serum HCG β levels were more than 1000. Due to the exacerbation of abdominal pain, emergency laparotomy was performed, which revealed ruptured ectopic pregnancy and ovarian torsion with active bleeding and a 7×6 cm cyst in the same side with two rounds of torsion. Open torsion, right salpingectomy and cystectomy were performed. The patient was discharged 48 hours after the operation with a good general condition and without serious complication, and there was no problem during the 6-week postoperative follow-up.

CONCLUSION: Simultaneous occurrence of ovarian torsion and ectopic pregnancy is rare, but it is likely to occur. Therefore, early diagnosis to maintain future pregnancies and preserve the ovary is important and suitable medical measures may prevent the unwanted side effects in these patients.

KEYWORDS: *Ectopic Pregnancy, Ovarian torsion, Laparotomy, Pregnancy, Ovarian cyst.*

Please cite this article as follows:

Ghomian N, Alamatian A, Gaffarian Omid M. Report of a Case with Simultaneous Ovarian Cyst Torsion and Ectopic Pregnancy in the Right Adnexa after Spontaneous Pregnancy. J Babol Univ Med Sci. 2017;19(8):69-73.

* Corresponding author: N. Ghomian (PhD)

Address: Neonates and Mothers Research Center, Mashad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R.Iran

Tel: +98 51 38538659

E-mail: ghomiann@mums.ac.ir

References

- 1.M Ekin, C Kaya, H Cengiz, L Yasar, K Dogan. A rare case: ruptured ectopic pregnancy with contralateral adnexal torsion. *Olgu Sunumları*. 2015;107(11):29-32.
- 2.Andrea J, D Maier, Andrea J. C Benadiva. Ruptured ectopic pregnancy with contralateral adnexal torsion after spontaneous conception. *Fertil Sterilit*. 2008;90(5):2007.
- 3.De Cherney, Eichhorn AJ. Case 3-1996: severe abdominal pain during early pregnancy in a woman with previous infertility. *New Eng J Med*. 1996;334(4): 255-60.
- 4.JE Peña, D Ufberg, AL Denis. Nancy cooney usefulness of doppler sonography in the diagnosis of ovarian torsion. *Fertililit sterilit*. 2000;73(5):1047-50.
- 5.Shadinger LL, Andreotti RF, Kurian RL. Preoperative sonographic and clinical characteristics as predictors of ovarian torsion. *J Ultrasound Med*. 2008;27(1):7-13.
- 6.Hannah C, Bhatt S, Dogra VS. Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. *Radiograph*. 2008;28(5):1355-68.
- 7.Kolluru V, Gurumurthy R, Vellanki V, Gururaj D. Torsion of ovarian cyst during pregnancy. *Cases J*. 2009;2:9405
- 8.Ben-Ami MY, Perlitz S. The effectiveness of spectral and color Doppler in predicting ovarian torsion: a prospective study. *Eur J Obstetri Gynecol Reproduct Biol*. 2002;104(1):64-6.
- 9.Albayram F, Hamper UM. Ovarian and adnexal torsion: spectrum of sonographic findings with pathologic correlation. *J Ultrasound Med*. 2001;20(10):1083-89.
- 10.PanLee-Wen HS, Lee Jiann-Loung H, Chang H. Ovarian pregnancy torsion. *Arch Gynecol Obes*. 2004;270(2):119-21.
- 11.Sasaki KJ, Miller CE. Adnexal torsion: review of the literature. *J Minim Invasive Gynecol*. 2014;21(2):196-202.
- 12.Insunza A, De Pablo F, Croxatto H, Letelier M, Morante M, Croxatto H. On the rate of tubal pregnancy contralateral to the corpus luteum. *Acta Obste Gynecol*. 1988;67(5):433-6.
- 13.Mohapatra K, Mishra S, Sahoo B, Marandi B, Sen R, Sagarika N. Adnexal torsion in a heterotopic pregnancy: a rare clinical entity with diagnostic dilemma. *Int J Reproduc Contracep Obs Gynecol*. 2016;5(1):232-6.