

## بررسی ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر قلب در بیماران تحت عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر در شهرستان بابل

کاترین بهزاد (MD)<sup>۱</sup>، ساعده ذاکری (MD)<sup>۲</sup>، حمیدرضا وفايي (MD)<sup>\*</sup>

۱- واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

۲- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

دریافت: ۹۷/۴/۱۶، اصلاح: ۹۷/۹/۱۳، پذیرش: ۹۷/۱۱/۶

### خلاصه

**سابقه و هدف:** آگاهی از میزان شیوع ریسک فاکتورهای قابل اصلاح بیماری های قلبی عروقی و سعی در اصلاح و کنترل آن می تواند در کاهش احتمال وقوع بیماری قلبی عروقی پیشرفته که منجر به جراحی های سنگین و پرعارضه می شود مؤثر باشد. از آنجائیکه ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی پیشرفته در شمال ایران چندان مشخص نیست، این مطالعه به منظور بررسی ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر قلب در بیماران تحت عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر در شهرستان بابل انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** این مطالعه مقطعی بر روی ۴۶۰ نفر از بیمارانی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۴ در بیمارستان آیت‌الله روحانی شهرستان بابل تحت عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر قلب قرار گرفته‌اند، انجام شد. ریسک فاکتورهای قابل اصلاح بیماری کرونری قلب با توجه به اطلاعات ثبت شده در پرونده‌های پزشکی بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.

**یافته‌ها:** شیوع فشار خون در کل نمونه ۵۶/۷۴٪ (۲۶۱ نفر)، شیوع هیپرلیپیدمی ۳۲/۶۱٪ (۱۵۰ نفر) و شیوع دیابت ۳۸/۹۱٪ (۱۷۹ نفر) بوده است. ۳۱/۰۹٪ (۱۴۳ نفر) از بیماران سابقه انفارکتوس میوکارد در گذشته داشته‌اند. ۱۲/۶٪ (۵۸ نفر) از بیماران از سیگار استفاده می‌کرده‌اند که تمامی آنها مرد بودند. از نظر توزیع جنسی، ۵۳٪ (۲۴۴ نفر) از بیماران مرد و ۴۷٪ (۲۱۶ نفر)، زن بودند. متوسط سن بیماران ۶۱/۴±۹/۷۲ سال بوده و میانگین وزن بیماران ۶۸±۱۲/۵۷ کیلوگرم بود. از لحاظ شاخص توده بدنی میانگین کلی ۲۶/۳±۴/۲۵ بود.

**نتیجه‌گیری:** طبق نتایج مطالعه حاضر در جمعیت بیماران قلبی شهرستان بابل، فشار خون، دیابت و چاقی از شیوع قابل توجهی برخوردارند. شیوع ریسک فاکتورها در زنان بیشتر است. لذا غربالگری به موقع و کنترل دقیق این موارد می تواند در پیشگیری از ایجاد عوارض بلند مدت حائز اهمیت باشد.

**واژه‌های کلیدی:** ریسک فاکتور، بیماری عروق کرونر قلب، جراحی بای‌پس عروق کرونری قلب.

### مقدمه

هیپرکلسترولمی، چاقی و عدم انجام فعالیت فیزیکی مناسب، رژیم غذایی ناسالم، مصرف سیگار و استرس روانی هستند که همه آنها به جز سن، جنس، نژاد و سابقه فامیلی مثبت قابلیت اصلاح شدن دارند (۲). براساس شواهد قوی مبنی بر نقش پررنگ فشار خون بالا، هیپرلیپیدمی، دیابت و مصرف سیگار در پاتوژنز بیماری کرونری قلب، این چهار مورد تحت عنوان ریسک فاکتورهای Conventional شناخته می‌شوند (۳). رویکرد مناسب و منطقی در برخورد با این بیماران بیشتر بر اساس کنترل ریسک فاکتورهای قابل اصلاح این بیماری جهت پیشگیری از پیشرفت آن و بروز حوادث قلبی جدی همچون آنژین صدری، انفارکتوس میوکارد، نارسایی احتقانی قلب و مرگ می‌باشد (۴). چرا که استفاده از استراتژی‌های درمانی تهاجمی تر نظیر PCI (Percutaneous Coronary Intervention) و CABG (Coronary Artery Bypass Graft). به‌رغم پیشرفت‌های نوین علم پزشکی همچنان جزء روش‌های پرخطر محسوب می‌شوند (۵). شیوع

بیماری عروق کرونری قلب (Coronary Artery Disease = CAD) از بیماری‌های جدی و شدیداً رو به رشد است. امروزه این بیماری با شیوع بسیار بالایی چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه همراه بوده و به عنوان یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر به شمار می‌آید (۱). در سال ۲۰۱۳ این بیماری به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در دنیا شناخته شد که مسئول مرگ بیش از ۱۷/۳ میلیون بیمار بوده است و پیش‌بینی می‌شود با رشد سریع این بیماری در سال ۲۰۳۰ میزان مرگ و میر در اثر این بیماری به بیش از ۲۳/۶ میلیون نفر برسد (۱). به سبب این شیوع بالا و مورتابلیتی زیاد، این بیماری در طی دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با پاتوفیزیولوژی، علل شیوع و ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز بیماری‌های عروق کرونری انجام شده است. ریسک فاکتورهای کلاسیک و شناخته شده بیماری عروق کرونر قلب شامل سن، جنس، نژاد، سابقه خانوادگی مثبت، فشار خون بالا، دیابت،

\* مسئول مقاله: دکتر حمیدرضا وفايي

۱). شیوع فشارخون در کل نمونه مورد مطالعه ۵۶/۷۴٪ (۲۶۱ نفر) برآورد شده است. ۲۵/۴۴٪ (۱۱۷ نفر) از مبتلایان به فشار خون مردان و ۳۱/۳۰٪ (۱۴۴ نفر) زن بوده اند. شیوع هیپرلیپیدمی ۳۲/۶۱٪ (۱۵۰ نفر) - ۱۵/۴۳٪ (۷۱ نفر) مرد و ۱۷/۱۷٪ (۷۹ نفر) زن - و شیوع دیابت ۲۸/۹۱٪ (۱۷۹ نفر) - ۱۳/۲۶٪ (۶۱ نفر) مرد و ۲۵/۶۵٪ (۱۱۸ نفر) زن - بوده است. ۳۱/۰۹٪ (۱۴۳ نفر) از بیماران سابقه انفارکتوس میوکارد در گذشته داشته‌اند (جدول ۲).

در رابطه با مصرف سیگار، بر اساس شرح حالی که از بیماران گرفته شده بود، ۱۲/۶۱٪ (۵۸ نفر) از بیماران از سیگار استفاده می‌کردند که تمامی آنها مرد بودند. شیوع مصرف مداوم یا گهگاه اپیوم در بیماران ۸/۴۸٪ (۳۹ نفر) بود که ۱/۷۴٪ از این مقدار مربوط به زنان بوده است. متوسط مقدار کسرتخلیه‌ای قلب در بیماران مورد بررسی ۴۷/۵±۸/۴۳٪ بوده است. میزان مورتالیته داخلی بیمارستانی در این جمعیت از بیماران ۱/۳٪ (۶ نفر) از ۴۶۰ بیمار بوده که از این بین ۵ نفر زن و ۱ نفر مرد بودند.

#### جدول ۱. گزارش وضعیت سایر ریسک فاکتورها در نمونه مورد بررسی به تفکیک

ریسک فاکتور	جنسیت بر حسب میانگین و انحراف معیار		
	مرد Mean±SD	زن Mean±SD	کل Mean±SD
سن	۶۰/۸±۱۰/۵۵	۶۲±۸/۶۸	۶۱/۴±۹/۷۲
وزن	۷۱/۱±۱۲/۹۸	۶۴/۵±۱۱/۱۴	۶۸±۱۲/۵۷
قد	۱۶۷±۷/۴۸	۱۵۳/۹±۱۱/۱۴	۱۶۰/۸±۹/۷۳
شاخص توده بدنی	۲۵/۴±۲/۸۱	۲۷/۳±۴/۵۱	۲۶/۳±۴/۲۵

#### جدول ۲. شیوع ریسک فاکتورهای کاردیو اسکولار در نمونه مورد بررسی به

ریسک فاکتور	تفکیک جنسیت		
	مرد (درصد)	زن (درصد)	کل (درصد)
فشارخون بالا	۲۵/۴۳	۳۱/۳۰	۵۶/۷۴
هایپرلیپیدمی	۱۵/۴۳	۱۷/۱۷	۳۲/۶۱
دیابت ملیتوس	۱۳/۲۶	۲۵/۶۵	۳۸/۹۱
سابقه سکتته قلبی	۲۰/۰۰	۱۱/۰۹	۳۱/۰۹
سابقه مصرف سیگار	۱۲/۶۱	۰/۰۰	۱۲/۶۱

#### بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر ۹۱٪ از بیماران واجد حداقل یکی از ریسک فاکتورها بوده اند. بیش از ۵۰٪ بیماران مبتلا به فشار خون و نزدیک به ۴۰٪ از آنها دیابت داشته‌اند. شیوع تمام این ریسک فاکتورها در زنان بیشتر از مردان بوده است. به دنبال پژوهش‌های گذشته، تعداد زیادی از ریسک فاکتورهای این بیماری شناسایی شده‌اند که از بین آنها می‌توان به فاکتورهای conventional شامل فشار خون، هیپرلیپیدمی، دیابت، مصرف سیگار و سابقه خانوادگی مثبت اشاره کرد که اثرگذاری هر کدام از آنها به تنهایی یا در کنار سایر عوامل در بروز فرآیند آترواسکلروز عروق کرونر قلب یا حتی عروق محیطی به صورت قطعی اثبات شده است (۱۱ و ۱۲). به‌رغم مطالعات مشابه زیادی که در این زمینه صورت گرفته، با

بیماری‌های عروق کرونر قلب در اکثر جوامع بشری از جمله ایران رو به افزایش است. با توجه به میزان قابل توجه مورتالیته ناشی از این بیماری و همچنین بالا بودن هزینه‌های لازم جهت مداخلات درمانی، شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بروز و پیشرفت این بیماری‌ها جهت تدوین رویکردهای پیشگیرانه اهمیت می‌یابد (۶ و ۷). در مطالعه حاضر شیوع برخی ریسک فاکتورهای قابل اصلاح بیماری عروق کرونر قلب در گروهی از بیماران که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، بررسی شده است. شناسایی این ریسک فاکتورها می‌تواند در پیش‌بینی احتمال وقوع بیماری قلبی عروقی پیشرفته که منجر به جراحی سنگین و پرعارضه شود، مؤثر باشد. با آگاهی از میزان شیوع منطقه‌ای این ریسک فاکتورها می‌توان اقدامات مقتضی جهت پیشگیری از پیشرفت این بیماری‌ها و درمان زودرس را در دستور کار قرار داد.

#### مواد و روش‌ها

این مطالعه و مقطعی پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بابل با کد Mubabol.Rec.1396.13 بر روی ۴۶۰ بیمار که در فاصله بین فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴ توسط یکی از جراحان قلب و عروق در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب به صورت الکتیو قرار گرفته بودند، انجام شد و اطلاعات مربوط به آنان از پرونده‌های پزشکی استخراج شده و در چک لیست‌های مشخص ثبت شد. ریسک فاکتورهای قلبی عروقی شامل: سن، جنس، وزن، شاخص توده بدنی، سابقه فشار خون، هیپرلیپیدمی، دیابت، مصرف سیگار، به تفکیک جنسیت به صورت جداگانه بررسی شدند. منظور از فشار خون تشخیص سابقه ابتلا به فشار خون سیستمیک مساوی یا بیشتر از ۱۴۰ و یا فشار خون دیاستولیک مساوی یا بیشتر از ۹۰ (۸) و منظور از دیابت سابقه قلبی وجود قند خون ناشتا بیشتر یا مساوی ۱۲۶ و قند خون غیر ناشتا بیشتر یا مساوی ۲۰۰ و یا هموگلوبین A1C بیش از ۶/۵ بوده است (۹). منظور از مصرف سیگار سابقه مصرف در اکثر روزها و یا وابستگی به نیکوتین بوده است (۱۰). علاوه بر اینها فراوانی بیماران با سابقه انفارکتوس میوکارد قلبی بیماران نیز با توجه به اطلاعات موجود در پرونده‌ها ارزیابی شد.

در تمامی بیماران پیش از عمل جراحی آزمایشات کامل انجام شده و در پرونده‌های پزشکی ثبت گردیده است. ضمناً نام بیماران و اطلاعات شخصی آنان به صورت محرمانه حفظ شده است. داده‌های استخراج شده به نرم افزار Excel وارد شده و پس از محاسبه فراوانی آنها نشان داده شد.

#### یافته‌ها

در بررسی نمونه مورد مطالعه، ۵۳٪ از بیماران مرد (۲۴۴ نفر) و ۴۷٪ زن (۲۱۶ نفر) بودند. متوسط سن بیماران در کل نمونه ۶۱/۴±۹/۷۲ سال (در مردان ۶۰/۸±۱۰/۵۵ سال و در زنان ۶۲±۸/۶۸ سال) بوده و میانگین وزن بیماران ۶۸±۱۲/۵۷ کیلوگرم (مردان ۷۱/۱±۱۲/۹۸ و زنان ۶۴/۵±۱۱/۱۴) بوده است. از لحاظ شاخص توده بدنی نیز (BMI) میانگین کلی ۲۶/۳±۴/۲۵ شناسایی شده که این میزان در مردان ۲۵/۴±۳/۸۱ و در زنان ۲۷/۳±۴/۵۱ بوده است (جدول

زنان، شایع‌تر از مردان بوده است. در مجموع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که در جامعه مورد نظر این مطالعه، زنان برای ابتلا به بیماری کرونری شدید قلب که منجر به جراحی پیوند عروق کرونر شود در خطر قابل توجهی قرار دارند. به ویژه آنکه ریسک فاکتورهای HTN، HLP، DM و BMI بالا، در زنان فراوانی بیشتری نسبت به مردان دارند. بنابراین منطقی است که برنامه‌های غربالگری جدی‌تری را جهت شناسایی این ریسک فاکتورها خصوصاً در زنان تدارک دید. رویکردهای پیشگیرانه از طریق برنامه‌های آموزشی جهت اصلاح الگوی زندگی و غربالگری‌های هدفمند ریسک فاکتورها جهت درمان به موقع، روش‌هایی بی‌خطر و کم هزینه‌تر نسبت به روش‌های تشخیصی دیگر از جمله آنژیوگرافی و Euro score هستند که می‌توانند تا حدی در کاهش هزینه‌های ناشی از درمان‌های تهاجمی بکاهند.

دقت نظر به این موضوع که نزدیک به ۹٪ از بیماران دارای هیچ کدام از ریسک فاکتورهای Conventional نبوده‌اند، تا حدی می‌تواند نشان دهنده تأثیرگذاری ژنتیک و ریسک فاکتورهای آتیپیک مانند ابتلا به بیماری التهابی مزمن، نارسایی کلیوی، سندرم متابولیک، اختلالات هموسیستین و... در بروز درجات شدید بیماری عروق کرونر قلب در جمعیت مورد مطالعه ما باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی به بررسی شیوع ریسک فاکتورهای مذکور نیز در بیماران قلبی پرداخته شود.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله روحانی، تشکر و قدردانی می‌گردد.

توجه به تفاوت منطقه‌ای در اپیدمیولوژی بیماری‌ها و همچنین عادات و سبک زندگی مردم، منطقی است که در هر جمعیت میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی عروقی به صورت مجزا ارزیابی شود تا بر این اساس اقدام جهت آموزش به مردم، تبیین روش‌های پیش‌گیری از بیماری، غربالگری بیماران و مداخلات درمانی در بیماران با توجه به شرایط جمعیتی همان منطقه اولویت‌بندی شود.

در مطالعه مشابهی که توسط Yaribeygi و همکاران بر روی طیف گسترده‌ای از بیماران در شهر تهران انجام شد، شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بالا گزارش شد (۵). Safaei و همکاران در پژوهشی که در یکی از بیمارستان‌های شهر تبریز روی ۷۰۰ بیمار CABG انجام دادند، میزان شیوع ریسک فاکتورهای CAD با دقت نظر به سن و جنس بیماران را بالا گزارش کردند (۶). طبق نتایج مطالعه Kasliwal و همکاران در هندوستان نیز شیوع ریسک فاکتورهای قلبی عروقی تیپیک شامل فشار خون، دیس لیپیدمی و دیابت در بیمارانی که تحت عمل CABG قرار گرفته بودند، بالا بوده است. بر اساس یافته‌های آنها، ۹/۹۵٪ از بیماران واجد حداقل یکی از ریسک فاکتورهای کلاسیک بیماری عروق کرونری بوده‌اند (۱۰). حال آنکه در مطالعه حاضر نتایج نسبتاً متفاوتی به دست آمده است. به طوری که به لحاظ ویژگی‌های جمعیت‌شناسی نمونه مورد بررسی، متوسط سنی بیماران مورد مطالعه نسبت به نتایج پژوهش‌های قبلی بالاتر بوده است. همچنین بر خلاف مطالعات پیشین که در توزیع جنسی بیماران، سهم عمده متعلق به گروه مردان بوده، در این مطالعه توزیع جنسیتی تقریباً مشابه بوده است (۴۷ درصد زنان و ۵۳ درصد مردان). از بررسی یافته‌های بدست آمده اینگونه به نظر می‌رسد که در جمعیت مورد مطالعه ما در مقایسه با مطالعات دیگر، میزان ابتلای زنان به بیماری شدید عروق کرونری بیشتر بوده است. شایان ذکر است؛ متوسط BMI نمونه بررسی شده، بالاتر از محدوده نرمال بوده (۲۵/۴±۲۶/۳) که البته اضافه وزن در

# An Evaluation of the Risk Factors of Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Coronary Artery ByPass Graft Surgery in Babol

C. Behzad (MD)<sup>1</sup>, S. Zakeri (MD)<sup>2</sup>, H. Vafaey (MD)<sup>1\*</sup>

1.Clinical Research Development Unite of Rouhani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

2.Student Research Committee, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

---

J Babol Univ Med Sci; 21; 2019; PP: 6-10

Received: July 7<sup>th</sup> 2018, Revised: Dec 7<sup>th</sup> 2018, Accepted: Jan 26<sup>th</sup> 2019.

## ABSTRACT

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Awareness of the prevalence of modifiable cardiovascular risk factors and attempts to correct and control it can be effective in reducing the chance of advanced cardiovascular disease that leads to complicated surgical procedures. Since the risk factors of advanced heart disease in northern Iran are unclear, this study was conducted to evaluate the risk factors of coronary artery disease in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery in Babol, northern Iran.

**METHODS:** This cross-sectional study was performed on 460 patients who underwent coronary artery bypass graft surgery from the beginning of 2011 to the end of 2015 in Ayatollah Rohani Hospital in Babol. The modifiable risk factors of coronary heart disease were evaluated according to the data in medical records of patients.

**FINDINGS:** The prevalence of hypertension in the total samples was 56.74% (261 patients), the prevalence of hyperlipidemia was 32.16% (150 patients) and the prevalence of diabetes was 38.91% (179 patients). 31.09% (143 patients) had history of myocardial infarction in the past. 12.6% (58 patients) were smokers, all of whom were male. In terms of gender distribution, 53% (244 patients) were male and 47% (216 patients) were female. The mean age of the patients was 61.4±9.72 years and the mean weight of the patients was 68±12.57 kg. In terms of body mass index, the total mean was 26.3±4.25.

**CONCLUSION:** According to the results of this study, hypertension, diabetes, and obesity are significantly common in the population of cardiac patients in Babol. The prevalence of risk factors in women is higher. Therefore, timely screening and precise monitoring of these issues can be important in preventing long-term complications.

**KEY WORDS:** *Risk Factors, Coronary Heart Disease, Coronary Artery Bypass Surgery.*

---

### Please cite this article as follows:

Behzad C, Zakeri S, Vafaey H. An Evaluation of the Risk Factors of Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Coronary Artery ByPass Graft Surgery in Babol. J Babol Univ Med Sci. 2019; 21: 6-10.

---

\*Corresponding Author: H. Vafaey (MD)

Address: Clinical Research Development Unite of Rouhani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

Tel: +98 11 32338301

E-mail: hamidreza.vafaey@yahoo.com

## References

1. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlain AM, Chang AR, Cheng S, et al. Heart disease and stroke statistics—2018 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2018;137(12):e67-492.
2. Hajar R. Risk factors for coronary artery disease: Historical perspectives. *Heart Views*. 2017;18(3):109-14.
3. Khot UN, Khot MB, Bajzer CT, Sapp SK, Ohman EM, Brener SJ, et al. Prevalence of conventional risk factors in patients with coronary heart disease. *Jama*. 2003;290(7):898-904.
4. Shirazi E. Coronary Artery Bypass Graft: Pomp-Time Relationship with Psychological Status. *Iran J Psychiat Clin Psychol*. 2004; 9(3):51-9. [In Persian]
5. Yaribeygi H, Taghipour H, Taghipour H. Prevalence of cardiovascular risk factors in patients undergoing CABG: brief report. *Tehran Univ Med J*. 2014; 72(8):570-4. [In Persian]
6. Safaei N, Alikhah H, Abadan Y. Coronary risk factors in patients underwent coronary artery bypass grafting. *Pakistan journal of biological sciences : PJBS*. 2011;14(1):25-33.
7. Kasliwal R, Kulshreshtha A, Agrawal S, Bansal M, Trehan N. Prevalence of cardiovascular risk factors in Indian patients undergoing coronary artery bypass surgery. *J Assoc Physicians India*. 2006;54:371-5.
8. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European heart journal*. 2018;39(33):3021-104.
9. Alberti KGMM, Zimmet Pf. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consultation. *Diabetic medicine*. 1998;15(7):539-53.
10. Choi Y, Choi SM, Rifon N. "I smoke but I am not a smoker": phantom smokers and the discrepancy between self-identity and behavior. *Journal of American College Health*. 2010;59(2):117-25.
11. Wu C, Camacho FT, Wechsler AS, Lahey S, Culliford AT, Jordan D, et al. A risk score for predicting long-term mortality following coronary artery bypass graft surgery. *Circulation*. 2012; 125(20):2423-30.
12. Hannan EL, Racz M, Culliford AT, Lahey SJ, Wechsler A, Jordan D, et al. Risk score for predicting in-hospital/30-day mortality for patients undergoing valve and valve/coronary artery bypass graft surgery. *Ann Thorac Surg*. 2013;95(4):1282-90.