

اتیولوژی و درمان زخم های آفتی عود کننده دهانی

نادر نوابی (DDS,MS^{*})، هما کامیابی (DDS)[†]

۱- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۲- دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

دریافت: ۹۸/۶/۲۳؛ اصلاح: ۹۸/۹/۲۴؛ پذیرش: ۹۸/۱۰/۲۴

خلاصه

سابقه و هدف: زخم های آفتی عود کننده دهانی یکی از شایع ترین بیماری های مخاط دهان محسوب می گردد. امروزه حجم مرورهای ساختار یافته منتشر شده رو به افزایش، تصمیم گیرندگان سلامت را در حل نمودن مشکلات بالینی با توجه عظیمی از شواهد مواجه می سازد. این مطالعه مرور چتری به منظور خلاصه نمودن شواهد و گزارش نمودن دانسته های حاضر درباره اتیولوژی، تشخیص و درمان زخم های آفتی عود کننده دهان انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه مرور چتری با جستجوی مقالات مرور سیستماتیک در پایگاه های اطلاعاتی Cochrane, Scopus, ISI web of science و Pubmed از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی با استفاده از واژه های کلیدی "مرور سیستماتیک" "متا آنالیز" و "آفت" انجام شد. دو پژوهشگر به صورت جداگانه مراحل غربالگری مقالات، استخراج داده ها و ارزیابی نقادانه مقالات گزینش شده را با استفاده از دستورالعمل موسسه جوانا بریجز برای مرور چتری انجام دادند.

یافته ها: در این تحقیق ۱۸ مرور سیستماتیک وارد مرور نهایی گردید که ۸ مرور آن مربوط به حیطه درمان بود. از میان این مقالات یافته های مربوط به ۶ متا آنالیز به همراهی میان زخم های آفتی دهان با کمبود های خونی، پلی مرفیسم ایترولوکین و هلیکوبکتریلوری اشاره داشته است. با این وجود برای درمان زخم های آفتی (اعم از موضعی، سیستمیک و لیزر تراپی) یافته های قطعی مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کمبود های خونی، پلی مرفیسم ایترولوکین و هلیکوبکتریلوری از جمله جدیدترین اتیولوژی های مطرح برای زخم های آفتی عود کننده دهانی محسوب می گردد. در حالیکه در زمینه درمان این ضایعات تاکنون گزینه ای واحد و قطعی ارائه نشده است.

واژه های کلیدی: مرور سیستماتیک، زخم آفتی عود کننده، زخم دهان.

مقدمه

santos و همکاران اظهار نموده اند که لیزر درمانی را می توان یک جایگزین مطمئن برای درمان RAS محسوب نمود (۱). در مرور سیستماتیک جدیدی که توسط Alli و همکاران انجام شده، تتجه گیری گردید که استفاده از خمیرندان های فاقد SLS (سدیم لوریل سولفات) در مبتلایان به RAS سودمند است (۲). به نظر می رسد برای فهم بهتر جایگاه کنونی درمان RAS به رویکردهای مبتنی بر شواهدی نیازمندیم که بتواند در حل این مشکل بالینی موثر باشد. جستجوی مقدماتی منابع نشان داد که در زمینه RAS مرورهای سیستماتیک و مقالات متا آنالیز متعددی تاکنون چاپ شده است و لذا به نظر رسید جمع بندی و خلاصه نمودن یافته های این مطالعات می تواند در این مسیر کمک کننده باشد. به این نوع از مطالعات مبتنی بر شواهد در اصطلاح مرور چتری Umbrella review (۳) یا Overviews (۴) اطلاق می گردد. در مرور چتری به دنبال یافتن معتبرترین شواهد و خلاصه و سنتر

Zxم های آفتی عود کننده دهانی (Recurrent Aphthous RAS=Stomatiticy) یکی از شایع ترین بیماری های مخاط دهان محسوب می گردد که به صورت ایدیوپاتیک و مالتی فاکتوریال ایجاد می گردد. مطالعات زیادی مشخص نموده اند که عوامل زمینه ساز متعددی نظیر تنش های روحی، تروما، میکروارگانیسم ها، داروها، کمبودهای نتیجه ای، اختلالات سیستم دفاعی بدن و توارث ممکن است در پیدایش اینگونه زخم ها دخیل باشد (۵-۱). انتخاب های درمانی موضعی و سیستمیک متعددی برای این ضایعه پیشنهاد شده اما از آنجاییکه اتیولوژی قطعی آن هنوز معرفی نگردیده است هنوز نمی توان پروتکل درمانی واحدی را برای تمام مبتلایان توصیه نمود (۶). اخیراً در متا آنالیزی که توسط Al-Maweri و همکاران انجام شده، نتایج نشان داد که همراهی معنی داری میان کاهش سطح سرمی و بیتامین D وجود دارد (۷)، به تازگی نیز Amorim Dos- RAS وجود دارد (۸).

□ این مقاله حاصل پایان نامه هما کامیابی دانشجو رشته دندانپزشکی و طرح تحقیقاتی به شماره ۹۶/۶۹۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.

* مسئول مقاله: دکتر نادر نوابی

Aphthous AND OR جستجو گردید. بدین ترتیب جستجوی: (Aphthous AND “systematic review” در فیلدهای عنوان مقاله، چکیده و واژه های کلیدی، پایه جستجو را تشکیل می داد. جستجو و بررسی مقالات توسط دو مرورگر و به صورت مستقل انجام گردید. در گام اول، مقالات جداگانه از پایگاه های مختلف جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Endnote عنوانین تکراری حذف شد. در مرحله بعد و طی سه گام، با مطالعه عنوان، چکیده و متن کامل مقالات، به ترتیب، حذف مقالات غیر مرتبط بر این سه معیار صورت گرفت (۱۵).

در مرحله بعد مرورهای سیستماتیک گردآوری شده، ارزیابی نقادانه گردید و Preferred Reporting (PRISMA) منظور با استفاده از ابزار معتبر Items for Systematic review and Meta-analysis گردآوری شده امتیاز دهی شد. چک لیست مرور شده در یکی از سه وضعیت NOT آیتم است که هر یک از آیتم های بررسی شده در یکی از سه وضعیت YES=0 و NO=1 applicable=1 سقف امتیاز را کسب کرد وارد مرور نهایی گردید (۱۵-۳۳)، البته آیتم های ۹ و ۸ تنها برای مواردی که متابالیز انجام شده در نظر گرفته شد. بدین ترتیب نمره مقالات متابالیز از ۲۲ و مرور های سیستماتیک از ۱۸ محاسبه گردید.

استخراج داده ها از مقالاتی که وارد مرور نهایی شده نیز از طریق چک لیست JBI data extraction from for review استاندارد موجود در این زمینه (Joanna Bridges Institute) PICO بدین ترتیب مطرح شد: "در مرورهای سیستماتیک چک شده تاکنون، در مطالعه حاضر چه موضعی و سیستمیک (در مقایسه با یکدیگر) موثر معرفی شده چهت بهبود علایم زخم ها، التیام سریع تر و کاهش عود برای مبتلایان به RAS چه بوده است؟".

یافته ها

ابتدا ۷۷ مرور سیستماتیک مرتبط از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری گردید که ۱۵ مورد آن تکراری بود و ۴۴ مورد نیز با مرور عنوان، چکیده و متن کامل مقالات (۱۹) مورد با عنوان، ۲۲ مورد با چکیده و ۳ مورد با متن کامل) حذف گردید. از میان ۱۸ مقاله نهایی، ۸ تای آن مربوط به اتیولوژی و مابقی مربوط به گزینه های درمانی برای RAS بود (جدول ۱ و ۲). ارزیابی نقادانه مقالات نهایی نشان داد که ۳ مقاله Chen, Wu, Yang و Chen, Vale, Gomes, Afghari کیفیت متدولوژیک متدولوژیک بودند و سه مقاله Afghari, Gomes, Vale و ۳ مقاله Afghari, Chen, Wu, Yang کیفیت متداولیک متوسطی داشتند (۳۳ و ۳۱ و ۲۹-۳۰ و ۱۶).

در ۶ مقاله از ۱۸ مقاله وارد شده به مرور، متابالیز صورت گرفته (مقالات اتیولوژی برای RAS بود (نقایص همتولوژیک، عفونت هلیکوبکترپلوری و پلی مریسم ایترلوکین) و در تمام این متابالیزها نتایج آماری معنی داری درباره ارتباط سه اتیولوژی مذکور با RAS حاصل شده بود (۳۱ و ۳۰ و ۲۳ و ۲۱ و ۱۷ و ۱۶). جدول ۳ نتایج این ۶ متابالیز را با ذکر Odds ratio و هتروزنیتی میان مطالعات نشان می دهد.

کردن تحقیقات مرور سیستماتیک و متابالیز انجام شده تاکنون در مورد موضوع مورد نظر هستیم. روزانه ۱۱ مرور سیستماتیک در سطح دنیا منتشر می شود و این مساله سبب می گردد مراجعه نمودن محققان، کلینیسین ها و سیاستگذاران سلامت به این حجم انبوه جهت تصمیم گیری های بالینی دشوار گردد (۱۱ و ۱۰). بنابراین در زمینه هایی که با مقالات مرور چتری می تواند کارساز باشد. لذا در مطالعه حاضر تلاش گردیده، مرور های سیستماتیک و مطالعات متابالیزی که تاکنون درباره اتیولوژی و درمان RAS انجام شده است مرورگردد تا بتوان ایده های جدید مربوط به این ضایعه شایع دهانی را ارزیابی نمود.

مواد و روش ها

این مطالعه مرور چتری پس از تصویب در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کد IR.KMU.REC.1396.1946 و بر اساس پروتکل Joanna Bridges Institute (JBI) انجام شد (۱۲ و ۱۱). پرسشن PICO بدین ترتیب مطرح شد: "در مرورهای سیستماتیک چک شده تاکنون، درمان های موضعی و سیستمیک (در مقایسه با یکدیگر) موثر معرفی شده چهت بهبود علایم زخم ها، التیام سریع تر و کاهش عود برای مبتلایان به RAS چه بوده است؟".

در مطالعه حاضر، تنها مرور های سیستماتیک وارد گردید و مقالات مروری ساده و آنچه شرح نظرات نویسنده ایان است بررسی نشد. شرط بررسی مرور های سیستماتیک در مطالعه حاضر درمان بر روی افرادی بود که تشخیص بالینی ایشان RAS بوده و محدودیت سنی وجود نداشت. اما عدم ابتلاء به بیماری های سیستمیک یا سندروم های زمینه ساز زخم های آفت مانند لازم بود و مرور حاضر شامل بررسی انتخاب های درمانی برای بیماری هایی نظیر Crohn یا سندروم بیهودت نگردیده است. همچنین مرور حاضر محدودیت های فرهنگی، جغرافیایی و تزادی نداشته است.

در مرور مقالات گردآوری شده و برای مقالاتی که با زبانی غیر از انگلیسی نوشته شده، تلاش گردید تا ترجمه به انگلیسی صورت گیرد اما مرور شامل مطالعات اولیه نظیر کارآزمایی های بالینی نبوده است. کلیه مرور های سیستماتیک از زمانی که در پایگاه های اطلاعاتی مرور نظر قابل دسترس بود از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی جمع آوری گردید. تلاش برای یافتن گزارشات محتمل در Grey Literature نیز انجام شد (۱۴ و ۱۳).

پایگاه های معتبر اطلاعاتی شامل Scopus و Cochrane و Data base of systematic (Pubmed و ISI web of Science) "Systematic", "Reviews", "MESH" با واژه های کلیدی منتخب از "Recurrent Aphthous stomatitis", "Meta-analysis", "Aphthous", "Aphthous Ulcer", "Aphthae", "Canker sore" با استفاده از عملگرهای منطقی

جدول ۱. استخراج داده های مربوط به مطالعات مرور سیستماتیک مربوط به اتیولوژی زخمهای آفتی عود کننده دهانی

یافته اصلی	مرور شده	تعداد مطالعه	پایگاه های جستجو شده	حجم نمونه	عامل اتیولوژیک	کشور	سال انتشار	نویسنده
كميد و بيتامين 12B، اسيد فوليک و فريتين مي تواند ريسك فاكتور معنى داري باشد.	۹	Pubmed, CNKI	710 RAS 602 كنترل	نفاذ هماتولوژيک	چين	Chen et al	2015	
كميد و بيتامين 12B، اسيد فوليک و فريتين در RAS معنى دار است.	۱۵ ۳ ۶ مقطعي شاهدی مدخله اي	Pubmed, cochrane, Scopus, Science Direct ovid	-	نفاذ هماتولوژيک	ايران	Navabi et al	2013	
IL-1β(+3954C/T) مي دهد.	۱۰ شاهدی	Pubmed, Embase	884 RAS 1104 كنترل	پلي مرفيسم ايترلوكين	چين	Wu et al	2018	
IL-10-1082 G/A, IL-6-174 G/C ممکن است نقش داشته باشد.	۱۰ شاهدی	Pubmed, Embase, ISI, cochrane	779 RAS 1016 كنترل	پلي مرفيسم ايترلوكين	چين	Yang et al	2017	
IL-1b+3954C/T افزايش ريسك IL-1b-1082G/A اثر protective در جمعیت آسیایی دارد.	۱۱ باليني	Pubmed, Embase, ISI	-	پلي مرفيسم ايترلوكين	چين	Chen et al	2018	
ارتباطی وجود ندارد.	۷ ۲ مقطعي شاهدی	Pubmed	-	هليکوباكترپيلوري	ايران	Afghari et al	2011	
همراهی وجود ندارد.	۱۵ ۳ تجربی مروري	Pubmed	339 Cases 271 كنترل	هليکوباكترپيلوري	برزيل	Gomes et al	2016	
عفونت هليکوباكترپيلوري با افزايش ريسك همراهی RAS دارد.	۷ شاهدی	Pubmed	649 RAS	هليکوباكترپيلوري	چين	Li et al	2014	

جدول ۲. استخراج داده های مربوط به مطالعات مرور سیستماتیک مربوط به درمان زخمهای آفتی عود کننده دهانی

یافته اصلی	مرور شده	تعداد مطالعه	پایگاه های جستجو شده	مدخله درمانی	کشور	سال انتشار	نویسنده
لیزر درمانی در تسکین درد و کاستن از زمان التیام برتری دارد.	RCT ۱۰	Pubmed, Embase, sciencedirect, Cochrane, ISI	لیزر تراپی	چين	Han et al	2016	
لیزرهای CO ₂ ، Ndyag و Diode تسکین علائم و تسریع التیام می باشد.	۱۰ RCT ۱ non randomozal trial	Pubmed, Embase, Cochrane	لیزر تراپی	سوئیس	Suter et al	2017	
نتایج سودمند لیزر درمانی برای RAS می باشد با احتیاط تفسیر گردد.	۲ RCT ۱ Comparative ۱ Prospective	Pubmed, Science Direct, Cochrane	لیزر تراپی	بوسنه هرزگوین	Pavlic et al	2015	
لیزر کم CO ₂ به دلیل نیاز به زمان تابش کم مزیت دارد.	۷ RCT ۲ Case report	Pubmed, ISI, Cochrane, Embase	لیزر کم توان	عربستان سعودی	Najeeb et al	2016	
لیزر کم توان تاثیرات معنی داری در کاهش درد و تسریع التیام دارد و فاکتور طول موج نقش عمده ای ایفا می نماید.	۲ RCT	LILAC, Google scholar, Pubmed, Cochrane	لیزر کم توان	برزيل	Vale et al	2015	
کلرهزیدین و کورتیکواستروئید های موضعی درمان های موضعی موثر می باشد.	۱۸ مژو سیستماتیک و RCT observational	Pubmed, Embase, Cochrane	درمان های موضعی	انگلستان	Porter et al	2007	
کلرهزیدین و کورتیکواستروئید های موضعی درمان هایی موثر با شواهد بیشتر قلمداد می شود.	۹ RCT	Pubmed, Embase, Cochrane	درمان های موضعی	انگلستان	Staines	2013	
نتایج مطالعات قطعی نمی باشد.	۸ RCT	Pubmed, LiLac, Scielo, Embase	کورتیکواستروئید های موضعی	کلمبیا	Quijano et al	2008	
این نوع طب ممکن است بر کاهش درد- کاهش اندازه زخم ها مدت زمان التیام و تناوب زخم ها تأثیر داشته باشد.	۱۱ RCT ۱ Trial	Pubmed, Embase, Cochrane, Sciencecitation index	طب اختصاصی چینی	چين	Zhou et al	2017	
هیچ درمان واحدی به عنوان بهترین مداخله سیستماتیک موثر هنوز قطعاً معرفی نشده است.	۲۵ Trials	Cochrane, pubmed, Embase, Cinahl Amed	درمان های سیستماتیک	Conhrane review	Brocklehurst et al	2012	

جدول ۳. خلاصه نتایج متاآنالیزهای انجام شده در زمینه زخم های آفتی عودکننده دهانی

هتروژنیتی	نتیجه متاآنالیز	نویسندها	سال انتشار	عامل مورد بررسی	نفاقش هماتولوژیک
-	p برای تاثیر کمبود ویتامین ۱۲ فولیک اسید و آهن سرم و <۰/۱ برای تاثیر مکمل آهن در التیام زخم ها	Navabi et al	۲۰۱۳	نفاقش هماتولوژیک	
-	عفونت هلیکوباتریپلوری در مبتلایان به RAS بیشتر از غیر مبتلایان بوده است.	Li et al	۲۰۱۴	هلیکوباتریپلوری	
-	Vit B ₁₂ (OR=۳/۷۵) Folic acid (OR =۷/۵۵) RAS را ریسک فاکتورهای بالقوه برای Ferritin (OR =۲/۶۲) می توان فرض نمود.	Chen et al	۲۰۱۵	نفاقش هماتولوژیک	
Significant	IL-10- 1082 G1A (OR=۱/۴۹) IL-6-174G1C (OR=۲/۳۶, OR=۷/۰۵, OR=۴/۲۸, OR=۲/۵۹)	Yang et al	۲۰۱۷	پلی مرفیسم اینترلوکین	
Significant	IL- 1beta(-511C1T)(OR=۱/۷۷) IL-1beta (t3954+CIT) (OR=۱/۵۲) Cgene (OR=۱/۴۶) IL-10-1082 GIA	Wu et al	۲۰۱۸	پلی مرفیسم اینترلوکین	
Significant	IL-10-592 C/A (OR=.۰/۷۱۰) تنها در مدل مغلوب معنی دار بود. IL-10-592 C/A در تمام مدل ها معنی دار بود.	Chen lei et al	۲۰۱۸	پلی مرفیسم اینترلوکین	

مطالعات صورت گرفته در این زمینه انجام متاآنالیز پیرامون آن را دشوار ساخته است (۲۰). Vale نیز اشاره نموده است که فاکتور (طول موج) نقش عمده ای در این گونه مطالعات ایفا می کند و علاوه بر آن می باشد فاکتورهایی همچون زمان تابش، تعداد جلسات درمان و نوع لیزر به کار رفته را نیز در نظر داشت از این رو هنوز امکان ارایه یک پروتکل اختصاصی برای لیزرترابی زخم های آفتی فراهم نگردیده است (۲۹). Najeeb و همکاران اختصاصاً لیزر CO₂ را به دلیل نیاز به زمان تابش پایین (۵ تا ۱۰ ثانیه) دارای مزیت منحصر بفرد در این زمینه تلقی نموده اند (۲۲). در حالیکه Pavlic و همکاران معتقدند نتایج تاثیر لیزرها را در این زمینه تکمیل نموده اند که پارامترهای متعدد دخیل از یکسو و مطالعات اندک موجود برای انواع لیزر از سویی دیگر می باشد ما را از نتیجه گیری های قطعی در این زمینه بر حذر دارد (۲۹ و ۲۰ و ۲۴). یکی از موارد قابل توجه در مطالعات این گونه، گروه های کنترل مطالعات می باشد چنانچه Pavlic نیز اشاره نموده است در مطالعات بررسی شده ایشان به تناوب از دارونما یا کوتیکواستروئید موضوعی برای گروه کنترل در مقابل گروه تحت درمان لیزر استفاده شده است و این امر نیز مقایسه میان نتایج مطالعات را دشوار ساخته است (۲۴).

در حیطه درمان های موضعی Porter و Staines در مروه های خود معتقد بودند که بیشترین شواهد موجود از درمان های موضعی موثر برای RAS به دهانشیوه کلرهگزیدین و نیز کوتیکواستروئید های موضعی اختصاص داشته است. Porter و همکاران اظهار داشته اند استفاده از دهانشیوه کلرهگزیدین از شدت و درد ناشی از زخم های آفتی می کاهد و این مساله احتمالاً به دلیل اثر آنتی سپتیک این دهانشیوه و حذف آن دسته از فلورمیکروبی دهانی است که به صورت ثانویه زخم آفتی را عفونی می سازد. Staines و همکاران در این زمینه عوارض جانبی مصرف این دهانشیوه را مذکور شده اند (مانند ایجاد رنگیزه بر روی دندان ها) و تأکید نموده اند که کلرهگزیدین نمی باشد بدون تجویز کلینیسین استفاده گردد. Porter و Staines در این زمینه ایجاد زخم های جدید جلوگیری نماید اما کوتیکواستروئید های موضعی نمی توانند از ایجاد زخم های جدید جلوگیری نمایند اما در این حیطه

بحث و نتیجه گیری

بر اساس مروه چتری حاضر کمبود های خونی، پلی مرفیسم اینترلوکین و هلیکوباتریپلوری از جمله جدید ترین اتیولوژی های مطرح برای زخم های آفتی عودکننده دهانی محسوب می گردد در حالیکه در زمینه درمان این ضایعات تاکنون گزینه ای واحد و قطعی ارایه نشده است.

هتروژنیتی در هر سه مطالعه مربوط به بررسی تاثیر پلی مرفیسم اینترلوکین ملاحظه گردیده است (۳۰ و ۳۱ و ۱۷). Chen و Yang پرداخته اند که بر مبنای Odds Ratio (G/A-۱۰-۸۲-۱۰) (P) تاثیر اینترلوکین مذکور در بروز RAS معنی دار بوده است (۱۷ و ۳۱). نتایج دو متاآنالیزی که در آن به بررسی اثر نفاقش هماتولوژیک در اتیولوژی RAS پرداخته شده است نشان می دهد که Chen و همکاران تاثیر اینترلوکین مذکور در بروز RAS نیز ارایه نموده اند اما این نتیجه در مطالعه Yang کمبود سرمی المان هایی نظیر فولیک اسید، فربین و ویتامین B12 را در بروز Navabi و همکاران حاصل نگردیده است (۱۶ و ۳۲). Afghari و Gomes در مطالعه ایشان، تاثیر هلیکوباتریپلوری را بر RAS ارزیابی نموده اند و هر دو معتقدند میان عفونت حاصل از میکروارگانیسم مذکور و بروز RAS همراهی وجود ندارد (۱۹ و ۳۳) اما می باشد مد نظر داشت Li در این زمینه متاآنالیز انجام داده و به OR= ۱/۸۵ دست یافته است (۲۱) بنابراین به نظر می رسد بررسی در این حیطه به انجام مطالعات بیشتری نیاز دارد.

از میان ۱۰ مقاله مربوط به حیطه درمان RAS در پنج مروه به تاثیر لیزر تراپی، در سه مروه به تاثیر درمان های موضعی، در یک مروه به طب سنتی چینی و در یک مروه نیز به درمان های سیستمیک پرداخته شده است (۳۲ و ۳۳ و ۲۹ و ۲۴ و ۲۰ و ۱۸). Pavlic و Han, Suter و Najeeb اثراً لیزر درمانی را بصورت کلی برای RAS ارزیابی نموده اند (۲۰ و ۲۸) و Vale و Najeeb اثراً لیزر استفاده به بحث اثر لیزرها کم توان در این زمینه پرداخته اند (۲۲ و ۲۹) انواع لیزر استفاده شده، دو تاثیر بالینی (تسکین درد) و (کاستن از دوره ابتلا به زخم) را در مبتلایان به RAS نشان داده است اما معتقد است وجود هتروژنیتی نسبتاً بالا در میان

نیز اظهار نموده اند تاکنون هیچ درمان سیستمیک موثر واحدی به عنوان بهترین مداخله درمانی قطعی در این زمینه تعیین نگردیده است و به نظر می رسد داروهای اختصاصی بر دسته های خاصی از بیماران مبتلا تأثیر بگذارد (۱۸). مضاف بر آنکه انجام درمان های سیستمیک (مانند کورتیکواستروئیدهای سیستمیک و داروهای مربوط به سیستم ایمنی) همواره با چالش عوارض جانبی آن همراه می باشد و توصیه کلی این است که اینگونه درمان ها در موارد پیچیده RAS و زمان هایی که تأثیرات قابل قبولی از درمان های موضعی حاصل نشده صورت گیرد (۱۸و۳۴).

محدو دبیتی که در انجام این مطالعات احساس گردیده وجود همپوشانی در مطالعات اولیه مرور های برسی شده بود. در زمینه اتیولوژی های مطرح مانند برای RAS مانند هلیکوباتریپلوری، ناقص هماتولوژیک و پلی مرفیسم ایتنتروکین و نیز درمان های موثر (به خصوص درمان های سیستمیک) به انجام کار آزمایی های بالینی تصادفی شده دو سوکوری در آینده نیاز است تا بتوان با جمع آوری شواهد معتبر در برخی انتخاب های درمانی (به خصوص لیزرترابی) به پروتکل های استاندارد بالینی دست یافت.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای تصویب طرح و از معاونت تحقیقات و فناوری برای حمایت مالی صورت گرفته تشکر و قدردانی می گردد.

ممکن است علاوه بر دو اثر تسکین درد و تسريع التیام زخم بتواند چنین اثری را نیز به جای بگذارد. این دو محقق در مرورهایشان همچنین تاکید نموده اند که شواهد کافی از تأثیر ضد درد های موضعی، دهانشویه تتراسیکلین و نیز دهانشویه بنزیدامین در دست نیست و Staines اظهار نموده است ۴۴٪ از مبتلایان، دهانشویه بنزیدامین را ترجیح داده اما این مساله صرفاً به آثار بی حس کنندگی موضعی این دارو بر می گردد (۲۵و۲۷).

در مرور Quijano و همکاران صرفاً به تأثیر کورتیکواستروئیدهای موضعی RAS پرداخته شده است و ایشان نکته مهمی را متنزک شده اند که به نظر می رسد می تواند عامل بروز هتروژنیتی در مطالعاتی از این دست قلمداد گردد و آن تعدد ابزارهای سنجش پیامد است که به عنوان مثال بعضی از محققان از مقیاس چشمی رقمی جهت سنجش کاهش درد ناشی از زخم ها استفاده نموده اند و بعضی دیگر ملاک هایی نظیر متوسط زمان بهبود زخم ها، کاهش ارتیتم متعاقب درمان، کاهش سایز زخم ها و کاسته شدن از میزان عود مجدد (در فاصله هفته تا ماه) را مد نظر داشته اند. Staines معتقد است تنوع کورتیکواستروئید های موضعی به کار رفته توسط محققان مختلف نیز عامل دیگری در این زمینه است چنانچه تریامسینولون، بتامتازون و ... در مطالعات مختلف به عنوان انتخاب درمان موضعی به چشم می خورد. Quijano نیز به مانند Porter و Staines کورتیکواستروئیدهای موضعی را یکی از مؤثرترین انتخاب های درمان موضعی برای RAS ذکر کرده است (۲۵-۲۷). تنها مرور انجام گرفته در زمینه تأثیر درمان های سیستمیک بر Brocklehurst و همکاران بوده است (مرور Cochrane) که ایشان

Etiology and Treatment of Oral Recurrent Aphthous Stomatitis

N. Navabi (DDS,MS)*¹, H. Kamiabi (DDS)²

1.Social Determinants on Oral Health Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, I.R. Iran.

2.Dental School, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, I.R.Iran

J Babol Univ Med Sci; 22; 2020; PP: 380-387

Received: Sep 14th 2019, Revised: Dec 15th 2019, Accepted: Jan 14th 2020.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS) is one of the most common oral mucosal diseases. Nowadays, the majority of published systematic reviews is increasing, hence healthcare decision makers are meeting much evidence in order to solving their clinical problems. The aim of the present umbrella review was to report current knowledge on etiology, diagnosis and treatment of RAS.

METHODS: In the present umbrella review, we searched for systematic reviews using PubMed, ISI web of science, Scopus and the Cochrane Library from the beginning of 2000 up to end of 2018 using the following key words: "systematic review" "Meta-analysis" and "aphthous". Two investigators independently screened, extracted the data, and quality appraised the papers using Joanna Bridges Institute (JBI) protocol.

FINDINGS: Finally, 18 systematic reviews were included (8 on etiology and 10 on treatment). Out of these papers, findings of 6 meta-analysis suggested that hematologic deficiencies, interleukin polymorphism and helicobacter pylori seem to have association with RAS, however for treatment of RAS (including: topical, systemic and laser therapy) there were not conclusive findings.

CONCLUSION: According to results of this study, hematologic deficiencies, interleukin polymorphism and helicobacter pylori are among the novel etiologies of recurrent aphthous stomatitis, although there is no presented unique and conclusive treatment option for this common lesion yet.

KEY WORDS: *Umbrella Review, Systematic Review, Recurrent Aphthous Stomatitis, Oral Ulcer.*

Please cite this article as follows:

Navabi N, Kamiabi H. Etiology and Treatment of Oral Recurrent Aphthous Stomatitis. J Babol Univ Med Sci. 2020; 22: 380-7.

* Corresponding Author: N. Navabi (DDS,MS)

Address: Department of Oral and Maxillofacial Medicine, Dental School, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, I.R.Iran

Tel: +98 34 32118071

E-mail: nader_nawabi@yahoo.com

References

- 1.Chiang CP, Yu-Fong Chang J, Wang Y-P, Wu Y-H, Wu Y-C, Sun A. Recurrent aphthous stomatitis - Etiology, serum autoantibodies, anemia, hematinic deficiencies, and management. *J Formos Med Assoc.* 2019 ;118(9):1279-89.
- 2.Edgar NR, Saleh D, Miller RA. Recurrent Aphthous Stomatitis: A Review. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2017;10(3):26-36.
- 3.Altenburg A, El-Haj N, Micheli C, Puttkammer M, Abdel-Naser MB, Zouboulis CC. The treatment of chronic recurrent oral aphthous ulcers. *Dtsch Arztebl Int.* 2014;111(40):665-73.
- 4.Wiriyakijja P, Fedele S, Porter S, Mercadante V, Ni Riordain R. Patient-reported outcome measures in recurrent aphthous stomatitis: A critical assessment of quality properties. *Oral Dis.* 2017;23(8):1168-79.
- 5.Tarakji B, Gazal G, Al-Maweri SA, Azzeghaiby SN, Alaizari N. Guideline for the diagnosis and treatment of recurrent aphthous stomatitis for dental practitioners. *J Int Oral Health.* 2015;7(5):74-80.
- 6.Rezvaninezhad RS, Navabi N, Atai Z, Shahravan A. The effect Co2 laser on reducing pain associated with aphthous stomatitis. *J Babol Univ Med Sci.* 2016;18(10):20-5. [In Persian]
- 7.Al-Maweri SA, Halboub E, Al-Sufyani G, Alqutaibi AY, Shamala A, Alsahlani AB. Is vitamin D deficiency a risk factor for recurrent aphthous stomatitis? A systematic review and meta-analysis. *Oral Dis.* 2019.
- 8.Amorim Dos Santos J, Normando AGC, de Toledo IP, Melo G, De Luca Canto G, Santos-Silva AR, Guerra ENS. Laser therapy for recurrent aphthous stomatitis: an overview. *Clin Oral Investig.* 2020;24(1):37-45.
- 9.Alli BY, Erinoso OA, Olawuyi AB. Effect of sodium lauryl sulfate on recurrent aphthous stomatitis: A systematic review. *J Oral Pathol Med.* 2019;48(5):358-64.
- 10.Ranganath SP, Pai A. Is Optimal Management of Recurrent Aphthous Stomatitis Possible? A Reality Check. *J Clin Diagn Res* 2016;10(10): ZE08-ZE13.
- 11.Aromataris E, Fernandez RS, Godfrey C, Holly C, Khalil H, Tungpunkom P. Methodology for JBI umbrella reviews. In: Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual, 2014 ed/ Supplement. Australia: University of Wollongong; 2014. p. 1-34. Available from: <https://pdfs.semanticscholar.org/57fd/32e6f5930cd402c93c42f6ea897788d7268f.pdf>
- 12.Aromataris E, Fernandez R, Godfrey CM, Holly C, Khalil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an umbrella review approach. *Int J Evid Based Healthc.* 2015;13(3):132-40.
- 13.Lunny C, Brennan SE, McDonald S, McKenzie JE. Toward a comprehensive evidence map of overview of systematic review methods: paper 2-risk of bias assessment; synthesis, presentation and summary of the findings; and assessment of the certainty of the evidence. *Syst Rev.* 2018;7(1):159.
- 14.Lunny C, Brennan SE, McDonald S, McKenzie JE. Evidence map of studies evaluating methods for conducting, interpreting and reporting overviews of systematic reviews of interventions: rationale and design. *Syst Rev.* 2016;5:4.
- 15.Smith V, Devane D, Begley CM, Clarke M. Methodology in conducting a systematic review of systematic reviews of healthcare interventions. *BMC Med Res Methodol.* 2011;11(1):15.
- 16.Chen H, Sui Q, Chen Y, Ge L, Lin M. Impact of haematologic deficiencies on recurrent aphthous ulceration: a meta-analysis. *Br Dent J.* 2015;218(4):E8.
- 17.Chen L, Ke Z, Zhou Z, Jiang X, Zhao Y, Zhang J. Associations of IL-1, 6, and 10 Gene Polymorphisms with Susceptibility to Recurrent Aphthous Stomatitis: Insights from a Meta-Analysis. *Genet Test Mol Biomarkers.* 2018;22(4):237-45.
- 18.Brocklehurst P, Tickle M, Glenny A-M, Lewis MA, Pemberton MN, Taylor J, et al. Systemic interventions for recurrent aphthous stomatitis (mouth ulcers). *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(9):CD005411.
- 19.Gomes C-C, Gomez R-S, Zina L-G, Amaral F-R. Recurrent aphthous stomatitis and Helicobacter pylori. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2016;21(2):e187-e91.

- 20.Han M, Fang H, Li Q-L, Cao Y, Xia R, Zhang Z-H. Effectiveness of Laser Therapy in the Management of Recurrent Aphthous Stomatitis: A Systematic Review. *Scientifica* (Cairo). 2016;2016:9062430.
- 21.Li L, Gu H, Zhang G. Association between recurrent aphthous stomatitis and Helicobacter pylori infection: a meta-analysis. *Clin Oral Investig*. 2014;18(6):1553-60.
- 22.Najeeb S, Khurshid Z, Zohaib S, Najeeb B, Qasim SB, Zafar MS. Management of recurrent aphthous ulcers using low-level lasers: A systematic review. *Medicina (Kaunas)*. 2016;52(5):263-8.
- 23.Navabi N, Zarei MR, Falsafi F, Sadeghi B. Assessment the Role of Hematologic Agent Deficiencies in the Etiology of Recurrent Aphthous Stomatitis. *J Babol Univ Med Sci*. 2013;15(3):88-95. [In Persian]
- 24.Pavlić V, vujić-Aleksić V, Aoki A, Nežić L. Treatment of recurrent aphthous stomatitis by laser therapy: A systematic review of the literature. *Vojnosanit Pregl*. 2015;72(8):722-8.
- 25.Porter S, Scully C. Aphthous ulcers (recurrent). *Clin Evid* 2005; 13:1687-94. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16135306/>
- 26.Quijano D, Rodríguez M. Topical corticosteroids in recurrent aphthous stomatitis. Systematic review. *Acta Otorrinolaringol Esp*. 2008;59(6):298-307.
- 27.Staines K, Greenwood M. Aphthous ulcers (recurrent). *BMJ Clin Evid*. 2015;2015:1303. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356175/pdf/2015-1303.pdf>
- 28.Suter VGA, Sjölund S, Bornstein MM. Effect of laser on pain relief and wound healing of recurrent aphthous stomatitis: a systematic review. *Lasers Med Sci*. 2017;32(4):953-63.
- 29.Vale FA, Moreira MS, de Almeida FC, Ramalho KM. Low-level laser therapy in the treatment of recurrent aphthous ulcers: a systematic review. *Sci World J*. 2015;2015:150412.
- 30.Wu D, Xin J, Liu J, Zhou P. The association between interleukin polymorphism and recurrent aphthous stomatitis: A meta-analysis. *Arch Oral Biol*. 2018;93:3-11.
- 31.Yang S, Zhang B, Shi Q, Liu J, Xu J, Huo N. Association of IL-6-174G/C and IL10-1082G/A polymorphism with recurrent aphthous stomatitis risk: A meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2017;96(52):e9533.
- 32.Zhou P, Mao Q, Hua H, Liu X, Yan Z. Efficacy and safety of Chinese patent medicines in the treatment of recurrent aphthous stomatitis: A systematic review. *J Am Dent Assoc*. 2017;148(1):17-25.
- 33.Afghari P, Khazaei S, Kazemi S, Savabi O, Keshteli AH, Adibi P. The role of Helicobacter pylori in the development of recurrent aphthous stomatitis: SEPAHAN systematic review no. 9. *Dent Res J (Isfahan)*. 2011;8(Suppl 1):S2-8.
- 34.Rezvaninejad R, Navabi N, Khoshroo MR, Torabi N, Atai Z. Herbal Medicine in Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis: A Literature Review. *J Islam Dent Assoc Iran*. 2017;29(3):127-34. [In Persian]