

# بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه در کودکان دیالیزی بیمارستان دکتر شیخ مشهد

دکتر حمید رضا عرب\*، دکتر کاظم فاطمی\*\*، دکتر محمد اسماعیلی\*\*\*

\* استادیار گروه پریوپنیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

\*\* استادیار گروه پریوپنیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

\*\*\* استادیار نفرونلوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ارائه مقاله: ۱۵/۱۲/۸۳ - تاریخ پذیرش: ۱۴/۱۲/۸۳

**Title:** Evaluation of oral hygiene and periodontal status in hemodialytic children of Mashhad Dr. Sheikh hospital

**Authors:**

Arab HR. Assistant Professor\*, Fatemi K. Assistant Professor\*\*, Esmaili M. Assistant Professor of Nephrology\*\*\*

**Address:**

\* Periodontics Dept, School of Dentistry Mashhad University of Medical science, Iran.

\*\* Periodontics Dept, School of Dentistry Mashhad University of Medical science, Iran.

\*\*\* School of Medicine Mashhad University of Medical science, Iran.

**Introduction:**

The purpose of this research was to determine the status of oral and gingival hygiene of dialytic patients (case group) in comparison with healthy children (control group).

**Materials and Methods:**

The two groups which consisted 19 hemodialytic patients aged between 5-16 years old from the Dr. Sheikh hospital as case group and 19 patients of the dental school as control group, were examined.

These two groups were matched according to age, sex and status of tooth-brushing. In both groups, there were 10 girls and 9 boys, 7 aged between 5-10 years and 12 aged between 11-16 years. In both groups the Gingival Index, Debris Index, simplified Calculus Index and oral Hygiene Index were examined. Mann-whitney and kruskal-walis test were used for statistical analysis.

**Results:**

Evaluation of the indices mentioned above showed that the DI-S and GI were Significantly higher in Case group than Control group. But there was not any Significant differences between the 2 group in OHI-S and CI-S. Assesment of the indices according to the age in the case group, displayed that CI-S was higher in patients aged 11-16 years old.

**Conclusion:**

Among the hemodialytic patients, plaque formation and the resultant amount of gingivitis was increased.

**Key words:**

Chronic renal failure, hemodialysis, gingival inflammation.

*Journal of Dentistry. Mashhad University of Medical Sciences*

## چکیده

### مقدمه

هدف از این مطالعه بررسی اختلالات ناشی از نارسایی مزمن کلیه بر پریوپنیکس و تعیین وضعیت لثه و بهداشت دهان در بیماران دیالیزی و مقایسه آن با کودکان سالم بود.

### مواد و روشها

در این مطالعه مورد شاهدی ۱۹ بیمار دیالیزی ۵-۱۶ ساله از بیمارستان دکتر شیخ و نیز ۱۹ نفر به عنوان گروه شاهد از مراجعه کنندگان دانشکده دندانپزشکی بررسی شدند. گروه شاهد از نظر سن، جنس و وضعیت مسوک زدن با گروه بیمار مشابه داشتند. از ۱۹ نفر در هر دو گروه ۱۰ نفر دختر و ۹ نفر پسر بودند. ۷ نفر در گروه سنی ۵-۱۰ سال و ۱۲ نفر در گروه سنی ۱۱-۱۶ سال قرار داشتند. شاخص های ایندکس لثه ای، ایندکس دبری، ایندکس کلکلوس و ایندکس ساده شده بهداشت دهان در گروه بیمار و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری توسط تست های Kruskal walis و Mann-whitney انجام گردید.

**یافته‌ها**

بررسی شاخص‌های مورد نظر نشان داد که شاخص‌های ایندکس در گروه بیمار بطور معنی داری نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. هیچ تفاوت معنی داری در بررسی ایندکس کلکلوس و ایندکس ساده شده بهداشت دهان بین دو گروه مشاهده نشد. بررسی شاخص‌های مورد نظر به تفکیک سن در گروه بیمارانشان داد که ایندکس کلکلوس در گروه سنی ۱۱-۱۶ سال بطور معنی داری نسبت به گروه دیگر بالاتر بود.

**نتیجه‌گیری**

در گروه بیماران دیالیزی میزان تشکیل پلاک و در نتیجه آن میزان ژنتیویت افزایش می‌یابد.

**کلید واژه‌ها**

نارسائی مزمن کلیوی، همودیالیز، التهاب لثه.

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / سال ۱۳۸۳ جلد ۲۸ / شماره ۳ و ۴

اورمی از عوارض شایع نارسائی مزمن کلیه است. ممکن است اورمی به علت به هم زدن تعادل مایعات و الکتروولیت‌ها و کاهش فلوئی بزاق موجب تغییرات روی لثه بیماران همودیالیزی شود و در نتیجه پریودنتیت مزمن در این بیماران با انسیدانس بالاتری دیده شود<sup>(۲)</sup>. در این بیماران افزایش جرم به دلیل تغییر کلسیم و فسفر نیز ممکن است دیده شود<sup>(۴)</sup>.

مطالعات مختلفی در زمینه بررسی وضعیت انساج دهانی بیمارانی که تحت همودیالیز قرار دارند تا کنون انجام گرفته است.

Curtis و همکارانش نقش سلولهای پلی مورفونوکلئر را در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه گزارش کرده اند<sup>(۵)</sup>. Naugle نیز با اندازه‌گیری DMFT و OHI، سلامت دهان افراد بالغ تحت همودیالیز را مورد بررسی قرار داد و گزارش نمود که تمامی افراد مورد مطالعه برخی از اشکال بیماری پریودنتال را نشان دادند<sup>(۶)</sup>. Rahman Al و همکارانش پارامترهای پریودنتالی را در بیمارانی که تحت همودیالیز بوده و نیز افرادی که پیوند کلیه داشتند بررسی نمودند. در مطالعه این محققین پلاک ایندکس بین دو گروه همودیالیز و گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت<sup>(۷)</sup>.

Kitsou و همکارانش نیز اثرات نارسائی مزمن کلیه را روی سیر و پیشرفت التهاب لثه ای بررسی کرده و تفاوت معنی داری را بین بیماران و گروه کنترل از نظر وضعیت لثه ای نیافتند<sup>(۸)</sup>. با

**مقدمه :**

بسیاری از اختلالات سیستمیک به عنوان یک عامل خطر برای بیماری مخرب پریودنتال معرفی شده اند. اکنون بوضوح مشخص گردیده که علت اصلی بیماری پریودنتال عامل باکتریائی است. شاید یکی از مشخص ترین کشیفات اخیر در مورد پریودنتیت این باشد که پاسخ میزان در افراد مختلف متفاوت است. یک پاسخ ایمنی ناقص تا تشدید شده میزان به باکتریهای پاتوژن به ایجاد فرم‌های شدید بیماری منجر می‌شود.

شواهد اخیر به روشن کردن تاثیر عفونت پریودنتال بر شرایط سیستمیک و نیز مشکلات عمومی بدن بر انساج پریودنتال کمک نموده است. عمدتاً این اختلالات شروع کننده پریودنتیت مخرب مزمن نیستند ولی ممکن است پیشرفت بیماری و میزان تخریب بافت‌های پریودنتال را تشدید و یا افزایش دهند و یا شرایط را برای این امر مستعد نمایند<sup>(۱)</sup>.

بیماری نارسائی مزمن کلیه یکی از بیماریهای ناتوان کننده است که علاوه بر ایجاد مشکلات و عوارض بسیار برای فرد، جامعه را نیز به دلیل نیاز به هزینه‌های سنگین تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌دهد. تظاهرات بیماریهای کلیه در حفره دهان می‌تواند به صور مختلف نظیر از دست دادن فانکشن طبیعی، زیایی و راحتی فرد باشد. همچنین مشکلات دهان و دندان در این بیماران می‌تواند وضعیت سلامت عمومی را بدتر نماید.

ژنتیوال اندکس<sup>(۹)</sup> دبری ایندکس، کلکلوس ایندکس و اندکس ساده شده بهداشت دهان<sup>(۱۰)</sup>. تست آماری مورد استفاده Kruskal Walis و Mann-Whitney کامپیوتر انجام گرفت.

توجه به گزارشات متفاوت و نیز عدم بررسی وضعیت بهداشت دهان و انساج پریو دنタル در کودکان دیالیزی بر آن شدیم تا ارتباط دیالیز و انساج پریو دنタル را در کودکانیکه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد تحت دیالیز قرار داشتند بررسی نمائیم.

### یافته ها :

نتایج حاصل از مطالعه به شرح زیر ارائه می گردد:  
از نظر وضعیت مسواک زدن به دو گروه تقسیم شدند.  
گروهی که استفاده مرتب از مسواک داشتند (هر روز حداقل یک بار مسواک می زدند) و گروهی که بطور نامرتب از مسواک استفاده می کردند (هر روز مسواک نمی زدند). بین گروه شاهد و مورد پس از محاسبه آماری از نظر مسواک زدن اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین از نظر جنسیت اختلاف معنی داری وجود نداشت. گروه شاهد طوری انتخاب شدند که از نظر سن، یکدیگر هماهنگ بودند.

### - آنالیز شاخص های مورد بررسی در گروه شاهد و مورد

جدول ۱: مقایسه اندکس های مورد بررسی به تفکیک گروه شاهد و بیمار

| P-value | انحراف معیار | میانگین | تعداد | اندکس های مورد بررسی |
|---------|--------------|---------|-------|----------------------|
| ۰/۰۱    | ۰/۷۳۶۶       | ۰/۰۵۲۶  | ۱۹    | شاهد DI-S            |
|         | ۰/۰۵۰۲       | ۰/۹۷۰۰  | ۱۹    | بیمار                |
| ۰/۳۳۵   | ۰/۷۰۵۲       | ۰/۴۶۳۲  | ۱۹    | شاهد CI-S            |
|         | ۰/۴۶۹۵       | ۰/۶۰۲۶  | ۱۹    | بیمار                |
| ۰/۰۰۰   | ۰/۰۴۲۰       | ۰/۸۰۴۵  | ۱۹    | شاهد GI              |
|         | ۰/۴۸۹۳       | ۱/۰۴۴۷  | ۱۹    | بیمار                |
| ۰/۰۵۱   | ۱۰/۰۳۳۴      | ۴/۹۲۷۹  | ۱۹    | شاهد OHI-S           |
|         | ۱/۰۴۹۶       | ۲/۲۰۵۳  | ۱۹    | بیمار                |

### مواد و روشها :

این مطالعه از نوع مورد - شاهد بوده و در فاصله زمانی ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۱ در دانشکده دندانپزشکی مشهد و بخش همودیالیز بیمارستان دکتر شیخ مشهد انجام گرفت.  
روش نمونه گیری در گروه بیمار از نوع غیر تصادفی ساده بود. در این مطالعه ۱۹ بیمار دیالیزی ۵-۱۶ ساله که در بخش بیمارستان فوق الذکر همودیالیز می شدند و نیز ۱۹ نفر به عنوان گروه شاهد از مراجعه کنندگان دانشکده دندانپزشکی شرکت داده شدند. گروه شاهد طوری انتخاب شدند که از نظر سن، جنس و وضعیت مسواک زدن با گروه بیمار مشابهت داشتند.  
متغیر مستقل دیالیز و متغیر وابسته، سلامت لثه و بهداشت دهان بود که با معیارهای اندکس لثه ای (GI)، اندکس دبری و اندکس کلکلوس اندازه گیری شد. معاینه گروه شاهد با مراجعه با بخش های ترمیمی، اندو و اطفال داشکده دندانپزشکی و بر روی یونیت با استفاده از سوند و پروب پریو دنタル ویلیامز و آینه دندانپزشکی و زیر نور چراغ یونیت انجام شد.

معاینه تعدادی از بیماران دیالیز که دارای همکاری مطلوب بودند و امکان مراجعه به دانشکده برایشان وجود داشت در بخش پریو دانشکده انجام شد. معاینه باقی مانده بیماران دیالیزی که امکان مراجعه به دانشکده برایشان میسر نبود در بخش همودیالیز بیمارستان به کمک سوند، پروب پریو دنタル ویلیامز، آینه دندانپزشکی و زیر نور چراغ قوه دستی انجام گرفت. برای هر بیمار فرم مخصوص که شامل وضعیت لثه، وضعیت جرم و بهداشت دهان بود تکمیل شد.

بطور خلاصه در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از تکنیک مشاهده، معاینه کلینیکی و تکمیل فرم اطلاعات استفاده گردید. پارامترهای کلینیکی مورد ارزیابی عبارت بودند از

**جدول ۳: مقایسه اندکس های مورد بررسی در گروه بیمار به تفکیک گروههای سنی**

| OHI-S  | GI     | CI-S   | DI-S   | شاخص ها           |              |
|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
|        |        |        |        | گروهها            | تعداد        |
| ۷      | ۷      | ۷      | ۷      | ۵-۱۰ سال میانگین  | تعداد        |
| ۱/۷۷۱۴ | ۱/۵۷۲۹ | ۰/۲۰۷۱ | ۱/۶۵۷۱ | ۱۱-۱۶ سال میانگین | انحراف معیار |
| ۰/۹۲۱۴ | ۰/۶۰۱۹ | ۰/۲۶۹۹ | ۰/۹۴۳۱ |                   | معیار        |
| ۱۲     | ۱۲     | ۱۲     | ۱۲     | ۱۱-۱۶ سال میانگین | تعداد        |
| ۲/۴۲۰۰ | ۱/۵۲۸۳ | ۰/۸۸۳۳ | ۱/۰۷۵۰ | ۱۱-۱۶ سال میانگین | انحراف معیار |
| ۱/۰۹۸۹ | ۰/۴۳۹۷ | ۰/۴۰۴۱ | ۰/۷۵۳۳ |                   | معیار        |
| ۱۹     | ۱۹     | ۱۹     | ۱۹     | ۱۱-۱۶ سال میانگین | تعداد        |
| ۲/۱۸۴۲ | ۱/۵۴۴۷ | ۰/۶۵۲۶ | ۱/۶۰۵۳ | ۱۱-۱۶ سال میانگین | مجموع        |
| ۱/۰۶۱۱ | ۰/۴۸۹۳ | ۰/۴۶۹۵ | ۰/۸۰۳۱ | ۱۱-۱۶ سال میانگین | انحراف معیار |
| ۰/۱۴۲  | ۰/۰۹۲  | ۰/۰۰۱  | ۱/۰۰۰  |                   | P-value      |

با بررسی جدول ۳ مشخص می گردد که در گروه بیمار در ۲ گروه سنی ۵-۱۰ سال و ۱۱-۱۶ سال در ایندکس های OHI-S، GI، DI-S اختلاف معنی داری وجود نداشت. اما در شاخص S-CI بین دو گروه سنی اختلاف معنی داری وجود داشت ( $P=0.001$ ).

#### - بررسی شاخص های مطالعه در گروه بیمار بر اساس وضعیت مساواک زدن

**جدول ۴: مقایسه میانگین شاخص های مورد بررسی در گروه بیمار به تفکیک وضعیت مساواک زدن**

| OHI-S | GI    | CI-S  | DI-S | شاخص ها |                        |
|-------|-------|-------|------|---------|------------------------|
|       |       |       |      | گروهها  | استفاده مرتب از مساواک |
| ۰     | ۰     | ۰     | ۰    | میانگین | تعداد                  |
| ۱/۳۴  | ۰/۹   | ۰/۴۲  | ۰/۹۲ |         | انحراف معیار           |
| ۰/۲۶  | ۰/۲۴  | ۰/۲۶  | ۲/۷  |         | انحراف معیار           |
| ۱۴    | ۱۴    | ۱۴    | ۱۴   | میانگین | تعداد                  |
| ۲/۵۸  | ۱/۷   | ۰/۷۳  | ۲/۸۷ |         | انحراف معیار           |
| ۱/۰۹  | ۰/۳۱  | ۰/۵   | ۳/۸  |         | معیار                  |
| ۰/۰۰۷ | ۰/۰۰۱ | ۰/۱۸۶ | ۰/۰۱ |         | P-value                |

جدول ۱ مقایسه ایندکس ها را نشان می دهد. با بررسی جدول فوق در می یابیم که در گروه شاهد و بیمار از نظر شاخص OHI-S و CI-S از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. از نظر شاخص DI-S اختلاف معنی دار وجود داشت ( $P=0.01$ ). همچنین از نظر شاخص GI اختلاف معنی دار وجود داشت ( $P=0.00$ ).

#### - آنالیز شاخص های مورد بررسی در گروه بیمار به تفکیک جنس

**جدول ۲: مقایسه اندکس های مورد بررسی در گروه بیمار به تفکیک جنس**

| OHI-S  | GI     | CI-S   | DI-S   | شاخص ها       |              |
|--------|--------|--------|--------|---------------|--------------|
|        |        |        |        | گروهها        | مونث میانگین |
| ۲/۰۵۰۰ | ۱/۴۳۹۰ | ۰/۷۴۰۰ | ۱/۴۱۰۰ | انحراف معیار  | ۰/۴۶۶۹       |
| ۱/۲۵۹۰ |        | ۰/۵۷۳۹ | ۰/۶۹۰۳ |               |              |
| ۲/۳۷۸۸ | ۱/۶۶۲۲ | ۰/۰۰۰۶ | ۱/۸۲۲۲ | مذکور میانگین | ۰/۵۲۳۳       |
| ۱/۰۶۳۹ |        | ۰/۳۲۴۵ | ۰/۹۰۲۵ |               |              |
| ۲/۲۰۵۳ | ۱/۵۴۴۷ | ۰/۶۵۲۶ | ۱/۶۰۵۳ | مجموع میانگین | ۰/۴۶۹۵       |
| ۱/۱۰۵۶ | ۰/۴۸۹۳ | ۰/۴۶۹۵ | ۰/۸۰۳۱ |               |              |
| ۰/۴۴۷  | ۰/۳۵۶  | ۰/۰۴۹۷ | ۰/۰۴۰۰ |               | P-value      |

جدول ۲ مقایسه ایندکس های مورد مطالعه را در گروه بیمار بر حسب جنس نشان می دهد. همانگونه که از جدول مشخص است از نظر آماری اختلاف معنی داری در ایندکس های مورد مطالعه وجود نداشت.

#### - بررسی شاخص های مورد بررسی در گروه بیمار به تفکیک سن

شدن اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر OHI-S، GI و DI-S اختلاف معنی دارای وجود داشت ( $P=0.01$ ) و ( $P=0.007$ ).

این مطالعه نشان داد که شاخص S-DI بین گروه بیمار و گروه شاهد اختلاف معنی داری دارد یعنی در گروه بیمار دبری بیشتر وجود دارد و چون دو گروه از لحاظ مسوک زدن با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند لذا ممکن است انجام عمل دیالیز با تشکیل دبری در ارتباط باشد. پاسخ های ایمنی در افراد اورمیک و دیالیزی سرکوب می گردند و پاسخ موضعی بافت در افراد اورمیک دستخوش تغییر شده و اورمیک شدن بر روی میزان پلاک تاثیر می گذارد<sup>(۱۱)</sup>.

بررسی شاخص CI-S در دو گروه نشان داد که اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند. لیکن وقتی گروه بیمار به دو دسته سنی ۵-۱۰ سال و ۱۱-۱۶ سال تقسیم شدن اختلاف در شاخص CI-S معنی دار می گردد به عبارت دیگر با افزایش سن میزان تشکیل جرم نیز بیشتر می شود. این مطلب با مطالعات دیگر از جمله Anerud و همکارانش (1983) هماهنگی دارد<sup>(۱۲)</sup>. چون میانگین کلیه شاخص های مورد مطالعه بر حسب مدت دیالیز و طول زمان دیالیز با یکدیگر تفاوت چشمگیری ندارند، لذا افزایش جرم در گروه سنی بزرگتر را می توان بدون ارتباط با دیالیز در نظر گرفت. با در نظر گرفتن شاخص GI در می یابیم که بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد. از طرفی چون وضعیت مسوک زدن در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته لذا تفاوت در GI را می توان به اختلاف موجود بین DI-S دو گروه نسبت داد و نتیجه گرفت که التهاب لثه در افراد دیالیز بیشتر بوده لذا ممکن است با انجام عمل دیالیز و سرکوب پاسخ های ایمنی ارتباط داشته بشد. Wolff و همکارانش با بررسی بر روی ۹ کودک دیالیزی هفت ساله و ۱۵ کودکی که مبتلا به CRF بوده اند، دریافت که نسبت به گروه کنترل دارای التهاب لثه بیشتری بودند<sup>(۱۳)</sup>.

جدول ۴ مقایسه این شاخص ها را بر اساس وضعیت مسوک زدن نشان می دهد. با توجه به جدول فوق در می یابیم که در شاخص های DI-S، GI (P=0.001)، OHI-S (P=0.007) اختلاف معنی دار وجود داشت. ولی در شاخص CI-S اختلاف معنی داری یافت نشد.

#### - بررسی شاخص های مورد مطالعه به تفکیک مدت دیالیز

بیماران به ۲ گروه تقسیم شدند. گروه ۱: ۱ تا ۱۲ ماه دیالیز شده بودند و گروه ۲ که در ۱۳ تا ۲۴ ماه دیالیز گردیده بودند. بررسی داده ها نشان داد که در ۲ گروه از نظر مدت دیالیز اختلاف معنی دار آماری در ایندکس های مورد مطالعه وجود نداشت (جدول ۵).

جدول ۵: مقایسه میانگین شاخص های مورد بررسی در گروه بیمار به تفکیک مدت دیالیز

| شاخص ها | گروهها       | OHI-S  | GI     | CI-S   | DI-S   |              |         |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------|
|         |              |        |        |        |        | تعداد        | میانگین |
| ۱۴      | ۱-۱۲ ماه     | ۱۴     | ۱۴     | ۱۴     | ۱۴     | تعداد        |         |
|         |              | ۲/۳۰۰۰ | ۱/۶۳۴۳ | ۰/۶۳۵۷ | ۱/۶۶۴۳ | میانگین      |         |
| ۰/۹۲۴۹  | انحراف معیار | ۰/۴۸۱۷ | ۰/۳۵۰۰ | ۰/۷۷۸۲ | ۰/۷۷۸۲ | انحراف معیار |         |
|         |              |        |        |        |        |              |         |
| ۵       | ۱۳-۲۴ ماه    | ۵      | ۵      | ۵      | ۵      | تعداد        |         |
|         |              | ۲/۱۴۰۰ | ۱/۲۹۴۰ | ۰/۷۰۰۰ | ۱/۴۴۰۰ | میانگین      |         |
| ۱/۶۰۸۷  | انحراف معیار | ۰/۴۶۵۳ | ۰/۷۶۸۱ | ۰/۹۴۲۳ | ۰/۹۴۲۳ | انحراف معیار |         |
|         |              |        |        |        |        |              |         |
| ۱۹      | مجموع        | ۱۹     | ۱۹     | ۱۹     | ۱۹     | تعداد        |         |
|         |              | ۲/۲۵۷۹ | ۱/۵۴۴۷ | ۰/۶۵۲۶ | ۱/۶۰۵۳ | میانگین      |         |
| ۱/۰۹۴۶  | انحراف معیار | ۰/۴۸۹۳ | ۰/۴۶۹۵ | ۰/۸۰۳۱ | ۰/۸۰۳۱ | انحراف معیار |         |
|         |              |        |        |        |        |              |         |
| ۰/۱۸    | P-value      | ۰/۰۹   | ۰/۰۷   | ۰/۱    | ۰/۱    |              |         |

#### بحث :

در مطالعه فوق دو گروه شاهد و بیمار از لحاظ سن و جنس با یکدیگر هماهنگ بودند. شاخص های مورد نظر بین دختران و پسران با یکدیگر از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت. وقتی دو گروه از لحاظ مسوک زدن به دو دسته مرتب مسوک زدن و نامرتب مسوک زدن تقسیم بندی

\* Chronic Renal Failure

بطور کلی محدودیت تعداد کودکان دیالیزی از نقاط ضعف مطالعه ما می باشد. ولی با توجه به اینکه بیماران دیالیز GI و DI-S بالاتری نسبت به گروه کنترل داشتند پیشنهاد می گردد که جهت تعیین دقیق تر رابطه دیالیز با شرایط لثه مطالعات بیشتری صورت پذیرد و حتی المقدور پس از آموزش بهداشت و یکسان سازی شرایط لثه ای در دو گروه پس از دوره ۳ هفته ای وضعیت لثه ای در دو گروه بررسی گردد.

#### تشکر و قدردانی :

بدینوسیله از زحمات بیدریغ خانم دکتر میترا نوروزی و پرسنل بخش دیالیز بیمارستان دکتر شیخ بویژه سرکار خانم جهان تیغ قدردانی می شود.

Al Rahman و همکارانش ۵۲ مورد بیمار دیالیزی را در گروه سنی بزرگسالان بررسی کردند و پلاک ایندکس بیشتری را در بیماران دیالیزی نسبت به گروه کنترل مشاهده کردند که از این نظر با تحقیق انجام شده توسط ما همانگی دارد. محققین فوق الذکر تفاوتی از لحاظ GI نیافتند که با یافته های ما در زمینه ایندکس لثه ای در اطفال دیالیزی مغایر می باشد<sup>(۷)</sup>. Gavolda و همکاران پلاک ایندکس و کلکلوس ایندکس بالاتری در بیماران دیالیزی بالغ که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشت گزارش کردند<sup>(۱۴)</sup>.

Kitsou و همکاران با ایجاد ژنتیک آزمایشی در بیماران همودیالیز بالغ تفاوتی را از نظر ایندکس لثه ای و پلاک ایندکس بین دو گروه کنترل و آزمایش نیافتند که با یافته های ما تطابق ندارد<sup>(۸)</sup>.

#### منابع :

- 1- Carranza FA, Newman MG, Takei HH. Clinical Periodontology. 9<sup>th</sup> ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2002. P. 204, 527.
- 2- Little JW, Falace DA, Miller CS. Dental management of the medically Compromized patient. 6<sup>th</sup> ed. Atimes mirror Co; 2002. P. 170.
- 3- Lazaras JM, Brenner BN. Chronic renal failure. Harrisons principles of internal medicine, disorders of the kidney and urinary tract. V.2 14<sup>th</sup> ed. 1998. P. 1026.
- 4- Ziccardi VB, Demas PN, Braun TW. Management of the oral and maxillofacial surgery patient with ESRD. J Oral Maxillofacial Surg 1992; 77: 1207-12.
- 5- Curtis JJ. Treatment of irreversible renal failure. Cecil textbook of medicine. V.1 21<sup>th</sup> ed. W.B. Saunders Company; 2000. P. 972-95.
- 6- Naugle K, Darby ML, Power R. The oral health status of individual on renal dialysis. Annals of Periodontol 1998, 3(7): 197-205.
- 7- Al Rahman MM, Calglayan F, Rahman B. Periodontal health parameters in patients with CRF and transplants receiving immuno suppressive therapy. J Nihon Univ 1992; 34: 265-72.
- 8- Kitsou VK, Konstantinidis A, Siamopoulos KC. Chronic renal failure and periodontal disease. J Ren Fail 2000; 22: 307-18.
- 9- Loe H. The gingival index, the plaque index and retention index systems. J Periodontol 1967; 38: (supp) 610.
- 10- Greene JC, Vermilion JR. The simplified oral hygiene index. J Am Dent Assoc. 1969, 68: 7-16.
- 11- Katzung BG. Drugs and the immune system. Basic and clinical pharmacology. 3<sup>rd</sup> ed. Appleton and Lange, Prentice Hallint; 1987. P. 923.
- 12- Anerud KE, Robertson PB, Loe H, Anerud LA, Boysen HM, Patters MR. Periodontal disease in tree young adult population. J Peniodontal Res. 1983; 18: 655-68.
- 13- Wolff A, Stark H, Sarnat H, Drukker A. The dental status of children with chronic renal failure. Int J Ped Nephrol 1985; 2: 127-32.
- 14- Gavolda C, Bagan J, Scully C, Milial M. Renal hemodialysis in 105 adult cases. J Oral Dis 1999; 5: 299-302.