

مطالعه شاخص های بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان (*Schizothorax zarudnyi*)

مهرداد جهان تیغ

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۸/۶

چکیده

عواملی از قبیل صید بی رویه، کاهش ورودی آب، استفاده بیش از حد از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی، آلودگی منابع آب و شیوع بیماری ها، حیات آبزیان را تهدید می کند. بررسی شاخص های خونی می تواند نقش مهمی در تشخیص تغییرات محیطی و بیماری های آبزیان ایفا کند. به این منظور در این مطالعه از تعداد ۳۰ عدد بچه ماهی سفیدک با میانگین وزنی $4/43 \pm 4/43$ گرم که به صورت آزاد در چاهنیمه های منطقه سیستان زندگی می کردند، از طریق سیاهه گدمی نمونه اخذ گردید. پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم، سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Sigma State3.5 صورت گرفت. میانگین \pm انحراف معیار گلوکز: $129/52 \pm 37/84$ ، تری گلیسرید: $274/48 \pm 118/35$ ، کلسترول: $\pm 53/42$ ، LDL: $59/95 \pm 14/05$ ، HDL: $271/87 \pm 14/05$ ، کلریم: $1/84$ ، فسفر: $20/77 \pm 3/35$ ، ازت اوره خون (BUN): $1/11 \pm 1/13$ و اسید اوریک: $1/18 \pm 2/31$ میلی گرم در دسی لیتر محاسبه گردید. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات بعدی استفاده شود.

واژگان کلیدی: شاخص های بیوشیمیایی، بچه ماهی سفیدک سیستان

* نویسنده مسؤول، پست الکترونیک: jahantighm@gmail.com

(Bullis, 1993). چنان که میزان طبیعی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون و دامنه تغییرات آن در انواع ماهیان در شرایط طبیعی یا فیزیولوژیک در دسترس باشد، بررسی فاکتورهای خون شناسی و بیوشیمیایی می‌تواند نقش مهمی در تشخیص بیماری‌های آبزیان ایفاکند (شاھسونی، ۱۳۷۷). علاوه بر این بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی یکی از راههای مناسب جهت تعیین سن بلوغ در ماهیان و همچنین تعیین جنسیت ماهیان در سنین پایین می‌باشد (Anver Celik 2004. Asadi et al., 2006).

تاکنون فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهیانی از قبیل قول آلای رنگین کمان، سیاه ماهی و ماهی کپور مورد مطالعه قرار گرفته است (خواجه و پیغان، ۱۳۸۵). شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲. یوسف زاده و همکاران، ۱۳۹۲). این مطالعه با هدف اندازه‌گیری مقادیر طبیعی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در بچه ماهی سفیدک سیستان صورت گرفت.

۲. مواد و روش ها

برای انجام این پژوهش در تابستان سال ۱۳۹۳ از تعداد ۳۰ عدد بچه ماهی سفیدک (میانگین طول $6/45 \pm 0/49$ سانتی‌متر و وزن $0/50 \pm 0/43$ گرم) استفاده شد. بچه ماهیان از چاهنیمه‌های منطقه سیستان صید شدند. خواص فیزیکی و شیمیایی آب در جدول شماره ۲ آورده شده است. دما به وسیله دماسنجد جیوه ای، pH با دستگاه پرتاپل (Oakton instrument, pH tester 30) و مواد مغذی آب به کمک دستگاه فتومتر 8000 Palintest و بر اساس دستور العمل استاندارد اندازه‌گیری شد. شفافیت به وسیله سی‌شی دیسک تعیین گردید. بچه ماهیان پس از صید و معاینه بهداشتی (از لحاظ سالم بودن و نبود علائم بیماری) با استفاده از عصاره گل میخک با دوز ۲۰۰ ppm بیهوش شدند (شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲). بچه ماهیان فوق از نظر جنسیت قابل شناسایی نبودند. عملیات خون‌گیری از طریق

۱. مقدمه

جنس *Schizothorax* قبلاً در زیر خانواده Coad طبقه بندی می‌شد (Barbus 1995)، ولی در منابع جدید همراه با جنس *Schizothoracinae* و چند جنس دیگر در زیر خانواده *Barbinae* قرار گرفته است (Nelson, 2006). ماهیان زیر خانواده *Schizothoracinae* درشت و بزرگ در اطراف مخرج و باله مخرجی با ماهیان زیر خانواده *Barbinae* تفاوت دارند (Nikolskii, 1961). این زیر خانواده شامل ۲۱ جنس، ۹۱ گونه و ۱۱ زیر گونه است. جنس *Schizotorax* با داشتن ۱۰ گونه در سال ۱۸۳۸ توسط Heckel بنیان‌گذاری شد (Sizhong, 1995) و در منابع آبی از آسیای مرکزی و شرق ایران در غرب تا مکان‌های دوری در شرق مانند رودخانه‌های مگونگ و یانگ تسه یانگ چین یافت می‌شوند (Nikolskii, 1961).

ایران در غرب تا شرق چین می‌باشد (Berg, 1949). در ایران سه گونه به نام‌های *S. intermedius* و *S. pelzami* و *S. zarudnyi* وجود دارد که دو گونه اول فقط در منطقه سیستان وجود دارند (Coad, 1995). *S. zarudnyi* در دوران بلوغ در آبگیرهای دریاچه هامون در میان بسترها پوشیده از نی به صورت اجتماعی زندگی می‌کند. تغذیه آن برخلاف دیگر گونه‌های این جنس به صورت آزادانه و از سخت‌پوستان، نرم‌تنان، جلبک‌های زرد، قهقهه‌ای، سبز، گیاهان عالی و ماهیان ریز گامبوزیا می‌باشد (وثوقی، ۱۳۶۶). عواملی از قبیل صید بی‌رویه، کاهش ورودی آب، استفاده بیش از حد از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی، آلودگی منابع آب و شیوع بیماری‌ها حیات آبزیان را تهدید می‌کند (Asadi et al., 2006). یکی از شاخص‌های مهم و قابل اطمینان در بررسی وضعیت سلامتی و فیزیولوژی آبزیان، پارامترهای بیوشیمیایی خون می‌باشد که تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله شرایط محیطی قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۲. خواص فیزیکوشیمیایی آب

شاخص	مقدار
دما (°C)	۲۶/۵
pH	۸/۲
شفافیت(cm)	۱۴۸
سولفات(mg/L)	۲۱۵
فسفات(mg/L)	۰/۲۹
نیترات(mg/L)	۲/۲
نیتریت(mg/L)	۰/۰۰۵

۴. بحث و نتیجه گیری

داشتن مقادیر طبیعی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی امکان تشخیص بسیاری از بیماری‌ها، نارسائی‌ها و شرایط غیرطبیعی را فراهم می‌آورد.(Flynn et al., 2003; Krayushkina et al., 2006). شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون در گونه‌های مختلف ماهیان با هم تفاوت دارد و بواسطه عواملی از قبیل تغییر شرایط محیطی، تغذیه‌ای، سن، بیماری و غیره تحت تاثیر قرارمی‌گیرد (شاهسونی و همکاران، ۱۳۸۵). بنابراین داشتن مقادیر طبیعی این فاکتورها برای آبزیان هر منطقه امری ضروری است. در این تحقیق نیز مقادیر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی سفیدک دریاچه هامون تعیین گردید تا به عنوان شاخص و مبنای تغییرات آن در مقایسه با سایر شرایط از قبیل استرس، بیماری، تغذیه، سن و غیره مورد استفاده قرار گیرد. مقادیر طبیعی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در سایر گونه‌های ماهی در جدول شماره ۳ ارائه شده است. گلوکز خون بچه ماهی سفیدک نسبت به ماهی بُنی سطح بالاتری داشت و تقریباً نزدیک به سطح گلوکز در ماهی کپور، قزل‌آلă و سیاه‌ماهی بود (خواجه و همکاران، ۱۳۸۶؛ خواجه و پیغان، ۱۳۸۵؛ شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲؛ یوسف‌زاده و همکاران، ۱۳۹۲). مقادیر تری‌گلیسرید با نتایج بررسی‌های صورت گرفته در

سیاه‌رگ دمی صورت گرفت. نمونه‌های خون به لوله‌های فاقد ماده ضدانعقاد منتقل و با دور ۲۵۰ rpm به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ شدند. نمونه‌های سرم با استفاده از سمپلر برداشت و به لوله‌های میکروتیوب منتقل شدند و تا زمان سنجش پارامترهای بیوشیمیایی در فریزر -۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بوسیله کیت‌های شرکت Selectra ProM پارس آزمون و دستگاه اتوآنالایزر صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری Sigma State3.5 انجام و بر اساس میانگین ± انحراف معیار، میانه، حداقل و حداکثر مقدار اعلام گردید.

۳. نتایج

نتایج بررسی پارامترهای گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، HDL، LDL، کلسیم، فسفر، BUN، اسید اوریک، وزن و طول کل بدن بچه ماهیان سفیدک سیستان در جدول ۱ آورده شده است. محاسبات بر اساس میانگین ± انحراف معیار، میانه، حداقل و حداکثر مقدار در جدول فوق آورده شده است.

جدول ۱. پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان

شاخص	میانگین ± انحراف معیار	میانه	حداقل	حداکثر
گلوکز	۱۲۹/۵۲ ± ۳۷/۴۸	۱۳۳	۵۶	۱۹۸
تری‌گلیسرید	۲۷۴/۴۸ ± ۱۱۸/۳۵	۲۴۸	۱۰۸	۴۹۹
کلسترول	۲۷۱/۸۷ ± ۵۳/۴۲	۲۹۰	۱۲۴	۳۲۲
HDL	۵۹/۹۵ ± ۱۴/۰۵	۶۶	۲۶	۷۷
LDL	۱۷۶/۷۳ ± ۴۱/۹۲	۱۷۷	۷۱	۲۳۱
کلسیم	۸/۵۴ ± ۱/۸۴	۹/۱	۴/۲	۱۱/۶
فسفر	۲۰/۷۷ ± ۳/۳۵	۲۰/۴	۱۶/۱	۲۹/۲
ازت‌اوره‌خون	۴/۱۳ ± ۱/۱۱	۳/۸	۲/۸	۶/۸
اسید اوریک	۲/۳۱ ± ۱/۱۸	۱/۸	۱/۲	۴/۹
وزن	۶/۳۴ ± ۰/۵۰	۶/۲	۵/۸	۷/۶
طول کل بدن	۴/۵۶ ± ۰/۴۹	۴/۳	۳/۷	۵/۵

کلیه شاخص‌ها بر اساس میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، وزن بر حسب گرم و طول کل بدن بر حسب سانتی‌متر اندازه‌گیری شده است.

۰/۲ تا ۲/۴ میلی گرم در دسی لیتر متغیر است. در کپور ماهیان این مقدار حدود ۲ میلی گرم در دسی لیتر و در قزل آلا $1/7 \pm 0/6$ میلی گرم در دسی لیتر گزارش شده است. که نسبت به مطالعه حاضر سطح پایین تری داشت. در اغلب ماهیان سالم آب شیرین میزان BUN پایین و در حدود ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر می باشد، ولی اختلافات گونه ای در این مورد وجود دارد به طوری که مقدار BUN در ماهیان استخوانی دریایی به طور طبیعی در حدود ۵ میلی گرم در دسی لیتر است. در مقابل در ماهیان الاسموبرانش، غلظت BUN به طور طبیعی بالاتر است و از آن برای حفظ تعادل اسمزی با آب شور استفاده می کنند (مجابی، ۱۳۷۹). نتایج این مطالعه حاکی از اختلاف بین پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان سفیدک سیستان با سایر گونه ها بود. البته این احتمال وجود دارد که با افزایش سن و قابلیت تشخیص جنس شاخص های بیوشیمیایی دستخوش تغییر گردد که نیازمند تحقیقات بیشتر است.

بچه ماهیان کپور و قزل آلای رنگین کمان مطابقت داشت (خواجه و پیغان، ۱۳۸۵؛ شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲)، اما نسبت به سیاه ماهی پایین تر و از سطح تری گلیسیرید سرم خون در ماهی بنی بیشتر است (یوسف زاده و همکاران، ۱۳۹۲؛ خواجه و همکاران، ۱۳۸۶). کلسترول در مقایسه با ماهی کپور و قزل آلا سطح بالاتری دارد و نزدیک به سطح کلسترول در سیاه ماهی و ماهی بنی می باشد (خواجه و پیغان، ۱۳۸۵؛ شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲؛ یوسف زاده و همکاران، ۱۳۹۲). کلسیم با مقادیر گزارش شده برای ماهی کپور مطابقت دارد. اما نسبت به قزل آلای رنگین کمان به مراتب کمتر و در مقایسه با سیاه ماهی سطح بالاتری دارد (خواجه و پیغان، ۱۳۸۵؛ شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲؛ یوسف زاده و همکاران، ۱۳۹۲). سطح فسفر در سرم خون ماهی سفیدک نسبت به ماهی کپور بالاتر و نزدیک به مقادیر گزارش شده برای قزل آلای رنگین کمان بود (خواجه و پیغان، ۱۳۸۵؛ شموشکی و حجتی، ۱۳۹۲). میزان اسیداوریک در ماهیان دریایی مناطق حاره از

جدول ۳. مقادیر طبیعی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون در سایر گونه های ماهیان

شاخص های بیوشیمیایی خون	ماهی بنی	سیاه ماهی	قزل آلا رنگین کمان	ماهی کپور	۱۲۴±۱۲/۵۳
گلوکز	۶۴/۶۰±۲/۵	۱۱۵/۶۶±۵۷/۷	۱۰۳/۸±۳۵/۹	۲۷۳/۴±۱۶۵/۲	۲۶۲/۶۷±۲۳/۳
تری گلیسیرید	۱۵۷/۱۰±۴/۲	۳۳۶/۹۲±۹۹/۹	۲۵/۳±۵	۲۰۲/۵۶±۵۷/۱۷	۱۶۳±۷۴/۲۸
کلسترول	۲۴۶/۲±۵/۳	۱۶/۰۷±۱/۴۶	۱۵/۹±۲/۹	-	۸/۲±۰/۶۴
کلسیم	-	-	-	-	۱۶/۴±۰/۷۴
فسفر	-	-	-	-	-
ازتاوره خون	-	-	-	-	-
اسیداوریک	-	-	-	-	-

کلیه شاخص های بیوشیمیایی بر اساس میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شده است.

تحقیقات دامپژوهشی، دوره ۶۲، شماره ۲، ص. ۲۰۳-۱۹۷.

خواجه، غ.، مصباح، م.، پیغان، ر. ۱۳۸۶. مطالعه مقایسه ای برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون

منابع

خواجه، ع.، پیغان، ر. ۱۳۸۵. بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی. مجله

سیاهروド و تالار استان مازندران. فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری، سال ششم، شماره دوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ص. ۹۳-۱۰۱.

Anver, C.E. 2004. Blood chemistry (electrolytes, lipoprotein and enzymes) values of black scorpion fish (*Scorpaena porcus*, 1758) in the Dardanelles, Turkey. J. Biol. Sci. 4: 716-719.

Asadi, F., Halajian, A., Purkabir, M. 2006. Serum biochemical parameters of *Huso huso*. Comp clin pathol. 15: 245-248.

Berg, L.S. 1949. Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. Israel program for scientific translation, Jerusalem, volume II. 1962-1965.

Bullis, R.A .1993. Clinical pathology of temperate freshwater and estuarine fishes, 232-238. In: Stoskopf MK (eds) Stoskopf fish medicine. Saunders, Philadelphia, p 882.

Coad, B.W. 1995. Freshwater fishes of Iran. Acta. Sc. Nat. Brno. 29(1).

Flynn, S. R., Matsuoka, M., Reith, M., Martin-Robichaud, D. J., & Benfey, T. J. 2006. Gynogenesis and sex determination in shortnose sturgeon, *Acipenser brevirostrum* Lesuere. Aquaculture, 253(1), 721-727.

Krayushkina, L. S., Panov, A. A., Gerasimov, A. A., & Potts, W. T. W. (1996). Changes in sodium, calcium and magnesium ion concentrations in sturgeon (*Huso huso*) urine and in kidney morphology. Journal of Comparative Physiology B, 165(7), 527-533.

Nelson, J.S. 2006. Fishes of the word. 4th ed: John Wiley and sons, Inc, 141: 622.

Nikol'skiI, G. V. 1961. Special ichthyology= Chastnaya ikhtiologiya. Translat. from russian, Nat. Sc. Found. Washington and Smith, Inst., Israel Progr. Translat. Jerusalem.

Sizhong, L. 1995. On the geographical distribution of the schizothoracinae fishes (Cypriniformes, Cyprinidae). Sinozoologia, 12: 297-310.

ماهی بنی (*Barbus sharpeyi*) و کپور علفخوار (*Ctenopharyngodon idella*) پرورشی. مجله دامپزشکی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص. ۲۳-۱۴.

ذبیحی، م. ۱۳۷۸. تعیین زمان رسیدگی جنسی و تولید مثل ماهی *Schizotorax zarudnyi* پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیلات،

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. شاهسونی، د. ۱۳۷۷. تعیین شاخصهای خونی

ماهیان خاویاری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر. پایان نامه دکتری تخصصی دامپزشکی. دانشکده

دامپزشکی، دانشگاه تهران، شماره ۶۵، ص. ۷۶-۷۲. شاهسونی، د.، مهرداد، م.، مازندرانی، م. ۱۳۸۵.

تعیین مقادیر برخی از الکتروولیت های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (*Acipenser persicus*)

مجله دامپزشکی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز ۱۳۸۵ ، جلد ۲، شماره ۲، مسلسل ۱۳ ، ص. ۱۱۲-۱۱۷

محمد نژاد شموشکی، م.، حجتی، و. ۱۳۹۲. بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای

بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus Carpio). فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری، سال ششم، شماره سوم،

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. ص. ۷۰-۶۳.

مجابی، ع. ۱۳۷۹. بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی. انتشارات نوربخش. صفحه: ۳۹۱-۳۸۵.

وشوقی، غ. ۱۳۶۶. شناسایی ماهیان حوزه دریاچه هامون. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۴۱، ص. ۴۱: ۲۰-۳.

یوسف زاده، ف.، نظامی، ش.، خارا، ح. ۱۳۹۲. مقایسه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis)

The study of serum biochemical parameters of juvenile Snow trout (*Schizothorax zarudny*)

Mehdi Jahantigh*

Department of Clinical Scince,Faculty of Veterinary Medicin and Special Animal Reserch
Institute, University of Zabol, Zabol, Iran

Abstract

Factors such as overfishing, reduction in water flow, overuse of water resources for agricultural purposes, contamination of water resources and disease outbreaks, threaten ??? aquatic life. Study of blood indicators can play an important role in the recognition of environmental changes and aquatic diseases. For this purposeblood samples from caudal vein were collected from 30 juvenile Snow trout weighing 6.34 grams from wells in Sistan area. After centrifugation and separation of serum, the measurement of the biochemical parameters was made by using auto analyzer. The statistical analysis of the data was done using the statistical software Sigma State 3.5. The mean \pm SD were calculated for different materials as follows: 129.52 ± 37.84 for Glucose, 274.48 ± 118.35 for triglyceride, 271.87 ± 53.42 for cholesterol, 59.95 ± 14.05 for HDL, 176.73 ± 41.92 for LDL, 176.73 ± 41.92 for calcium, 8.54 ± 1.84 for phosphorus, 20.77 ± 3.35 for BUN, 4.13 ± 1.11 for

Keyword: Biochemical parameters, Juvenile Snow trout,

*Corresponding author, E-mail: jahantighm@gmail.com