

## القاء علائم رفتاری شبه محرومیت از مورفين با تزریق اورکسین A به داخل هسته لوکوس سرولئوس در موش‌های صحرایی وابسته به مورفين

حسین عزیزی، سعید سمنانیان\*

گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

پذیرش: ۲۱ آبان ۹۰

دریافت: ۲۳ آبان ۸۹

### چکیده

**مقدمه:** نوروپیتید اورکسین که از هسته‌های هیپوتالاموسی منشأ می‌گیرد در رفتارهای محرومیت اپیوئیدی نقش دارد. هسته لوکوس سرولئوس (LC) متراکم ترین فیرهای اورکسینزیک را دریافت می‌کند. سندرم محرومیت از نظر زمانی با افزایش فعالیت نورون‌های هسته LC منطبق است. با وجود این، افزایش فعالیت القایی با محرومیت در این نورون‌ها در محیط *in vitro* اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ممکن است فاکتورهایی خارج از این هسته سبب تشدید فعالیت نورون‌های هسته LC طی سندرم محرومیت شوند. در این مطالعه می‌خواهیم بدانیم که آیا تزریق اورکسین A به داخل هسته LC قادر است سبب بروز علایم رفتاری سندرم محرومیت در موش‌های صحرایی وابسته به مورفين شود.

**روش‌ها:** موش‌های نر بالغ (ویستار) در محدوده وزنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم از طریق تزریق زیر جلدی مورفین (10 mg/kg, 1 ml/kg) دو بار در روز با فاصله ۱۲ ساعته به مدت ۹ روز به مورفین وابسته می‌شدند. در روز دهم ۲ ساعت پس از تزریق مورفین، اورکسین A (100 μM, 200 nl) به داخل هسته LC تزریق می‌شد. این تیمار به دنبال تزریق آنتاگونیست آن، A-SB-3334867 (0.2 μM, 0.1 μl) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. علائم سندرم محرومیت به مدت ۲۵ دقیقه در حالی که حیوان در یک استوانه شفاف از جنس پلکسی گلاس بود ارزیابی می‌شد.

**یافته‌ها:** اورکسین A توانست سبب القاء چندین علامت از علائم سندرم محرومیت شود (جویدن، خاراندن، روی پاها ایستادن، دندان قروچه، سگ لرزه و لرزش اندام جلویی). همچنین تزریق آنتاگونیست اورکسین A به داخل هسته لوکوس سرولئوس، A-SB-3334867، قبل از تزریق اورکسین A سبب کاهش این علائم شد.

**نتیجه گیری:** بنابراین ممکن است اورکسین از طریق گیرنده آن در هسته LC به عنوان یک فاکتور خارج از هسته در ایجاد علائم رفتاری سندرم محرومیت نقش ایفا کند.

**واژه‌های کلیدی:** اورکسین A، SB-334867، محرومیت از مورفین، لوکوس سرولئوس

### مقدمه

خاطر ترغیب منفی از سندرم محرومیت است که با قطع دارو ایجاد می‌شود.

مطالعات متعددی نشان داده اند که هسته LC در وابستگی به اوپیات‌ها دخیل است. در این سلول‌ها تراکم بالایی از گیرنده‌های اوپیاتی بویژه  $\mu$  و  $K$  وجود دارد [۲۴]. کاربرد موضعی یا سیستمیک اوپیات‌ها در موش‌های صحرایی سبب مهار ثبت تک واحدی نورون‌های هسته LC می‌شود [۲]. در موش‌های صحرایی وابسته به اوپیات‌ها طی محرومیت القایی

در بسیاری از مدل‌های وابستگی به دارو، ترغیب مثبت و منفی دو جزء کلیدی هستند. تداوم استفاده از دارو، بخشی به دلیل ترغیب مثبت از آثار پاداش دریافت دارو است و بخشی به

ssmenan@modares.ac.ir  
www.phypha.ir/ppj

\*نویسنده مسئول مکاتبات:  
وبگاه مجله:

*Archive of SID*

اورکسینرژیک می باشد [۱۵]. شواهد متعددی نشان می دهنده اورکسین به عنوان بازیکنی مهم در وابستگی فیزیکی به مورفين و بروز علائم محرومیت ایفای نقش می کند؛ الف. کاهش چشمگیر علائم فیزیکی سندروم محرومیت در موش های فاقد اورکسین [۸]. ب. کاهش باز علائم فیزیکی محرومیت از مورفين با تزریق داخل صفاقی آنتاگونیست گیرنده نوع ۱ اورکسین قبل از تزریق نالوکسان [۲۱]. ج. افزایش بیان cFos در نورون های اورکسینرژیک با القاء سندروم محرومیت از مورفين توسط نالوکسان [۲۱].

سندروم محرومیت با افزایش فعالیت نورون های هسته LC مرتبط است. این افزایش فعالیت القایی با محرومیت در محیط in vitro اتفاق نمی افتد. از آنجا که فعالیت نورون های اورکسینرژیک هنگام القاء سندروم محرومیت افزایش می یابد این سؤال مطرح می شود که آیا این فعالیت افزایش یافته فیبرهای اورکسینرژیک به هسته LC می تواند سبب تشديد فعالیت نورون های این هسته و سپس بروز رفتارهای محرومیت در موش های صحرایی وابسته به مورفين شود. برای پاسخ به این پرسش نوروپیتید اورکسین A را به هسته LC حیوانات وابسته به مورفين تزریق می نماییم.

## مواد و روش ها

در این پژوهش موش های صحرائی نر بالغ نژاد ویستار (۲۵۰-۳۰۰ گرمی) تهیه شده از موسسه رازی کرج مورد استفاده قرار گرفتند. حیوانات در شرایط ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند و کار با حیوانات بر اساس مصوبه کمیته اخلاق دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. برای تزریق داروها، ابتدا کانول گذاری بر اساس اطلس پاکسینوس انجام می شد. حیوان با تزریق داخل صفاقی ترکیبی از کتامین (100 mg/kg) و زایلوزین (10 mg/kg)، بیهوده می گردید و در دستگاه استریوتاکسی قرار می گرفت. بعد از ثابت کردن سر حیوان پوست ناحیه سر در خط وسط با تیغ جراحی به حداقل میزان برش داده می شد و براساس مختصات ذکر شده در اطلس پاکسینوس ناحیه مربوط به هسته LC در سطح جمجمه مشخص می گردید (۹/۸-۹/۸ میلی متر از برگما و ۱/۳ میلی متر از خط وسط) بعد از علامت-

با نالوکسان، افزایش بارزی در شلیک نورونی در هسته LC دیده می شود [۲۳، ۱۷]. دلایل متعددی نشان می دهد که افزایش فعالیت نورون های هسته LC نقش مهمی در بروز علائم محرومیت ایفا می کند؛ اولاً، از نظر زمانی، افزایش شلیک نورونی هسته LC با رفتارهای محرومیت مطابقت دارد [۱۷]. ثانیاً، تزریق سیستمیک یا موضعی کلونیدین (آگونیست گیرنده ۵۲ آدرنرژیک) به داخل هسته LC سبب سرکوب شلیک افزایش یافته نورون های این هسته [۲۰] و نیز خیلی از علائم رفتاری ناشی از محرومیت اوپیاتی می شود [۲۲]. ثالثاً، تخریب هسته LC علائم فیزیکی محرومیت اوپیاتی را کاهش می دهد [۱۱] و رابعاً، حساس ترین محل برای القای علائم محرومیت توسط تزریق موضعی آنتاگونیست اوپیاتی، هسته LC می باشد [۱۲].

فاکتورهای خارجی نقش مهمی در افزایش فعالیت ناشی از محرومیت اوپیاتی در نورون های هسته LC ایفا می کند [۱۸]. تخریب هسته PGi (شکمی جانبی بصل النخاع) که منبع اصلی آوران های گلوتاماترژیک به هسته LC است سبب کاهش فعالیت افزایش یافته ناشی از محرومیت در این نورون ها می شود [۱۶]. همچنین در طی محرومیت القایی با نالوکسان، میزان گلوتامات خارج سلولی در این هسته افزایش می یابد [۱، ۲۸] و این افزایش رهایش گلوتامات حدود ۳۰ دقیقه ماندگار است [۲۵]. تزریق نالوکسان یا گلوتامات به داخل هسته LC در موش های وابسته به مرفین سبب ایجاد علائم فیزیکی محرومیت می شود [۲۵].

اخیراً نشان داده شده است که پیتید کشف شده در دهه اخیر، اورکسین یا هیپوکرتین در وابستگی به دارو نقش ایفا می کند [۵]. پیتیدهای اورکسینی شامل اورکسین A و اورکسین B هستند که در ابتدا با نقش تحریکی بر غذا خوردن معرفی شدند [۲۰]. این پیتیدها از طریق دو گیرنده متصل به پروتئین G عمل میکنند، گیرنده نوع ۱ (OXR1) و گیرنده نوع ۲ (OXR2) اورکسین [۱۳، ۲۰]. نورون های حاوی اورکسین تعداد محدودی از نورون ها را در ناحیه هیپوپalamوس جانبی (LH) تشکیل می دهند [۱۵، ۲۰]. علی رغم تعداد کم این نورون ها، توزیع وسیع استطاله های آنها در مغز نمایانگر اهمیت و عملکرد گسترده آن ها می باشد [۱۵]. هسته لوکوس سرولئوس (LC) حاوی متراکم ترین استطاله های

*Archive of SID*

سرنگ هامیلتون ۱ میکرولیتری وصل بود. تزریق‌ها به داخل هسته LC با مقدار ۲۰۰ نانولیتر در مدت زمان ۶۰ ثانیه انجام می‌گرفت. برای اطمینان از حجم تزریق شده، حرکت حباب هوایی که حین کشیدن دارو در لوله پلی‌اتیلن (PE-20) ایجاد می‌شد مد نظر قرار می‌گرفت. برای جلوگیری از جریان معکوس داروها به سمت کانول راهنمای، کانول تزریق ۶۰ ثانیه بعد از پایان تزریق در محل خود باقی می‌ماند. پس از انجام هر آزمایش، مغز خارج می‌شد و با کمک اطلس پاکسینوس درستی محل تزریق بررسی می‌گردید. در صورتی که تزریق در محدوده هسته LC قرار می‌گرفت، داده‌های آن حیوان مورد ارزیابی واقع می‌شد. گروه‌های مورد مطالعه شامل (تیمارها در روز دهم ۲ ساعت پس از تزریق مورفین وابسته می‌گرفت):

گروه ۱: در موش‌های وابسته به مورفین اورکسین A (100 μM, 200 nl) درون هسته LC تزریق می‌شد (n=6).

گروه ۲: در موش‌های وابسته به مورفین حلال اورکسین A (200 nl) درون هسته LC تزریق می‌شد (n=6).

گروه ۳: در موش‌های وابسته به مورفین، دو دقیقه قبل از تزریق داخل هسته‌ای اورکسین A، (100 μM, 200 nl) SB درون هسته LC تزریق می‌شد (n=6).

گروه ۴: در موش‌های وابسته به مورفین دو دقیقه قبل از تزریق داخل هسته‌ای اورکسین A، حلال SB (200 nl) درون هسته LC تزریق می‌شد (n=6). در بخش آنالیز داده‌ها در مواردی که توزیع نرمال وجود داشت از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه (One Way ANOVA) و برای تعیین گروه‌های دارای اختلاف از آزمون Student-Newman-Keuls استفاده شد. گروه‌هایی که توزیع نرمال نداشتند با آزمون Kruskal-Wallis Test بررسی شدند و برای تعیین گروه‌های دارای اختلاف از Dunn's test استفاده شد. در مواردی که وجود یا عدم وجود یک علامت مدنظر بود از Chi-square test استفاده شد. P<0.05 ملاک معنی‌دار بودن اختلاف بین گروه‌های آزمایش در نظر گرفته شد.

## یافته‌ها

مطالعه حاضر نشان داد که تزریق داخل هسته‌ای اورکسین A در حیوانات وابسته به مورفین می‌تواند سبب بروز رفتارهای

گذاری ناحیه مذکور، با استفاده از مته‌های دندانپزشکی در محل مشخص شده منفذی به اندازه قطر کانول راهنمای، ایجاد شده و کانول راهنمای که از سر سوزن نمره ۲۳ دندانپزشکی ساخته می‌شد، ۱ میلی‌متر بالاتر از عمق ذکر شده در اطلس برای هسته LC (۷/۲ میلی‌متر شکمی نسبت به سطح جمجمه) درون مغز مستقر می‌گردید و به وسیله سیمان دندانپزشکی روی جمجمه ثابت می‌گردید. منفذ کانول راهنمای در بیرون جمجمه توسط درپوشی از سر سوزن نمره ۳۰ دندانپزشکی که طول آن برابر طول کانول راهنمای بود، مسدود می‌گردید.

پس از طی یک هفته دوره بهبودی حیوانات با تزریق زیر جلدی مورفین (10 mg/kg, 1 ml/kg) دو بار در روز با فاصله ۱۲ ساعت به مدت ۹ روز به مورفین وابسته می‌شدند [7]. تزریق زیر جلدی در ناحیه پشت گردن و کتف انجام می‌گرفت.


در گروه‌های مورد مطالعه بعد از انجام تیمارها، علایم فیزیکی سندروم محرومیت در یک دوره زمانی ۲۵ دقیقه‌ای در حالی که حیوان در یک استوانه شفاف از جنس پلکسی‌گلاس با ابعاد ۳۰ سانتی‌متر قطر و ۵۰ سانتی‌متر ارتفاع و بسترهای از براده‌های چوب قرار می‌گرفت، شمارش می‌شدند. قبل از شروع ثبت علائم رفتاری، به منظور عادت کردن به شرایط محیط، حیوان به مدت یک ساعت در محفظه آزمایش قرار می‌گرفت. علائم بررسی شامل جوییدن (Chewing)، خاراندن (Rearing)، روی دو پا ایستادن (Scratching)، دندان‌قروه (Wet-dog shake)، سگ‌لرزه (Teeth chattering) اندام جلویی (Paw tremor) بود. داروهای مورد استفاده در این بخش شامل مورفین سولفات (تماد، SB-334867)، آنتاگونیست انتخابی گیرنده نوع ۱ اورکسین (Tocris)، اورکسین A (Sigma) می‌باشند. پودر مورفین در سرم فیزیولوژیک حل می‌شد. اورکسین A در ACSF با غلظت ۱۰۰ میکرومولار تهیه می‌شد و SB-33467 در 100% DMSO با غلظت ۱۰ میلی‌مولار حل می‌شد و سپس با کمک ACSF به ۱۰۰ میکرومولار رسانده می‌شد (DMSO 1%).

تزریق داخل هسته‌ای LC به حیوان هوشیار و در حالیکه آزادانه در قفس حرکت می‌کرد انجام می‌شد. به منظور تزریق از سر سوزن نمره ۳۰ که به اندازه ۱ میلی‌متر بلندتر از کانول راهنمای تهیه شده بود و به یک لوله نازک پلی‌اتیلن (PE-20) متصل بود استفاده می‌گردید. انتهای دیگر لوله پلی‌اتیلن به

*Archive of SID*

**جدول ۱- القاء علائم سندروم محرومیت در موش‌های وابسته به مورفین با تزریق اورکسین A به هسته LC**  
 داخل هسته‌ای اورکسین A ( $100 \mu\text{M}$ ,  $200 \text{ nl}$ ) و یا حلال اورکسین A به داصل هسته LC در روز دهم، ۲ ساعت پس از تزریق مورفین انجام شده است. مخرج کسرها تعداد کل حیوانات و صورت آن‌ها تعداد حیواناتی که علامت مذکور را نشان داده‌اند را نمایش می‌دهند (Chi-square test, \* $P<0.05$ , \*\* $P<0.01$  n=6).

Withdrawal signs	Orexin-A vehicle	Orexin-A
<b>Chewing</b>	0/6	5/6*
<b>Scratching</b>	0/6	6/6**
<b>Rearing</b>	1/6	6/6*
<b>Teeth chattering</b>	0/6	2/6
<b>Wet-dog shake</b>	0/6	3/6
<b>Paw tremor</b>	0/6	2/6



**شکل ۱- اثر تزریق یک طرفه SB به داصل هسته LC بر بروز علائم محرومیت از مورفین القابی با تزریق اورکسین A به داصل هسته LC در موش‌های وابسته به مورفین. تزریق SB ( $100 \mu\text{M}$ ,  $200 \text{ nl}$ ) به داصل هسته LC قبل از تزریق اورکسین A ( $100 \mu\text{M}$ ,  $200 \text{ nl}$ ) به داصل هسته LC انجام گرفت. گروه‌های تزریق داصل هسته‌ای اورکسین A (OXA)، پیش تیمار با حلال SB (OXA-SB veh) و پیش تیمار با SB (OXA-SB) با هم مقایسه شدند. داده‌ها به صورت میانگین ± خطای معیار نشان داده شده‌اند (\* $P<0.05$ , n=6).**

*Archive of SID*

حیواناتی که محل تزریق اورکسین A در داخل هسته LC بود، اورکسین A نتوانست سبب بروز علائم رفتاری سندروم محرومیت شود. بنابراین اثر ظاهر شده مربوط به تأثیر دارو در این هسته، و نه در نواحی خارج از آن، می‌باشد.

در هنگام بروز سندروم محرومیت افزایش بارزی در شلیک نورونی هسته LC دیده می‌شود [۱۹، ۲۶] که از نظر زمانی، افزایش شلیک نورونی آن با رفتارهای محرومیت مطابقت دارد [۲۶]. هسته LC حاوی متراکم‌ترین فیبرهای اورکسینرژیک در بسیاری از گونه‌ها به ویژه موش صحرایی است [۱۴]. اورکسین A با اثر مستقیم بر نورون‌های هسته LC سبب افزایش شلیک خودبخودی آن‌ها می‌شود [۱۷]. دلایل قوی وجود دارد که افزایش شلیک نورونی هسته LC با رفتارهای محرومیت ارتباط دارد [۲۶]. یافته‌های ما نیز با این داده‌ها مطابقت دارد.

مکانیسم یا مکانیسم‌هایی که به واسطه آن اورکسین A سبب بروز علائم رفتاری شبیه محرومیت از مورفین در موش‌های صحرایی وابسته به مورفین می‌شود مشخص نیست. هر چند که تغییر در فعالیت گیرنده‌های گلوتامات ممکن است در این روند نقش ایفا کنند. گلوتامات که گیرنده‌های NMDA را فعال می‌کند، ورودی تحریکی اصلی نورون‌های هسته LC را تشکیل می‌دهد [۱۸]. شواهد متعدد دیگری نشان می‌دهند که ممکن است افزایش رهایش گلوتامات‌الاکتاکننده بروز سندروم محرومیت اوپیاتی باشد [۱]. از طرف دیگر اورکسین A سبب تقویت افزایش کلسیم داخل سلولی ناشی از NMDA و نیز افزایش گیرنده‌های NMDA می‌شود [۶]. اورکسین A حتی در غلظتی که اثر قابل اندازه‌گیری ایجاد نمی‌کند، سبب افزایش A ۳۰-۴۳٪ اثر NMDA می‌شود. همچنین اعمال اورکسین در برش‌های مغزی حاوی هیپوتالاموس، باعث افزایش رهایش گلوتامات از این برش‌ها می‌شود [۲۷]. لذا با توجه به داده‌های A ما در این بخش شاید بتوان گفت که احتمالاً اورکسین A علاوه بر اثر مستقیم خود بر نورون‌های هسته LC، به صورت غیر مستقیم با تقویت اثر گلوتامات در این هسته سبب افزایش شلیک نورون‌های هسته LC می‌شود و احتمالاً این افزایش شلیک است که با بروز رفتارهای سندروم محرومیت ارتباط پیدا می‌کند. شایان ذکر است که برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر در این زمینه نیاز به پژوهش‌های بیشتری است.

جویدن (Chewing)، خاراندن (Scratching)، روی پاهای ایستادن (Rearing)، دندان‌قروچه (Teeth chattering)، سگلرزه (Wet-dog shake) و لرزش اندام جلویی (Paw tremor)، شود. در گروهی که حلال اورکسین A دریافت کرده بودند علایم سندروم محرومیت از مورفین مشابه گروه قبل مشاهده نشد (جدول ۱). در گروهی که قبل از تزریق اورکسین A، SB (آناتاگونیست انتخابی گیرنده نوع ۱ اورکسین) را دریافت کرده بودند کاهش چشمگیری در علائم رفتاری القایی با تزریق داخل هسته‌ای اورکسین A مشاهده شد. حلال SB سبب کاهش علائم القایی با اورکسین A نشد (شکل ۱)، هر چند که فقط کاهش دو علامت خاراندن (Scratching) و روی پاهای ایستادن (Rearing) از نظر آماری معنی دار بود ( $P < 0.05$ ). این مسئله احتمالاً به دلیل پراکندگی زیاد داده‌های علائم رفتاری است که ممکن است با افزایش تعداد نمونه کاهش آنها نیز معنی دار شود.

**بحث**

میزان قابل توجهی از گیرنده‌های نوع ۱ اورکسین در هسته LC بیان می‌شود [۲۶]. از آنجا که میل اتصالی اورکسین A برای این گیرنده ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از اورکسین B است؛ به همین دلیل برای مطالعه اثر اورکسین در هسته LC از اورکسین A استفاده شد. غلظت اورکسین A و SB بر اساس مطالعاتی که این داروها را به صورت تزریق به داخل هسته LC استفاده کرده بودند انتخاب گردید [۴، ۱۰].

یافته‌های این قسمت از مطالعه رفتاری ما نشان داد که با تزریق اورکسین A به داخل هسته LC می‌توان علائم رفتاری شبیه محرومیت از مورفین را به وجود آورد. در حیوانات وابسته به مورفین تزریق داخل هسته‌ای اورکسین A سبب بروز رفتارهای جویدن (Chewing)، خاراندن (Scratching)، روی دو پا ایستادن (Rearing)، دندان‌قروچه (Teeth chattering)، سگلرزه (Wet-dog shake) و لرزش اندام جلویی (Paw tremor) شد. از آنجا که تزریق حلال اورکسین A به داخل هسته LC سبب بروز چنین علائمی نشد، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً این اثر به دلیل اثر فارماکولوژیک اورکسین A بوده است و ناشی دستکاری هسته LC نبوده است. در

**Archive of SID**

به مورفین سبب کاهش علائم رفتاری محرومیت القایی بالوکسان می‌شود. این یافته اخیر نیز با مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد که اورکسین ممکن است یکی از فاکتورهای خارج از هسته LC باشد که در افزایش فعالیت نورون‌های این هسته و ایجاد علائم رفتاری سندروم محرومیت نقش ایفا کند.

## سپاسگزاری

این تحقیق مستخرج از رساله دکتری رشته فیزیولوژی و با حمایت مالی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. نویسنده‌گان این مقاله از دانشگاه تربیت مدرس و صندوق حمایت از پژوهشگران که حمایت مالی این طرح را به عنوان داشتن سپاسگزاری می‌نمایند.

در بخش دیگری از این مطالعه، قبل از تزریق اورکسین A به داخل هسته LC، آنتاگونیست انتخابی گیرنده نوع ۱ اورکسین (SB) به داخل هسته LC تزریق شد. پیش تیمار با SB به طور چشمگیری علائم رفتاری القایی با تزریق داخل هسته‌ای اورکسین A را کاهش داد. در هسته LC اورکسین توسط گیرنده نوع ۱ خود سبب فعال کردن نورون‌ها می‌شود [۹]. از آنجا که SB یکی از آنتاگونیست‌های شناخته شده و انتخابی این گیرنده است؛ لذا دور از انتظار نیست که SB بتواند مانع اثر اورکسین A بر نورون‌های این هسته شود. نتیجه ما در این بخش با دیگر نتایج که نشان می‌دهند اورکسین A در حضور SB نمی‌تواند اثر خود را اعمال کند [۱۷] هم‌خوانی دارد. در مطالعه دیگری که اخیراً انجام شده است، نشان داده‌اند که تزریق آنتاگونیست انتخابی گیرنده نوع ۱ اورکسین (SB) به داخل هسته LC قبل از تزریق بالوکسان در موش‌های وابسته

## References

- [1] Aghajanian GK, Kogan JH, Moghaddam B. Opiate withdrawal increases glutamate and aspartate efflux in the locus coeruleus: an in vivo microdialysis study. *Brain Res* 636 (1994) 126-130.
- [2] Aghajanian GK. Tolerance of locus coeruleus neurones to morphine and suppression of withdrawal response by clonidine. *Nature* 276 (1978) 186-188.
- [3] Akaoka H, Aston-Jones G. Opiate withdrawal-induced hyperactivity of locus coeruleus neurons is substantially mediated by augmented excitatory amino acid input. *J Neurosci* 11 (1991) 3830-3839.
- [4] Azizi H, Mirnajafi-Zadeh J, Rohampour K, Semnanian S. Antagonism of orexin type 1 receptors in the locus coeruleus attenuates signs of naloxone-precipitated morphine withdrawal in rats. *Neurosci Lett* 482 (2010) 255-9.
- [5] Carr D, Kalivas PW. Orexin: a gatekeeper of addiction. *Nat Med* 12 (2006) 274-276.
- [6] Chen XW, Mu Y, Huang HP, Guo N, Zhang B, Fan SY, Xiong JX, Wang SR, Xiong W, Huang W, Liu T, Zheng LH, Zhang CX, Li LH, Yu ZP, Hu ZA, Zhou Z. Hypocretin-1 potentiates NMDA receptor-mediated somatodendritic secretion from locus ceruleus neurons. *J Neurosci* 28 (2008) 3202-3208.
- [7] Fan GH, Wang LZ, Qiu HC, Ma L, Pei G. Inhibition of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in rat hippocampus attenuates morphine tolerance and dependence. *Mol Pharmacol* 56 (1999) 39-45.
- [8] Georgescu D, Zachariou V, Barrot M, Mieda M, Willie JT, Eisch AJ, Yanagisawa M, Nestler EJ, DiLeone RJ. Involvement of the lateral hypothalamic peptide orexin in morphine dependence and withdrawal. *J Neurosci* 23 (2003) 3106-3111.
- [9] Hagan JJ, Leslie RA, Patel S, Evans ML, Wattam TA, Holmes S, Benham CD, Taylor SG, Routledge C, Hemmati P, Munton RP, Ashmeade TE, Shah AS, Hatcher JP, Hatcher PD, Jones DN, Smith MI, Piper DC, Hunter AJ, Porter RA, Upton N. Orexin A activates locus coeruleus cell firing and increases arousal in the rat. *Proc Natl Acad Sci* 96 (1999) 10911-10916.
- [10] Kiyashchenko LI, Mileykovskiy BY, Lai YY, Siegel JM. Increased and decreased muscle tone with orexin (hypocretin) microinjections in the locus coeruleus and pontine inhibitory area. *J Neurophysiol* 85 (2001) 2008-16.
- [11] Maldonado R, Koob GF. Destruction of the locus coeruleus decreases physical signs of opiate withdrawal. *Brain Res* 605 (1993) 128-138.

- [12] Maldonado R, Stinus L, Gold LH, Koob GF. Role of different brain structures in the expression of the physical morphine withdrawal syndrome. *J Pharmacol Exp Ther* 261 (1992) 669-677.
- [13] Marcus JN, Aschkenasi CJ, Lee CE, Chemelli RM, Saper CB, Yanagisawa M, Elmquist JK. Differential expression of orexin receptors 1 and 2 in the rat brain. *J Comp Neurol* 6 (2001) 425-435.
- [14] Nixon JP, Smale L. A comparative analysis of the distribution of immunoreactive orexin A and B in the brains of nocturnal and diurnal rodents. *Behav Brain Funct* 3 (2007) 28.
- [15] Peyron C, Tighe DK, van den Pol AN, de Lecea L, Heller HC, Sutcliffe JG, Kilduff TS. Neurons containing hypocretin (orexin) project to multiple neuronal systems. *J Neurosci* 18 (1998) 9996-10015.
- [16] Rasmussen K, Aghajanian GK. Withdrawal-induced activation of locus coeruleus neurons in opiate-dependent rats: attenuation by lesions of the nucleus paragigantocellularis. *Brain Res* 505 (1989) 346-350.
- [17] Rasmussen K, Beitner-Johnson DB, Krystal JH, Aghajanian JK, Nestler EJ. Opiate withdrawal and the rat locus coeruleus: behavioral, electrophysiological, and biochemical correlates. *J Neurosci* 10 (1990) 2308-2317.
- [18] Rasmussen K. The role of the locus coeruleus and N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) and AMPA receptors in opiate withdrawal. *Neuropsychopharmacology* 13 (1995) 295-300.
- [19] Redmond Jr DE, Huang YH. The primate locus coeruleus and effects of clonidine on opiate withdrawal. *J Clin Psychiatry* 43 (1982) 25-29.
- [20] Sakurai T, Amemiya A, Ishii M, Matsuzaki I, Chemelli RM, Tanaka H, Williams SC, Richardson JA, Kozlowski JP, Wilson S, Arch JR, Buckingham RE, Haynes AG, Carr SA, Annan RS, McNulty DE, Liu WS, Terrell JA, Elshourbagy NA, Bergsma DJ, Yanagisawa M. Orexins and orexin receptors: a family of hypothalamic neuropeptides and G protein-coupled receptors that regulate feeding behavior. *Cell* 92 (1998) 573-585.
- [21] Sharf R, Sarhan M, DiLeone RJ. Orexin mediates the expression of precipitated morphine withdrawal and concurrent activation of the nucleus accumbens shell. *Biol Psychiatry* 64 (2008) 175-183.
- [22] Taylor JR, Elsworth JD, Garcia EJ, Grant SJ, Roth RH, Redmond Jr DE. Clonidine infusions into the locus coeruleus attenuate behavioral and neurochemical changes associated with naloxone-precipitated withdrawal. *Psychopharmacology* 96 (1998) 121-134.
- [23] Taylor JR, Punch LJ, Elsworth JD. A comparison of the effects of clonidine and CNQX infusion into the locus coeruleus and the amygdala on naloxone-precipitated opiate withdrawal in the rat. *Psychopharmacology* 138 (1998) 133-142.
- [24] Tempel A, Zukin RS. Neuroanatomical patterns of the mu, delta, and kappa opioid receptors of rat brain as determined by quantitative in vitro autoradiography. *Proc Natl Acad Sci* 84 (1987) 4308-4312.
- [25] Tokuyama S, Zhu H, Oh S, Ho IK, Yamamoto T. Further evidence for a role of NMDA receptors in the locus coeruleus in the expression of withdrawal syndrome from opioids. *Neurochem Int* 39 (2001) 103-109.
- [26] Trivedi P, Yu H, MacNeil DJ, Van der Ploeg LH, Guan XM. Distribution of orexin receptor mRNA in the rat brain. *FEBS Lett* 438 (1998) 71-75.
- [27] Walling SG, Nutt DJ, Lalies MD, Harley CW. Orexin-A infusion in the locus ceruleus triggers norepinephrine (NE) release and NE-induced long-term potentiation in the dentate gyrus. *J Neurosci* 24 (2004) 7421-7426.
- [28] Zhang T, Feng Y, Rockhold RW, Ho IK. Naloxone-precipitated morphine withdrawal increases pontine glutamate levels in the rat. *Life Sci* 55 (1994) PL25-PL31.