



## نقش یک بلاکر کانال‌های کلسمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون‌های حسی گانگلیون‌های کشت شده ریشه پشتی نخاع رت بالغ

حمیدرضا مومنی<sup>\*</sup>، سید محمد علی شریعت زاده، احمد همتا، مریم میرفخرابی، نجمه اسکندری  
دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اراک، کد پستی: ۸۳۴۹-۸-۳۸۱۵۶

پذیرش: ۹۱ بهمن

دریافت: ۹۱ مهر

### چکیده

**مقدمه:** تحت شرایط پاتولوژیک، غلظت داخل سلولی کلسیم بطور غیر طبیعی افزایش یافته و منجر به مرگ سلولی می‌شود. در این پژوهش بلاکر کانال‌های کلسمی وابسته به ولتاژ مورد استفاده قرار گرفت تا نقش آن بر مهار آپوپتوزیس نورون‌های حسی گانگلیون‌های کشت شده ریشه پشتی نخاع مورد بررسی قرار گیرد.

**روش‌ها:** گانگلیون‌های L5 از ریشه پشتی نخاع رت‌های بالغ خارج و به سه گروه تقسیم شدند: ۱- گانگلیون‌های لحظه زمانی صفر که بلاکر فیکس شدند، ۲- گانگلیون‌های کنترل -۳- گانگلیون‌های تیمار شده با بلاکر کانال‌های کلسمی وابسته به ولتاژ (لوپرامید هیدروکلراید، ۲۰۰ میکرومولا). گروه‌های کنترل و تیمار برای لحظه‌های زمانی ۷۲ ساعت در محیط کشت انکوبه و فیکس شدند و سپس از کلیه گانگلیون‌های فیکس شده برش تهیه شد. برای مطالعه مورفو‌لوزیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس نورون‌های حسی، به ترتیب از رنگ‌آمیزی فلوروست (پروپیدیوم آبوداید و هوخست) و تکنیک تانل استفاده شد.

**یافته‌ها:** نورون‌های حسی گانگلیون کشت شده برای ۷۲ ساعت، مشخصات مورفو‌لوزیکی آپوپتوزیس را نمایان ساختند. علاوه بر آن، اکثر نورون‌های حسی به صورت تانل مثبت ظاهر شدند. در این زمان کاربرد لوپرامید هیدروکلراید نه تنها توانست مشخصات مورفو‌لوزیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس را در نورون‌های حسی مهار نماید، بلکه توانست میانگین قطر هسته این نورون‌ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش دهد.

**نتیجه گیری:** افزایش کلسیم داخل سلولی احتمالاً یکی از دلایل آپوپتوزیس نورون‌های حسی در گانگلیون‌های کشت شده ریشه پشتی نخاع می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** گانگلیون‌های ریشه پشتی، نورون حسی، آپوپتوزیس، لوپرامید هیدروکلراید

### مقدمه

شده و مطالعات متعددی نیز در این خصوص وجود دارد. برخلاف آکسون نورون‌های موجود در سیستم اعصاب مرکزی که ترمیم نمی‌شوند، نورون‌های حسی موجود در سیستم اعصاب محیطی در محیط کشت از قابلیت بقا و ترمیم نسبتاً زیادی برخوردار هستند. در این خصوص مطالعات متعددی نیز در مورد ترمیم آکسون و مکانیسم‌های دخیل در آن در این نورون‌ها انجام شده است. با وجود قابلیت حیات بالای نورون‌های حسی در محیط کشت، تعدادی از آن‌ها در شرایط *in vitro* دستخوش مرگ سلولی می‌شوند. مطالعات صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که مرگ سلولی در این نورون‌ها به روش آپوپتوزیس بوده است. به

کشت بافت اولین بار در آغاز قرن بیستم به عنوان روشی برای مطالعه رفتار سلول ابداع شد تا شرایطی مشابه آنچه که در *in vivo* بر بافت حاکم است را بوجود آورد. کشت گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglia) به عنوان مدلی برای کشت بافت در نظر گرفته

h-momeni@araku.ac.ir

\*نویسنده مسئول مکاتبات:

www.phypha.ir/ppj

وبگاه مجله:

اگر چه گزارش هایی دال بر آپوپتوزیس نورون های حسی در طی کشت عقده های ریشه پشتی نخاع وجود دارد، با این حال مکانیسم های متفاوتی جهت القا آپوپتوزیس را در این نورون ها مطرح نموده است [۱۴، ۸]. با توجه به اینکه آپوپتوزیس فرایند پیچیده ای است که می تواند از طریق مکانیسم های مختلف به طور همزمان القا شود، نه تنها مکانیسم های مختلف ارائه شده در خصوص آپوپتوزیس نورون های حسی را توجیه می نماید بلکه احتمال دخالت سایر مکانیسم ها در القا آپوپتوزیس این نورون ها را نیز می تواند مطرح نماید. از آنجا که کشت گانگلیون های ریشه پشتی نخاع می تواند مدلی از آکسوتومی نورون های حسی این گانگلیون ها باشد، لذا بررسی و شناسایی کلیه مکانیسم های دخیل در مرگ این نورون ها با هدف مهار آن ها می تواند استراتژی را جهت بقا این نورون ها و بنابراین تسهیل در امکان ترمیم آکسون های آسیب دیده آن ها ارائه نماید.

با توجه به این که افزایش بیش از حد سطح کلسیم سیتوزولی برای سلول ها و به خصوص نورون ها مرگ آور است، این احتمال وجود دارد که کشت گانگلیون های ریشه پشتی نخاع موجب شده است تا نورون های حسی آن در معرض افزایش کلسیم داخل سلولی قرار گرفته باشند. بنابراین می توان این گونه فرض نمود که با جلوگیری از افزایش بیش از حد این یون در داخل سلول بتوان از مرگ این نورون ها جلوگیری و یا حداقل مرگ آن ها را به تأخیر انداخت. یکی از این روش ها می تواند استفاده از بلاکر کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ باشد. در این خصوص مطالعات مختلفی نیز دال بر مهار آپوپتوزیس در نورون ها با استفاده از کاربرد بلاکر کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ وجود دارد [۲۸، ۱۵].

بنابراین پژوهش حاضر برای اولین بار با هدف بررسی اثر یک بلاکر کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ بر روی آپوپتوزیس نورون های حسی از گانگلیون های ریشه پشتی نخاع (که در شرایط طبیعی و بدون تأثیر عوامل خارجی کشت شده اند) طراحی شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا افزایش بیش از اندازه کلسیم داخل سلولی می توانست به عنوان یکی از عوامل محتمل برای القا آپوپتوزیس این نورون ها باشد.

عنوان مثال تحقیقات Lindwall و همکارانش [۱۴] نشان داد که طی کشت گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت های تازه متولد شده، تعدادی از نورون های حسی دستخوش آپوپتوزیس شده اند. این گروه کاهش مکانیسمی برای القا آپوپتوزیس در این نورون ها پیشنهاد نمودند. همچنین حدادی و همکاران [۸] گزارش نمودند که مرگ سلولی نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع کشت شده موش بالغ از نوع آپوپتوزیس بوده است و فعال شدن کاسپاز ۳ را در این نورون ها به عنوان یکی از مکانیسم های دخیل در آپوپتوزیس این نورون ها مطرح نمودند. علاوه بر آن، به دنبال آسیب اعصاب محیطی مربوط به نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع در شرایط *in vivo* تغییرات دترنرایتو در جسم سلولی این نورون ها حاکی از مرگ سلولی به روش آپوپتوزیس بوده است [۲، ۳، ۱۸، ۱۹].

مکانیسم های متعددی در خصوص مرگ نورونی مطرح است که از جمله می توان به افزایش غیر طبیعی یون کلسیم داخل سلولی اشاره نمود. تحت شرایط فیزیولوژیک غلظت کلسیم سیتوزول در سطح بسیار پایین است، در حالی که این غلظت در شرایط پاتولوژیک افزایش یافته و موجب شروع سیگنال هایی می گردد که به مرگ سلولی می انجامد. در این خصوص شواهدی دال بر مرگ سلولی القا شده توسط افزایش غلظت کلسیم داخل سلول های در سلول های تیمار شده با یونوفورهای کلسیم و یا مهار پمپ کلسیم موجود بر روی غشا سیتوپلاسمی وجود دارد [۱۱]. کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ یکی از راه های ورود کلسیم به درون سلول هستند. این کانال ها عضوی از خانواده بزرگ کانال های یونی وابسته به ولتاژ می باشند که با توجه به ویژگی های فارماکولوژیکی و بیوفیزیکی، انواع مختلفی از آن ها در سلول های مختلف شناسایی شده است [۳۰]. یکی از انواع این کانال ها نوع N می باشد که وجود آن ها در نورون ها ثابت شده است [۲۶]. در شرایط پاتولوژیک تغییر ولتاژ یا سایر اختلالات یونی نورون ها منجر به باز شدن این کانال ها شده و با ورود بیش از اندازه کلسیم موجب افزایش غیرطبیعی کلسیم داخل سلولی [۲۰] و سرانجام مرگ سلولی می گردد.

## مواد و روش ها


برش گیری و برش ها بر روی لام های آغشته به پلی - ال - لایزین (۱:۹) در آب مقطر (قرار گرفتند. سرانجام لام ها در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد تا هنگام استفاده نگهداری شدند. به منظور بررسی مشخصات مورفولوژیکی آپوپتوزیس در نورون های حسی، رنگ های فلئورسنت پروپیدیوم آبوداید (Propidium iodide, Sigma) با غلظت ۱۰ میکرو گرم بر ۳۳۳۴۲ میلی لیتر به مدت ۳ دقیقه و هوخت ۵ میکرو گرم بر میلی (Hoechst 33342, Sigma) با غلظت ۵ میکرو گرم بر میلی لیتر به مدت ۳۰ ثانیه مورد استفاده قرار گرفتند. سپس لام ها با PBS شستشو داده شد (۳ بار و هر بار ۵ دقیقه) و پس از اضافه نمودن محلول گلیسرول / PBS (۱:۱) با لامل پوشانده شدند. لام ها سپس با استفاده از میکروسکوپ فلئورسنس و فیلتر مناسب مشاهده و از آن ها عکس تهیه شد. به منظور بررسی جنبه بیوشیمیایی آپوپتوزیس در نورون های حسی تکنیک تانل TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase Biotin dutp nick end labling) مورد استفاده قرار گرفت. مراحل انجام تکنیک تانل بر اساس دستورالعمل پیشنهادی شرکت سازنده (Chemicon, USA) انجام شد. سرانجام لام ها توسط میکروسکوپ نوری مشاهده و از آن ها عکس تهیه شد. جهت اندازه گیری قطر هسته نورون های حسی از نرم افزار متیک استفاده شد و داده های حاصل از این اندازه گیری به صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار بیان شدند. آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) همراه با آزمون Tukey برای سنجش آماری داده ها مورد استفاده قرار گرفت و  $P < 0.05$  به عنوان مرز معنی دار بودن داده ها در نظر گرفته شد.

## یافته ها


در گانگلیون های لحظه زمانی صفر، نورون های حسی دارای اجسام سلولی و هسته بزرگ بودند، مواد هسته ای توزيع طبیعی داشته و هیچ گونه علامت آپوپتوزیس مشاهده نشد (شکل ۱A). در اکثر نورون های حسی گانگلیون های کشت شده برای ۷۲ ساعت یعنی گروه کنترل (شکل ۱B) چروکیدگی سلول و متراکم شدن هسته و کروماتین به خوبی مشخص بود. تیمار با لوپرامید هیدروکلراید با غلظت ۲۰۰

در این مطالعه رت های ماده های بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی  $20 \pm 20$  گرم مورد استفاده قرار گرفتند. رت ها از انستیتو پاستور ایران خردباری و در خانه هی حیوانات در شرایط استاندارد، دمای  $21 \pm 2$  درجه سانتی گراد، رطوبت ۷۵ درصد و نور کنترل شده با شرایط ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی با دسترسی به آب و غذای کافی نگهداری شدند. در کلیه آزمایش ها، اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شده است. حیوانات با استفاده از اتر کاملاً بی هوش و توسط شکافتگی قلب کشته شدند. پس از باز نمودن ناحیه پشتی در محل نخاع، یک جفت گانگلیون ۵.۵ از گانگلیون های ریشه پشتی نخاع هر رت خارج و به پتری استریل حاوی محیط کشت سرد منتقل شدند. سپس نمونه ها به سه گروه تقسیم شدند: ۱- گانگلیون های لحظه زمانی صفر که بلا فاصله فیکس شدند. ۲- گانگلیون های گروه کنترل و ۳- گانگلیون های گروه تیمار با لوپرامید هیدروکلراید (با غلظت ۲۰۰ میکرومولار در این پژوهش) به عنوان یک بلاکر کanal کلسبیمی وابسته به ولتاژ. نمونه های گروه کنترل و تیمار به پتری استریل حاوی  $2000$  میکرولیتر محیط کشت شامل Minimum Essential Medium (MEM) درصد ۵۰، HEPES درصد ۲۵، سرم اسپ، میلی مولار  $25$ ، (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)، HBSS درصد ۲۵، Hanks Balanced Salt Solution درصد پنی سیلین- استریوتومایسین و  $6$  گرم در لیتر گلوکز با درصد  $pH=7/3-7/4$  با دمای  $37$  درجه سانتی گراد منتقل و در انکوباتور  $CO_2$  دار با دمای  $37$  درجه سانتی گراد برای  $72$  ساعت انکوبه شدند.


گانگلیون های لحظه زمانی صفر و کشت شده توسط فیکساتور استفانی شامل  $2$  درصد پارافرمالدئید،  $0.0/0$  درصد اسید پیکریک در  $1/0$  مولار بافر فسفات با  $pH: 7/2$  ساعت فیکس شدند. سپس گانگلیون ها  $3$  بار و هر بار به PBS (Phosphate Buffered Saline) توسط شستشو و برای مدت یک شب در محلول ساکاروز  $20$  درصد در PBS، در یخچال نگهداری شدند. سپس گانگلیون ها با استفاده از cryostat (لایکا، آلمان) با ضخامت  $10$  میکرون



**شکل ۱**- نقش یک بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ (لپرامید هیدروکلرايد) در مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع. رنگ آمیزی فلئورسنت پروپیدیوم آیوداید و هوختن ۳۳۳۴۲ تغییرات را در نورون های حسی نشان می دهد. (A) نورون های حسی گانگلیون های لحظه زمانی صفر. (B) نورون های حسی گانگلیون های کشته شده برای ۷۲ ساعت (کنترل). کاربرد لپرامید هیدروکلرايد برای ۷۲ ساعت (C) با غلظت ۲۰۰ میکرومولار توانست نشانه های مورفوЛОژیکی آپوپتوزیس را در نورون های حسی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گروه کنترل مهار نماید. فلاش ها نورون های حسی را نشان می دهند. Scale bar = 50  $\mu\text{m}$ .



**شکل ۲**- تأثیر یک بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ (لپرامید هیدروکلرايد) در مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع با استفاده از تکنیک تائل (TUNEL). (A): بدون رنگ بودن نورون های حسی برش های مریوط به لحظه زمانی صفر بیانگر تائل منفی بودن این نورون ها بود. (B): رنگ قهوه ای هسته ها بیانگر تائل مشبت بودن نورون های حسی گانگلیون های کشته شده پس از ۷۲ ساعت در محیط کشته بود. (C): کاربرد لپرامید هیدروکلرايد با غلظت ۲۰۰ میکرومولار پس از ۷۲ ساعت توانست آپوپتوزیس را در نورون های حسی نسبت به گروه کنترل مهار نماید و نورون ها به صورت تائل منفی ظاهر شدند. فلاش ها نورون های حسی را نشان می دهند. Scale bar = 50  $\mu\text{m}$ .



**شکل ۳**- اثر یک بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ (لپرامید هیدروکلرايد) بر قطر هسته نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع. میانگین قطر هسته نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع کشته شده پس از ۷۲ ساعت نسبت به میانگین قطر هسته این نورون ها در لحظه زمانی صفر کاهش معنی داری را نشان داد. لپرامید هیدروکلرايد با غلظت ۲۰۰ میکرومولار پس از ۷۲ ساعت در محیط کشته به طور معنی داری توانست کاهش قطر هسته نورون های حسی را در مقایسه با کنترل مهار نماید. داده ها به صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار ارائه شده است. (\*:P<0.05 در مقایسه با گروه کنترل و f: P<0.05 در مقایسه با لحظه صفر) (ANOVA, Tukey's test, n=25)

کروماتین را نشان دادند. مطالعات متعددی این مشخصات را به عنوان ویژگی‌های مورفولوژیکی آپوپتوزیس گزارش نموده‌اند [۲۶، ۲۴، ۲۲]. نتایج حاصل از تکنیک تانل توانست نتایج مورفولوژیکی را تایید نماید. این روش برای تشخیص مشخصه بیوشیمیایی آپوپتوزیس (قطعه قطعه شدن DNA) مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۲]. با این حال، این تکنیک دارای محدودیت‌هایی است، به طوری که گزارش‌هایی وجود دارد که این روش علاوه بر سلول‌های آپوپتویک قادر است سلول‌های نکروتیک را نیز به صورت تانل مثبت مشخص نماید [۷، ۱]. با این وجود در حال حاضر این تکنیک در بسیاری از تحقیقات جهت شناسایی آپوپتوزیس مورد استفاده قرار می‌گیرد [۴، ۲۲]. بر اساس نتایج کسب شده این احتمال وجود داشت که آپوپتوزیس مسئول مرگ نورون‌های حسی در گانگلیون‌های کشت شده ریشه پشتی نخاع باشد.

مطالعات نشان می‌دهد که آپوپتوزیس در سلول‌ها می‌تواند از طریق مکانیسم‌های متعددی القا شود. به عنوان مثال افزایش کلسیم داخل سلولی به عنوان یکی از مکانیسم‌های مهم دخیل در آپوپتوزیس نورون‌ها مطرح است. در این خصوص گزارش‌هایی داد بر القا آپوپتوزیس در نورون‌ها ناشی از افزایش غیر طبیعی کلسیم داخل سلولی در بیماری‌های ناشی از ذُرَر شدن نورون‌ها (بیماری‌هایی که در آن نورون‌ها دچار اضمحلال می‌شوند) وجود دارد [۲۵].

کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ یکی از راه‌های ورود کلسیم به درون سلول هستند که می‌توانند در شرایط پاتولوژیک در روند آپوپتوزیس نقش داشته باشند [۲۶]. مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از بلاکر کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ توانسته است آپوپتوزیس القا شده در نورون‌ها را مهار نماید [۱۵، ۱۶، ۲۸]. بنابراین در تحقیق حاضر از لوپرامید هیدروکلراید استفاده شد تا نقش این کانال‌ها در آپوپتوزیس نورون‌های حسی مشخص گردد. نتایج به دست آمده نشان داد لوپرامید هیدروکلراید می‌تواند جنبه‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آپوپتوزیس را در نورون‌های حسی مهار نماید. لوپرامید به عنوان یک بلاکر کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ مطرح است [۵] که قادر است به طور کامل به درون سیستم اعصاب مرکزی نفوذ نماید [۲۷]. از آنجا که این

میکرومولار برای ۷۲ ساعت (شکل ۱C) توانست نشانه‌های مورفولوژیکی آپوپتوزیس را در نورون‌های حسی نسبت به گروه کنترل به طور قابل ملاحظه‌ای مهار نماید. تکنیک تانل جهت بررسی جنبه‌ی بیوشیمیایی آپوپتوزیس (شکسته شدن DNA) در نورون‌های حسی گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع به کار برده شد. هسته نورون‌های حسی برش‌های مربوط به گانگلیون‌های لحظه زمانی صفر، بدون رنگ و بدین ترتیب تانل منفی (TUNEL negative) بودند (شکل ۲A). پس از گذشت ۷۲ ساعت در محیط کشت، به تدریج هسته بعضی از نورون‌ها به رنگ قهوه‌ای ظاهر شدند که بیانگر نشاندار شدن هسته این نورون‌ها و تانل مثبت (TUNEL positive) بودن این سلول‌ها بود (شکل ۲B). در این زمان کاربرد لوپرامید هیدروکلراید با غلظت ۲۰۰ میکرومولار (شکل ۲C) توانست شکستگی DNA را در این نورون‌ها نسبت به گروه کنترل مهار نماید و نورون‌ها به صورت تانل منفی ظاهر شدند.

میانگین قطر هسته نورون‌های حسی گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع کشت شده پس از ۷۲ ساعت (کنترل) نسبت به میانگین قطر هسته این نورون‌ها در لحظه زمانی صفر کاهش معنی داری ( $P < 0.05$ ) را نشان داد. کاربرد لوپرامید هیدروکلراید (۲۰۰ میکرومولار) پس از گذشت ۷۲ ساعت توانست کاهش میانگین قطر هسته نورون‌ها را نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری ( $P < 0.05$ ) جبران نماید (شکل ۳).

## بحث

در تحقیق حاضر کشت گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع مورد استفاده قرار گرفت تا یکی از مکانیسم‌های احتمالی دخیل در مرگ نورون‌های حسی این گانگلیون‌ها مورد مطالعه قرار گیرد. این بررسی نشان داد که لوپرامید هیدروکلراید به عنوان بلاکر کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ توانست آپوپتوزیس ایجاد شده در نورون‌های حسی را مهار نماید. با استفاده از رنگ‌های فلئورسنت پروپیدیوم آبوداید و هوختست که می‌تواند با اتصال به DNA تغییرات هسته‌ای در طی آپوپتوزیس را مشخص نماید [۱۳، ۲۳]. نورون‌های حسی گانگلیون‌های کشت شده مشخصات مورفولوژیکی آپوپتوزیس مانند چروکیدگی سیتوپلاسم، متراکم شدن هسته و

ناشی از فعال شدن این آنزیمها باشد. علاوه بر این افزایش بیش از حد کلسیم داخل سلولی موجب عملکرد غیر طبیعی ارگانل های سلولی از جمله میتوکندری ها می شود. بدین ترتیب که با افزایش غیرطبیعی غلظت کلسیم سیتوزولی، جذب کلسیم توسط میتوکندری ها افزایش و منجر به تجمع بیش از اندازه کلسیم در این ارگانل می گردد. این امر موجب تغییر ولتاژ غشا میتوکندری ها و باز شدن منافذ این ارگانل شده که به واسطه آن منجر به آزاد شدن پروتئین های آپوپتوزنیک همچون سیتوکروم c، فاکتور القا کننده آپوپتوزیس (Apoptosis inducing factor) و اندونوکلئاز G از این اندامک می شود [۱۰].

از آنجا که کاربرد بلاکر کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ در محیط کشت گانگلیون های ریشه پشتی نخاع توانست نشانه های آپوپتوزیس را در نورون های حسی مهار نماید می توان احتمال داد که افزایش کلسیم داخل سلولی احتمالاً یکی از دلایل آپوپتوزیس نورون های حسی در گانگلیون های کشت شده ریشه پشتی نخاع می باشد.

## سیاستگزاری

این پژوهش در آزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک و با حمایت مالی این دانشگاه انجام شده است.

## References

- [1] Ansari B, Coates PJ, Greenstein BD, Hall PA, In situ end-labelling detects DNA strand breaks in apoptosis and other physiological and pathological states. *J Pathol* 170 (1993) 1-8.
- [2] Atlasi MA, Mehdizadeh M, Bahadori MH, Joghataei MT, Morphological identification of cell death in dorsal root ganglion neurons following peripheral nerve injury and repair in adult rat. *Iran Biomed J* 13 (2009) 65-72.
- [3] Bahadori MH, Al-Tiraihi T, Valojerdi MR, Sciatic nerve transection in neonatal rats induces apoptotic neuronal death in L5 dorsal root ganglion. *J Neurocytol* 30 (2001) 125-130.

ماده همچنین قادر است که به عنوان یک آگونیست ریپتورهای اپیوئیدی نوع مو نیز عمل نماید [۶]، لذا امکان دخالت سیستم اپیوئیدی در نتایج کسب شده پژوهش حاضر منتفی نیست. با این وجود با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اینکه لوپرامید قادر است جریان کلسیم به درون نورون های پیرامیدال هیپوکامپ موش [۵] و نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع موش [۹] را مهار نماید، این احتمال را قوت می بخشد که در نورون های حسی لوپرامید بتواند نقش موثر تری به عنوان یک بلاکر کانال کلسیمی وابسته به ولتاژ تا یک آگونیست ریپتورهای اپیوئیدی مو ایفا نماید. بنابراین می توان احتمال داد که طی کشت گانگلیون های ریشه پشتی نخاع، تغییر ولتاژی در غشاء سیتوپلاسمی نورون های حسی موجب باز شدن این کانال ها و بنابراین افزایش غیرطبیعی غلظت کلسیم داخل سلولی شده باشد و این افزایش به نوبه خود از طریق مکانیسم های مختلف وابسته به کلسیم توانسته است آپوپتوزیس را در نورون های حسی این عقده ها القا نماید. این که چطور و با چه مکانیسمی افزایش غیر طبیعی کلسیم داخل سلولی توانسته است منجر به آپوپتوزیس نورون های حسی شده باشد قابل بحث است. از آن جا که افزایش غیر طبیعی کلسیم داخل سلولی با فعال نمودن پروتئاز ها [۲۱] و اندونوکلئاز های [۱۷] وابسته به کلسیم می تواند در القا آپوپتوزیس نقش مهمی بازی نماید، بنابراین منطقی ترین احتمال در خصوص آپوپتوزیس نورون های حسی می تواند

- [4] Buschmann T, Martin-Villalba A, Kocsis JD, Waxman SG, Zimmermann M, Herdegen T, Expression of Jun, Fos, and ATF-2 proteins in axotomized explanted and cultured adult rat dorsal root ganglia. *Neuroscience* 84 (1998) 163-176.
- [5] Church J, Fletcher EJ, Abdel-Hamid K, MacDonald JF, Loperamide blocks high-voltage-activated calcium channels and N-methyl-D-aspartate-evoked responses in rat and mouse cultured hippocampal pyramidal neurons. *Mol Pharmacol* 45 (1994) 747-757.
- [6] DeHaven-Hudkins DL, Burgos LC, Cassel JA, Daubert JD, DeHaven RN, Mansson E, Nagasaka H, Yu G, Yaksh T, Loperamide (ADL 2-1294), an opioid antihyperalgesic agent with peripheral selectivity. *J*

- Pharmacol Exp Ther** 289 (1999) 494-502.
- [7] Grasl-Kraupp B, Ruttay-Nedecky B, Koudelka H, Bukowska K, Bursch W, Schulte-Hermann R, In situ detection of fragmented DNA (TUNEL assay) fails to discriminate among apoptosis, necrosis, and autolytic cell death: a cautionary note. **Hepatology** 21 (1995) 1465-1468.
- [8] Haddadi M, *Study of cell death in sensory neurons of dorsal root ganglia in adult mouse*. (dissertation). Biology department, Faculty of Science, Arak University, 2011.
- [9] Hagiwara K, Nakagawasaki O, Murata A, Yamadera F, Miyoshi I, Tan-No K, Tadano T, Yanagisawa T, Iijima T, Murakami M, Analgesic action of loperamide, an opioid agonist, and its blocking action on voltage-dependent Ca<sup>2+</sup> channels. **Neurosci Res** 46 (2003) 493-497.
- [10] Jeong SY, Seol DW, The role of mitochondria in apoptosis. **BMB Rep** 41 (2008) 11-22.
- [11] Kajitani N, Kobuchi H, Fujita H, Yano H, Fujiwara T, Yasuda T, Utsumi K, Mechanism of A23187-induced apoptosis in HL-60 cells: dependency on mitochondrial permeability transition but not on NADPH oxidase. **Biosci Biotechnol Biochem** 71 (2007) 2701-2711.
- [12] Labat-Moleur F, Guillermot C, Lorimier P, Robert C, Lantuejoul S, Brambilla E, Negescu A, TUNEL apoptotic cell detection in tissue sections: critical evaluation and improvement. **J Histochem Cytochem** 46 (1998) 327-334.
- [13] Lecoeur H, Nuclear apoptosis detection by flow cytometry: influence of endogenous endonucleases. **Exp Cell Res** 277 (2002) 1-14.
- [14] Lindwall C, Kanje M, The Janus role of c-Jun: cell death versus survival and regeneration of neonatal sympathetic and sensory neurons. **Exp Neurol** 196 (2005) 184-194.
- [15] Mason RP, Leeds PR, Jacob RF, Hough CJ, Zhang KG, Mason PE, Chuang DM, Inhibition of excessive neuronal apoptosis by the calcium antagonist amlodipine and antioxidants in cerebellar granule cells. **J Neurochem** 72 (1999) 1448-1456.
- [16] Momeni HR, Jarahzadeh M, Effects of a voltage sensitive calcium channel blocker and a sodium calcium exchanger inhibitor on apoptosis of motor neurons in adult spinal cord slices. **Cell Journal** 14 (2012) 171-176.
- [17] Nagata S, DNA degradation in development and programmed cell death. **Annu Rev Immunol** 23 (2005) 853-875.
- [18] Oliveira AL, Apoptosis of sensory neurons and satellite cells after sciatic nerve transection in C57BL/6J mice. **Braz J Med Biol Res** 34 (2001) 375-380.
- [19] Oliveira AL, Risling M, Deckner M, Lindholm T, Langone F, Cullheim S, Neonatal sciatic nerve transection induces TUNEL labeling of neurons in the rat spinal cord and DRG. **Neuroreport** 8 (1997) 2837-2840.
- [20] Ozaki T, Yamashita T, Ishiguro S, Mitochondrial m-calpain plays a role in the release of truncated apoptosis-inducing factor from the mitochondria. **Biochim Biophys Acta** 1793 (2009) 1848-1859.
- [21] Ray SK, Hogan EL, Banik NL, Calpain in the pathophysiology of spinal cord injury: neuroprotection with calpain inhibitors. **Brain Res Rev** 42 (2003) 169-185.
- [22] Sango K, Horie H, Saito H, Ajiki K, Tokashiki A, Takeshita K, Ishigatsubo Y, Kawano H, Ishikawa Y, Diabetes is not a potent inducer of neuronal cell death in mouse sensory ganglia, but it enhances neurite regeneration in vitro. **Life Sci** 71 (2002) 2351-2368.
- [23] Suzuki T, Fujikura K, Higashiyama T, Takata K, DNA staining for fluorescence and laser confocal microscopy. **J Histochem Cytochem** 45 (1997) 49-53.
- [24] Vogelbaum MA, Tong JX, Rich KM, Developmental regulation of apoptosis in dorsal root ganglion neurons. **J Neurosci** 18 (1998) 8928-8935.
- [25] Vosler PS, Brennan CS, Chen J, Calpain-mediated signaling mechanisms in neuronal injury and neurodegeneration. **Mol Neurobiol** 38 (2008) 78-100.
- [26] Westenbroek RE, Hell JW, Warner C, Dubel SJ, Snutch TP, Catterall WA, Biochemical properties and subcellular distribution of an N-type calcium channel alpha 1 subunit. **Neuron** 9 (1992) 1099-1115.
- [27] Wuster M, Herz A, Opiate agonist action of antidiarrheal agents in vitro and in vivo--findings in support for selective action. **Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol** 301 (1978) 187-194.
- [28] Yagami T, Ueda K, Sakaeda T, Itoh N, Sakaguchi G, Okamura N, Hori Y, Fujimoto M, Protective effects of a selective L-type voltage-sensitive calcium channel blocker, S-312-d, on neuronal cell death. **Biochem**

- Pharmacol* 67 (2004) 1153-1165.
- [29] Yeo W, Gautier J, Early neural cell death: dying to become neurons. *Dev Biol* 274 (2004) 233-244.
- [30] Zhang JF, Randall AD, Ellinor PT, Horne WA, Sather WA, Tanabe T, Schwarz TL, Tsien RW, Distinctive pharmacology and kinetics of cloned neuronal Ca<sub>2+</sub> channels and their possible counterparts in mammalian CNS neurons. *Neuropharmacology* 32 (1993) 1075-1088.

Archive of SID