

بررسی تاثیر امواج نشستی از اجاق مایکروفر بر فاکتورهای خونی موش صرحایی نر بالغ و نابالغ

دکتر غلامعلی جلودار^{*}، یدالله زارع^{**}، دکتر مریم انصاری لاری^{***}، دکتر سعید نظیفی^{****}

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۵/۴

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۹/۲

* دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، بخش فیزیولوژی

** دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دانشکده پرستاری مامائی، گروه پرستاری مامائی

*** دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، بخش بهداشت

**** دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، بخش کلینیکال پاتولوژی

چکیده

زمینه و هدف: به کارگیری وسیع امواج پر فرکانس در سیستم های مخابراتی و پخت و پز در دهه های اخیر توجه محققین را به اثرات سوء احتمالی این امواج معطوف نموده است. گسترش اختلالات خونی امکان مرتبط بودن استفاده از امواج مایکروویو را با این اختلالات مطرح می نماید. سن فرد در زمان مواجه شدن با این امواج می تواند بر میزان اثرات آن نقش مهمی داشته باشد، لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر احتمالی امواج مایکروویو حاصل از دستگاه مایکروفر بر فاکتورهای خونی موش صحرایی در دو مقطع سنی بالغ و نابالغ می باشد.

مواد و روش کار: برای انجام این تحقیق ۱۸ سرموش صحرایی نر بالغ با سن حدود دو ماه و وزن ۱۸۰-۱۵۰ گرم و ۱۸ سرموش نابالغ با سن حدود یک ماه و وزن ۶۰-۸۰ گرم مورد استفاده قرار گرفتند. هر گروه سنی نیز به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه های آزمایش روزانه سه نوبت و هر بار به مدت سی دقیقه طی دو ماه در مجاورت دستگاه مایکروفر با فرکانس ۲۴۵۰ مگا هرتز قرار گرفتند. گروه های کنترل در شرایط مساوی از نظر نور و دما در محیط آزمایشگاه نگهداری شدند. در پایان دوره نمونه های خون تهیه گردید و فاکتورهای خونی شامل تعداد پلاکتها، گلوبولهای قرمز و سفید، درصد گلوبولهای سفیدو میزان هموگلوبین (Hb) میانگین حجم سلولی (MCV)، میانگین غلظت هموگلوبین سلول (MCH) و میانگین غلظت هموگلوبین سلولی (MCHC) با استفاده از T-test مورد ارزیابی قرار گرفت و $P < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: نتایج نشان داد در گروه نابالغ تحت تاثیر امواج، درصد لنفوسيت ها، میزان هموگلوبین، MCHC و تعداد گلوبول های سفید کاهش معنی داری می یابد ($P < 0.05$) در حالی که تعداد گلوبول های قرمز، حجم سلولی گلوبول های قرمز و تعداد پلاکت ها در این گروه افزایش معنی داری نشان می دهد ($P < 0.05$). از فاکتورهای مورد ارزیابی در گروه بالغ، فقط تعداد گلوبول های قرمز تحت اثر امواج افزایش معنی داری نشان داد ($P < 0.05$).

نتیجه گیری: امواج مایکروویو نشستی از اجاق مایکروفر سبب تغییرات معنی داری در اکثر فاکتورهای خونی گروه نابالغ گردید در حالیکه بر فاکتورهای خونی گروه بالغ اثرات کمتری داشت. این اثر می تواند به دلیل تاثیر مستقیم امواج بر سلول های مغز استخوان و یا به دلیل اثر این امواج بر سلولها در خون محیطی باشد. (محله طبیب شرق، دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷، ص ۲۶۵ تا ۲۷۱)

کلیدواژه ها: امواج مایکروویو، فاکتورهای خونی، موش صحرایی، مایکروفر

مقدمه

امواج مایکروویو بخشی از طیف وسیع امواج الکترومغناطیس می باشند که دامنه فرکانس آنها بین ۱ میلیمتر تا ۱ متر می باشد. این امواج الکترومغناطیس غیر یونیزه کننده جذب

های پایین بر میزان فاکتورهای خونی بی تاثیر است، در حالیکه با افزایش فرکانس میزان اثرات منفی افزایش می یابد. سرت و همکاران (۲۰۰۰) با تحقیق بر روی کارگران نیرو گاه برق که در معرض امواج الکترو مغناطیس تولید شده از خطوط انتقال برق با فرکانس پایین (۵۰ مگاهرتز) قرار گرفته بودند گزارش کردند که این امواج با فرکانس پایین اثربخشی بر فاکتورهای ایمیونولوژیک و هماتولوژیک مانند تعداد گلوبولهای سفید و قرمز، پلاکت ها و هموگلوبین ندارند.^(۱۱)

با توجه به گسترش استفاده از مایکروفر (آون خانگی) در رستورانها و منازل از یک طرف و گسترش بیماریهای خونی از سوی دیگر و عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه اثرات سوء احتمالی استفاده از این دستگاهها، این تحقیق به منظور بررسی تاثیر امواج مایکروویو حاصل از دستگاه مایکروفر در دو مقطع سنی بالغ و نابالغ بر فاکتورهای خونی در موش صحرایی طراحی گردید.

روش کار

این تحقیق در سال ۱۳۸۶ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام گردید. ابتدا میزان نشت امواج مایکروویو از دستگاه در فواصل ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتری که موشهای اجازه حرکت داشتند در حالت درب بسته با استفاده از دستگاه اندازه گیری نشت امواج RF اندازه گیری شد. جهت انجام این تحقیق تعداد ۱۸ موش صحرایی نر بالغ با سن حدود ۲ ماه و وزن ۱۶۰-۱۸۰ گرم از نژاد Sprague Dawley و ۱۸ موش صحرایی نابالغ با حدود یک ماه سن و ۸۰ گرم وزن از مرکز حیوانات دانشکده پزشکی شیراز خریداری و هر دسته به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. کلیه موش ها ابتدا به منظور عادت کردن به محیط به مدت یک هفته در شرایط نگهداری جدید قرار گرفته، آب و غذا به صورت آزاد در اختیار آنها بود. و میزان نور اتاق به صورت ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی تنظیم گردید. گروه های آزمایش به مدت دو

مولکول ها شده و تغییراتی در انرژی آنها ایجاد می کنند.^(۱) شواهد موجود نشان می دهد که امواج مایکروویو بسته به شدت فرکانس، نوع موج و مدت مواجه شدن اثرات مختلف بیولوژیکی ایجاد می کند.^(۲,۳)

در رابطه با خطرات امواج نشت یافته از دستگاه مایکروفر برای مصرف کننده، گزارشات ضد و نقیضی وجود دارد. برخی از گزارشات بیانگر عدم نشت مقادیر خطر ناک امواج مایکروویو از درب بسته دستگاه مایکروفر می باشد. در این ازاین دستگاهها در حدود یک میلی وات بر سانتی متر مربع می باشد و این در حدی نیست که برای مصرف کننده خطرساز باشد^(۴) ویلیام و همکاران میزان نشت امواج مایکروویو از (mW/cm²) گزارش نمودند^(۵)، همچنین اینازول و همکاران (۱۹۹۷) میزان نشت این امواج را از مایکروفر با درب بسته بر روی موش صحرایی باردار مضر و خطرناک دانسته اند.^(۶)

به گزارش هارالا و همکاران امواج مایکروویو حاصل از تلفن های همراه جریان خون نواحی مختلف مغز بویژه کورتکس لوب گیجگاهی را تحت تاثیر قرار میدهد و با توجه به نحوه قرارگیری آتنن موبایل و تماس آن با گوش، ناحیه گیجگاهی سر در معرض بیشترین آسیب ناشی از امواج مایکروویو حاصل از تلفن های همراه می باشد.^(۷) در رابطه با تاثیر امواج مایکروویو حرارتی وغیر حرارتی بر میزان فاکتورهای خونی گزارشات اندکی وجود دارد. به گزارش کلری و همکاران امواج حرارتی حاصل از امواج مایکروویو مانع از تقسیم و تکثیر لنفوسيت های T کشنده می شود^(۸) و از سوی دیگر گزارشات پسلجتا و همکاران حاکی از افزایش تعداد اريتروسيت ها، هموگلوبین و هماتوکریت در جریان خون محیطی موش های صحرایی نر تحت تاثیر امواج مایکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز می باشد.^(۹) گزارشات موجود نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویو با فرکانس

سطح میز در سه نقطه مختلف در جداول ۱ و ۲ ذکر شده است. میانگین نشت امواج در ارتفاع صفر و ۵ سانتی متری به ترتیب $35/5$ و $40/5$ mW/cm^2 در فاصله ۳۰ سانتیمتری و $5/5$ در فاصله ۴۰ سانتیمتری می باشد.

تحت تاثیر امواج میکروویو در گروه نابالغ، تعداد گلبول های قرمز و MCV بترتیب $29/6$ درصد و 34 درصد افزایش یافت، در حالی که میزان MCHC $19/5$ درصد، و میزان هموگلوبین $16/6$ درصد در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (جدول ۴) که این تغییرات از نظر آماری معنی دارمی باشد ($P < 0.05$). در گروه بالغ فقط تعداد گلبول های قرمز تحت تاثیر امواج میکروویو افزایش $(4/8)$ ٪ معنی داری نشان داد و تغییرات سایر فاکتورها در این گروه از نظر آماری معنی دار نبود. میانگین هموگلوبین سلولی (MCH) تنها فاکتوری است که تغییرات میانگین آن در گروه نابالغ نسبت به گروه های کنترل معنی دار نیست.

در گروه نابالغ تحت تاثیر امواج، میانگین تعداد گلبولهای سفید $46/7$ درصد و لنفوцитها 5 درصد کاهش یافت (جدول ۳) که این کاهش از نظر آماری معنی دار می باشد ($P < 0.05$)، در حالی که تعداد پلاکتها 27 درصد افزایش داشت. از نظر آماری تفاوت معنی داری در میانگین تعداد اوزینوفیل ها و مونوسیتیهای گروه بالغ و نابالغ تحت تاثیر امواج میکروویو مشاهده نگردید.

ماه در قفسهایی در فاصله ۳۰ سانتی متری (تا فاصله ۵۰ سانتیمتری اجازه حرکت داشتند) از دستگاه مایکروویفر ساخت شرکت LG مدل MS-543XD قرار گرفتند. این دستگاه امواج الکترومغناطیس با فرکانس 2450 مگاهرتز تولید می کند. دستگاه سه نوبت هر نوبت به مدت نیم ساعت روشن گردید. به این ترتیب موش های مورد مطالعه کلایک ساعت و نیم در شبانه روز با امواج میکروویو مواجه بودند. به منظور ایجاد شرایط یکسان، موش های گروه کنترل نیز هم زمان از اتفاق نگهداری خارج و در محیط آزمایشگاه قرار می گرفتند. در پایان دوره آزمایش (60 روز) کلیه موش ها با اتر بیهوش شدند و با خون گیری مستقیم از قلب، خون مورد نظر جهت انجام آزمایشهای هماتولوژی تهیه گردید و فاکتورهای خونی شامل: میزان هموگلوبین (Hb)، میانگین هموگلوبین سلولی (MCH)، میانگین حجم سلولی (MCV)، میانگین غلظت هموگلوبین سلولی (MCH)، تعداد پلاکتها، گلبولهای قرمز (RBC) و گلبولهای سفید (WBC) توسط دستگاه شمارشگر سلول Cell Counter مدل SYS MEX مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از T-test مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر $P < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج اندازه گیری میزان نشت امواج میکروویو در فواصل 30 و 40 سانتیمتری دستگاه، در ارتفاع صفر و 5 سانتیمتری از

جدول (۱): میزان نشت امواج میکروویو (mW/cm^2) در فاصله 30 سانتیمتری دستگاه مایکروویفر در سه نقطه مختلف

ارتفاع سانتی متر	فاصله 30cm	کنار سمت چپ دستگاه									
		حداکثر	حداقل	میانگین	حداکثر	حداقل	میانگین	حداکثر	حداقل	میانگین	حداکثر
$35/5 \pm 19/25$	۳۵	۳۰	۴۰	۵۵	۵۰	۶۰	۱۶/۵	۱۴	۱۹		صفر
$40/5 \pm 16/75$	۴۰	۳۰	۵۰	۵۷/۵	۴۵	۷۰	۲۴	۲۰	۲۸		پنج سانتی متر

جدول (۱۲): میزان نشت امواج مایکروویو (mW/cm^2) در فاصله ۰-۴ سانتیمتری دستگاه مایکروفر در سه نقطه مختلف

میانگین کل ± انحراف معیار	کنار سمت راست دستگاه			وسط			کنار سمت چپ دستگاه			فاصله ۴۰cm ارتفاع
	میانگین	حداقل	حداکثر	میانگین	حداقل	حداکثر	میانگین	حداقل	حداکثر	
۱۷/۵±۱۵/۳۲	۱۱	۱۲	۲۰	۳۵	۲۵	۴۵	۶/۵	۳	۱۰	صفرو
۲۹/۶±۸/۷۵	۳۷/۵	۳۰	۴۵	۳۰	۲۵	۳۵	۲۰	۱۵	۲۵	پنج سانتی متر

جدول (۱۳)- مقایسه تاثیر امواج نشتی از اجاق مایکروفر بر گلوبولهای سفید و پلاکتهای موش صمرایی نر بالغ و نابالغ

PLT $\times 10^3/\mu\text{l}$	Mono %	Eos %	Neut %	Lymph %	WBC $\times 10^3/\mu\text{l}$	گروهها
۹۷۳/۳±۳۲/۷۴۶	۱/۱۵±۰/۱۵	۱/۰۶±۰/۱۶	۱۵/۵۶±۲/۸۳	۸۱/۸۸±۱/۴	۱۵/۷±۲/۶	کنترل بالغ
۹۹۱/۰۲±۱۳۸/۲۰	۲/۵±۰/۲	۳/۱۵±۰/۳	۱۶/۷۵±۲/۳۵	۷۷/۶±۱/۱۷	۱۷/۴±۲/۸	آزمایش بالغ
۷۳۰/۱±۳/۷۶	۱/۴±۰/۲۵	۱/۲±۰/۱۲	۱۲/۳۳±۲/۳۸	۸۶/۶±۱/۱*	۱۸/۴±۴/۶	کنترل نابالغ
۹۲۷/۲±۴۰/۶*	۳/۴±۰/۳	۲/۶۷±۰/۲۳	۱۰/۸±۱/۸۸	۸۱/۶±۱/۰۲	۹/۸±۴/۱*	آزمایش نابالغ

* نشان دهنده تفاوت معنی دار با گروه کنترل مربوطه می باشد ($P<0.05$)

جدول (۱۴)- مقایسه تاثیر امواج نشتی از اجاق مایکروفر بر گلوبولهای قرمز موش صمرایی نر بالغ و نابالغ

MCV (FL)	MCHC (g/dl)	MCH (pg)	Hb (g/dl)	RBC $\times 10^6/\mu\text{l}$	گروهها
۵۸/۲۵±۱/۸۳	۳۰/۷۴±۱/۸۳	۱۷/۹۸±۱/۲۱	۱۵/۷۳±۲/۰۱	۸/۵۹±۰/۰۸	کنترل بالغ
۵۸/۴۹±۰/۹۴	۳۲/۰۸±۱/۳۶	۱۸/۶۹±۰/۷۵	۱۶/۰۱±۱/۱۱	۹/۳۱±۰/۱۷*	آزمایش بالغ
۶۱/۲۶±۲/۹۱	۳۰/۸۸±۱/۰۳	۱۹/۰۶±۱/۳۱	۱۵/۴۲±۰/۶۲	۶/۲۸±۰/۳۲	کنترل نابالغ
۸۲/۶۸±۳/۴۱*	۲۴/۸۶±۲/۴۳*	۲۰/۵۲±۱/۴۷	۱۲/۸۶±۰/۹۶*	۸/۱۱±۰/۰۴*	آزمایش نابالغ

* نشان دهنده تفاوت معنی دار با گروه کنترل مربوطه می باشد ($P<0.05$)

بحث

این امواج افزایش معنی داری یافت در حالی که میزان هموگلوبین، MCHC، درصد لنفوسيتها و تعداد گلوبولهای سفید کاهش داشت. افزایش تعداد گلوبولهای قرمز می تواند به دلیل اثر تحریکی امواج بر تقسیم سلولی سلولهای سلولی بینیادی مغز استخوان باشد. این عمل می تواند منجر به افزایش گلوبولهای قرمز نابالغ خون (رتیکولوسیتها) گردد. افزایش حجم سلولها نیز می تواند به دلیل رتیکولوسیتوز یا افزایش سلولهای نابالغ باشد. از طرفی با افزایش حجم گلوبول های قرمز، میزان هموگلوبین (Hb) و میانگین غلظت هموگلوبین سلولی (MCHC) در سلول کاهش می یابد. هنگامی که حجم سلول افزایش می یابد درصد هموگلوبین در گلوبول مقدار کمتری را نشان می دهد.^(۱۳) اثرات تحریکی امواج بر فرایند تقسیم سلولی و متلاشی شدن

نتایج این تحقیق نشان داد که در گروه نابالغ اکثر فاکتورهای خونی تحت تاثیر امواج میکروویو نشت یافته از مایکروفرهای خانگی تغییرات معنی داری می نماید. در بررسی منابع موجود گزارش منتشر شده ای در زمینه اثر امواج در سینین قبل از بلوغ یافت نشد و بنظر می رسد این اولین گزارش در این زمینه باشد، لذا مقایسه نتایج امکان پذیر نمی باشد. بطور کلی حساسیت سلولها به پرتوها به درجه بلوغ آنها بستگی دارد، سلولهای رشد نیافته و بافت های جوان حساسیت بیشتری به پرتوها نشان می دهند.^(۱۲) لذا همان گونه که انتظار می رفت تاثیر امواج مورد مطالعه در گروه نابالغ بیشتر تظاهر یافت. از فاکتورهای خونی مورد مطالعه، تعداد گلوبولهای قرمز، میانگین حجم گلوبول های قرمز (MCV) و درصد پلاکت ها در گروه نابالغ تحت تاثیر

می باشد.^(۱۸) تفاوت در اثرات این امواج بر فاکتورهای خونی می تواند باسن افراد در زمان مواجهه، فرکانس امواج و فاصله بامنیع تولید امواج مرتبط باشد. این تحقیق با توجه به مدت و زمان استفاده از دستگاه مایکروویو در مصارف خانگی طراحی گردید و یک نمونه از دستگاههای مایکروویو وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفت، بررسی نمونه های دیگر از این اجاق ها و یا استفاده در مدت زمان بیشتر و در فواصل مختلف نسبت به دستگاه می تواند نتایج کاملتری را ارائه نماید. امواج مایکروویو نشت یافته از اجاق مایکروویو سبب تغییر اکثر فاکتورهای خونی مورد مطالعه در موشهای نابالغ گردید، این اثر می تواند به دلیل تاثیر مستقیم امواج بر سلول های مغز استخوان و یا به دلیل اثر این امواج بر سلولها در خون محیطی باشد. اثر این امواج بر موشهای بالغ ضعیف تر بود. لذا انجام مطالعات بیشتر در مورد دستگاهها تولیدی سایر شرکتها و همچنین بررسی مغز استخوان به منظور پی بردن به محل اثر امواج ضروری بنظر می رسد. از طرفی تلاش برای افزایش آگاهی عمومی هنگام استفاده از این وسایل شدیداً توصیه می شود.

سپاسگزاری

بدین وسیله از زحمات سرکار خانم احمدی کارشناس محترم بخش فیزیولوژی و همکاری صنایع الکترونیک شیراز تقدير و تشکر می گردد.

مگاکاریوسیت ها قبل از موعد مقرر و یا تاثیر بر مکان ذخیره سازی و آزادسازی فاکتورهای توائد از دلایل افزایش تعداد پلاکت ها باشد.^(۱۴) هر چند در گروه بالغ تعداد گلبول های قرمز تحت تاثیر امواج میکروویو افزایش معنی داری نشان داد(۴/۸٪)، بنظر می رسد این افزایش در حدی نبوده است که موجب تغییر در سایر فاکتورهای مربوط به گلبولهای قرمز گردد. فورکاس و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند که حجم سلولی گلبول های قرمز در حیواناتی که در معرض امواج میکروویو با فرکانس ۱۸۰۰ مگاهرتز قرار گرفته بودند افزایش یافته بود.^(۱۵)

باسلجهتا و همکاران (۲۰۰۴) گزارش کردند که قرار گرفتن موش صحرایی در معرض امواج میکروویو غیرحرارتی با فرکانس ۲/۴۵ گیگاهرتز باعث افزایش تعداد گلبولهای قمز و میزان هموگلوبین می شود.^(۱۰) که این یافته با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. ولی گزارش سری ناجسواری (۲۰۰۳) نشان دهنده کاهش تعداد گلبول های قرمز در اثر امواج مایکروویو در مدت سه ماه می باشد.^(۱۶) همچنین نتایج مطالعه تروسیک و همکاران (۱۹۹۹) در مورد اثر امواج مایکروویو بر تعداد گلبول های قرمز در تنافق با نتایج حاصل از این تحقیق می باشد.^(۱۷) نتایج تروسیک و همکاران (۲۰۰۴) در خصوص عدم اثر امواج بر تعداد گلبول های سفید با نتایج بدست آمده در گروه بالغ مطابقت دارد ولی در تضاد با نتایج حاصل در گروه نابالغ

References

1. Verschaeve L, Maes A. Genetic carcinogenic and teratogenic effects of radiofrequency fields. Mutat Res. 1998 ;410(2):141-65.
2. Banik S, Bandypadhyay S, Ganguly S. Bioeffect of microwave a brief review.Bioresource Technology. 2003;87: 155-9.
3. Grant EH, F Inst P. Biological effects of microwaves and radio waves. IEE PROC.1981; 128(9): 602-6.

4. Alhekail ZO. Electromagnetic radiation from microwave ovens. *J Radiol Prot.* 2001;21(3):251-8.
5. Delaney A. Reliability of modern microwave ovens to safely heat intravenous fluids for resuscitation. *Emerg Med (Fremantle)*. 2001;13(2):181-5.
6. Oates WH Jr, Snellings DD Jr, Wilson EF. Microwave oven survey results in Arkansas during 1970. *Am J Public Health*. 1973;63(3):193-8.
7. Inalöz SS, Daşdağ S, Ceviz A, et al. Acceptable radiation leakage of microwave ovens on pregnant and newborn rat brains. *Clin Exp Obstet Gynecol*. 1997; 24:215-19.
8. Haarala C, Aalto S, Hautzel H, et al. Effects of a 902 MHz mobile phone on cerebral blood flow in humans: a PET study. *Neuroreport*. 2003;14:2013-23..
9. Cleary SF, Du Z, Cao G, et al. Effect of isothermal radiofrequency radiation on cytolytic T lymphocytes. *FASEB J*. 1996;10(8):913-9.
10. Busljeta I, Trosic I, Milkovic-Kraus S. Erythropoietic changes in rats after 2.45 GJz nonthermal irradiation *Int J Hyg Environ Health*. 2004;207(6):549-54.
11. Dasdag S, Sert C, Akdag Z, et al. Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on hematologic and immunologic parameters in welders. *Arch Med Res*. 2002 ;33(1):29-32.
12. Takavar A, Medical Physic, 6th ed, Abij. 2006;423-28.
13. Duncan R, Prass KW, Mahaffey EA. Veterinary laboratory Medicine,Clinical Pathology, Translated by Nazifi S.2001; 316&655.
14. Henry JB. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, W.B. Saunders Company, Philadelphia. 2001;20:1512
15. Forgács Z, Kubinyi G, Sinay G, et al. Effects of 1800 MHz GSM-like exposure on the gonadal function and hematological parameters of male mice. *Magy Onkol*. 2005;49(2):149-51. Epuba. 2005 Oct 24.
16. Sri Nageswari K. Biological Effects of Microwave and Mobile Telephony, Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN (ICNIR) Electromagnetic Field and our Health. 2003; (20-22):1-11.
17. Trosić I, Matausićpisł M, Radalj Z,et al. Animal study on electromagnetic field biological potency. *Arh Hig Rada Toksikol*. 1999;50(1):5-11.
18. Trosic I, Busljeta I, Parcic IT. The Influence of 2.45 GHz Microwave Irradiation on Blood-Forming of System in Rats Whole- Body Microwave Exposurer,Refernce to the Lymphocytes. *Toxicology letters*. 2004;125-32.

Effect of Radiation Leakage of Microwave Oven on Hematological Parameters of Rat at Pre and Post Pubertal Stage

Jelodar GA, PhD*; Zarea Y, MsC; Ansarie Lari M, PhD***; Nazifi S, PhD ******

Received: 25/Jul/2008

Accepted: 22/Nov/2008

Background: High frequency waves are widely used in telecommunication and cooking. The biological effects of microwaves are in great attention. It is supposed that microwaves may increase the risk of hematological problems and the age at exposure may play an important role in this process. In this study, we evaluated the hematological parameters in rats by exposing them to microwave radiation at pre and post pubertal stages.

Materials and Methods: In this study, 18 adult (2 months old) and 18 immature (1 month old) male rats were involved and each group was randomly divided into two groups; the test and the control group. The rats in the test group were exposed to 2450 MHz microwaves produced by a microwave oven three times a day for 30 minutes at each time. Control groups were kept in laboratory at the same temperature and light condition. After 60 days, blood samples were taken by heart puncture and hematological parameters including Hb, MCHC, MCV, RBC and WBC counts and total number of platelets were measured. The means of hematological parameters were compared by T-test and $P<0.05$ considered to be significant.

Results: The results showed a significant decrease in Hb, MCHC, WBC and lymphocyte count in immature group compare to control group; while MCV, RBC and platelet count increased ($P<0.05$). The RBC count increased significantly in mature group compare to control group ($P<0.05$).

Conclusion: Exposure to microwaves leakage of microwave oven significantly affected hematological parameters in immature rats while changes in matures was limited to RBC count. This effect maybe due to direct effect of microwaves on bone marrow or peripheral blood cells.

KEY WORDS: Microwaves, Hematological Parameters, Microware oven

*Dept of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

**Dept of Nursing, Faculty of Nursery and Midwifery, Azad University of Estahban University, Estahban, Iran

*** Dept of Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

**** Dept of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran