

بررسی اثر صدای شدید بر اکسیداسیون و پراکسیداسیون کبد خرگوش

دکتر رمضان میرزایی^{*}، دکتر عبدالامیر علامه^{**}، دکتر سید باقر مرتضوی^{***}

دکتر علی خوانین^{****}، دکتر نصرالله کمالیان^{*****}

* استادیار گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

** استاد گروه بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۵/۱۱

*** دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۱۲/۲۴

**** استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی

***** استادیار گروه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک

چکیده

زمینه و هدف: امروزه صدا به عنوان یکی از عوامل زیان آور محسوب می شود. اگرچه شواهدی مبنی بر آسیب بافت‌های حلزون شناوری به وسیله رادیکال‌های آزاد وجود دارد اما مکانیسم دقیق آسیب بافتی ناشی از صدای بلند ناشناخته است لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین صدا و تغییر در میزان گلوتاتیون (آنٹی اکسیدان) و مالون دی‌آلدئید (متاپولیت ناشی از اکسیداسیون لیپید) کبد خرگوش در معرض صدای بلند انجام گرفته است.

مواد و روش کار: این مطالعه آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه تربیت مدرس بر روی ۱۲ سر خرگوش نر سفید نیوزلندری با وزن 1800 ± 200 gr در دو گروه مورد و شاهد انجام شد. به منظور بررسی اثرات تراز فشار صدای ۱۱۰ dBa در مدت ۹۶ ساعت (۱۲ روز و هر روز ۸ ساعت) با فرکانس‌های Hz ۲۵۰-۲۰۰۰ (باند وسیع فرکانسی)، تغییرات گلوتاتیون (GSH) به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان و مالون دی‌آلدئید (MDA) به عنوان محصول پراکسیداسیون چربی کبد خرگوش بررسی گردید. اندازه گیری گلوتاتیون و مالون دی‌آلدئید نمونه‌های کبد با استفاده از معرف‌های تیوباریتوريک اسید و المن (روش سیدلاک ولیندسى) و به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام شد و مقایسه بین میانگین مقادیر پارامترهای مورد اندازه گیری بین دو گروه با آزمون t انجام گرفت و $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی دار آماری مورد توجه قرار گرفت.

یافته‌ها: مقایسه بین میانگین مقادیر پارامترهای مورد اندازه گیری بین گروه مواججه و گروه شاهد نشان داد که صدا در گروه‌های مواججه نسبت به گروه شاهد باعث کاهش مقدار گلوتاتیون و افزایش سطح مالون دی‌آلدئید بافت کبد گردید و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. ($P < 0.05$)

نتیجه گیری: در صورت تشابه عملکرد سیستم بیولوژیک انسان و خرگوش احتمال تاثیر صدا بر قسمت‌های مختلف بدن قابل بحث بوده و پژوهش‌های بیشتری را در این زمینه می‌طلبند. (مجله طبیب شرق، دوره ۱۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۱ تا ۱۷)

کلیدواژه‌ها: گلوتاتیون، مالون دی‌آلدئید، صدا، اکسیداسیون، پراکسیداسیون، خرگوش

مقدمه

در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی می‌باشد.^(۱) استاندارد تراز فشار صدا برای ۸ ساعت کار در روز و ۴۰ ساعت در هفته، ۸۵ دسی بل می‌باشد و بالاترین حد تراز فشار و شدت صدا که فرد در طول ۸ ساعت کاری فقط ۱/۸۸ دقیقه مجاز به مواججه با

صدا یکی از شایع‌ترین عوامل زیان آور فیزیکی در محیط‌های کار و محیط زیست است. به طوری که برآورد می‌شود در جهان بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در محیط کار خود در معرض صدای خطناک قرار دارند که از این تعداد ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر

چربی‌ها می‌شود.^(۹) افرادی که مبتلا به اشکال مختلف بیماری‌های کبدی مانند بیماری کبد چرب غیر الکلی و هپاتیت C هستند کاهش اسیدهای چرب غیر اشباع و افزایش محصولات لیپید پر اکسیداسیون را نشان می‌دهند.^(۱۰-۱۲) این تحقیق به منظور بررسی اثر تراز فشار صدای بالا در فرکاتس‌های ناحیه شنوازی بر تغییرات آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون) و لیپید پر اکسیدانی (مالون دی آلدئید) کبد خرگوش انجام گرفت.

روش کار

این مطالعه آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه تربیت مدرس بر روی ۱۲ خرگوش نر سفید سه ماهه نیوزلندری سالم به وزن 1800 ± 200 گرم خریداری شده از استیتو پاستور انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات به عمل آمده (به صورت پایلوت) و انحراف معیار مطالعات گذشته، تعداد خرگوش‌های هر گروه ۶ سر انتخاب شد.^(۱۳-۱۵) گروه‌ها عبارت بودند از: گروه مواجهه با صدای dBA ۱۱۰ در فرکاتس‌های ۲۰۰۰ KHZ-۲۵۰ Hz (۸ ساعت در روز و ۱۲ روز متوالی) و گروه شاهد (بدون تماس با صدا).

به منظور تولید صدا در محدوده‌های فرکانسی مورد مطالعه و حصول اطمینان از ایجاد آن‌ها از برنامه‌های نرم افزاری تهیه شده توسط محققین با توانایی تولید صدای ایجادی با فرکاتس‌های خالص و ترکیبی استفاده شد. صدای تولیدی با استفاده از Kaejer صداسنج مدل 1358 TES ساخت تایوان و 2231 قرار گرفت، همچنین محفظه مناسب تهویه شونده (از جنس فلاگسی گلاس) مورد استفاده قرار گرفت.

۲۴ ساعت پس از اتمام دوره مواجهه با صدا، به منظور اندازه گیری گلوتاتیون و مالون دی آلدئید از کبد نمونه برداری شد و نمونه‌ها در شرایط سرمایی مناسب به آزمایشگاه انتقال یافته و آزمایش‌های مربوط به اندازه گیری گلوتاتیون و مالون دی آلدئید روی نمونه‌ها انجام شد. برآورد میزان گلوتاتیون غیر

آن می‌باشد، ۱۰۹ دسی بل تعیین گردیده است.^(۲) استرس ناشی از صدا منجر به تحریک سیستم عصبی مرکزی و در نتیجه افزایش کاته‌کولامین‌ها و گلوکوکورتیکوئیدهای سیستم گردش خون، افزایش ضربان قلب و فشار خون، تغییرات در سیستم تهویه تنفسی، میزان متابولیت، مکانیسم‌های دفاع آنتی اکسیدانی و حساسیت به پر اکسیداسیون لیپید، ترکیبات چربی و تغییرات در سیستم ایمنی و بزرگی غده آдрنال می‌شود.^(۳) استرس اکسیداتیو به فرآیندی گفته می‌شود که تعادل طبیعی بین پر اکسیدها و آنتی اکسیدها را به گونه‌ای تغییر دهد که نتیجه فرآیندها در جهت تقویت اکسیدکننده‌هایی باشد که باعث صدمه بیولوژیک می‌گردند.^(۴)

لیپیدها از مهم‌ترین ملکول‌هایی هستند که مورد تهاجم رادیکال‌های آزاد قرار می‌گیرند. فرآیند پر اکسیداسیون آنها در نهایت موجب کاهش حیات و مرگ سلولی می‌شود. در این میان غشای سلول‌ها که غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع است بیشتر از سایر قسمت‌های سلول به پر اکسیداسیون حساس است.^(۵) آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی هستند که وقتی در مقایسه با بیوملکول‌ها در غلاظت کم وجود داشته باشند تخریب اکسیداسیون بیوملکول‌ها را کاهش داده یا حفاظت می‌نمایند.^(۶) گلوتاتیون مهم‌ترین تیول غیر پروتئینی در سلول‌های پستانداران است. گلوتاتیون^۱ (GSH) آنتی اکسیدانی است که با گونه‌های اکسیژن آزاد به طور مستقیم و یا با واسطه آنزیم‌های پر اکسیداز و ترانس هیدروژناز واکنش می‌دهد و به ویژه برای اندام‌های در معرض استرس اکسیداتیو یا در مورد سوموم خارجی اهمیت دارد.^(۷) ایجاد گونه‌های اکسیژن و نیتروژن فعال موجب تحریک بیش از حد نوترفیل‌ها، سلول‌های کوپفر و آسیب کبدی می‌گردد.^(۸) وقتی اسیدهای چرب غیر اشباع تحت تاثیر رادیکال‌های آزاد قرار گیرند، یک سری واکنش‌های زنجیره‌ای منجر به تشکیل لیپیدهای الکترون دوست و پر اکسیداسیون

در این مطالعه از روش تیوباریتوریک اسید جهت اندازه گیری مالون دی آلدئید (MDA) بافت کبد استفاده شد^(۱۷) ابتدا هموژنه بافت کبد به صورت دوتایی برای مدت کوتاهی با ۳۰۰۰ دور در دقیقه (ده دقیقه) سانتریفیوژ شد. یک میلی لیتر از این محلول به لوله درب دار که در يخ قرار داشت منتقل شد و به آن ۲ میلی لیتر از معرف تیوباریتوریک اسید (TBA) اضافه و به وسیله ورتکس لوله تکان داده شد. سپس درب لوله بسته و برای ۱۵ دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شد. پس از سرد کردن، محتويات لوله مجدد به مدت ده دقیقه با ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس جذب محلول شفاف رویی (یک میلی لیتر) در طول موج ۵۳۵ نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر (مدل Shimadzu - 3100) خوانده شد (در نمونه های بلاتک به جای هموژنه بافت از بافر فسفات که هموژنه توسط آن تهیه شده استفاده گردید) و غلظت مالون دی آلدئید با استفاده از ضربی خاموشی مولی آن ($\text{cm}^2/\text{mmol} = 1/56 * 10.5 = 0.18$) محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t آنالیز شد و $P < 0.05$ معنی دار تلقی گردید.

یافه ها

بر اساس نتایج آزمون t اختلاف بین میانگین مقادیر MDA اندازه گیری شده در گروه مواجهه با صدا نسبت به گروه شاهد معنی دار می باشد ($P < 0.001$). میانگین مقادیر گلوتاتیون اندازه گیری شده کبد در گروه در معرض صدا نسبت به گروه شاهد در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. همچنین نتایج آزمون t بین میانگین مقادیر GSH اندازه گیری شده در گروه در مواجهه با صدا نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد ($P < 0.001$).


جدول ۱: میانگین و انحراف معیار مقادیر مالون دی آلدئید (MDA) و گلوتاتیون (GSH) در گروه های شاهد و در معرض صدا

P*	شاهد	مواجهه	گروه
۰/۰۰۱	۵/۵±۰/۱	۶/۵۳±۰/۱	(uM/gt) MDA
۰/۰۰۱	۰/۱۳۱±۰/۰۰۴	۰/۱۲۶±۰/۰۰۶	(nM/gt) GSH

* معنی دار است $P < 0.05$

پروتئینی کبد با به کار گیری معرف المن مطابق با روش سیدلاک ولیندی (۱۹۸۶) اندازه گیری شد.^(۱۶) ابتدا بافت کبد با محلول ۰/۰۲ مولار EDTA هموژنه شد. ۵ میلی لیتر از این هموژنه به لوله دیگری انتقال داده شد. ۴ میلی لیتر آب دوبار تقطیر و یک میلی لیتر تری کلرو استیک اسید ۵۰ درصد به آن اضافه شد. محلول حاصل به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه و به طور ناپیوسته تکان داده شد و سپس ۱۵ دقیقه با ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. بدین ترتیب رسوبات پروتئین جدا شده و فاز آبی در بالا تشکیل گردید. به دو میلی لیتر از محلول رویی، ۴ میلی لیتر بافر^۱ TRIS ۰/۰۲ درصد محتوی ۰/۰۲ مولار^۲ EDTA^۳ (pH = ۸/۹) اضافه شد ، سپس ۰/۰۲ میلی لیتر ۰/۰۲ EDTA^۴ مولار نیز افزوده و به هر کدام از لوله ها ۰/۰۲ میلی لیتر^۵ DTNB یک صدم مولار (تهیه شده در متانول) اضافه و با ورتکس محلوط گردید . پس از پنج دقیقه در طول موج ۴۱۲ نانومتر مقدار جذب در مقابل بلاتک قادر هموژنه خوانده شد . با استفاده از منحنی استاندارد، غلظت گلوتاتیون احیا محلول محاسبه شد. (نمودار ۱) سپس مقدار گلوتاتیون بر حسب میکرو مول گلوتاتیون به ازای یک گرم بافت تعیین گردید. در این مطالعه کلیه نمونه ها به صورت دوتایی تهیه شد.

نمودار شماره ۱ منحنی استاندارد گلوتاتیون



- 2- Trisamine (Tromethamine)
3 - Ethylen Diamine Tetra Acetic Acid
4 - 5,5 Dithio bis, 2- Nitrobenzoic Acid

بحث

که غلظت گونه های آزاد اکسیژن تا ۳۰ برابر بیش از گروه شاهد بوده است.^(۲۳) Ising در نتیجه تحقیقات خود گزارش کرده است که تماس با صدا به طور حاد و مزمن باعث افزایش هورمون ها و در نتیجه افزایش رادیکال های آزاد اکسیژن می شود و نشان داد که حدود این عوامل اکسید کننده را می توان اعضايی مثل کبد اندازه گیری کرد^(۲۴) در این مطالعه نتایج آزمایش های بیو شیمیایی (اندازه گیری مالون دی آلدئید خون و بافت، گلوتاتیون خون و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسمای نشان داد که صدا باعث افزایش متابولیت های حاصل از اکسیداسیون در خون و بافت کبد شده و این افزایش در متابولیت های اکسیداسیون باعث کاهش آنتی اکسیدانی های بافت ها می گردد.

نتایج اندازه گیری های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون) و لیپید پراکسیدانی بافت کبد (مالون دی آلدئید) در این مطالعه نیز نشان داد که کاهش گلوتاتیون و افزایش مالون دی آلدئید (محصول لیپید پراکسیداسیون) در گروه های در معرض صدا نسبت به گروه شاهد بیشتر دیده می شود. باید توجه داشت که در این مطالعه مواجهه از نوع تحت حاد بود ولی مواجهه با صدا در محیط های کار مزمن می باشد و برای تعیین اثر قابل تعیین به محیط کار نیاز به مواجهه بیش از ۹۰ روز می باشد. نتایج این مطالعه و نتایج مطالعات متعدد دیگر لزوم توجه بیشتر محققین، سازندگان و سایل صدادار خانگی، و سایل نقلیه و صنعتی را در جهت کاهش آلودگی صوتی در محیط کار و زندگی مطرح می سازد.

سپاسگزاری

با سپاس از استاد گروه بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس آزمایشگاه گروه بیوشیمی خانم افشاری و کارشناس آزمایشگاه گروه بهداشت حرفه ای آقای مهندس سلیمانیان که در انجام این تحقیق همکاری نمودند.

اندازه گیری متابولیت حاصل از پراکسیداسیون لیپید (مالون دی آلدئید) کبد نشان داد که در گروه در معرض صدای بلند مقدار مالون دی آلدئید نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است و میزان گلوتاتیون (آنتی اکسیدان) کبد در گروه معرض نسبت به گروه شاهد کاهش داشته است. در مطالعه Long-Evanse که بر روی ۳۵ موش آزمایشگاهی انجام شد جهت تعیین آسیب ناشی از رادیکال های آزاد اکسیژن به دنبال دو ساعت مواجهه با صدای با باند پهن، مایع حلزون گوش، بافت مغز و کبد، سرم و ادرار در ۱، ۳، ۸، ۷۲ و ۶۷۲ ساعت بعد از مواجهه مورد آزمایش قرار گرفته و صدمه اکسیدشوندگی DNA با اندازه گیری ۸-هیدروکسی ۲ دی اکسی گوآنوزین (8oHdG)^(۲۵) با استفاده از کروماتوگرافی مایع فشار بالا^(۵) (HPLC)، همراه با تشخیص الکتروشیمیایی و پراکسیداسیون چربی از طریق مواد فعل اسید تیوباربی تیوریک (TBARS) به طریق رنگ سنجدی برای تشخیص آلدئیدها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ۸-هیدروکسی ۲ دی اکسی گوآنوزین در گروه ۸ ساعت مواجهه در حلزون گوش و در گروه ۷۲ ساعت مواجهه در مغز و کبد افزایش داشت و TBARS نیز در گروه ۷۲ ساعت مواجهه به طور معنی داری در سرم افزایش داشت.^(۱۹) مرگ برنامه ریزی شده سلول(Apoptosis) در حلزون گوش گروه مواجهه با صدا مشاهده شده است.^(۲۰) بعضی از مطالعات اثر اکسیداتیو استرس و تاثیر رادیکال های آزاد اکسیژن را در ایجاد افت شناوری مورد بحث قرار داده اند.^(۷،۲۱) یامنه و همکارانش پس از مواجهه خوکچه های هندی به مدت ۳ ساعت با صدای ۱۲۰-۱۲۵ دسی بل افزایش آنیون های سوپر اکسیدی را در حلزون شناوری نشان داده اند.^(۲۲)

در مطالعه ای بر روی خوکچه های هندی در مواجهه با ۱۱۵ دسی بل در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز به مدت ۵ ساعت نشان داده شد

References

1. Koepke RD, Weisskopf PA, Boone JL, et al. Reduction of noise – induced hearing loss using NAC and salicylate in the chinchilla. Hearing Research. 2000; 149(1-2): 138-146.
2. Van Raaij MTM, Oortgiesen M. Noise stress and airway toxicity: a prospect for experimental analysis. Food and chemical toxicology. 1996; 34(0278): 1159-1161.
3. American Conference Governmental Industrial Health (ACGIH). Threshold limit values for chemical substance, physical agents and biological exposure indicies. 2007; 117.
4. Pryor WA, Stanley JP, Bleir E. Autoxidation of polyunsaturated fatty acids. Lipids. 1976; 2: 370-379.
5. Prior RL, Cao G. In vivo total antioxidant capacity: comparison of different analytical methods. Free Radical Biology & Medicine. 1999; 27 (11-12): 1173-1181.
6. Halliwell B, Aeschbach R, Loliger J, et al. The characterization of antioxidants. Food Chem Toxicol. 1995;33(7):601-17
7. Ohinata Y, Yamasoba T, Schacht J, et al. Glutathione limits noise-induced hearing loss. Hearing Research. 2000; 146(1-2): 28-34.
8. Jaeschke HGJ, Gores AI, Cederbaum JA, et al. Mechanisms of hepatotoxicity. Toxicol Sci. 2002; 65(2): 166–176.
9. Uchida K. Role of reactive aldehyde in cardiovascular diseases. Free Radic Biol Med. 2000; 28(12): 1685–1696.
10. Videla LA, Rodrigo R, Araya J, et al. Oxidative stress and depletion of hepatic long-chain polyunsaturated fatty acids may contribute to nonalcoholic fatty liver disease. Free Radic Biol Med. 2004; 37(9): 1499–1507.
11. Araya J, Rodrigo R, Videla LA, et al. Increase in long-chain polyunsaturated fatty acid n - 6/n - 3 ratio in relation to hepatic steatosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Clin Sci (Lond.) 2004; 106(6): 635–643.
12. Kitase AK, Hino T, Furutani M, et al. In situ detection of oxidized n-3 polyunsaturated fatty acids in chronic hepatitis C: correlation with hepatic steatosis. J Gastroenterol. 2005; 40(6): 617–624.
13. Dereköy FS, Köken T, Yilmaz D, et al. Effects of ascorbic acid on oxidative system and transient evoked otoacoustic emissions in rabbits exposed to noise. Laryngoscope. 2004;114(10):1775-9.

14. Balkan J, Oztezcan S, Aykac-toker G, et al. Effects of added dietary Taurine on erythrocyte lipids and oxidative stress in rabbits fed a high cholesterol diet. *Biosci Biotechnol Biochem.* 2002; 66(12):2701-2705.
15. Dereköy FS, Dündar Y, Aslan R, et al. Influence of noise exposure on antioxidant system and TEOAEs in rabbits. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2001; 258 (10):518–522.
16. Sedlak J, Lindsay RH. Estimation of total protein bound and nonprotein sulphhydryl groups in tissue with Ellman's reagent. *Anal Biochem.* 1968; 25(1):192-205.
17. Wills ED. Lipid peroxide formation in microsomes: General consideration. *Biochem J.* 1969; 113: 315-324.
18. Buege JA, Aust SD. Microsomal lipid peroxidation. *Methods in Enzymology.* 1978; 52:302-311
19. Van Campen LE, Murphy WJ, Franks JR, et al. Oxidative DNA damage is associated with intense noise exposure in the rat. *Hear Res.* 2002; 164(1-2):29-38.
20. Hu BH, Guo W, Wang PY, et al. Intense noise-induced apoptosis in hair cells of guinea pig cochleae. *Acta Otolaryngol.* 2000; 120(1):19-24.
21. Ohlemiller KK, McFadden SL, Ding DL, et al. Targeted mutation of the gene for cellular glutathione peroxidase (Gpx1) increases noise-induced hearing loss in mice. *J Assoc Res Otolaryngol.* 2000;(1): 243–254
22. Yamane H, Nakai Y, Takayama M, et al. Appearance of free radicals in the guinea pig inner ear after noise-induced acoustic trauma, *Eur. Arch. Otorhinolaryngol.* 1995;252:504-508
23. Ising H. Acute and chronic stress hormone increases in noise exposure. *Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg.* 2000;106: 169-77.

Effects of Loud Noise on Oxidation and Lipid peroxidation Variations of Liver Tissue of Rabbit

Mirzaei Ramazan, PhD^{*}; Allameh Abdolamir, PhD^{}; Mortazavi Bagher, PhD^{***}
Khavanin Ali, PhD^{****}; Kamalian Nasrollah, PhD^{*****}**

Received: 1/Aug /2008

Accepted: 14/Mar /2009

Background: In today's world, noise is one of the major physical pollutants. The exact mechanism leading to tissue damage in loud noise is not clear. There are increasing evidences that show damage to cochlear tissue by noise is linked to cell injury induced by free radical species. The aim of this study was to investigate the relationship between change in liver tissue glutathione (antioxidant) and malondialdehyde (one metabolite of lipid oxidation) levels that occur in rabbits which were exposed to continuous loud noise.

Materials and Methods: This experimental study was performed on 12 white Newzeland male rabbits in Tarbiat Modarres University in 2004. The rabbits were assigned to the following two groups: control, and exposed to continuous loud noise for 96 hours (8 h/day for 12 days, SPL=110dBA and 250Hz to 20 KHz). The concentration of malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) in liver tissue samples were measured in rabbits after exposure to noise. Thiobarbituric acid reacting substance, Ellman's reagent and spectrophotometry techniques were used for this measurement. The data were statically analyzed by SPSS software and 2 groups were compared by t-test. Differences at the level of $P<0.05$ were considered statistically significant.

Results: Comparison of the biochemical parameters of GSH and MDA measured in treated group with control indicated that antioxidant and lipid peroxidants parameters were suppressed in treated group compared to control group ($p<0.05$).

Conclusion: Possible similarities between rabbit and human biological system indicate the possible role of noise in causation of oxidative stress in context with liver tissue impairment.

KEYWORDS: Glutathione, Malondialdehyde, Noise, Oxidation, Peroxidation, Rabbit

*Assistant Prof of Occupational Health, Health promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Zahedan, Iran

** Professor, Dept of Biochemistry, Faculty of Medicine, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

*** Associate Prof, Dept of Occupational Health, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

**** Assistant Prof, Dept of Occupational Health, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

***** Assistant Prof, Dept of Geophysics, Geophysics Institute, Tehran University, Tehran, Iran