

مقایسه جنبه‌های دموگرافیک آلپسی آرثاتی محدود و گستردگی

گزارش کوتاه

مینا دلیری^۱, عبدالصمد شیخزاده^۲, حامد کریمی‌یزدی^۳

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۱/۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۹/۳/۳

۱. استادیار بیماری‌های پوست و مو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
۲. پژوهش عمومی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

چکیده

زمینه و هدف: آلپسی آرثاتی بیماری التهابی مزمنی است که فولیکول مو را در گیر می‌کند. آلپسی آرثاتا به دو نوع محدود و گستردگی تقسیم بندی می‌شود. هدف از این مطالعه مقایسه جنبه‌های دموگرافیک آلپسی آرثاتا بین دو گروه محدود و گستردگی می‌باشد.

مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال ۸۶ بر روی ۳۰۶ بیمار مبتلا به آلپسی آرثاتا انجام شد. بیماران به دو گروه آلپسی آرثاتی محدود و گستردگی تقسیم شدند و متغیرهای سن، جنس، سن شروع بیماری، طول مدت بیماری و سابقه خانوادگی در بین دو گروه مقایسه شد.

یافته‌ها: از ۳۰۶ بیمار مورد بررسی ۸/۵۸ درصد مذکور و ۴۱/۲ درصد موئیت بودند. از کل بیماران بررسی شده ۲۴۷ نفر (۸۰/۷٪) در گیری محدود و ۵۹ نفر (۱۹/۲٪) در گیری گستردگی داشتند. میانگین سنی اولین در گیری در گروه محدود 12 ± 9 و در گروه گستردگی 12 ± 15 سال بود. متوسط دوره بیماری در گروه محدود ۱۸/۷ ماه و در گروه گستردگی ۷۱ ماه بود.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر آلپسی آرثاتا گستردگی در سنین پایین‌تری شروع می‌شود و دوره طولانی‌تری داشته و سابقه فامیلی مثبت در اقوام درجه یک بیشتر می‌باشد. وجود سابقه فامیلی و در گیری ناخنی در این مطالعه بیشتر از مطالعات مشابه بود. [م ت ع پ ز، ۱۲، (۳): ۴۴-۴۷]

کلیدواژه‌ها: آلپسی آرثاتا، جنبه‌های دموگرافیک

مقدمه

و بلوچستان جنبه‌های دموگرافیک آلپسی آرثاتا را در بین این مردم بررسی نمودیم.

روش کار

این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال ۸۶ بر روی ۳۰۶ بیمار مبتلا به آلپسی آرثاتا انجام شد. نمونه‌ها از بین مراجعه کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان خاتم الانیاء زاهدان به روش نمونه‌گیری در استرس انتخاب شدند.

تشخص بیماری براساس معاینه بالینی صورت گرفت و بیمارانی که تشخیص در آن‌ها مشکوک بود و نیاز به بررسی‌های بیشتر داشتند و یا ریزش موی آنان از نظر بالینی آشکار نبود از مطالعه حذف شدند. اطلاعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک شامل: سن، جنس، سن شروع بیماری، طول مدت بیماری، وجود بیماری هم‌زمان (آتوپی، اختلالات تیروئید و دیابت)، سابقه فامیلی در اقوام درجه یک و در گیری ناخن با استفاده از مصاحبه با بیمار استخراج و در چک لیست مخصوص درج شد (لازم به ذکر است که سندیت اطلاعات محدود به گفته‌های بیماران می‌باشد) براساس علایم بیماران به دو گروه محدود و گستردگی تقسیم شدند که نوع محدود شامل: از دادن حداقل ۹۹ درصد موی سر یا هر عضو دیگر بدن و نوع گستردگی شامل: آلپسی توتالیس (از دست دادن تمام موی سر) و آلپسی یونیورسالیس (از دست دادن تمام موی سر و بدن) بود. برای تعیین درصد در گیری سر دو طرف سر هر کدام ۱۸ درصد (دو قسمت ۵ درصدی و دو قسمت ۴ درصدی) بالای سر ۴۰ درصد (چهار قسمت ۱۰ درصدی) پس سر ۲۴ درصد (چهار قسمت ۶ درصدی) در نظر گرفته شد. مجموع آن‌ها درصد در گیری را مشخص می‌نمود. برای مقایسه متغیرهای کمی از آزمون t و برای مقایسه

آلپسی آرثاتا بیماری التهابی مزمنی است که فولیکول مو و گاهی ناخن را در گیر می‌کند. شواهد اخیر نشان می‌دهد که التهاب فولیکول‌های مو در آلپسی آرثاتا توسط مکانیسم‌های اینمی به واسطه TCell ها در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند اتفاق می‌افتد.^{۱,۲} مشخصه اصلی ضایعات وجود follicular marking ندارد.^۳ شیوع آلپسی آرثاتا حدود ۰/۲ درصد می‌باشد و شیوع آن در طول دوران زندگی ۱/۷ درصد می‌باشد. این بیماری هر دو جنس را به طور مساوی است.^۴ اتیولوژی بیماری به طور کامل مشخص نشده است ولی در بسیاری از مطالعات نقش عواملی چون سیستم ایمنی، وراثت و استرس مطرح شده‌اند. البته شواهدی قوی مبنی بر وجود یک بیماری اتوایمیون اختصاصی باقی با یک عامل مستعد کننده ژنتیکی وجود دارد.^۴

مطالعات در زمینه جنبه‌های مختلف اپیدمیولوژیک بیماری می‌تواند به شناخت بهتر آن کمک نماید. مطالعاتی که در مورد تفاوت فرم محدود و گستردگی بیماری از لحاظ HLA و هم‌چنین سایتوکاین‌های مترشحه از لنفوسيت‌های T انجام گرفته است؛ نشان داده‌اند که نوع HLA های موجود در این دو گروه و هم‌چنین سایتوکاین‌های آن‌ها با هم متفاوت است.^{۵,۶} بنابراین احتمال دارد فرم‌های محدود و گستردگی این بیماری از لحاظ سایر جنبه‌های اپیدمیولوژیک از جمله خصوصیات دموگرافیک با هم متفاوت باشند. در این باره مطالعاتی انجام گرفته است که با توجه به جمعیت و قومیت مورد بررسی نتایج مختلفی داشته‌اند.^{۷-۱۱} با توجه به این بررسی‌ها و ارتباط این بیماری با HLA و قومیت افراد و محدودیت این نوع مطالعات در سیستان

بحث

براساس نتایج مطالعه حاضر آلوبسی آرثاتا گستردہ در سنین پایین تری شروع می شود و دوره طولانی تری داشته و سابقه فامیلی مثبت در اقوام درجه یک بیشتر می باشد. در مورد همراهی اختلالات تیروئیدی و درماتیت آتوپیک با آلوبسی آرثاتا تفاوت معنی داری بین شدت بیماری و همراهی با اختلالات تیروئیدی و درماتیت آتوپیک مشاهده شد. در اکثر مطالعات انجام شده آلوبسی آرثاتا در هر دو جنس به تساوی دیده شده است. در مطالعات Xiao و Yang در چین انجام گرفت، نسبت ابتلاء در مردان به زنان به ترتیب ۱/۱ و ۱/۴ به در گزارش شده است.^{۹,۱۰} در مطالعه‌ی ولیخانی نسبت ابتلاء در مردان و زنان ۲/۱ به دست آمد^۸ ولی در مطالعه Goh در آمریکا زنان ۳ برابر مردان مبتلا شده بودند.^{۱۱} در مطالعه‌ی خلیلی مردان ۶۵ درصد و زنان ۳۵ درصد مبتلا به ۱ بود.^{۱۲} در مطالعه‌ی شمس الدینی، نسبت ابتلاء در مردان به زنان آلوبسی آرثاتا بودند.^{۱۳} در مطالعه‌ی مشابه مطالعه Xiao و Yang با ۱/۴ به ۱ بود.^{۱۴} در مطالعه‌ی مشابه مطالعه حاضر تفاوت معنی داری بین سن شروع بیماری و شدت آن وجود دارد که تقریباً مشابه مطالعات دیگر می باشد. در بررسی Goh میانگین سن شروع بیماری ۲۲/۵ سال گزارش شده که در گروه محدود و گستردہ به ترتیب ۲۵/۴ و ۱۸/۵ سال بوده است.^{۱۵} در مطالعه‌ی ولیخانی میانگین سن شروع بیماری در گروه محدود در گروه گستردہ نسبت به مطالعات دیگر بالاتر بود؛ گرچه تفاوت معنی داری بین شدت بیماری و سابقه فامیلی مثبت دیده نشد. طبق نتایج مطالعه حاضر تفاوت معنی داری بین سن شروع بیماری و شدت آن وجود دارد که تقریباً مشابه مطالعات دیگر می باشد. در مطالعات Sabقه فامیلی در اقوام درجه یک به ترتیب ۸/۴ درصد و ۱۱/۰۶ درصد گزارش شده است.^{۹,۱۰} ولی در استان سیستان و بلوچستان سابقه فامیلی در اقوام درجه یک در هر گروه نسبت به مطالعات دیگر بالاتر بود؛ گرچه تفاوت معنی داری بین شدت بیماری و سابقه فامیلی مثبت دیده نشد. طبق نتایج مطالعه حاضر تفاوت معنی داری بین سن شروع بیماری و شدت آن وجود دارد که تقریباً مشابه مطالعات دیگر می باشد. در آرثاتا، درماتیت آتوپیک و اختلالات تیروئیدی همانند سایر مطالعات ارتباط معنی داری با شدت بیماری داشت ولی سابقه فامیلی و در گیری تاریخی در این مطالعه بیشتر از مطالعات مشابه بود. به نظر می رسد بیشتر بودن ازدواج های فامیلی در استان سیستان و بلوچستان باعث شده است که میزان سابقه فامیلی در این بیماری بسیار بالا باشد. در پایان پیشنهاد می گردد که مطالعات آینده-نگری با رویکرد مبتنی بر جامعه برای شناسایی دقیق تر جنبه های دموگرافیک آلوبسی آرثاتا انجام گیرد و به مردم جهت عدم انجام ازدواج های فامیلی آموزش داده شود و بیماری های زمینه ای درمان گردد تا از میزان بروز فرم های گستردہ بیماری آلوبسی آرثاتا کاسته شود.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی با کد ۱۱۳۰ می باشد که در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به تصویب رسیده است.

متغیرهای کیفی از آزمون χ^2 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ۱۵ انجام گرفت.

یافته ها

براساس نتایج این مطالعه میانگین سنی بیماران به هنگام مراجعه ۲۳/۱۲ \pm ۱۱/۷۲ سال بود. از ۳۰۶ بیمار مورد بررسی ۱۸۰ نفر (۵۸/۸٪) مذکور با میانگین سنی ۸/۹ \pm ۱۱/۹ سال و ۱۲۶ نفر (۴۱/۲٪) مومنت با میانگین سنی ۱۹/۱۱ \pm ۱۲/۰ سال بودند که نسبت مردان به زنان ۱/۴ بود و تفاوت معنی داری بین میانگین سنی زنان و مردان نشد ($p=0/۴۹۹$). از کل بیماران بررسی شده ۲۴۷ نفر (۸۰/۷٪) در گیری محدود و ۵۹ نفر (۱۹/۲٪) در گیری گستردہ داشتند. میانگین سنی در گروه محدود ۲۳/۴ \pm ۱۲/۳ سال و در گروه گستردہ ۲۱/۷ \pm ۱۰/۱ سال بود. البته تفاوت معنی داری ($p=0/۳۰۷$) نداشتند (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه جنبه های دموگرافیک در دو گروه محدود و گستردہ

متغیر	آمار	
	سن	یماری
سن شروع	محدود	محدود
	۲۱/۷ \pm ۱۰/۰	۲۱/۹ \pm ۱۲/۱
یماری	محدود	محدود
	۱۵/۸ \pm ۹/۶	۱۵/۸ \pm ۹/۶
طول دوره	محدود	محدود
	۳۲/۵ \pm ۱۸/۷	۳۲/۵ \pm ۱۸/۷
	گستردہ	گستردہ
	۷۳/۷ \pm ۷۱/۰	۷۳/۷ \pm ۷۱/۰

متوسط دوره بیماری در گروه محدود ۳۲/۵ \pm ۱۸/۷ ماه و در گروه گستردہ ۷۳/۷ \pm ۷۱/۰ ماه بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت ($p<0/۰۰۰۱$). در گیری تاریخی در گروه محدود در ۴۴ بیمار (۱۷/۸٪) و در گروه گستردہ در ۳۸ بیمار (۶۴/۴٪) وجود داشت که تفاوت معنی داری آماری با هم داشتند ($p<0/۰۰۰۱$). سابقه فامیلی در اقوام درجه یک در گروه محدود در ۶۲ بیمار (۲۵/۱٪) مثبت و در گروه گستردہ در ۱۷ بیمار (۲۸/۸٪) مثبت بود که تفاوت معنی داری ($p=0/۵۵۸$) بین دو گروه دیده نشد. در ارتباط با همراهی برخی بیماری ها با آلوبسی آرثاتا مانند آتوپی، اختلالات تیروئید و دیابت، در گروه محدود بیشتر همراهی با آتوپی دیده شد. ۴۹ بیمار (۱۹/۸٪) آتوپی و ۲۶ بیمار (۱۰/۵٪) اختلالات تیروئید داشتند و در گروه گستردہ نیز ۲۷ بیمار (۴۵/۷٪) مبتلا به آتوپی و ۱۲ بیمار (۲۰/۳٪) مبتلا به بیماری های تیروئید بودند (جدول ۲). در مورد همراهی اختلالات تیروئیدی و درماتیت آتوپیک با آلوبسی آرثاتا اختلاف معنی داری بین شدت بیماری و همراهی با اختلالات تیروئیدی ($p=0/۰۴$) و درماتیت آتوپیک ($p=0/۰۰۱$) مشاهده شد.

جدول ۲: توزیع فراوانی همراهی بین بیماری های بیماران دو گروه محدود مطالعه

بیماری همراه	مجموع		
	بیماری همراه	گستردہ	محدود
بدون بیماری	-	-	-
تعداد (درصد)	۱۷ (۲۸/۸٪)	۸۲ (۳۳/۱٪)	۱۷ (۲۸/۸٪)
تعداد (درصد)	۱۲ (۲۰/۳٪)	۲۶ (۱۰/۵٪)	۳۸ (۱۲/۴٪)
تعداد (درصد)	-	۸ (۲/۳٪)	۸ (۲/۳٪)
تعداد (درصد)	۲۷ (۴۵/۷٪)	۴۹ (۱۹/۸٪)	۷۶ (۲۴/۸٪)

References

1. Berker DAR, Messenger AG, Sinclair RD. Disorders of hair. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. *Rook text book of dermatology*. 7th ed. U.K: Black Well Science; 2004: Chap 63.
2. Lu W, Shapiro J, Yu M, et al. Alopecia areata: pathogenesis and potential for therapy. *Expert Rev Mol Med* 2006; 8(14): 1-19.
3. Oslen EA. Disorder of epidermal appendages and related disorders. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, editors. *Dermatology in general medicine*. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2003.
4. Blaumeiser B, van der Goot I, Fimmers R, et al. Familial aggregation of alopecia areata. *J Am Acad Dermatol* 2006; 54(4): 627-32.
5. McDonagh AJ, Messenger AG. The pathogenesis of alopecia areata. *Dermatol Clin* 1996; 14(4): 661-70.
6. Duvic M, Hordinsky MK, Fiedler VC, et al. HLA-D locus associations in alopecia areata. DRw52a may confer disease resistance. *Arch Dermatol* 1991; 127(1): 64-8.
7. Teraki Y, Imanishi K, Shiohara T. Cytokines in alopecia areata: contrasting cytokine profiles in localized form and extensive form (alopecia universalis). *Acta Derm Venereol* 1996; 76(6): 421-3.
8. Valikhani M, Barzegari M, Aghaeinia F. [compare the demographic aspects of patient with limited and diffuse type of alopecia areata] Persian. *Skin Dis* 2001; 18(2): 11-14.
9. Yang S, Yang J, Liu JB, et al. The genetic epidemiology of alopecia areata in China. *Br J Dermatol* 2004; 151(1): 16-23.
10. Khalili G, Tavakoli MR. [Etiology of alopecia areata in patient in Khatm Al Anbia hospital dermatology clinic] Persian [dissertation]. Zahedan: Zahedan University of Medical Sciences and Health Services; 1997.
11. Shamsoddini S, Sepehr VR. [The clinical properties of alopecia areata in Kerman dermatology clinic] Persian. *Skin Dis* 2002; (20)4: 20-27.
12. Xiao FL, Yang S, Liu JB, et al. The epidemiology of childhood alopecia areata in China: a study of 226 patients. *Pediatr Dermatol* 2006; 23(1): 13-8.
13. Goh C, Finkel M, Christos PJ and Sinha AA. Profile of 513 patients with alopecia areata: associations of disease subtypes with atopy, autoimmune disease and positive family history. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2006; 20(9): 1055-60.
14. Seyrafi H, Akhiani M, Abbasi H, et al. Evaluation of the profile of alopecia areata and the prevalence of thyroid function test abnormalities and serum autoantibodies in Iranian patients. *BMC Dermatol* 2005; 5: 11.

Comparing the demographic factors of patient with limited and diffuse type of alopecia areata

Mina Daliri¹, Abdolsamad Sheikhzadeh², Hamed Yazdi-Karimi²

Received: 25/Mar/2010

Accepted: 24/May/2010

Background: Alopecia areata is a chronic inflammatory disease that involves the hair follicle. Clinically, patients with alopecia areata may have patchy or confluent hair loss on the scalp or body so we conduct a study to compare the demographic aspects of patient with limited and diffuse type of alopecia areata.

Materials and Method: We conducted a descriptive-analyzing study in which 306 patient were chosen. The patients were divided into two groups of diffuse and limited Alopecia. Demographic factors including age, gender, disease onset were compared in two groups.

Results: Out of 306 patients, 58.8 % were male and 41.2 % were female. 247 patients (80.7%) suffered from limited type and 59 patients (19.2%) suffered from diffuse type. The mean age of the onset of involvement in limited group was 21.9 ± 12 yr and 15.8 ± 12 yr in diffuse group. The mean duration of involvement in limited group was 18.7 months and 71 months in diffuse group.

Conclusion: Diffuse type alopecia areata starts at lower age and has longer duration. Our study results were similar to the others. Like other studies, thyroid disorders and atopic dermatitis are positively correlative to the severity of disease. [ZJRMS, 12(3):44-47]

Keywords: Alopecia areata, demographic factors.

1. Assistant Professor of Dermatology, Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Zahedan, Iran.

2. General Physician, Development Center of Clinical Research, Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Zahedan, Iran.