

## مقایسه تاثیر علف چای و ویتامین B<sub>6</sub> بر درمان سندروم پیش از قاعده‌گی

سمانه ثابت بیرجندی<sup>۱</sup>, میترا تدین نجف‌آبادی<sup>۲</sup>, امیر سیاهپوش<sup>۳</sup>, محمدحسین حقیقی‌زاده<sup>۴</sup>

۱. مریبی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

۲. مریبی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی

۳. استادیار داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی

۴. مریبی آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۱/۲۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۹/۳/۲۵

### چکیده

**زمینه و هدف:** سندروم پیش از قاعده‌گی مجموعه‌ای از علایم جسمی و روانی است و یکی از درمان‌های موثر بر این سندروم تع giozis داروهای مهارکننده باز جذب سروتونین از جمله فلوکسین می‌باشد. علف چای با نام علمی Hypericum perforatum از مکانیسمی شبیه به فلوکسین برخورداری می‌باشد و به طور سنتی در درمان این سندروم به کار می‌رود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر علف چای و ویتامین B<sub>6</sub> بر درمان سندروم پیش از قاعده‌گی انجام شد.

**مواد و روش کار:** این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی ۷۲ نفر از دانشجویان خوابگاه شهید چمران اهواز مبتلا به فرم متوسط و شدید سندروم پیش از قاعده‌گی، صورت گرفت. شرکت کنندگان برای دو سیکل متواتی فرم ثبت وضعیت روزانه را تکمیل کردند. سپس بیماران به طور تصادفی به دو گروه درمانی ویتامین B<sub>6</sub> و پرفوران تقسیم شدند. ویتامین B<sub>6</sub> روزانه ۸۰ میلی گرم و قرص پرفوران ۱۶۰ میلی گرم سه بار در روز، یک هفته قبل از قاعده‌گی، به مدت دو ماه تع giozis گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS-13 انجام شد.

**یافته‌ها:** میزان کاهش میانگین علایم روانی در گروه علف چای و ویتامین B<sub>6</sub> برابر بود ولی از نظر علایم جسمانی سندروم پیش از قاعده‌گی، کاهش میانگین در گروه ویتامین B<sub>6</sub> نسبت به گروه علف چای اختلاف معنی داری را نشان داد ( $p=0.194$ ).

**نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، درمان با علف چای در مقایسه با درمان با ویتامین B<sub>6</sub> تنها بر کاهش علایم روانی سندروم پیش از قاعده‌گی موثر است، در صورتی که ویتامین B<sub>6</sub> هم در درمان علایم روانی و هم جسمانی موثر بود. انجام تحقیقی برای مقایسه تاثیر علف چای و فلوکسین بر درمان سندروم پیش از قاعده‌گی توصیه می‌شود. [۱-۵] م ت ع پ ز (۱۲):۴

**کلیدواژه‌ها:** سندروم پیش از قاعده‌گی، هایپریکوم پرفوراتوم، پیریدوکسین

### مقدمه

به علت مشخص نبودن دقیق پاتوفیزیولوژی سندروم پیش از قاعده‌گی پروتوکل‌های درمانی بسیاری توصیه شده است. توصیه‌های درمانی عبارتند از برومکرپتین جهت درد و احتقان پستان، مهارکننده‌های باز جذب سروتونین (SSRIs) مثل فلوکسین، داروهای ضد پروستاگلاندین، آنالوگ‌های GnRH، ویتامین‌ها و گیاهان دارویی نیز پیشنهاد شده‌اند.<sup>۱-۴</sup> امروزه کارآمدترین درمان فلوکسین در نظر گرفته شده است که دارای عوارض جانبی شامل: بی‌خوابی، عصبانیت و کاهش میل جنسی می‌باشد.<sup>۱-۳</sup> گیاهان دارویی یکی از رایج‌ترین روش‌های درمانی هر نوع بیماری است، چرا که علاوه بر مقرون به صرفه بودن، عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند و به علاوه استفاده از آن‌ها بی‌خطر، مطمئن، کم هزینه و در دسترس می‌باشند.<sup>۴</sup> از طرفی ویتامین‌ها به عنوان درمان نهایی با خطر کم و ارزان که در درمان سندروم پیش از قاعده‌گی موثر هم می‌باشند، پیشنهاد شده‌اند.<sup>۱-۵</sup> علف چای با نام علمی Hypericum perforatum یکی از گیاهان دارویی است که از فعالیت آمینوکسیداز و باز جذب سروتونین که در ایجاد سندروم پیش از قاعده‌گی نقش مهمی دارد، جلوگیری می‌کند و به علت شباهت زیاد آن با فلوکسین از نظر مکانیزم و خواص درمانی به آن فلوکسین طبیعی می‌گویند. در مطالعات مختلف اثرباره‌منی این گیاه معجزه‌آسا در درمان افسردگی خفیف و متوسط گزارش شده است. از عوارض جانبی

یکی از مسائل روان‌تی که با عملکرد تولید مثل زنان ارتباط دارد، سندروم پیش از قاعده‌گی است.<sup>۱</sup> سندروم پیش از قاعده‌گی با بروز علایم جسمانی و روانی متغیر و عود کننده‌ای همراه است که ۷ الی ۱۴ روز قبل از قاعده‌گی به وجود آمده و با شروع قاعده‌گی تخفیف می‌یابد.<sup>۷۵</sup> تا ۹۰ درصد زنان قبل از خونریزی ماهیانه آن را تجربه می‌کنند.<sup>۲</sup> سندروم پیش از قاعده‌گی نه تنها بر خود فرد بلکه بر خانواده وی نیز تاثیر می‌گذارد و سبب ایجاد تغییرات در رفتار زنان می‌گردد. این آثار شامل ناسازگاری با همسر و بذرخواری با فرزند می‌گردد.<sup>۳</sup> طیف وسیعی از تغییرات رفتاری که در مرحله قبل از قاعده‌گی افزایش می‌یابد شامل دو دسته علایم جسمانی و روانی است. علایم جسمانی شامل: تورم، حساسیت پستان‌ها، سردرد، افزایش اشتها، تپش قلب و علایم روانی شامل: انزوا طلبی، غیبت از کار، فقدان تمرکز، کاهش کارآیی، اجتناب از فعالیت‌های اجتماعی، افزایش بروز حوادث، مصرف الکل، رفتارهای جانی و تمایل به خود کشی می‌باشد.<sup>۳</sup> علت سندروم نامشخص است و تئوری‌هایی که در مورد آن مطرح می‌گردد، عبارتند از افزایش فعالیت آلدسترون، بالارفتن عملکرد آدرنال، هایپرپرولاکتینی، هیپوگلیکیسمی، کاهش ویتامین B<sub>6</sub>، کاهش میزان دوبامین و سروتونین مرکزی، کاهش اسیدهای چرب ضروری که امروزه کاهش میزان سروتونین و دوبامین مرکزی بیشتر از سایر علل مورد توجه قرار گرفته است.<sup>۱-۳</sup>

بیقراری و دلواپسی، اضطراب، بی خوابی، آکنه، سردرد، ادم و تورم انتهایا، حساسیت سینه، نفع شکم، افزایش یا کاهش اشتها، احساس اشکال در تفکر و یادآوری، تمایل به غذاهای شور یا شیرین، احساس عدم جذابت، تهوع، احساس گناه و نامیدی و... میباشد. در مقابل هر علامت ۳۵ ستون چهت مشخص کردن شدت علایم در روزهای سیکل قاعده‌گی قرار دارد. شرکت کنندگان باید علایم را با شدت‌های معین شده که عبارتند از صفر (نارم)، یک (خفیف)، دو (متوسط)، سه (شدید) امتیازبندی می‌کردند. با بررسی علایم در دو سیکل افرادی که علایم را از ۷ روز قبل از قاعده‌گی تا حداقل ۴ روز اول قاعده‌گی داشتند، مبتلا به بیماری تشخیص داده شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفری تقسیم شدند (شکل ۱). به گروه اول ۱۶۰ میلی‌گرم قرص پرفوران حاوی ۳۳۰ میکروگرم ماده موثره هایپرسین (ساخت شرکت گل داروی اصفهان) سه بار در روز به مدت ۷ روز آخر فاز لوتوال و به گروه دوم روزانه ۸۰ میلی‌گرم قرص ویتامین<sup>۶</sup> (ساخت شرکت ایران هورمون تهران) به مدت ۲ ماه تجویز گردید. بعد از دو ماه درمان، فرم ثبت وضعیت روزانه مورد بررسی قرار گرفت و علایم جسمانی و روانی به صورت جداگانه قبل و بعد از درمان اندازه‌گیری شد. از نمونه‌ها درخواست گردید تا بروز هر گونه عارضه جانبی را اطلاع دهند.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS-13 استفاده شد. برای مقایسه دویه دوی درون گروه‌ها از آزمون *t* زوجی و طرح آماری اندازه‌گیری مکرر و برای مقایسه دویه دویین گروه‌ها، از آزمون *t* مستقل و طرح آماری اندازه‌گیری مکرر استفاده گردید. سطح معنی دار  $0.016 < t < 0.010$  برای آزمون *t* زوجی و سطح معنی دار  $0.05 < t < 0.01$  برای بقیه آزمون‌ها در نظر گرفته شد. روش طرح آماری اندازه‌گیری مکرر به این دلیل استفاده گردید که افراد در زمان‌های متواتی مورد سنجش قرار گرفتند، بنابراین علاوه بر مقایسه اثر درمان، اثر زمان و اثر مقابل زمان و درمان هم با این روش مورد بررسی قرار گرفت. پروتکل مطالعه توسط کمیته اخلاقی دانشگاه جندی شاپور اهواز به تایید رسید.

## یافته‌ها

از ۲۵۰ نفری که مورد غربالگری اولیه قرار گرفتند، ۱۰۰ نفر واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند که به کلیه آن‌ها فرم ثبت وضعیت روزانه برای دو سیکل داده شد و افراد واجد شرایط در یک مطالعه دو گروهی قرار گرفتند و ۵۰ نفر پرفوران و ۵۰ نفر ویتامین<sup>۶</sup> دریافت نمودند. شرکت کنندگان از نظر نحوه مصرف دارو و عوارض جانبی آن‌ها هر دو هفته ویزیت می‌شدند. در نهایت ۲۸ نفر به دلایل مختلف از قبیل، عدم تکمیل پرسشنامه، مصرف نکردن دارو در زمان مناسب، عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه و عوارض جانبی از مطالعه حذف و خارج شدند و تجزیه و تحلیل نهایی بر روی ۷۲ نفر انجام شد. متغیرهای دموگرافیک و شدت علایم هر گروه قبل از درمان با یکدیگر مقایسه شدند و همگن بودن آن‌ها به اثبات رسید (جدول ۱). میانگین سنی بیماران ۲۳ سال بود. اکثریت شرکت کنندگان مقدار خونریزی قاعده‌گی را ۶ روز و فاصله سیکل قاعده‌گی را ۲۸-۲۹ روز گزارش کردند.

گزارش شده این گیاه دارویی به حساسیت پوستی در مقابل نور (آثار فتوژنیک) اشاره شده است. از آن جایی که تعدادی از علایم سندرم ماهیانه شامل علایم افسردگی است دور از انتظار نخواهد بود که درمان‌های موثر بر افسردگی بتوانند بر این سندرم موثر باشند.<sup>۶,۷</sup> پیرامون تاثیر جان مقدس St. John's Wort مطالعه‌ای به صورت پایلوت انجام داد و نشان داد که استفاده از این داروی گیاهی موجب کاهش حداقل ۵۰ درصد در علایم سندرم پیش از قاعده‌گی شده است.<sup>۸</sup> از طرفی Hicks و همکاران در سال ۲۰۰۴ تاثیر هایپریکم پروفراستوم را در درمان علایم این سندرم در مقایسه با درونما معنی دار گزارش نکردند.<sup>۹</sup> از طرفی ویتامین<sup>۶</sup> به عنوان یکی از درمان‌های علامتی این سندرم مورد قبول قرار گرفته است.<sup>۱۰</sup> تا کنون مقایسه‌ای جهت بررسی اثرات درمانی این گیاه دارویی با داروی دیگری که موثر بر این سندرم باشد صورت نگرفته است و انجام آن ضروری به نظر می‌رسد. از این رو در این تحقیق اثر درمانی علف چای و ویتامین<sup>۶</sup> بر درمان سندرم پیش از قاعده‌گی مورد مقایسه قرار گرفت.

## روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در خوابگاه ساکن بودند انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری آسان و مبتنی بر هدف انجام شد. محاسبه حجم نمونه طبق مشاوره با استاد محترم آمار و بررسی مقالات متفاوت، در این مطالعه شامل ۷۲ نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز بود که دچار فرم متسط و شدید سندرم پیش از قاعده‌گی بودند و شرایط ورود به مطالعه داشتند ولی به دلیل ریزش احتمالی نمونه‌ها و نیز نتایج دقیق‌تر حجم نمونه ۱۰۰ نفر برآورد شد.

طول مدت نمونه گیری ۶ ماه بود که در مرداد ماه ۸۷ به پایان رسید. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: داشتن قاعده‌گی منظم با فواصل ۲۴ تا ۳۵ روز، سن ۲۰ تا ۳۰ سال، مدت خونریزی ۳ تا ۱۰ روز و مجرد بودن. معیارهای خروج از مطالعه: ۱- ابتلا به بیماری‌های روانی یا جسمانی ۲- مصرف داروهای افسردگی، هورمونی، جلوگیری از بارداری (جهت درمان برخی بیماری‌ها) و ویتامین‌ها ۳- استفاده از گیاهان دارویی ۴- داشتن برنامه ورزشی منظم ۵- وجود استرس در سه ماه گذشته، فوت نزدیکان، ازدواج یا عمل جراحی بود. برای این که رضایت افراد برای شرکت در مطالعه مشخص گردد فرم رضایت‌نامه آگاهانه از واحدهای پژوهش اخذ گردید. با استفاده از فرم Bonnlander & Rossignol<sup>۱۱</sup> موقع سندرم پیش از قاعده‌گی از واحدهای پژوهش به عمل آمد.

دانشجویان در صورت داشتن امتیاز ۳۴-۳۷ و بیشتر از ۳۴ به عنوان سطح متسط و شدید سندرم وارد مطالعه می‌شدند، بعد از ثبت مشخصات Bonnlander & Rossignol در پرسشنامه، فرم ثبت وضعیت روزانه فرم Bonnlander & Rossignol به مدت ۲ سیکل توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. فرم ثبت وضعیت روزانه، علامت از علایم سندرم پیش از قاعده‌گی را مشخص می‌نماید که شامل: خستگی، زورنجی، گریه کردن، خلق افسرده، عصبانیت،

جسمانی در ماه اول و دوم درمان موثرتر از علف چای بوده است (p=0.19). در پایان از واحدهای پژوهش خواسته شد که در صورت بروز عوارض جانبی آن را بیان کنند، که یک نفر از مصرف کنندگان پرفوران دچار حساسیت پوستی و ۵ نفر از گروه پیریدوکسین دچار لکه‌بینی شدند، که از مطالعه خارج شدند.

**جدول ۴:** مقایسه میانگین‌های مجموع عالیم روانی سندروم پیش از قاعده‌گی قبل و بعد از درمان بین دو گروه مورد مطالعه

عالیم ویتامین B <sub>6</sub> Mean±SD	علف چای Mean±SD	نموده مجموع عالیم روانی دو ماه قبل از درمان
۱۴/۱۰±۰/۹۴	۱۳/۰۱±۵/۵۴	ماه اول بعد از درمان
۱۲/۹۷±۰/۸۴	۱۱/۳۹±۴/۸۹	ماه دوم بعد از درمان
۱۱/۸۱±۰/۷۶	۹/۱۷±۴/۰۸	مقایسه دوره‌های درمانی
<i>p</i> =0.124		

### بحث

یافته‌ها حاکی از آن است که علف چای و ویتامین B<sub>6</sub> هر دو بر درمان سندروم پیش از قاعده‌گی موثر هستند ولی علف چای در تخفیف عالیم جسمانی در مقایسه با ویتامین B<sub>6</sub> ضعیف عمل کرده است. در حالی که کاهش میانگین عالیم روانی در گروه علف چای و ویتامین B<sub>6</sub> برابر بوده است. در بررسی درون گروهی علف چای در کاهش عالیم جسمانی نسبت به قبل از درمان موثر بوده است ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است. خندقی و همکاران در مطالعه‌ای نشان دادند که عصاره هایپریکوم با مهار سنتز پروستاگلاندین و سایر مدیاتورهای عصبی اثر ضد دردی خود را اعمال می‌کند.<sup>11</sup> Hicks و همکاران در بررسی خود علف چای را در کاهش میانگین عالیم جسمانی موثر یافتند ولی در مقایسه با گروه دارونیما این کاهش معنی دار نبود.<sup>9</sup> به نظر می‌رسد علت همسو بودن نتایج این مطالعه و نتایج Hicks گستردگی عالیم جسمانی و دوره کوتاه مدت مصرف دارو باشد. از طرفی علف چای در مطالعه حاضر سبب کاهش میانگین عالیم روانی نسبت به قبل از درمان شده است که با مطالعه حاضر همسو می‌باشد. وجود آنزیم مونو آمینواکسیداز سبب تجزیه هورمون‌های آدرنالین و نورآدرنالین در محل سیناپس‌های عصبی می‌شود تجزیه هورمون‌های مذکور سبب ایجاد اختلالات خلقي می‌گردد. هایپرسین موجود در هایپریکوم پر فوراً از جذب این هورمون‌ها جلوگیری نموده پتانسیل جذب رسپتورهای آدنوزین و سروتونین و بزوپریازین را داشته و مانع تولید مونو آمینواکسیداز و در نهایت کاهش افسردگی می‌گردد.<sup>7,8</sup> در تحقیقی که پاک‌گهر و همکاران با هدف بررسی تاثیر هایپریان بر درمان سندروم پیش از قاعده‌گی انجام دادند، نفر از ۷۰ مبتلایان به مدت دو سیکل تحت درمان با قطره هایپریان (عصاره آبی علف چای) قرار گرفتند که بعد از اتمام مطالعه ۵۰ درصد از عالیم این سندروم کاهش یافت که از این میان بیشترین کاهش در عالیمی مثل گریه کردن ۹۲ درصد، افسردگی ۸۵ درصد، عدم تمعرک حواس ۷۵ درصد و اضطراب ۹۶ درصد بوده است. این مطالعه به صورت مقایسه با دارونوما صورت گرفته است.<sup>12</sup> دیه گولی و همکاران طی تحقیقی که با عنوان

جدول ۱: مقایسه میانگین سن، سن شروع قاعده‌گی، طول مدت سیکل قاعده‌گی و مدت خونریزی قاعده‌گی در دو گروه علف چای و ویتامین B<sub>6</sub>

گروه	علف چای Mean±SD	ویتامین B <sub>6</sub> Mean±SD	<i>p</i>
سن	۲۲/۲۲±۰/۸۳	۲۳/۷۲±۰/۵۳	۰/۶۱۷
سن شروع قاعده‌گی	۱۲/۹۱±۰/۳۰	۱۲/۴۴±۰/۴۹	۰/۴۱۹
طول مدت سیکل قاعده‌گی	۲۸/۴۴±۰/۵۲	۲۹/۳۸±۰/۴۷	۰/۱۸۳
مدت خونریزی قاعده‌گی	۶/۵۵±۰/۲۴	۶/۴۱±۰/۲۳	۰/۶۸۴

مجموع عالیم روانی و جسمانی در دو گروه قبل از درمان یکسان بود برطبق فرم ثبت وضعیت روزانه، مقایسه میانگین مجموع عالیم جسمانی قبل از درمان به ترتیب در گروه علف چای و ویتامین B<sub>6</sub> A<sub>6</sub> اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد و دو گروه از این نظر همگن گردیدند (جدول ۲).

**جدول ۲:** مقایسه میانگین عالیم سندروم پیش از قاعده‌گی قبل از درمان بین دو گروه مورد مطالعه

سیکل‌های درمانی دو به دو با استفاده از آزمون *t* زوجی با یکدیگر

عالیم	علف چای Mean±SD	ویتامین B <sub>6</sub> Mean±SD	<i>p</i>
عالیم جسمانی	۰/۵۹±۸/۷۷	۰/۶۸±۹/۷۸	۰/۲۶۴
عالیم روانی	۰/۹۲±۱۳/۰۱	۰/۹۴±۱۴/۱۰	۰/۴۱۲

مقایسه شدند در گروه علف چای عالیم جسمانی در ماه اول درمان کاهش یافته ولی مقایسه ماه دوم در مقایسه با ماه اول معنی دار نبوده است (p=0.255) (جدول ۳). ولی تأثیر آن بر روی عالیم روانی در سیکل دوم نسبت به قبل از درمان و دوره اول درمان محسوس می‌باشد (p=0.0001). از طرفی ویتامین B<sub>6</sub> در تخفیف عالیم جسمانی و روانی در هر دو سیکل درمانی موثر عمل کرده است (p=0.0001).

**جدول ۳:** مقایسه میانگین‌های عالیم سندروم پیش از قاعده‌گی قبل و بعد از درمان بین دو گروه مورد مطالعه

نموده مجموع عالیم جسمانی	علف چای Mean±SD	ویتامین B <sub>6</sub> Mean±SD	<i>p</i>
دوره قبل از درمان	۸/۷۷±۰/۵۹	۹/۷۸±۰/۶۸	۹/۷۸±۰/۶۸
یک ماه بعد از درمان	۸/۰۲±۰/۵۲	۷/۸۲±۰/۶۳	۷/۸۲±۰/۶۳
دو ماه بعد از درمان	۸/۳۹±۰/۶۹	۷/۶۰±۰/۴۸	۷/۶۰±۰/۴۸
مقایسه دوره‌های درمانی			<i>p</i> =0.0003

بر این اساس با استفاده از طرح آماری اندازه‌گیری مکرر مقایسه میانگین عالیم روانی در گروه علف چای در دوره‌های مختلف درمانی، اختلاف معنی داری را نشان می‌دهد (p=0.0001) و در گروه ویتامین B<sub>6</sub> مقایسه میانگین عالیم جسمانی (p=0.0001) و عالیم روانی (p=0.0001) در دوره های مختلف درمانی از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد. هم چنین نتیجه این آزمون نشان می‌دهد که دو گروه مورد مداخله از نظر تاثیر بر کاهش میانگین مجموع عالیم روانی (p=0.124) در دوره‌های مختلف درمان تفاوتی نداشته‌اند (جدول ۴). با استفاده از تست *t* مستقل ویتامین B<sub>6</sub> در کاهش عالیم

حاضر باشد، داروهای گیاهی مدت زمان بیشتری برای شروع اثر نیاز دارند. تاثیر پرفوران و پیریدوکسین در کاهش عالیم جسمانی سندروم پیش از قاعدگی یکسان نبود. شاید بتوان نتایج حاصل در این مورد را به مدت زمان مصرف دارو واژ همه مهم تر به متتنوع بودن عالیم جسمانی این سندروم در پرسشنامه های مختلف نسبت داد. نتایج نشان می دهد که تاثیر دو داروی پرفوران و پیریدوکسین در کاهش عالیم روانی به یک اندازه موثر بوده است. پرفوران می تواند به عنوان یکی از روش های درمانی سندروم پیش از قاعدگی پیشنهاد گردد. به علت نبود مستندات کافی مربوط به بی خطر بودن این گیاه در درون شیردهی، استفاده از آن در این دوران توصیه نمی شود. مزیت آن این است که نیازی به مصرف آن در سراسر سیکل نیست و استفاده از آن تنها در هفته آخر سیکل قاعدگی کافی می باشد و با توجه به عوارض جانبی تعدادی از داروهای شیمیایی موثر بر درمان این سندروم می توان این داروی گیاهی بدون عوارض مطرح شده برای فلوکستین برای برطرف کردن عالیم روانی و نظایر آن سود جست.

### سپاسگزاری

بدین وسیله از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در اجرای این طرح پژوهشی (با شماره ۹۰-U-۸۷۰۰۹) مساعدت نمودند و معاونت محترم دانشجویی و مسؤولین محترم خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز برای دسترسی به جامعه پژوهش قدردانی و تشکر می شود.

### References

1. Ghazi-Jahani B. [Translation of clinical gynecologic endocrinology and infertility] Persian. Leon Speroff. Tehran: Golban Publications; 2004:13.
2. Ghazi-Jahani B. [Translation of Berek & Novak gynecology] Persian. Jonathan s, Berek. Tehran: Golban Publications; 2007: 331.
3. Sina S. [Translation of Kistners Gynecology] Persian. Kenneth J Ryan. Tehran: samat Publications; 1999: 68.
4. Steiner M, Pearlstein T, Cohen LS, et al. Expert guidelines for the treatment of sever PMS, PMDD, and comorbidities: the role of SSRIs. *J Womens Health (Larchmt)* 2006; 15(1): 57-69.
5. Kholdi N. [Translation of rabinsons basic nutrition] Persian. Cornni H. Tehran: Salem Publications; 1379: 52.
6. Norman L, Darids G. Psychotropic drugs. Elsevier Mosby; 2005:517.
7. Ziaii A. [Herbal drugs and their interaction evidence based] Persian. Tehran: Teimurzade Press; 2005: 139.
8. Stevinson C, Ernst E. Complementary/alternative therapies for premenstrual syndrome: A systematic review of randomized controlled trials. *Am J Obstet Gynecol* 2001; 185(1): 227-35.
9. Hicks SM, Walker AF, Gallagher J, et al. The significance of "nonsignificance" in randomized controlled studies: adiscussion inspired by a double-

" مقایسه تاثیر پیریدوکسین، آپرازولام، فلوکستین و پروپرانولول در درمان نوع شدید سندروم پیش از قاعدگی پرداختن، گزارش کردند که ۶۳/۷ درصد بیماران دریافت کننده ویتامین B<sub>6</sub>، ۶۳/۳ درصد آپرازولام، ۵۰ درصد فلوکستین و ۷۳/۴ درصد پروپرانولول بهبودی بالای ۵۰ درصد را نشان دادند.<sup>۱۳</sup> در مطالعه حاضر پرفوران از نظر میزان اثر از مکانسیمی ماند دست آمده در پژوهش حاضر در مقایسه با سایر مطالعات را می توان به دوز و مدت زمان استفاده از دارو نسبت داد چرا که پیریدوکسین به صورت روزانه و پرفوران به مدت ۷ روز آخر قاعدگی مورد استفاده قرار می گرفت. در مطالعه دیگری که کاشانیان و همکاران با هدف تاثیر پیریدوکسین در درمان سندروم پیش از قاعدگی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ویتامین B<sub>6</sub> در درمان عالیم روانی و جسمانی سندروم به صورت معنی داری با گروه بلاسبو متفاوت است.<sup>۱۴</sup> اهداف بعدی شامل مقایسه دو گروه درمانی بود. در تحقیق حاضر اختلاف معنی داری از نظر عالیم جسمانی بین دو گروه درمانی مشاهده شد و تنها پیریدوکسین در تخفیف عالیم جسمانی موثر بود. مطالعه ای وجود ندارد که اثر بخشی علف چای با داروی دیگری را مقایسه نماید، اما مطالعات عدیده ای در ارتباط با فلوکستین (با مکانیسم مشابه علف چای) انجام شده، نشان می دهد که در اختلالات سندروم پیش از قاعدگی، فلوکستین ۲۰ و ۱۰ میلی گرمی در کاهش اختلالات روانی موثر بوده ولی در مورد عالیم جسمانی فقط فلوکستین ۲۰ میلی گرمی موثر بوده است.<sup>۱۵</sup> شاید علت اختلاف در درمان عالیم جسمانی نتایج به علت کم بودن دوز پرفوران در مطالعه

blinded study on St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.) for premenstrual symptoms. *J Altern Complement Med* 2004; 10(6): 925-32.

10. Rossignol AM, Bonnlander H. Evidence against multiple premenstrual syndromes: results of a multivariate profile analysis of premenstrual symptomatology. *J Psychosom Res* 1993; 37(3): 257-63.
11. Khandaghi R. [Assessment of *Hypericum* effects in prophylaxis of migraine and comparison of it with amitriptyline and propranolol in Imam Khomeini Medical Center] Persian. Tabriz Med J 2002; (4): 37-44.
12. Pakgohar M. [Effect of *Hypericum perforatum* L. for treatment of premenstrual syndrome] Persian. *Herbal Medicine J* 2004; (15):33-40.
13. Diegoli MS, da Fonseca AM, Diegoli CA and Pinotti JA. A double blind trial of four trial of four medicdation to treat severs premenstrual syndrome. *Int J Gynaecol Obstet* 1998; 62(1): 63-7.
14. Kashanian M. Pyridoxine (vitamin B6) therapy for premenstrual syndrome. *Int J Gynaecol Obstet* 2007; 96(1): 43-44.
15. Mokhber N, Bordbar MR. Effect of fluoxetine for treatment of premenstrual dysphoric disorder. *Fundamental Mental Health J* 2005; (23,24): 111-115.

## **Comparision the effect of Hypericum perforatum and vitamin B<sub>6</sub> in the treatment of premenstrual syndrome**

**Samaneh Sabet-Birjandi<sup>1</sup>, Mitra Tadayon-Najafabadi<sup>2</sup>, Amir Siyahpooshan<sup>3</sup>, Mohammadhossein Haghizadeh<sup>4</sup>**

Received: 12/Apr/2010

Accepted: 15/Jun/2010

**Background:** Premenstrual syndrome is the cyclic appearance of one or more of a large collection of symptoms just prior to menstruation. The aim of this study was to compare the effect of Hypericum perforatum and vitamin B<sub>6</sub> in the treatment of premenstrual syndrome.

**Materials and Method:** In this study after two completion of questionnaire during two consecutive periodic cycles 72 female students selected between ages of 20 to 30 years with moderate to severe premenstrual syndrome with inclusion criteria for entering into the study. Subjects randomly divided in to two groups. First group received perforan consist of hypericum perforatum 160mg, took three times one week before menstruation period and second group took vitamin B<sub>6</sub> 80mg daily for two months. Data were analyzed using SPSS software.

**Result:** Results showed significant difference between means for score of physical symptoms of premenstrual syndrome between two groups ( $p = 0.019$ ) but means of score in psychological symptoms of premenstrual syndrome had no significant difference between two groups ( $p=0.124$ ).

**Conclusion:** According to this study Hypericum perforatum can only reduce psychological symptoms but vitamin B<sub>6</sub> will reduce both somatic and psychological symptoms. [ZJRMS, 13(4):1-5]

**Keywords:** Premenstrual syndrome, Hypericum perforatum, Vitamin B6

1. Instructor of Midwifery, Azad University Birjand Branch, Birjand, Iran.
2. Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Jondi Shapour University of Medical Sciences and Health Services, Ahwaz, Iran.
3. Assistant Professor of Pharmacy, School of Pharmacy, Jondi Shapour University of Medical Sciences and Health Services, Ahwaz, Iran.
4. Instructor of Biostatistics, School of Health, Jondi Shapour University of Medical Sciences and Health Services, Ahwaz, Iran.

Please cite this article as: Sabet-Birjandi S, Tadayon-Najafabadi M, Siyahpooshan A, MH Haghizadeh. Comparision the effect of Hypericum perforatum and vitamin B<sub>6</sub> in the treatment of premenstrual syndrome. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2011; 13(4): 1-5.