

تأثیر دو میزان مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر شاخص های سرمی آسیب سلولی در کشتی گیران

رامین امیرسازان^۱, سعید نیکو خصلت^۱, وحید ساری صراف^۱, بتوراک کاوه^۲, امیر لطافت کار^۳

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۸/۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۹/۹/۳

۱. استاد بار تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی

۲. کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی

۳. دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی

چکیده

زمینه و هدف: تاکنون تحقیقات اندکی در مورد تأثیر مصرف مقادیر متفاوت مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار بر شاخص های سرمی آسیب سلولی در کشتی گیران انجام شده است. هدف این پژوهش مقایسه تأثیر دو میزان متفاوت مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر شاخص های سرمی آسیب عضلاتی در کشتی گیران پس از یک فعالیت مقاومتی سنگین بود.

مواد و روش کار: در این مطالعه یئمه تجربی ۲۹ کشتی گیر جوان به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه تقييم‌بندی شدند. همه آزمودنی‌ها در یک جلسه تمرین مقاومتی سنگین شرکت کردند. همینطور ۳۰ دقیقه قبل و بعد از اجرای آزمون ورزشی به آزمودنی‌ها اسیدهای آمینه شاخه دار (آسیب سلولی) به مقدار ۴۵۰ mg/kg در گروه اول و ۲۱۰ mg/kg در گروه دو) یا شبه دارو (دکسترن به مقدار ۴۰ mg/kg) داده شد. نمونه‌های خونی ۳۰ دقیقه قبل، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین از ورید آتنی کوبیات آزمودنی‌ها جمع آوری شد.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان فعالیت سرمی آنزیم‌های CK-CKMB-LDH ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی سنگین افزایش معنی‌داری در هر سه گروه داشت. میزان دامنه تغییرات و میانگین فعالیت سرمی CK-CKMB-LDH در گروه شبه‌دارو نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بود. از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین سه گروه در میزان فعالیت سرمی آنزیم‌های CK-CKMB-LDH ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از آزمون ورزشی مشاهده شد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق احتمالاً مصرف دو مقدار متفاوت اسیدهای آمینه شاخه دار در این تحقیق با وجود اثر کاهنده تأثیر معنی‌داری بر فعالیت‌های آنزیمی-CK-CKMB-LDH سرم، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی سنگین ندارد. [۲۲-۲۸؛ (۸)۱۳؛ ۱۳۹۰، م ت ع ب، ز]

کلیدواژه ها: اسیدهای آمینه شاخه دار، آسیب عضلانی، فعالیت

مقدمه

است. لاکتات دهیدروژنаз آنزیمی است که به مقادیر فراوان در سیتوپلاسم تمام بافت های بدن با غلظت های مختلف یافت می شود و در تبدیل پیروات به لاکتات یا به عکس در مسیر گلیکولیزی هوازی باعث سرعت آن می شود.^{۱۵} Greer و همکارانش تفاوت معنی‌داری بین مصرف BCAA و شبه‌دارو هم کالری مشاهده نکردند.^{۱۱} در مطالعه‌ای که توسط Zebblin به صورت دوسوکور انجام گرفت، محققان دریافتند که مصرف ۸ گرم BCAA قبل از فعالیت مقاومتی سبک تأثیری بر شاخص کراتین کیناز سرمی ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت ندارد.^{۱۶}

در هر کدام از بررسی‌های به عمل آمده از این قبیل، مقدار متفاوتی از مکمل BCAA مورد استفاده قرار گرفته است، ضمن این که اکثر فرادرادهای تمرینی در این تحقیقات، از نوع طولانی مدت و استقامتی می‌باشد و همین طور نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف، همسو و یکسان نمی‌باشند. از طرفی فعالیت‌های مقاومتی به ندرت مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در هیچ کدام از بررسی‌های به عمل آمده تأثیر مصرف مقادیر متفاوت مکمل BCAA قبل و بعد از فعالیت مقاومتی بر شاخص های سرمی آسیب سلولی مورد مقایسه قرار نگرفته است. لذا این سوال مطرح است که، مصرف دو مقدار متفاوت مکمل BCAA قبل و بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی سنگین چه تأثیری بر شاخص های سرمی آسیب عضلانی (- CK-CKMB LDH) کشتی گیران خواهد داشت؟

روش کار

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. آزمودنی‌های تحقیق از بین کشتی گیران تمرین کرده شهرستان مهاباد با توجه به معیارها و شاخص های

مکمل‌های غذایی عمده‌تاً شامل ترکیبات کربوهیدراتی، پروتئین‌ها (اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری)، ویتامین‌ها، مواد معدنی و ... هستند.^۱ مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش بسیار گستره است و کمتر ورزشکاری را می‌توان یافت که در بعضی مراحل دوره قهرمانی خود یک یا چند مورد از آن‌ها را تجربه نکرده باشند.^۷

اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAA: Branched-Chain Amino Acid) شامل لوسین، ایزو لوسین و والین می‌باشد که جزء اسیدهای آمینه ضروری طبقه‌بندی می‌شود. بدن قادر به سنتز این اسیدهای آمینه نبوده و باید در رژیم غذایی گنجانده شوند.^{۳-۵} شواهد نشان می‌دهد که مصرف اسیدهای آمینه شاخه دار در حین و پس از ورزش اثر آتنی کاتابولیکی دارد.^{۶-۹} این نظریه مطرح شده است که مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار می‌توانند تسريع کننده ترمیم آسیب عضلانی پس از ورزش باشد.^{۱۰-۱۲} یکی از پیامدهای تمرینات مقاومتی، آسیب و درد و کوفتگی عضلانی delayed onset muscle soreness (DOMS) است. آسیب عضلانی هنگامی اتفاق می‌افتد که ساختار سلولی عضلات شکسته می‌شوند.^{۴-۱۳} از علایم آسیب عضلانی ظهور پروتئین‌های درون عضلانی در خون و افت طولانی مدت در عملکرد عضلانی شامل کاهش در قدرت و توان تولیدی، انعطاف‌پذیری و سرعت داینامیکی عضله است.^{۱۴} در تحقیقات زیادی برای اندازه گیری آسیب عضلانی از شاخص های سرمی آسیب سلولی مثل آنزیم‌ها و ایزو آنزیم‌های کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) استفاده شده است.^{۱۵} کراتین کیناز از آنزیم‌های دستگاه فسفاتری از شمار می‌رود که برای سوخت و ساز انرژی در بیشتر سلول‌های بدن به ویژه سلول‌های عضلانی و مغز مهم

ترتیب بود که ابتدا پس از ورود آزمودنی ها به محل آزمایشگاه، هر یک به مدت پنج دقیقه بر روی صندلی نشسته سپس توسط تکنسین آزمایشگاه مقدار ۵ میلی لیتر خون از محل ورید آنتی کوپیتال آزمودنی ها با استفاده از سرنگ های ۵ میلی لیتر گرفته شد. پس از آن نمونه ها به مدت ۳۰ دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار گرفتند تا لخته شود. سپس سرم را توسط سانتی فورز ساخت شرکت Hettich آلمان جدا کرده و میزان فعالیت آنزیم های CK و CKMB و LDH به کمک دستگاه اتو آنالایزور شرکت COBAS Mira plus ساخت سوئیس مورد اندازه گیری قرار گرفتند.

روش های آماری: آزمون کلمو گروف اسمرینوف برای طبیعی بودن داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی تحلیل واریانس یک طرفة با اندازه گیری مکرر ANOVA با عامل بین گروهی و آزمون پس تعقیبی بونفرونی استفاده شد ($p < 0.05$).

یافته ها

مشخصات فیزیولوژیکی آزمودنی هابه تفکیک سه گروه در جدول یک ذکر شده است.

جدول ۱: مشخصات فیزیولوژیکی آزمودنی هابه تفکیک سه گروه

گروه شبه دارو (تعداد نفر)	گروه مکمل با مقدار (تعداد نفر)	گروه مکمل با مقدار بالا (تعداد نفر)	گروه پایین (تعداد ۱۰ نفر)	متغیرها
۲۲/۶ ± ۱/۶	۲۲/۶ ± ۱/۴	۲۲/۴ ± ۱/۹		سن (سال)
۷۴/۷ ± ۱۲/۳	۷۱/۹ ± ۹/۲	۷۳/۴ ± ۱۱/۵		وزن (کیلو گرم)
۱۷۲/۸ ± ۵/۳	۱۷۴/۴ ± ۳/۸	۱۷۳/۸ ± ۴/۸		قد (سانتی متر)
۱۷/۲ ± ۳/۷	۱۷/۵ ± ۳/۱	۱۷/۲ ± ۲/۱		درصد چربی (%)
۴۴/۳ ± ۴/۱	۴۳/۰ ± ۳/۷	۴۲/۴ ± ۴/۲		اکسیتون مصروف پیشنهادی ml/kg/min
۵۰/۸ ± ۷/۰	۵۱/۵ ± ۶/۲	۵۲/۲ ± ۵/۸		پوش سارجنت (سانتی متر)
۲۴/۵ ± ۴/۰	۲۳/۷ ± ۲/۹	۲۴/۲ ± ۳/۰		شاخص توده بدنی (کیلو گرم) بر محدود متر

نتایج مقایسه بین گروهی، در میانگین و دامنه تغییرات شاخص های سرمی آسیب سلوالی CK، LDH، CKMB، LDH و ۴۸ ساعت پس از آزمون ورزشی بین گروه های مکمل با مقدار پایین، مکمل با مقدار بالا و شبه دارو تفاوت معنی داری نشان نداد. به عبارتی مصرف مقداری متفاوت اسیدهای آمینه شاخه دار تاثیر معنی دار بر شاخص های سرمی آسیب سلوالی CK، LDH، CKMB و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین نداد. بررسی نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با عامل درون گروهی نشان داد که تاثیر زمان در دوره های زمانی مختلف (۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت) بر مقدار CK، CKMB، LDH، LDH معنی دار می باشد. بررسی با توجه به نتایج آزمون آماری، شاخص های آسیب سلوالی در سه گروه در که معنی دار نمی باشد. یافته های پژوهش نشان دهنده افزایش معنی دار درون گروهی میانگین و دامنه تغییرات شاخص های سرمی آسیب سلوالی CK-

آمادگی جسمانی به صورت داوطلبانه گزینش شدند. سپس با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش ۲۹ نفر از کشتی گیران (گروه مکمل با مقدار پایین، گروه مکمل با مقدار بالا، گروه شبه دارو تقسیم شدند) به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس برای همگن سازی گروه ها توان یو هوازی بیشینه، توان یو هوازی و یک تکرار بیشینه در حرکات مورد نظر اندازه گیری شد. سپس آزمودنی ها به صورت یک سو کور در سه گروه مکمل با مقدار پایین، گروه مکمل با مقدار بالا، گروه شبه دارو جایگزین شدند. آزمودنی ها موظف بودند که یک هفتنه قبل از آزمون عملی هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشته باشند. آزمودنی ها از هیچ گونه دارو یا مکملی استفاده نمی کردند و طبق پرسشنامه سابقه پزشکی شان سالم بودند. پس از تکمیل فرم رضایت شرکت در طرح و تست پزشکی، آزمودنی ها در طی اجرای تحقیق از مصرف هر گونه دارو و مکمل و فعالیت سنگین بدنه منع شدند. چری زیر پوست توسط دستگاه ضخامت سنج پوستی یا کاللپیر اندازه گرفته شد.

نحوه مصرف مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAA): ابتدا مکمل BCAA ۲۵ درصد لو سین، ۲۵ درصد ایزو لو سین و ۲۵ درصد والین به مقدار مورد نیاز تهیه شد. سپس توسط ترازوی دیجیتال Sartovious مدل GM312 با دقیق اندازه گیری ۱/۰ گرم و ظرفیت ۳۱۰ گرم، به مقدار ۶۸ mg/kg برای شش روز قبل از آزمون ورزشی و دو روز پس از آزمون ۴۵۰ mg/kg در روز اجرای آزمون ورزشی در بسته های پلاستیکی مخصوص قرار داده شد. شبه دارو برای تحقیق حاضر دکسترنین بود. قبل از مصرف مکمل ها، طریقه مصرف آن ها توسط محقق به آزمودنی ها توضیح داده شد سپس هر کدام از آزمودنی ها موظف بودند به مدت شش روز، روزانه در سه و عده (قبل از هر وعده غذایی) این مکمل را به مقدار ۶۸ mg/kg مصرف کنند. در روز آزمون گروه مکمل با مقدار پایین، ۲۱۰ mg/kg، گروه مکمل با مقدار بالا، ۴۵۰ mg/kg و گروه شبه دارو، ۲۱۰ mg/kg، ۳۰ دقیقه قبل و بعد از اجرای آزمون ورزشی مصرف کردند. آزمون مقاومتی سنگین: به منظور بررسی آسیب ورزشی از برنامه مقاومتی سنگین استفاده شد. در ابتدا از حرکات چند مفصلی و سپس از حرکات تک مفصلی استفاده شد. با تمرینی فعالیت مقاومتی مذکور معادل ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه انتخاب شد؛ در صورتی که آزمودنی ها توانایی انجام بیش از یک تکرار را داشتند از فرمول کوکران استفاده می شد.^{۱۵} تعداد حرکات شامل هفت حرکت با سه سرت و ده تکرار بود. فاصله استراحت بین سرت ها سه دقیقه و فاصله استراحت بین حرکات یک دقیقه در نظر گرفته شد. حرکات شامل پرس پا، پرس سینه، سیم کش، جلو ران، جلو بازو با هالت، خم کردن زانو و شکم مایل بود.

نمونه گیری خونی: نمونه های خونی دوم و سوم، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از انجام آزمون ورزشی از آزمودنی ها جمع آوری شد. روش اندازه گیری به این

اجرای دهست ده تکراری حرکت پلاتنار فلکشن (جهت تعویت عضلات دوقلو و نعلی) با شدت ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه گزارش کردند، میزان آنزیم LDH افزایش معنی داری پیدا می کند.^{۱۹}

یافته های حاصل از مقایسه گروه مکمل یک و شبه دارو هم کالری با نتایج مطالعه Greer^{۱۱} هم خوانی دارد در حالی که یافته ها تحقیق حاضر با نتایج حاصل از مطالعه Coombes^{۲۰} و همکارانش و Koba^{۲۱} و همکارانش هم خوانی ندارد. Coombes و همکارانش برای اولین بار تاثیر اضافه کردن BCAA به رژیم غذایی و مصرف ۲۰ گرم BCAA را قبل و بعد از ۱۲۰ دقیقه فعالیت روی چرخ کارسنج بر آنزیم LDH بررسی کرده و دریافتند که مصرف BCAA باعث کاهش معنی دار فعالیت سرمی آنزیم LDH در افراد سالم در مقایسه با گروه کنترل می شود.^{۲۰} دلیل مغایرت ممکن است این باشد که Coombes و همکارانش از آزمودنی های غیر ورزشکار استفاده کرده بودند. هم چنین از گروه کنترل بدون مصرف شبه دارو برای مقایسه دامنه تغییرات استفاده شده بود. از طرفی آزمودنی های دو گروه فوق از لحاظ ویژگی های آمادگی جسمانی همگن سازی نشده بودند. در مطالعه ای Koba معنی دار آنزیم LDH در مقایسه با گروه شبه دارو هم کالری شده بود.^{۱۲} شاید دلیل تناقض این باشد که اولاً آزمودنی های آنها ورزشکاران استقاماتی کار بودند ثانیاً آزمون ورزشی مورد استفاده آنها یک پروتکل استقاماتی بوده و ثالثاً مقدار مصرف مکمل در تحقیق حاضر با مطالعه Koba و همکارانش تفاوت داشت.

نتایج مربوط به میزان فعالیت آنزیم CK قبل و ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین هر گروه بیانگر آن است که اضافه کردن مکمل BCAA به رژیم غذایی و مصرف دو مقدار متفاوت BCAA قبل و بعد از فعالیت مقاومتی سنگین تاثیری بر فعالیت آنزیم CK ندارد و میزان فعالیت CK سرمی افزایش معنی داری ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین پیدا می کند. تغییر در فعالیت سرمی آنزیم CK در آزمودنی های سالم و ورزشکاران بعد از پروتکل های مختلف ورزشی گزارش شده است و همبستگی بالایی با حالت های تمرینی دارد. هم چنین از عوامل تاثیر گذار بر فعالیت آنزیم های سرمی به میزان آمادگی جسمانی، نوع تارهای عضلاتی، توده عضلاتی، نژاد و سن می توان اشاره کرد به طوری که ورزشکاران به نسبت افراد غیر ورزشکار، تارهای کند انقباض به نسبت تند انقباض، سفید پوست به نسبت سیاه پوست و آزمودنی های مسن نسبت به آزمودنی های جوان افزایش کمتری در میزان آنزیم های سرمی پس از فعالیت ورزشی نشان می دهند.^{۲۲} میزان فعالیت آنزیم های سرمی به تفاوت های جنسی نیز بستگی دارد. هورمون استروژن اثر محافظتی بر غشاء سلول های عضلاتی دارد بنابراین میزان افزایش آنزیم های سرمی در زنان نسبت به مردان کمتر می باشد.

LDH-CKMB در گروه های مکمل با مقدار پایین، مکمل با مقدار بالا و شبه دارو ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از آزمون بود (جدول ۲).

جدول ۲: میانگین و دامنه تغییرات شاخصهای اندازه گیری شده (IU/L) در سه مرحله نمونه گیری

شاخص	مقایسه	قبل از فعالیت	بعد از فعالیت	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	دامنه		نحوه گیری
						بعد از ۲۴ ساعت	بعد از ۴۸ ساعت	
				ساعتهای	ساعتهای	ساعتهای	ساعتهای	
گروه	CK	±۱۶۳/۹	±۳۲۴/۸	/۸±۱۸۳/۵	۳۴۲/۰±۲۸/۵۵	۱۷۲/۴±۲۹/۰۹	مکمل یک	CK
گروه	CK	۲۲۸/۴	۴۰۶/۰۱	۴۰۰				گروه دو
گروه	CK	±۲۲۰/۶	±۲۱۹/۴	±۲۲۰/۲	۶۳۴/۱±۲۱۴/۴	۱۶۷/۷±۲۳/۹	مکمل دو	CK
گروه	CK	۳۰۰/۶	۴۶۶/۲	۴۶۸/۳				گروه CK
شبه دارو	CK _{MB}	±۲۵۵/۴	±۳۲۲/۹	±۴۶۹/۰۴	۷۶۲/۲±۳۳۱/۲	۱۷۷±۱۳/۴	شبه دارو	CK _{MB}
شبه دارو	CK _{MB}	۴۰۴/۸	۵۸۲/۲	۵۸۱/۸				گروه مکمل یک
شبه دارو	CK _{MB}	۷/۸±۵/۹	±۸/۴	۲۷±۶/۱	۳۲/۵±۸/۵	۱۹/۲±۲/۸	گروه مکمل دو	CK _{MB}
شبه دارو	CK _{MB}	۷±۵/۲	۱۱/۸	۲۵±۳/۵	۳۰±۵/۷	۱۸/۲±۵/۱	گروه شبه دارو	CK _{MB}
شبه دارو	LDH	۱۰/۳۳±۸/۲	±۸/۹	۲۹/۴±۸/۸	۳۸/۴±۱۰/۱	۱۹/۱۱±۲/۳	گروه شبه دارو	LDH
شبه دارو	LDH	۶۱/۴±۲۲/۷	±۶۴/۳	±۳۳/۵	۳۹۴±۶۰/۰۶	۲۵۰/۳±۲۹/۶	گروه مکمل یک	LDH
شبه دارو	LDH	۱۴۳/۷	۳۱۱/۷					گروه دو
شبه دارو	LDH	۹۸/۵±۶۲/۴	±۶۷/۷	±۵۳/۸	۳۹۷/۹±۷۲/۶	۲۵۹/۶±۳۷/۹	گروه مکمل دو	LDH
شبه دارو	LDH	۱۳۸/۹	۳۵۴/۱					شبه دارو
شبه دارو	LDH	۸۰/۸±۳۱/۱	±۴۰/۲	±۵۹/۸	۴۱۸/۶±۶۱/۰۷	۲۶۳/۶±۳۶/۹	شبه دارو	LDH
شبه دارو	LDH	۱۵۵	۳۴۴/۵					شبه دارو

بحث

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این بود که مصرف LDH دو مقدار متفاوت BCAA نمی تواند تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم LDH در مقایسه با مصرف شبه دارو هم کالری داشته باشد. پس از بررسی تغییرات فعالیت آنزیم LDH و ۲۴ ساعت پس از فعالیت افزایش معنی داری در میزان LDH در هر سه گروه مشاهده شد. بررسی دامنه تغییرات و میانگین فعالیت سه گروه اختلاف معنی داری بین سه گروه ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت نشان نداد. به نظر می رسد که غلط از آن سه گروه مکمل LDH سرمی به دنبال آسیب سلول عضلاتی در فعالیت های ورزشی بالا می رود. وقتی که نفوذ پذیری غشاء سلول عضلاتی افزایش می یابد و یا پارگی کامل سلول عضلاتی اتفاق می افتد، آنزیم ها به داخل خون یا سیستم لنفاوی وارد می شوند.^{۱۱} آنزیم LDH به طور وسیع در بافت های بدن پخش شده است و غلط از آن در کبد، میو کاردیال، کلیه، عضلات اسکلتی، گلبول های قرمز و بافت های دیگر یافت می شود. میزان فعالیت سرمی LDH مثل CK و آنزیم های دیگر بعد از آسیب عضلاتی بالا می رود اما برای دوره زمانی بیشتری غلط از آن بالا می ماند.^{۱۱،۱۷،۱۸} Ferri و همکارانش (۲۰۰۶) بعد از

گروه مکمل BCAA با مقدار پایین و گروه مکمل BCAA با مقدار بالا در مقایسه با گروه شبه دارو هم کالری کمتر بود اما از لحاظ آماری مشاهده نشد.^{۱۵} بررسی دامنه تغییرات ایزو آنژیم CKMB پس از ۲۴ ساعت با استفاده از آزمون *t* مستقل نشان می داد که بین گروه مکمل BCAA با مقدار بالا و گروه شبه دارو اختلافی نزدیک به سطح معنی داری وجود دارد. شاید اگر مصرف مکمل بیشتر و یا شدت فعالیت پایین تر بود احتمالاً تفاوت دامنه تغییرات گروه مکمل BCAA با مقدار بالا و گروه شبه دارو معنی دار می شد. فعالیتهای بدنی شدید به صورت بالقوه به عملکرد قلبی آسیب می رساند و اساساً بی خطر نیستند. این خطر نسبی برای آسیب سلولهای قلبی هنگام فعالیت بدنی شدید و تا حدود یک ساعت پس از آن افزایش می یابد. اختلال قلبی ناشی از فعالیت ورزشی در نبود بیماری قلبی - عروقی، دسته ای از عالیم را نشان می دهد که خستگی قلبی نامیده شده است.^{۱۶} Smith و همکارانش سطوح سرمی CKMB را پس از مسابقه دو ماراتن لندن بررسی کردند و دریافتند که دو ماراتن باعث افزایش معنی دار CKMB در آزمودنی های تمرین کرده می شود.^{۱۷} Shave و همکارانش، شاخص های هومورال آسیب قلبی را در زنان ورزشکار هنگام یک مسابقه کوهپیمایی دو روزه بررسی کردند. افزایش CKMB پس از روز اول مسابقه مشهود بود و بلا فاصله پس از تمام مسابقه نیز افزایش بیشتری یافت.^{۱۸} Hayward و همکارانش در مطالعه ای تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی شدید را بر شاخص های قلبی در زنان غیر ورزشکار (تمرین نکرده) بررسی کردند. آزمودنی ها، تمرین های مقاومتی را با ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی مقاومتی باعث افزایش CKMB در زنان غیر ورزشکار شد.^{۱۹} نتایج تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیر فعالیت همسو با تحقیقات مذکور می باشد ولی تاکنون تأثیر مصرف مکمل BCAA بر تغییرات ایزو آنژیم CKMB سرمی بررسی نشده، اما اثرات مصرف مکمل های کربوهیدراتی و مکمل کراتین بر فعالیت ایزو آنژیم CKMB بررسی شده است. آتشک در CK-CKMB مطالعه ای با هدف بررسی بارگیری کراتین بر شاخص های LDH سرم فوتبالیست های جوان به این نتیجه رسید که بارگیری کراتین باعث افزایش معنی دار ایزو آنژیم CKMB در سطح معنی داری ۰/۰۵ می شود.^{۲۰} همچنین در مطالعه فرامرزی و همکارانش تأثیر سه جلسه فعالیت تناوبی شدید و ۹۰ دقیقه ای فوتبال همراه با مصرف مکمل کربوهیدرات را در یک هفته بر تغییرات شاخص های بیوشیمیایی ویژه سلول های قلبی CKMB و cTnI بررسی نمودند. نتایج بدست آمده نشان می داد که سه جلسه فعالیت تناوبی شدید فوتبال باعث افزایش معنی دار ایزو آنژیم CKMB می شود و مصرف مکمل کربوهیدراتی باعث کاهش معنی دار فعالیت ایزو آنژیم CKMB در مقایسه با گروه شبه دارو شده بود.^{۲۱}

تحقیقات انجام شده نشان داده که در شرایط استراحت، فعالیت CK در ورزشکاران نسبت به افراد غیر ورزشکار بالاتر است. بنابراین پس از فعالیت ورزشی افزایش کمتری در میزان CK سرمی ورزشکاران مشاهده می شود.^{۲۲} به علاوه میزان فعالیت ممکن است پس از مصرف داروهای کاهنده کلسترول، آسم، کم کاری تیروئید، استفاده از داروهای واکنشی و مصرف استروئیدهای آنابولیکی افزایش یابد.^{۲۳} Sasaki و همکارانش نشان دادند تمرینات مقاومتی باعث افزایش معنی دار CK سرمی از یک ساعت تا هفت روز پس از اجرا آزمون ورزشی می شود.^{۲۴} در تحقیق حاضر میزان افزایش و دامنه تغییرات آنژیم CK حدود ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین در گروه مکمل BCAA با مقدار پایین و گروه مکمل BCAA با مقدار بالا در مقایسه با گروه شبه دارو هم کالری کمتر بود. اما از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین گروه ها وجود نداشت. یافته های تحقیق حاضر با نتایج تحقیق Greer و همکارانش و Zebblin همچنین یافته های تحقیق حاضر با یافته های مطالعات Coombes و همکارانش و مطالعات Koba^{۲۵} و همکارانش نشان دادند که مصرف گرم مکمل CK در مقایسه با شبه دارو هم کالری باعث کاهش فعالیت سرمی و LDH و آلدولاز می شود.^{۲۶} احتمالاً دلیل تناسب در نوع آزمودنی های استفاده شده باشد. همچنین در مطالعه حاضر از یک فعالیت مقاومتی سنگین برای ایجاد آسیب سلول عضلانی استفاده شده بود. فعالیت مقاومتی با شدت کم و زیاد باعث افزایش فعالیت CK سرمی می شود.^{۲۷} دلایل مغایرت یافته های تحقیق حاضر با یافته های مطالعات قبلی ممکن است به دلیل تفاوت پاسخ هورمون های آنابولیکی به مصرف BCAA در فعالیت های مقاومتی واستقامتی باشد. به طوری که مطالعات Carli و همکارانش اظهار نمودند که مصرف BCAA قبل از فعالیت ورزشی باعث افزایش هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت ورزشی می شود.^{۲۸} در مقابل مطالعات راتامس و همکارانش نشان داد که مصرف ۵/۵ گرم مکمل BCAA و مخلوطی از اسیدهای آمینه دیگر قبل از یک فعالیت مقاومتی که شامل شش سنت حرکت اسکات با ۷۵ درصد یک تکرار بیشینه بود، بر پاسخ هورمون های تستوسترون و رشد تاثیری ندارند.^{۲۹}

نتایج مربوط به میزان فعالیت ایزو آنژیم CKMB قبل و ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین بیانگر آن است که اضافه کردن مکمل BCAA به رژیم غذایی و مصرف دو مقدار متفاوت A قبل و بعد از فعالیت مقاومتی سنگین تأثیری بر فعالیت ایزو آنژیم CKMB ندارد و میزان فعالیت ایزو آنژیم CKMB سرمی افزایش معنی داری ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین پیدا کرده بود. میزان افزایش و دامنه تغییرات ایزو آنژیم CKMB ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین در گروه

استفاده کرده‌اند که ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت در همه آن‌ها بوده است و میزان تراوش این آنزیم‌ها را ۷ روز پس از فعالیت مقاومتی و استقامتی بررسی کرده‌اند.^{۶,۱۱,۲۴} ولی دلیل اصلی خون‌گیری ۲۴ و ۴۸ ساعت به اوج تراوش این آنزیم‌ها در خون (پس از ایجاد آسیب) برمی‌گردد (البته مکانیزم‌ها و مراحل آسیب عضلانی در توجیه این خون‌گیری می‌تواند موثر باشد). در کل از نتایج تحقیق حاضر چنین استنباط می‌شود که تاثیر مصرف مکمل BCAA به ویژه با مقدار بیشتر، اثری هر چند ناچیز بر جلوگیری از افزایش فعالیت آنزیم‌های سرمی آسیب سولولی دارد اما تحقیقات زیادی لازم هست تا به طور واقعی تاثیر اندازه‌های متفاوت مصرف BCAA را بر شاخص‌های سرمی آسیب سولولی مشخص کند.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل پایان نامه آقای امیرلطافت کار با کد ۱۲۳۲/ک/۸۶ می‌باشد.

References

- Atashak S. [The effect of CK supplement on juvenile football players serumic indexes] Persian [dissertation]. Tabriz: University Tabriz; 2006.
- Ghazizadeh S. [surveying the amount of supplement consumption among the body building athletes of Kermanshah province] Persian [dissertation]. Kermanshah: Kermanshah University; 2005.
- Tom A, Nair KS. Assessment of branched-chain amino acid status and potential for biomarkers. *J Nutr* 2006; 136(Suppl 1): 324S-30S.
- Gleeson M. Interrelationship between physical activity and branched-chain amino acid. *J Nutr* 2005; 135(6 Suppl): 1591S-5S.
- Shimomura Y, Honda T, Shiraki M. Branched-chain amino acid catabolism in exercise and liver disease. *J Nutr* 2006; 136 (Suppl 1): 250S-253S.
- Coombes JS, McNaughton LR. Effects of branched-chain amino acid supplementation on serum creatine kinase and lactate dehydrogenase after prolonged exercise. *J Sports Med Phys Fitness* 2000; 40(3): 240-6.
- Blomstrand E, Hassmén P, Ekblom B and Newsholme EA. Administration of branched-chain amino acids during sustained exercise -effects on performance and on plasma concentration of some amino acids. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol* 1991; 63(2): 83-8.
- Bigard AX, Lavier P, Ullmann L, et al. Branched-chain amino acid supplementation during repeated prolonged skiing exercises at altitude. *Int J Sport Nutr* 1996; 6(3): 295-306.
- Tang FC. Influence of branched-chain amino acid supplementation on urinary protein metabolite concentrations after swimming. *J Am Coll Nutr* 2006; 25(3): 188-194.
- Cowman J. The effects of branched-chain amino acid supplementation on the exercise time to exhaustion in sedentary individuals FSU. Digital Library Center 2003; 24(2): 102-107.
- Greer BK, Woodard JL, White JP. Branched-chain amino acid supplementation and indicators of muscle damage after endurance exercise. *Int J Sport Nutr Exerc Metab* 2007; 17(6): 595-607.
- Koba T, Hamada K, Sakurai M. Branched-chain amino acids supplementation attenuates the accumulation of blood lactate dehydrogenases during distance running. *J Sports Med Phys Fitness* 2007; 47(3): 316-22.
- Gaeini AA, Rajabi H, Hamedinie R and Azad A. [Scientific and specific criteria of fitness] Persian. *Physic Educ Staff* 2003; 5(1): 55-67.
- Marginson V, Rowlands AV, Gleeson NP and Eston RG. Comparison of the symptoms of exercise-induced muscle damage after an initial and repeated bout of plyometric exercise in men and boys. *J Appl Physiol* 2005; 99(3): 1174-81.
- Brancaccio P, Maffulli N, Limongelli FM. Creatine kinase monitoring in sport medicine. *Br Med Bull* 2007; 81(82): 209-30.
- Zebblin M, Sullivan S, Baier M, et al. Branched-chain amino acid supplementation maintains muscle power following eccentric exercise. *FASEB J* 2007; 5(2): 21-32.
- Vitrako M. Biochemical analysis of training programs. 1st ed. Tehran: Samt Press; 2007: 81-89.
- Nigam PK. Biochemical markers of myocardial injury. *Indian J Clin Biochem* 2007; 22(1): 10-17.
- Ferri A, Narici M, Grassi B and Pousson M. Neuromuscular recovery after a strength training session in elderly people. *Eur J Appl Physiol* 2006; 97(3): 272-79.
- Rahmaninia F, Nikbakht H, Ebrahim K. [The effect of selected training and ibuprofen on delayed onset muscle sureness after burst eccentric contractions] Persian. *Olympic* 2000; 10(1): 33-39.
- Kashef M, Nameni F. [The effect of static stretching trainings derived from eccentric contractions on delayed onset muscle sureness] Persian. *Olympic* 2003; 10(3): 12-21.
- Brancaccio P, Limongelli M, Maffulli N. Monitoring of serum enzymes in sport. *Br J Sports Med* 2006; 40(2): 96-97.
- Sasaki H, Matsuo ME. The responses of monocyte and neutrophil levels and maximal strength after resistance

آسیب سلول عضلانی در مدل‌های حیوانی و انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است. بیشترین علایم بررسی شده آسیب سلول عضلانی، کوفتگی تا خیری عضلانی می‌باشد که باستگی زیادی به نوع و شدت فعالیت ورزشی دارد. کوفتگی تا خیری عضلانی معمولاً ۸ تا ۲۴ ساعت پس از آسیب ورزشی به وجود می‌آید و معمولاً اوج آن ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از آسیب عضلانی ناشی از ورزش می‌باشد. از طرفی تراوش کراتین کیناز پس از ۲۴ ساعت به اوج می‌رسد هم‌چنین در برخی از مطالعات عنوان شده که در فعالیت‌های مقاومتی میزان تراوش کراتین کیناز پس از ۴۸ ساعت به اوج می‌رسد. در پیاری از مطالعات فیزیولوژی ورزشی در رابطه با آسیب سلول عضلانی خون‌گیری ۴، ۸، ۲۴، ۴۸ تا ۱۲۰ ساعت پس از فعالیت انجام می‌شود و ما در این تحقیق از الگوی مطالعات Zebblin که خون‌گیری را ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از فعالیت مقاومتی انجام داده بودند،^{۱۰} استفاده کردیم از طرفی همه تحقیقاتی که ما در کار خودمان از آن‌ها الگو گرفته‌ایم از خون‌گیرهای متعدد

- exercise and training accompanying slight muscle damage. *Med Sci Sport Exercise* 2007; 39(5): 122-4.
24. Koba T, Koichiro H, Sakurai M. Effect of a branched-chain amino acids supplementation on muscle soreness during intensive training program. *Med Sci Sports Exercise* 2005; 37(5): 43.
25. Güzel NA, Hazar S, Erbas D. Effects of different resistance exercise protocols on nitric oxide, lipid peroxidation and creatine kinase activity in sedentary males. *J Sports Sci Med* 2007; 6: 417-42.
26. Carli GM, Bonifazi L, Lodi C, et al. Changes in the exercise-induced hormone response to branched chain amino acid administration. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol* 1992; 64(3): 272-77.
27. Ratamess N, Hoffman R. Effects of an amino acid/creatine energy supplement on the acute hormonal response to resistance exercise. *Int J Sport Nutr Exerc Metab* 2007; 17(6): 608-23.
28. Faramarzi M, Gaeini A, Kordi R. [The effect of periodic burst training and carbohydrate supplement on biochemical heart cells parameters changes of football players] Persian. *Olympic* 2007; 15(3): 21-27.
29. Smith J, Garbutt G, Lopes P and Pedoe D. Effects of prolonged strenuous exercise (marathon running) on biochemical and haematological markers used in the investigation of patients in the emergency department. *Br J Sports Med* 2004; 38(3): 292-94.
30. Okada M, Bannai M, Takahashi M, et al. Branched-chain amino acids and alleviation of muscle damage and fatigue in the hyper-running rat model. *Med Sci Sports Exerc Suppl* 2007; 39(5): 364.
31. Hayward R, Hutcheson KA, Schneider CM. Influence of acute resistance exercise on cardiac biomarkers in untrained women. *J Emerg Med* 2003; 25(4): 351-56.

Archive of SID

The effect of two dosage of BCAA supplementation on wrestlers' serum indexes on cellular injury

Ramin Amirsasan,¹ Saeed Nikookheslat,¹ Vahid Sari-Sarraf,¹ Batoorak Kaveh,² Amir Letafatkar³

Received: 25/Oct/2010

Accepted: 24/Nov/2010

Background: A few studies were done to examine the effect of different dosage of branched-chain amino acid (BCAA) supplementation on serum indexes of muscle injury in wrestlers. The purpose of this research was to compare the effects of two dosage of branched-chain amino acid supplementation on muscle serumic damage indexes after heavy resistance exercise in wrestlers.

Materials and Method: Twenty-nine young wrestlers were randomly selected and divided into three groups. All subjects were participated in heavy resistance exercise (3 sets, 10 repetitions, 80% 1RM). The BCAA was given at doses of 210 and 450 mg/kg for supplemental groups 1 and 2 respectively, 30 minutes before and after to exercise test and dextrin was given at dose of 210 mg/kg for control group. To identify enzymes activity (IU/L), venous blood samples were obtained 30 min prior to exercise and at 24 and 48 hrs after exercise. Data were statistically analyzed using ANOVA with repeated measures and Bonfferoni post hoc test ($p \leq 0.05$).

Results: Based on this study results, CPK, LDH, CPK_{MB} activity were significantly increased ($p < 0.05$) in all groups. CPK, LDH, CPK_{MB} indexes having the highest activity in the control group, but there were no significant differences between all groups.

Conclusion: These results provide evidence that the use of two different dosage of BCAA could not decrease muscle damage associated with heavy resistance exercise. [ZJRMS, 2012; 13(8): 22-28]

Keywords: BCAA, muscle damage, exercise

1. Assistant Professor of Sport Physiology, School of Physical Education, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2. MSc of Sport Physiology, School of Physical Education, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3. PhD Student of Sport Injury and Corrective Exercise, School of Physical Education, Tehran university, Tehran, Iran.

Please cite this article as: Amirsasan R, Nikookheslat S, Sari-Sarraf V, Kaveh B, Letafatkar A. The effect of two dosage of BCAA supplementation on wrestlers' serum indexes on cellular injury. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 13(8): 22-28.