

بررسی کشت و آنتی بیو گرام در مبتلایان به زرد زخم

دکتر محمد جواد یزدان پناه*؛ متخصص پوست، استادیار گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مژگان بیات مختاری؛ متخصص کودکان، استاد یار گروه کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر جواد قناعت باجگیران؛ PhD میکروبیولوژی، استاد گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حبیب الله اسماعیلی؛ PhD آمار زیستی، استادیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فرزاد زمانی برسری؛ پژوهش عمومی

خلاصه

هدف: زرد زخم یک بیماری شایع عفونی پوست می‌باشد و بیشتر در کودکان ایجاد می‌شود. عامل بیمار استافیلوکوک طلایی یا استرپتیکوک بتاهمولیتیک گروه A یا ترکیب این دو ارگانیسم می‌باشد. کفایت درمان بستگی به حساسیت میکروبی به آنتی‌بیوتیک‌های رایج مورد استفاده دارد. هدف این مطالعه بررسی فراوانی نوع میکروب کشت شده از ضایعات و نتایج آنتی‌بیوگرام نسبت به چهار آنتی‌بیوتیک سیستمیک سفالکسین، اریتروماسین، کلوگزاسیلین و پنی‌سیلین بود.

روش مطالعه: در این مطالعه بیماران مبتلا به زرد زخم مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان قائم (عج) مشهد که سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک خوارکی یا موضعی قبل از مراجعه نداشتند از خرداد ۱۳۸۰ به مدت یک سال مورد ارزیابی قرار گرفته و از ضایعات جلدی کشت و آنتی‌بیوگرام تهیه شد. نتایج حاصل از آنتی‌بیوگرام با استفاده از آزمون (Chi-square) مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها: تعداد ۲۵ نفر وارد مطالعه شدند که ۲۲ نفر (۸۸٪) در سن زیر ۲۰ سال قرار داشتند. ۲۱ نفر (۸۴٪) مبتلا به زرد زخم غیر تاولی بودند. در ۱۷ نفر (۶۸٪) ضایعات در ناحیه صورت قرار داشت. بدليل وجود آلوگری ثانویه در ۳ نمونه کشت، روی ۲۲ نمونه از کشت‌ها بررسی آماری از نظر کشت و آنتی‌بیوگرام انجام شد. ارگانیسم غالب (۹۵٪) استافیلوکوک طلایی بود. نتایج آنتی‌بیوگرام بر روی کشت‌های استافیلوکوک طلایی به ترتیب به سفالکسین (۸۵٪)، اریتروماسین (۶۳٪)، کلوگزاسیلین (۴۰٪) و پنی‌سیلین (۳۶٪) حساسیت کامل نشان دادند.

نتیجه‌گیری: استافیلوکوک طلایی ارگانیسم غالب در ۹۵٪ موارد بوده و سفالکسین به عنوان درمان خط اول خوارکی و در مرحله بعدی اریتروماسین قابل استفاده می‌باشد.

*مسئول مقاله، آدرس:

مشهد، خیابان احمد آباد، بیمارستان

قائم (عج)، بخش پوست

E.mail:
m-azdanpanah@mums.ac.ir

تاریخ دریافت: ۸۴/۹/۲۱

تاریخ بازنگری: ۸۵/۱/۱۵

تاریخ پذیرش: ۸۵/۲/۹

واژه‌های کلیدی: زرد زخم، آنتی‌بیوتیک، استافیلوکوک طلایی، عفونت پوست، مقاومت

مشاهده می‌شود^{۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶} و در کودکی و سنین مدرسه شایع است^{۱، ۶}.

زرد زخم تاولی بیشتر در نوزادان و شیرخواران بزرگتر ایجاد می‌شود و استافیلوکوک طلایی از ضایعات پوستی جدا می‌شود^۷. گرچه صورت اغلب مبتلا می‌شود اما ضایعات در سایر نواحی نیز ممکن است ایجاد شود^{۶، ۷}. ضایعه همچنین در ناحیه آنوزنیتال و کپل شیرخواران ظاهر می‌شود و یکی از شایعترین علل اولسر در این نواحی می‌باشد^۸. در درمان بیماری به جز موارد بسیار محدود از درمان خوارکی استفاده می‌شود. آنتی‌بیوتیک‌های توصیه شده شامل

مقدمه

زرد زخم یک بیماری شایع عفونی پوست می‌باشد. دو کوکسی گرم مثبت شامل استافیلوکوک طلایی و استرپتیکوک بتاهمولیتیک گروه A یا ترکیبی از این دو باکتری عامل ایجاد کننده زرد زخم می‌باشند^۱. این بیماری دو فرم بالینی زرد زخم غیر تاولی (۷۰٪ موارد) و زرد زخم تاولی دارد. استافیلوکوک طلایی در ۶۴ تا ۹۶ درصد موارد تنها عامل پاتogen می‌باشد^۲. زرد زخم غیر تاولی بیشتر در ناحیه صورت

(Standards) تعیین گردید نتیجه ارزیابی حساسیت به صورت حساس (S)، نیمه حساس (I) و مقاوم (R) تفسیر و ثبت گردید.

اطلاعات شامل سن بیمار، جایگزینی، نمای بالینی، تعیین پاسخ کشت از ضایعات از نظر رشد استافیلوکوک طلایی یا استرپتوکوک با تاهمولیتیک گروه A یا هر دو و نتایج آنتی بیوگرام بر روی کشت حاصل از ضایعات به چهار آنتی‌بیوتیک سفالکسین، کلوگراسیلین، اریترومایسین و پنی‌سیلین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حساسیت به چهار آنتی‌بیوتیک مذکور با استفاده از آزمون مجذور کای مقایسه شد.

نتایج

در این بررسی ۲۵ بیمار، با ضایعه زرد زخم وارد مطالعه شدند که از نظر سنی از شیرخوار ۸ ماهه تا بزرگسال ۳۲ ساله را شامل می‌شد. میانگین و انحراف معیار سن 11.4 ± 8.0 و میانه آن ۱۰ سال بود. از ۲۵ بیمار ۲۲ نفر (۸۸٪) سن زیر ۲۰ سال داشتند. ۱۴ نفر مذکر (۵۶٪) و ۱۱ نفر مومنث (۴۴٪) بودند. از نظر شکل بالینی ضایعه در ۲۱ بیمار (۸۴٪) نمای زرد زخم غیر تاولی و ۴ بیمار (۱۶٪) زرد زخم تاولی داشتند. جایگزینی ضایعات در ناحیه صورت در ۱۷ مورد (۶۸٪)، در ناحیه تنه ۵ مورد (۲۰٪) و در اندام‌ها ۳ مورد (۱۲٪) قرار داشتند.

در بررسی کشت از ضایعات از ۲۵ نمونه ارسال شده ۳ مورد جواب کشت استافیلوکوک اپیدرمیس و کلبسیلا گزارش شد که به احتمال قوی بیانگر آلودگی ثانویه زخم یا نمونه بوده و بدليل عدم مطابقت با یافته‌های مسلم بالینی و علمی از جمع بندی و نتیجه‌گیری مربوط به کشت آنتی‌بیوگرام حذف گردیدند. از ۲۲ مورد باقی مانده ۲۱ مورد (۹۵٪) استافیلوکوک طلایی کشت شده و تنها یک مورد یعنی ۴٪ رشد استرپتوکوک با تاهمولیتیک گروه A بطور بارز همراه استافیلوکوک طلایی گزارش شد. نتیجه آنتی‌بیوگرام انجام شده برروی استافیلوکوک طلایی جدا شده از ضایعات زرد زخم در ۲۲ بیمار در جدول ۱ ذکر شده است.

نتایج حاصل از موارد حساس در پاسخ آنتی‌بیوگرام بر روی استافیلوکوک طلایی در نمونه‌ها دو به دو با هم مقایسه گردید. استافیلوکوک طلایی حساسیت بیشتری نسبت به سفالکسین در مقایسه با کلوگراسیلین داشت و این اختلاف از سفالکسین در مقایسه با پنی‌سیلین نشان داد ($p=0.002$). همچنین نظر آماری معنی دار بود ($p=0.001$). مقایسه با پنی‌سیلین نیز نسبت به پنی‌سیلین بیشتر - بود ($p=0.001$). حساسیت کلوگراسیلین و پنی

پنی‌سیلین مقاوم به پنی‌سیلیناز، سفالوسپورین نسل اول یا اریترومایسین می‌باشد.^{۳، ۹، ۱۰} جهت جلوگیری از گسترش عفونت در بین افراد در معرض و عوارض احتمالی ناشی از بیماری و ضرورت درمان و از طرف دیگر توجه به این نکته که پاسخ حساسیت میکرو بیولوژیک تحت تأثیر عواملی مثل بروز مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد مصرف که در جوامع مختلف بنا به در دسترس بودن و رایج بودن تجویز دارو توسط پزشکان و هزینه دارو، این حساسیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‌تواند تفاوت داشته باشد، بنابراین تصمیم به بررسی نتایج کشت و آنتی‌بیوگرام از ضایعات زرد زخم بیماران گرفته شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه توصیفی از خرداد سال ۱۳۸۰ در مرکز پزشکی بیمارستان قائم مشهد به مدت یک سال بر روی بیماران مبتلا به زرد زخم انجام شد بیمارانی که سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک خوراکی یا موضعی یا استفاده از محلول آنتی‌سپتیک طی بیماری قبل از مراجعه داشتند از مطالعه حذف شدند. تشخیص بیماری براساس شرح حال و علائم بالینی بود که از ضایعات کشت باکتریولوژیک انجام شد. به این ترتیب که با استفاده از سوپ استریل از سطح ضایعات بیماران نمونه برداری گردید و نمونه‌ها بر روی محیط کشت‌های مناسب از جمله آگار خوندار، مکانکی تلقیح شد. نمونه‌ها پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۶ درجه سانتیگراد در داخل جار دی اکسید کربن از نظر رشد کلنی‌های استافیلوکوک و استرپتوکوک مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور در آزمایشگاه پلیت‌های کشت شده از نظر رشد کلنی‌های با ظاهر مشابه استافیلوکوک و استرپتوکوک با روش استاندارد ارزیابی شد. در این راستا جهت تایید حضور استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس ابتدا از کلنی‌های ظاهر شده بر روی محیط کشت اسمر نهیه و پس از رنگ‌آمیزی گرم مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت و سپس براساس خصوصیات میکروسکوپی باکتری، ظاهر کلنی و تست‌های بیوشیمیایی تایید کننده از قبیل کاتالاز، کواگولاز، رشد در حضور نمک و تخمیر مانیتول و حساسیت به نووبیوسین و باسیتراسین حضور باکتری‌های مورد نظر تایید گردید. باکتری‌های شناسایی و تایید شده از نظر حساسیت و مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج با روش Agar Diffusion (روش کربی بائز) مورد ارزیابی قرار گرفتند. حدود غلطه‌های مورد استناد برای تعریف حساسیت یا مقاومت باکتری نسبت به آنتی‌بیوتیک براساس توصیه سال ۱۹۹۸ NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory)

جدول ۱- توزیع فراوانی نتایج آنتی بیوگرام روی استافیلولوکوک طلایی جداسده از ضایعات زرد زخم بیماران مورد مطالعه

مقاوم	مقاومت حد وسط	حساس	آنتی بیوگرام	
				آنتی بیوتیک
فراوانی (درصد)	فراوانی (درصد)	فراوانی (درصد)	سفالکسین	
	(٪.۱۳/۶) ۳	۰		
	(٪.۲۲/۷) ۵	(٪.۱۳/۶) ۳		اریترومایسین
	(٪.۴۰/۹) ۹	(٪.۱۸/۱) ۴		کلوگزاسیلین
(٪.۸۱/۸) ۱۸	(٪.۴/۵) ۱	(٪.۱۳/۶) ۳	پنی سیلین	

مثبت همراه با استرپتوکوک رشد کرد[۵]. اعتقاد بر این است که حتی در نمونه هایی که به طور اولیه توسط استرپتوکوک شکل می گیرند با گذشت زمان و با اضافه شدن بعضی سوش های خاص استافیلولوکوک طلایی از پوست یا نقاط حامل، این باکتری به عنوان مهاجم ثانویه رشد نموده و به خاطر تولید باکتریوسین ناشی از استافیلولوکوک طلایی گروه فاز ۷۱ باعث مرگ استرپتوکوک می گردد. بنابراین برتری کشت استافیلولوکوک واضح تر می شود[۷].

مقاومت به پنی سیلین و آمپی سیلین در اکثریت عفونت های استافیلولوکوک طلایی نشان داده شده است. [۱۳،۱۲]. در مطالعه دکتر منصوری نتایج حاصل از آنتی بیوگرام روی استافیلولوکوک های کواگولاز مثبت جدا شده از ضایعات، مقاومت دارویی نسبت به پنی سیلین (٪.۲۵)، اریترومایسین (٪.۱۰/۷) و کلوگزاسیلین (٪.۱۰) مشاهده شد و در هیچکدام از موارد مقاومت نسبت به سفالکسین مشاهده نشد[۵]. در مطالعه ما نیز مقاومت دارویی استافیلولوکوک های کواگولاز مثبت جدا شده از ضایعات نسبت به پنی سیلین (٪.۸۱/۸)، اریترومایسین (٪.۲۲/۷)، کلوگزاسیلین (٪.۴۰/۹) و سفالکسین (٪.۱۳/۶) مشاهده شد که مقایسه این نتایج با مطالعه قبل [۵] هر چند از نظر زمانی و مکانی متفاوت است اما هشدار دهنده می باشد. از آنجایی که استافیلولوکوک طلایی مقاوم به پنی سیلین شایعترین علت زرد زخم است، آنتی بیوتیک های مقاوم به بتالاکتاماز مانند کلوگزاسیلین، سفالکسین، سفرادین یا آموکسی سیلین همراه با کلاژلونات پتاسیم جهت مصرف توصیه شده است[۱]. با این وجود در یک بررسی در آلمان توسط Korting و همکاران حساسیت استافیلولوکوک های طلایی جدا شده از سطح پوست نرمال و پوست ضایعه دار مطالعه شد که در ٪.۵ موارد مقاوم به متی سیلین بودند و بیش از ٪.۲۵ استافیلولوکوک های طلایی نیز به تتراسیکلین و اریترومایسین مقاومت نشان دادند. در این مطالعه با بررسی نتایج و مقایسه آن با بررسی های مشابه قبلی، افزایش واضح سوش های

سیلین نیز مورد آزمون قرار گرفت که کلوگزاسیلین حساسیت بیشتری نسبت به پنی سیلین داشت ($X^2=4/1$, $p=0/04$).

بحث

در گذشته زرد زخم غیر تاولی یک بیماری ناشی از استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A محسوب می شد اما امروزه استافیلولوکوک طلایی از بسیاری از ضایعات کشت می شود[۳]. ضایعات بیشتر در ناحیه صورت مشاهده می شود و در این مطالعه نیز (٪.۶۸) ضایعات در ناحیه مذکور قرار داشت که مشابه سایر گزارشات می باشد[۴،۵،۶]. در ضمن زرد زخم غیر تاولی شایعترین فرم بیماری بود و ٪.۸۸ از بیماران ما سن زیر ۲۰ سال داشتند و این یافته ها مشابه با نتایج بدست امده در مطالعه دیگری است که ٪.۹۴ از کل بیماران آن مطالعه نیز در محدوده سنی مذکور بودند[۵]. از نظر ابتلا دو جنس نیز اختلاف قابل توجهی مشهود نبود که مشابه سایر مطالعات بود [۱۱]. در یک مطالعه روی ۶۰ بیمار، ۵۹ بیمار کشت استافیلولوکوک طلایی مثبت بود که در شش بیمار استافیلولوکوک طلایی همراه با استرپتوکوک وجود داشت و در یک بیمار استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A به تنهایی کشت شد[۱۲]. در یک مطالعه دیگر کشت خالص استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A در دو بیمار از ۷۱ بیمار مبتلا به زرد زخم بدست آمد [۱۳]. به طوری که در سایر منابع و مطالعات استافیلولوکوک طلایی شایعترین باکتری مسئول شناخته شده است[۳،۴،۵] که نتایج فوق با نتایج حاصل از مطالعه ما مشابه داشت. در مطالعه حاضر در ٪.۹۵/۵ موارد استافیلولوکوک طلایی و فقط یک مورد استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A همراه استافیلولوکوک طلایی گزارش شد. جالب این است که در نمونه های ما هیچکدام استرپتوکوک بتنهایی کشت نشد. در یک بررسی انجام شده روی کشت از ضایعات زرد زخم نیز هیچ مورد استرپتوکوک به تنهایی ارگانیسم عامل نبود و در ٪.۱۳/۱ استافیلولوکوک کواگولاز

محدودیت ها

محدودیت مطالعه سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک خوراکی یا موضعی یا استفاده از محلول آنتی‌سپتیک توسط تعدادی از مبتلایان به زرد زخم قبل از مراجعت بود که این بیماران از مطالعه خارج شدند.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج حاصل از بررسی ما نیز استافیلوکوک طلایی جداسده در محیط کشت به ترتیب به سفالکسین و اریترومایسین حساس بودند که هر چند بین حساسیت ارگانیسم به دو آنتی‌بیوتیک اختلاف معنی دار نشان نداد اما سفالکسین با توجه به تداخلات دارویی کمتر در مقایسه با اریترومایسین، به عنوان داروی انتخاب اول توصیه می‌شود. جایگاه دوم درمانی برای زرد زخم متعلق به اریترومایسین می‌باشد و بعد از آن کلوگراسیلین قرار می‌گیرد.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان از زحمات و همکاری پرسنل محترم آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج) تشکر می‌نمایند.

استافیلوکوک طلایی مقاوم به متی‌سیلین نشان داده شد و Korting و همکاران برای پیشگیری از افزایش بیشتر سوش‌های مقاوم یک استراتژی تعریف شده برای مصرف آنتی‌بیوتیک در درماتولوژی را مورد نیاز دانستند [۱۴]. در مطالعه Bass و همکاران و همچنین مطالعه منصوری سفالکسین داروی انتخابی برای درمان خوراکی ضد میکروبی در کودکان با زرد زخم پیشنهاد شده است [۱۵]. اریترومایسین اغلب موثر است، اما در نواحی که مقاومت شناخته شده وجود دارد نباید مورد استفاده قرار گیرد [۹]. در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها به تداخلات دارویی نیز باید توجه نمود. بهطور مثال ماکرولیدها با آنتی‌هیستامین‌های غیر سداتیو مثل ترفنادین، آستمیزول و یا کاربامپین تداخل اثر داشته و می‌تواند منجر به آریتمی قلبی گردد. همچنین اریترومایسین سطح سرمی تکوفیلین را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده که ممکن است سبب ایجاد آریتمی قلبی یا تشنج شود [۱۱].

Survey of culture and antibiogram in patients with impetigo

MJ Yazdanpanah*; **MD**, Assistant Professor of Dermatology, Mashhad University of Medical Sciences

M Bayat Mokhtari; **MD**, Assistant Professor of Pediatrics, Mashhad Islamic Azad University

J Ghanaat Bajgiran; **PhD**, Professor of Microbiology, Mashhad University of Medical Sciences

H Esmaeili; **PhD**, Assistant Professor of Community Medicine and Public Health, Mashhad University of Medical Sciences

F Zamani Barsari; **MD**, General practitioner

Abstract

Background: Impetigo is a common infectious skin disease and most commonly occurs in children. Etiologic agents are *Staphylococcus aureus* or Beta-hemolytic Streptococcus group A or combination of these organisms. Adequacy of treatment is related on sensitivity of bacteria to common prescribed antibiotics.

Methods: Study of the frequency of bacterial culture results from lesions and antibiograms for four systemic antibiotics cephalexin, erythromycin, cloxacillin and penicillin were assayed. Impetigo cases admitted to the dermatology clinic of Ghaem hospital in Mashhad for one year beginning from June 2001, were studied. These patients had no history of systemic or topical antimicrobial agents application. Results of antibiograms obtained from culture of skin lesions were analyzed with Chi-Square test.

Findings: Twenty two (88%) patients were younger than 20 years. Twenty one cases (84%) had non bullous impetigo. In 17 (68%) cases lesions were localized on the face. Because of secondary contamination in 3 cases, statistical analysis was performed on 22 cases. The most common bacteria (95.5%) was *Staphylococcus aureus*. Antibiograms of *S.aureus* showed complete sensitivity to cephalexin in 85.3%, erythromycin in 63.6%, cloxacillin in 40.9%, and penicillin in 13.6% of cases.

Conclusions: *Staphylococcus aureus* was the most common organism in 95.5% of cases and cephalexin was the first choice oral antibiotic followed by erythromycin.

Key Words: Impetigo, Antibiotic, *Staphylococcus aureus*, Resistancy, Skin infection

REFERENCES

1. Brown J, Shriner DL, Schwartz RA, et al, Impetigo: an up date. Int J Dermatol. 2003; 42, 251-5.
2. Oumeish I, Oumeish OY, Bataineh O. Acute bacterial infections in children. Clin Dermatol. 2000; 18: 667-78.
3. Odom RB, James WD, Berger TG. Bacterial infections. In: Odom RB, James WD, Berger TG; Andrews' Diseases of the Skin. 9th ed. Philadelphia, Saunders. 2000 Pp:307-57.
4. Arndt KA, Bowers KE. Bacterial skin infections. In: Arndt KA, Bowers KE. Manual of Dermatologic Therapeutics. 6th ed. USA, Lippincott Williams & Wilkins. 2002 Pp:32-8.

۵. منصوری پ، بررسی تحقیقی زردخم از نظر شیوع عالم بالینی (ارگانیسم مسئول و روش های درمانی جدید). مجله دانشکده پزشکی تهران. ۱۳۷۲؛ ۱۵(۳): ۶۶-۷۳.

6. Hay RJ, Adriaans BM. Bacterial infections. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, et al. Rook's Textbook of Dermatology. Oxford; Blackwell science. 2004 Pp:27.1- 27.85.
7. Lee PK, Weinberg AN, Swarts MN. Pyoderma: staphylococcus aureus, streptococcus, and other Gram positive Bacteria. In: Freedberg IM. Eisen AZ. Wolff K, et al. Dermatology in General Medicine. 5th ed. New York, Mc graw- Hill. 1999 Pp:2182-207.
8. Halbert AR, Chan JJ. Anogenital and buttock ulceration in infancy. Clin Exp Pharmacol physiol. 2002; 43(1): 1-6.
9. Burrows NP. Disorder of the skin. In: McIntosh N, Helms P. Smyth R. Forfar & Arneil's Textbook of Pediatrics. Vol 2. 6th ed. New York, Churchill Livingston. 2003 Pp: 1595-630.
10. Habif TP, Campbell JL, Quidam MJ, et al. Bacterial infection. In: Skin Disease Diagnosis and Treatment. USA, Mosby. 2001 Pp:112-29.
11. Koning S, Mohammedamin RSA. Vander Wouden JC, et al. Impetigo: incidence and treatment in Dutch general practice in 1987 and 2001, results from two national surveys. Bri J Dermatol. 2006; 154(2), 239-43.
12. Coskey RJ, Coskey LA. Diagnosis and treatment of impetigo. J Am Acad Dermatol. 1987; 17: 62-3.
13. Barton LL, Friedman AD. Impetigo a reassessment of etiology and therapy. Pediatr Dermatol. 1987; 4: 185-8.
14. Korting HC, Neubert U, Abeck D. Current antimicrobial susceptibility of Cutaneous bacteria to first line antibiotics. Intern J Antimicrobial Agents. 1998; 10(2): 165-8.
15. Bass JW, Chan DS, Creamer KM, et al. Comparison of oral cephalexin, topical mupirocin and topical bacitracin for treatment of impetigo. Pediatr Infect Dis J. 1997; 16: 708-10.