

تأثیر افزودن نیتروگلیسیرین داخل وریدی به لیدوکاین در بهبود کیفیت بیحسی منطقه‌ای داخل وریدی

دکتر رحمان عباسی وش^۱، دکتر میر موسی آقداشی^۲، دکتر ابراهیم حسنه^۳، دکتر فرهاد حشمی^۴، دکتر محمد شیروانی^۵، دکتر عزت الله رحیمی^۶

۱- استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) (مؤلف مسئول)
تلفن: ۰۴۴۱-۳۴۵۷۲۸۸، abbasivash@umsu.ac.ir

۲- استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۳- دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۴- دستیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۵- دستیار بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

زمینه و هدف: از عوارض بیحسی منطقه‌ای داخل وریدی، شروع آهسته بیحسی، شلی ضعیف عضلات، درد تورنیکه و شروع درد پس از خالی کردن کاف تورنیکه می‌باشد. ما در این کار آزمایی بالینی دو سو کور اثر نیتروگلیسیرین داخل وریدی را در بهبود بیحسی منطقه‌ای داخل وریدی مورد بررسی قراردادیم.

روش بررسی: در این مطالعه ۴۶ بیمار ۲۰-۵۰ ساله به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. تحت شرایط یکسان، در گروه شاهد برای انجام بیحس منطقه‌ای داخل وریدی ۳mg/kg لیدوکاین ۵٪ و در گروه مداخله علاوه بر آن ۲۰۰µm نیتروگلیسیرین مورد استفاده قرار گرفت. علائم حیاتی و درد تورنیکه بیماران بر اساس نمره دهی VAS پیش از بستن تورنیکه و در زمانهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ دقیقه بعد از تزریق، اندازه‌گیری و ثبت شد. زمان شروع بلوك حسی و بلوك حرکتی نیز در تمام بیماران ثبت شد. شدت درد بیماران در طی ۰/۵، ۰، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از باز شدن تورنیکه و مقدار کل پتیدین مصرفی در ۲۴ ساعت اندازه‌گیری و ثبت شد.

یافته‌ها: شروع بلوك حسی و حرکتی در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد سریعتر (به ترتیب ۲/۶۱ در مقابل ۵/۰۹ و ۴/۲۲ در مقابل ۷/۰۴ دقیقه) ($p<0.05$) و برگشت بلوك حسی، بلوك حرکتی و زمان شروع درد تورنیکه طولانی‌تر (به ترتیب، ۷/۲۶ در مقابل ۳/۴۳، ۹/۷۰ در مقابل ۳/۷۴ و ۲۵ در مقابل ۱۶/۶۵ دقیقه) ($p<0.05$) بود. زمان بی دردی بعد از باز کردن تورنیکه طولانی‌تر و شدت درد تورنیکه کمتر بود ($p<0.05$). همچنین، میانگین دوز مصرفی فنتانیل داخل وریدی در حین عمل، میانگین پتیدین مصرفی داخل عضلانی در طول روز اول بعد از عمل و میانگین شدت درد تا ساعات ۴، ۹، ۱۲ و ۲۴ در گروه مداخله کمتر از شاهد بود ($p<0.05$). هیچ عارضه خاصی در بیماران دو گروه ثبت نشد.

نتیجه‌گیری: افزودن نیتروگلیسیرین به لیدوکاین در بیحسی منطقه‌ای داخل وریدی بدون هیچ عارضه‌ای شروع بلوك حسی و حرکتی را تسريع کرده و باعث کاهش درد تورنیکه و درد بعد از عمل می‌شود.

کلید واژه‌ها: بیحسی منطقه‌ای داخل وریدی، نیتروگلیسیرین، لیدوکاین
وصول مقاله: ۸۷/۱/۱۷ اصلاح نهایی: ۸۷/۴/۳ پذیرش مقاله: ۸۷/۴/۲۳

