

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش تمرینات تنفسی و ورزش هوایی اندام‌های تحتانی بر نسبت FEV1/FVC و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به برونشیت مزمن مراجعه‌کننده به مرکز درمانی توحید و بعثت شهرستان سنندج

دکتر منوچهر بشیریان^۱، فخر ذره بینان^۲، سیروس شهسواری^۳، دکتر فریبا صابونی^۴

۱- پژوهشکار عمومی، عضو هیأت علمی داشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران (مؤلف مسئول)، تلفن تماس: ۰۸۷۱-۳۲۳۳۰۵۲ dr_bashirian@yahoo.com

۲- کارشناس ارشد پرستاری، داشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

۳- مریم گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

۴- پژوهشکار عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برونشیت مزمن از نظر بالینی وجود سرفه توأم با خلط در اکثر روزها برای حداقل سه ماه در دو سال متوالی است. این بیماری به همراه آمفیزیم تشکیل دهنده بیماریهای مزمن انسدادی ریه بوده که چهارمین علت مرگ و میر در خانم‌ها و پنجمین در آقایان است. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر دو روش بازتوانی ریوی شامل تمرینات تنفسی و ورزش هوایی اندام‌های تحتانی بر نسبت حجم بازدمی فعال در ثانیه نخست به طرفیت حیاتی (FEV1/FVC) و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به برونشیت مزمن انجام گرفت.

روش بررسی: این مطالعه تجربی و از نوع تصادفی شاهد دار است. تعداد نمونه‌ها در پایان پژوهش شامل ۷۱ بیمار مبتلا به برونشیت مزمن متوسط تا شدید بود که ۲۴ نفر از آنها از تمرینات تنفسی و ۲۴ نفر دیگر از ورزش هوایی اندام‌های تحتانی در امر بازتوانی ریوی استفاده نموده و ۲۳ نفر دیگر گروه شاهد را تشکیل داده بودند. طول مدت مطالعه هشت هفته در نظر گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t زوج، آنالیز واریانس و post hoc LSD استفاده گردید.

یافته‌ها: بیمارانی که از تمرینات تنفسی بهره برده‌اند، بعد از مداخله مقایسه بین میانگین نسبت FEV1/FVC آنها با گروه شاهد و نیز نمره کیفیت زندگی معنی‌دار نمی‌باشد ($P > 0.05$). در خصوص بیمارانی که از ورزش هوایی اندام‌های تحتانی بهره برده بودند، بعد از مداخله مقایسه میانگین نسبت FEV1/FVC آنها با گروه شاهد ($P < 0.05$) و نیز نمره کیفیت زندگی معنی‌دار نمی‌باشد ($P < 0.01$). در گروه شاهد اختلاف میانگین نسبت FEV1/FVC و نمره کیفیت زندگی، قبل و بعد از مطالعه معنی‌دار نمی‌باشد ($P > 0.05$).

نتیجه‌گیری: در امر بازتوانی ریوی مبتلایان به برونشیت مزمن، انجام ورزش هوایی اندام‌های تحتانی در مقایسه با تمرینات تنفسی میزان FEV1/FVC و کیفیت زندگی بیماران را بیشتر بهبود می‌بخشد.

کلید واژه‌ها: تمرینات تنفسی، ورزش هوایی اندام‌های تحتانی، FEV1/FVC، کیفیت زندگی، برونشیت مزمن

وصول مقاله: ۸۷/۸/۹ اصلاح نهایی: ۸۸/۲/۱۰ پذیرش مقاله: ۸۸/۳/۱۰

مقدمه

آن تأثیرگذار است (۹). عوارض بیماریهای مزمن انسدادی ریه شامل نارسایی تنفسی، پنومونی یا دیگر عفونتهای تنفسی، نارسائی قلب راست (قلب ریوی) اختلالات ریتم قلب و افسردگی است (۱۰). از جمله اقداماتی که جهت تسکین نشانه‌ها و بهبود وضعیت عملکردی مبتلایان به این بیماری‌ها در نظر گرفته شده، توانبخشی ریوی بوده و تمرینات تنفسی و برنامه‌های ورزشی که از اجزا آن می‌باشند جهت بهبود وضعیت عملکردی استفاده می‌شوند (۱۱). از جمله تمرینات تنفسی، تنفس بالبای غنچه و تنفس دیافراگمی است (۱۲و۱۳). همچنین در برنامه بازتوانی ریوی تمرینات ورزشی اندام‌های تحتانی بعنوان جزء اساسی در نظر گرفته می‌شود (۱۴). در انجام ورزش هوایی از ماشینهای ورزشی از قبیل دوچرخه ثابت و تردمیل می‌توان بهره برداشت. کالج طب ورزشی آمریکا (American College of Sports Medicine) توصیه می‌نماید که فعالیت هوایی باید به میزان سه تا پنج بار در هفته و به مدت ۲۰ دقیقه باشد (۱۵). از سویی دیگر اندازه‌گیری قلب انجام گردد (۱۶). درین این این اندام‌گیری شاخص کیفیت زندگی ابزاری کلیدی برای تصمیم‌گیریهای بالینی بشمار می‌رود و پزشکان بدون توجه به آن قادر نخواهند بود که در مدت زمان کوتاه به درمان بیماران بپردازند (۱۷). بررسی سطح سلامت بوسیله شاخص کیفیت زندگی، با مراحل مختلف بیماری COPD در ارتباط است (۱۸). بازتوانی ریوی افزایش دهنده شاخص کیفیت زندگی است. تعدادی از مطالعات انجام شده بیانگر این مطلبند که احتمال دارد ارتباطی مابین ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش مرگ و میر وجود داشته باشد (۱۹). این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر دو روش بازتوانی ریوی شامل تمرینات تنفسی و ورزش

بیماری‌های مزمن انسدادی ریه (Chronic obstructive pulmonary disease) نام گروهی از اختلالات تنفسی مزمن و تدریجی پیشرونده است که با کاهش حداکثر جریان بازدمی فعال مشخص می‌شوند. این گروه از بیماریها در برگیرنده آمفیزم (Emphysema) و برونشیت مزمن (bronchitis) است و گرچه از نظر پاتوفیزیولوژی مجزا می‌باشند ولی در غالب موارد همراه با هم وجود دارند. برونشیت مزمن از نظر بالینی عبارت است از وجود سرفه توأم با خلط در اکثر روزها برای حداقل سه ماه در دو سال متوالی که علت دیگری نداشته باشد (۱). تخمین زده می‌شود که از ۱۵/۷ میلیون مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه، ۱۴/۵ میلیون نفر به بیماری برونشیت مزمن دچار هستند (۲). شیوع COPD در مردان بیشتر از زنان است (۳). بیماریهای مزمن انسدادی ریه تنها علت شایع مرگ در ایالات متحده بوده که شیوع آن در ۲۰ سال گذشته افزایش داشته و در سرتاسر دنیا نیز مسبب بزرگ و رو به رشد مرگ می‌باشد (۴). طبق آمار ابتلا به این بیماریها بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳ میلادی روند رو به رشد ۵۷ درصدی را در آمریکا نشان داده است (۵). در مطالعه صورت گرفته در ۱۶ کشور اروپایی، میزان شیوع برونشیت مزمن در بین اشخاص با سن ۲۰ الی ۴۴ سال، ۲/۶ درصد (۷-۹/۷ درصد) اندازه‌گیری شده است (۶). در کانادا نیز حدوداً ۹ درصد از افراد بالغ مدعی این هستند که از علائم برونشیت مزمن رنج می‌برند (۷). بدلیل ماهیت موذیانه و پیشرونده این بیماریها، امکان دارد قبل از بروز علائم در بیمار به راحتی ۵۰ درصد از عملکرد ریوی از دست رفته باشد (۸). تشید ناگهانی علائم بیماریها بر روی کیفیت زندگی و هزینه معالجه

که دارای شرایط لازم جهت شرکت در پژوهش بودند به تدریج انتخاب و سپس بطور تصادفی ساده و با استفاده از قرعه‌کشی در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند.

معیارهای حذف واحد پژوهش از جامعه پژوهش شامل:

- ۱- معلولیت شدید بدنی -۲- اختلالات عروق محيطی -۳- ابتلا به بیماریهای قلبی نظیر انفارکتوس حاد میوکارد، آنژین ناپایدار، پریکارڈیت، میوکارڈیت، تنگی شدید آئورت، اختلال فعالیت شدید بطن چپ ۴- مرحله حاد بیماری (تشدید بیماری) -۵- چاقی مرضی یا وحیم ۶- اختلالات روانپزشکی سبب ساز اشکال در ارتباط ۷- عدم تکمیل چک لیست تمرینات تنفسی -۸- عدم مراجعة جهت انجام ورزش‌های هوازی اندام‌های تحتانی و تکمیل فرم مربوطه و -۹- ابتلا به فشار خون شدید بود. در این تحقیق محیط انجام پژوهش، درمانگاه تخصصی بیمارستان بعثت شهرستان سنتدج بود. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم ثبت مشخصات فردی و موارد پاراکلینیکی، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی St.George، چک لیست انجام تمرینات تنفسی، چک لیست ورزش هوازی Detecto - Medic - Medic، دستگاه دستگاه مانیتورینگ قلب Dynascope، دستگاه Spirodoc(ver.3) و دستگاه تردمیل High Spirometry life بود. پس از اتمام نمونه‌گیری گروه اول گروه شاهد این تحقیق در نظر گرفته شد و گروه‌های دوم و سوم که گروه‌های مداخله بودند به ترتیب تحت تمرینات تنفسی و ورزش هوازی اندام‌های تحتانی قرار گرفتند. پس از ثبت مشخصات دموگرافیک و ارزیابی اولیه، برای بیماران نوبت آزمون گذاشته شد و از آنان آزمون اسپریومتری بعمل آمد و سپس پرسشنامه کیفیت زندگی St.George تکمیل گردید. تا اینجا کلیه مراحل انجام آزمون اسپریومتری و آزمون کیفیت زندگی برای کلیه

هوازی اندام‌های تحتانی بر نسبت FEV1/FVC و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به برونشیت مزمن انجام گرفت.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع تصادفی شاهد دار است. در این پژوهش تأثیر متغیرهای مستقل تمرینات تنفسی و ورزش هوازی اندام‌های تحتانی بر متغیرهای وابسته تهویه ریوی و کیفیت زندگی دو گروه مداخله مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج بدست آمده از دو گروه باهم و با گروه شاهد بصورت قبل و بعد از مداخله مقایسه شد. جامعه پژوهشی نیز کلیه بیماران مبتلا به برونشیت مزمن شهر سنتدج مراجعه کننده به مراکز درمانی انتخابی در رده سنی ۳۰ تا ۶۹ سال با شدت بیماری متوسط $FEV1 / FVC < 0.70\%$ شدت بیماری $FEV1 < 50\%$ مقدار پیش‌بینی شده) و یا شدید $FEV1 < 0.70\%$ و $FEV1 / FVC < 0.50\%$ مقدار $FEV1 / FVC < 0.70\%$ پیش‌بینی شده) و خیلی شدید $FEV1 / FVC < 0.50\%$ مقدار پیش‌بینی شده) بودند. تعداد نمونه‌ها ۲۴ نفر برای هر گروه تعیین شد که با منظور کردن ۲۰ درصد افت یا ریزش، نمونه نهایی برای هر گروه ۳۰ نفر برآورد گردید. طی انجام پژوهش ۱۹ نفر از واحدهای مورد مطالعه به دلیل عدم انجام تمرینات تنفسی و ورزش هوازی اندام‌های تحتانی و نیز مراجعة مجدد از مطالعه حذف شدند و تعداد نمونه‌ها به ۷۱ نفر تقلیل پیدا کرد (گروه مداخله تحت تمرینات تنفسی ۲۴ نفر، گروه مداخله تحت ورزش هوازی ۲۴ نفر و گروه شاهد ۲۳ نفر). روش نمونه‌گیری تسهیل شده بوده، به این ترتیب که واحدهای پژوهش از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی توحید و بعث شهر سنتدج

توسط پرستار تاریخ زده شده و امضاء می‌گردید و مسافت طی شده و زمان نیز در کلیشه تأیید پرستار جهت مطالعه پیشافت بیمار ثبت می‌گردید. اما گروه اول یا شاهد، فقط به آنان توصیه گردید که رژیم دارویی خود را ادامه دهند و به محض تغییر یا قطع آن مراتب به پژوهشگر اطلاع داده شود و اقدام دیگری برای آنان صورت نگرفت. پس از گذشت دو ماه از آغاز مداخله هر سه گروه بیماران مجددًا دعوت گردیدند و از آنان آزمون اسپیرومتری و کیفیت زندگی مطابق با پروتکل شرح داده شده در ابتداء، بعمل آمد و شاخص‌های اسپیرومتری و نمره کیفیت زندگی جهت مقایسه ثبت گردید. پس از اتمام مراحل اجراء و تکمیل پرسشنامه و چک لیست‌ها، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS (ver 12) استفاده گردید. بمنظور بررسی تفاوت میانگین نمرات متغیرهای وابسته، قبل و بعد از مداخله از آزمون t زوج و جهت مقایسه میانگین بین گروه‌ها (دو گروه مداخله و گروه شاهد) از آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و Post hoc LSD استفاده و تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت.

یافته‌ها

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش تعداد نمونه‌ها در پایان مطالعه شامل ۷۱ بیمار مبتلا به بیماری برونشیت مزمن بین سنین ۳۰ تا ۶۹ سال با میانگین و انحراف معیار سنی $54/50 \pm 9/35$ سال بود که ۲۴ نفر در گروه مداخله تحت تمرینات تنفسی و ۲۴ نفر دیگر در گروه مداخله تحت ورزش هوایی اندام‌های تحتانی و ۲۳ نفر دیگر در گروه شاهد قرار داشتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، بیمارانی که از تمرینات تنفسی بهره برده‌اند میانگین و انحراف معیار FEV1/FVC آنها

نمونه‌های پژوهشی هر سه گروه یکسان بود و اما برای افراد گروه دوم که جهت انجام تمرینات تنفسی لب غنچه‌ای و دیافراگمی آموزش می‌دیدند دو جلسه آموزش در نظر گرفته شد و پس از فراغیری چک لیست تمرینات تنفسی داده شد و از آنان خواسته شد که هر روز باید در بخش مربوطه علامت گذاری نموده و تاریخ بزنند و پس از طی دو ماه جهت آزمون مجدد اسپیرومتری و سنجش کیفیت زندگی مراجعته نمایند. در این پژوهش به بیماران توصیه گردید تا مدت بیست دقیقه و چهار بار در روز این دو تکنیک تنفسی را تمرین نمایند و الگوی مناسب یک دقیقه تمرین و دو دقیقه استراحت را رعایت نمایند. در مورد گروه سوم که تحت ورزش هوایی اندام‌های تحتانی قرار داشتند، ابتدا در هر جلسه قبل از ورزش، نمونه‌ها حرکات کششی و نرمش سبک به مدت ۵ دقیقه انجام دادند و سپس بر روی دستگاه تردمیل قرار گرفته و فشار خون آنان در حالت ایستاده قبل، در حین و بعد از ورزش کنترل گردید. در مراحل اولیه هدف رسانیدن ضربان قلب تا میزان ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب (Maximum heart rate) بود (جمعاً طول مدت ورزش ۲۰–۳۰ دقیقه بسته به تحمل شخص و علائم حیاتی در نظر گرفته می‌شد) که به ازای هر ۵ جلسه با کنترل علائم حیاتی و تا سطح تحمل فرد، شدت فعالیت زیاد می‌گردید تا ضربان قلب به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و چنانچه فرد تحمل فعالیت بیشتر را نداشت بتدریج سرعت دستگاه کم می‌گردید و سپس دستگاه متوقف و فرد به مدت ۵ دقیقه در طول اطاق راه می‌رفت و پس از کنترل علائم حیاتی و تثیت آن ترجیح می‌شد. میزان جلسات ورزش برگزار شده در طی مدت دو ماه، ۱۴ جلسه بود و در هر جلسه چک لیست انجام ورزش هوایی اندام‌های تحتانی

بعد از مداخله نسبت به قبل از آن ارتقاء یافته و این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده ($P<0.01$) است (جدول ۴). همچنین قبل و بعد از مداخله مقایسه بین میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی این گروه با گروه شاهد از نظر آماری معنی دار نگردیده ($P>0.05$) است (جداول ۵ و ۶). در خصوص بیمارانی که از ورزش هوایی تحتانی بهره برده بودند، میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی آنها بعد از مداخله نسبت به قبل از آن ارتقاء یافته که از نظر آماری معنی دار نبوده ($P<0.001$) است (جدول ۴). همچنین قبل از مداخله مقایسه بین میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی این گروه با گروه شاهد از نظر آماری معنی دار نبوده ($P>0.05$) و بعد از مداخله معنی دار ($P<0.001$) می باشد (جداول ۵ و ۶). در گروه شاهد اختلاف میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی قبل و بعد از مطالعه از نظر آماری معنی دار نبوده ($P>0.05$) است (جدول ۴).

علاوه بر این بیمارانی که از تمرینات تنفسی بهره برده اند میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی آنها نسبت به قبل از مداخله ارتقاء یافته ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نبوده است ($P>0.05$) است (جدول ۱). علاوه بر این قبل از مداخله مقایسه بین میانگین و انحراف معیار درصد FEV1/FVC این گروه با گروه شاهد، از نظر آماری معنی دار نبوده و بعد از مداخله نیز معنی دار نگردیده ($P>0.05$) است (جداول ۲ و ۳). در خصوص بیمارانی که از ورزش هوایی تحتانی بهره برده بودند، میانگین و انحراف معیار FEV1/FVC آنها نسبت به قبل از مداخله ارتقاء یافته که از نظر آماری معنی دار نبوده ($P<0.05$) است (جدول ۱). همچنین قبل از مداخله مقایسه بین میانگین و انحراف معیار FEV1/FVC این گروه با گروه شاهد از نظر آماری معنی دار نبوده ($P>0.05$) و بعد از مداخله معنی دار ($P<0.05$) می باشد (جداول ۲ و ۳). در گروه شاهد اختلاف میانگین و انحراف معیار FEV1/FVC قبل و بعد از مطالعه از نظر آماری معنی دار نبوده ($P>0.05$) است (جدول ۱).

علاوه بر این بیمارانی که از تمرینات تنفسی بهره برده اند میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی آنها

جدول ۱: مقایسه میانگین FEV1/FVC گروه ها قبل و بعد از مداخله

P.Value	بعد از مداخله		قبل از مداخله	زمان	متغیر
	Mean ± SD	Mean ± SD			
$P>0.05$	۰/۷۱±۰/۲۴	۰/۷۲±۰/۲۰			گروه شاهد FEV1/FVC
$P>0.05$	۰/۷۸±۰/۳۰	۰/۷۱±۰/۳۰			گروه تمرینات تنفسی FEV1/FVC
$P<0.05$	۰/۸۷±۰/۱۴	۰/۷۸±۰/۲۱			گروه ورزش هوایی FEV1/FVC

جدول ۲. مقایسه میانگین FEV1/FVC سه گروه تحت مطالعه قبل از مداخله

P.Value	FEV1/FVC	متغیر
Mean ± SD		گروه‌های تحت مطالعه
0.71 ± 0.30		گروه تمرینات تنفسی
$P > 0.05$	0.78 ± 0.21	گروه ورزش هوایی
	0.72 ± 0.20	گروه شاهد

جدول ۳. مقایسه میانگین FEV1/FVC سه گروه تحت مطالعه بعد از مداخله

P.Value	FEV1/FVC	متغیر
Mean ± SD		گروه‌های تحت مطالعه
0.68 ± 0.30		گروه تمرینات تنفسی
$P < 0.05$	0.87 ± 0.14	گروه ورزش هوایی
	0.71 ± 0.24	گروه شاهد

* عدم اختلاف معنی دار ($P > 0.05$) دو گروه تمرینات تنفسی و شاهد* اختلاف معنی دار ($P < 0.05$) دو گروه ورزش هوایی و شاهد* اختلاف معنی دار ($P < 0.01$) دو گروه تمرینات تنفسی و ورزش هوایی

جدول ۴. مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی گروه ها قبل و بعد از مداخله

P.Value	بعد از مداخله	قبل از مداخله	زمان	متغیر
Mean ± SD		Mean ± SD		
$P > 0.05$	$57/16 \pm 7/04$	$54/70 \pm 17/87$		نمره کیفیت زندگی گروه شاهد
$P < 0.01$	$50/56 \pm 21/35$	$63/79 \pm 17/87$		نمره کیفیت زندگی گروه تمرینات تنفسی
$P < 0.001$	$27/89 \pm 16/18$	$59/84 \pm 18/75$		نمره کیفیت زندگی گروه ورزش هوایی

جدول ۵. مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی سه گروه تحت مطالعه قبل از مداخله

P.Value	نمره کیفیت زندگی	متغیر
Mean ± SD		گروه‌های تحت مطالعه
$63/79 \pm 17/87$		گروه تمرینات تنفسی
$P > 0.05$	$59/84 \pm 18/75$	گروه ورزش هوایی
	$54/70 \pm 17/87$	گروه شاهد

جدول ۶: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی سه گروه تحت مطالعه بعد از مداخله

P.Value	نمره کیفیت زندگی	متغیر	گروه‌های تحت مطالعه		
			گروه تمرینات تنفسی		
	Mean ± SD				
	۵۰/۵۶ ± ۲۱/۳۵				
P<0.001	۲۷/۸۹ ± ۱۶/۱۸		گروه ورزش هوایی		
	۵۷/۱۶ ± ۷/۰۴		گروه شاهد		

* عدم اختلاف معنی دار ($P>0.05$) دو گروه تمرینات تنفسی و شاهد

* اختلاف معنی دار ($P<0.001$) دو گروه ورزش هوایی و شاهد

* اختلاف معنی دار ($p<0.001$) دو گروه تمرینات تنفسی و ورزش هوایی

تنفس لب غنچه‌ای در مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه باعث تأثیراتی از قبیل کاهش تعداد تنفس، تهویه دقیقه‌ای و فشار دی اکسید کربن در خون شریانی و افزایش حجم جاری، فشار اکسیژن، اشباع شریانی ($O_2\text{sat}$) و کاهش تنگی نفس می‌گردد. تنفس دیافراگمی نیز در این بیماران باعث کاهش تعداد و عمق تنفس شده ولی تأثیر قابل ملاحظه بر تهویه ندارد (۲۱). هرناندز و همکاران که در سال ۲۰۰۰ میلادی به بررسی تأثیر ورزش اندام‌های تحتانی بر مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه پرداختند، نتیجه گرفتند که این تمرینات سبب بهبود تنگی نفس پس از انجام فعالیت کوششی و تنگی نفس پایه در این بیماران شده است (۲۲). در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۸ توسط سیوری و همکاران انجام و به بررسی تمرینات ورزشی اندام‌های تحتانی در برابر فوقانی در مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه پرداختند، چنین نتیجه گرفتند که این تمرینات باعث بهبودی تنگی نفس و کاهش میزان بسترهای یمارستانی در بیماران شده است (۲۳). در تحقیق دیگری که توسط نورماندین و دیگران در سال ۲۰۰۲ به بررسی مقایسه‌ای تمرینات استقاماتی اندام‌های تحتانی با

بحث

یافته‌های پژوهش نشان داد که بعد از مداخله، اختلاف میانگین FEV1/FVC گروه‌های تمرینات تنفسی و شاهد از نظر آماری معنی دار نبوده و ما بین گروه‌های ورزش هوایی و شاهد معنی دار است و حتی مقایسه اختلاف میانگین FEV1/FVC دو گروه مداخله تحت تمرینات تنفسی و ورزش هوایی نیز از نظر آماری معنی دار می‌باشد. تحقیقی که در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط اووه با هدف تأثیر بازتوانی ریوی بر مبتلایان به بیماریهای مزمن ریوی انجام گردید، نشان داد که گروه مداخله نسبت به گروه شاهد سطح پائین‌تری از تنگی (FEV1) نفس کوششی داشته اما تغییر در عملکرد ریوی از نظر آماری معنی دار نبوده است (۱۹). فرگونزی در سال ۲۰۰۴ در مقاله‌ای مروری نتیجه گیری کرد که تنفس لب غنچه‌ای در بیماران COPD باعث افزایش حجم جاری، بهبود تبادل گازی و کاهش مصرف اکسیژن (کار تنفسی) شده و شواهد دیگری بجز این موارد در مورد تأثیر این الگوی تنفسی بر بی‌کفايتی تنفسی وجود نداشته است (۲۰). دچمن و ویلسون در سال ۲۰۰۴ در مقاله‌ای مروری، چنین نتیجه گیری کردند که انجام

کیفیت زندگی بیماران شده است (۲۶). گیل مارتین نیز در سال ۱۹۹۳ میلادی در مقاله خود اشاره نموده است که تمرينات ورزشی مؤثرترین شیوه برای بهبود توانایی بیمار در اجرای فعالیتها است و در این میان ورزش هوایی اندام‌های تحتانی اساس برنامه بازتوانی می‌باشد (۲۷). در مطالعه متا‌آنالیزی که توسط سلمان و دیگران در سال ۲۰۰۳ انجام و به بررسی تأثیر برنامه بازتوانی ریوی در مبتلایان به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه پرداخته، در بیان نتایج اشاره می‌نماید: در کار آزمایی‌هایی که صرفاً از تمرينات تنفسی در بازتوانی استفاده شده در پایان تحقیق هیچگونه تغییر مهمی بین گروه مداخله و شاهد مشاهده نگردیده و بالعکس، کارآزمایی‌هایی که حداقل از تمرينات ورزشی اندام‌های تحتانی بهره برده‌اند، گروه مداخله نسبت به گروه شاهد تغییرات قابل توجهی در بهبود توانایی ورزشی (جسمانی) داشته و آنها نسبت به گروه شاهد کوتاهی تنفس کمتری داشته‌اند (۲۸). بنابراین نتایج بدست آمده از این مطالعه مشابه نتایج حاصل از تحقیقات مذکور است.

نتیجه‌گیری

بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که انجام تمرينات تنفسی لب غنچه‌ای و دیافراگمی در مبتلایان به بیماری برونشیت مزمن گروه مداخله اول در مقایسه با گروه شاهد موجب تغییر معنی‌داری در FEV1/FVC و کیفیت زندگی بیماران نگردیده و بالعکس ورزش هوایی اندام‌های تحتانی با استفاده از تردیل در بیماران گروه مداخله دوم موجب تغییر معنی‌داری در میزان FEV1/FVC و کیفیت زندگی این گروه در مقایسه با گروه شاهد گردیده و حتی این تغییر در مقایسه با گروه

شدت بالا در برابر برنامه تمرينی چندگانه بدناسازی با شدت پائین در مبتلایان به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه پرداخت، چنین نتیجه گیری شد که در نمونه‌های این دو گروه میزان تنگی نفس کوششی و پایه، و وضعیت سلامتی ارتقاء یافته و لیکن در گروه اول کاهش بیشتری در تنگی نفس کوششی به چشم می‌خورد (۲۴). روئیز و همکاران نیز که در سال ۲۰۰۴ با استفاده از تردیل به بررسی اثرات تمرينات ورزشی اندام‌های تحتانی با شدت بالا در مقابل تمرينات با شدت پائین در مبتلایان به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه پرداختند، چنین نتیجه گرفتند که در بیماران گروه اول میزان تهویه دقیقه‌ای افزایش و تعداد تنفس در حین ورزش کاهش بیشتری را نسبت به گروه دوم نشان می‌داد و این تمرينات باعث تنفس عمیق و آهسته و مؤثرتر در حین انجام فعالیت (با فضای مرده کمتری) شده بود و در نتیجه حس تنگی نفس در حین انجام فعالیت در نمونه‌ها کاهش یافته بود (۲۵). بنابراین نتایج بدست آمده از این مطالعه مشابه نتایج حاصل از تحقیقات مذکور است.

علاوه بر این یافته‌های پژوهش نشان داد که بعد از مداخله اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی گروه‌های تمرينات تنفسی و شاهد از نظر آماری معنی‌دار نبوده و مابین گروه‌های ورزش هوایی و شاهد معنی‌دار است و حتی مقایسه اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی دو گروه مداخله تحت تمرينات تنفسی و ورزش هوایی نیز از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. در تحقیق صورت پذیرفته توسط بینگیسر و همکاران در سال ۲۰۰۱ که به بررسی تأثیر برنامه بازتوانی ریوی (تمرينات ورزش اندام‌های تحتانی با شدت بالا) بر مبتلایان به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه پرداختند، نتیجه گیری نمودند که این برنامه‌ها منجر به تأثیرات مثبت بر استقامت ورزشی و

تشکر و قدردانی

بدینویسیله کمال تشکر و سپاسگزاری خود را از زحمات و همکاری مسئولین و پرسنل زحمتکش مراکز درمانی توحید و بعثت شهرستان سنتدج که در اجرای این تحقیق همکاری نمودند، ابراز می‌داریم.

مداخله اول که فقط اقدام به تمرینات تنفسی نموده‌اند، معنی دار است. بنابراین در امر بازتوانی ریوی، انجام ورزش هوایی اندام‌های تحتانی در مقایسه با تمرینات تنفسی از ارزش بالا و قابل توجهی برخوردار است.

References

- Sharma S. Chronic Bronchitis. Department of Internal Medicine, University of Manitoba. 2007. available from URL: <http://www.emedicine.medscape.com> Access May 18, 2008
- Hodgkin EJ, Celi RB and Connors LG. Pulmonary rehabilitation; Guidelines to success. 3rd ed. new York: Williams and Wilkins's. 2000. p. 12-16, 22-29, 147-161.
- Carpenter CJ. Cecil essential of medicine. 7th ed. new york: Saunders. 2007. P. 195-196.
- Allsetetter w. Simple test can help detect common lung disease. national jewish medical and research center. 2004. available from URL: <http://www.eurekalert.org/pub-releases/2004-06/njma-stc062104.php>. Access May 17, 2005
- American lung Association. Chronic bronchitis. 2003. available from URL: <http://www.cheshire-med.com/programs/pulrehab/chrbronc.html>. Access July 30, 2003.
- Cerveri I, Accordini S, Verlato G, Corsico A, Zoia MC, Casali L. Variations in the prevalence across countries of chronic bronchitis and smoking habits in young adults. Eur Respir J 2001; 18: 85-92.
- Cosby A. chronic bronchitis. Ipsos news center. 2003. available from URL: <http://www.Ipsos-na.com/news/act-hit-cntr.Cfm?Ids=1230and pdf-name=mr 010517 pdf>. Access May 18, 2005.
- Marley A M. A care pathway for COPD: professional nurse. BMJ 2001; 16: 821- 823.
- Jonsson AE, Larsson S and Lofdahl CG. preventing exacerbation of chronic bronchitis and COPD. BMJ 2001; 322: 1259-1261.
- Swierzewski JS. Chronic obstructive pulmonary disease. health community inc. 2007. available from URL: <http://www.pulmonology channel.com/COPD/complications.shtml> Access May 18, 2008.
- Ream C. Case Report: Emphysema and pulmonary rehabilitation. 2000. RTArticle. Available from URL: <http://www.rtmagazine.com/article.asp?ArticleId=R 9912 D06> Access October 12, 2005
- The cleveland clinic health information center. Pursed lip breathing. 2001. Available from URL: <http://www.cleveland clinic.org/health-info/docs/2400/2408.asp?Index=9443> Access: November 12, 2005.
- The Cleveland clinic health information center .Diaphragmatic breathing. 2001. Available from URL: <http://www.cleveland clinic.org/health/health-in/fo/docs/2400/2409.asp?Index=9445> Access: November 12, 2005
- Pitta F, Brunetto AF, padovani CR, Godoy I. Effects of Isolated cycle ergometer training on patients with moderate-to- sever chronic obstructive pulmonary disease. Respiration. 2004; 71: 477-83.
- Mcfarland EG. Aerobic exercise. medical network Inc. 2005. Available from URL: <http://www.atoz.iqhealth.com/atoz/fitness/cardiacraze/aroexcer.html> Access: September 24, 2005.
- Burckhardt C. Conceptualizing quality of life. 2000. available from URL: <http://www.uib.no/isf/people/doc/qol/compo000.htm>. Access: March 3, 2006.
- Sprengle MD, Niewoehner DE, Nelson DB and Nichol KL. The veterans short form 36 questionnaire is predictive of mortality and health care utilization in a population of veterans with a self reported diagnosis of asthma or COPD. Chest 2004; 126: 81-89.

18. Ullrich D. Improving quality of life for people with COPD. MCW Health link. 2005. Available from URL:<http://www.health link. mcw.edu/article/1031002460. html> Access: March 12, 2006.
19. Oh EG. The effect of home based pulmonary rehabilitation in patient with chronic lung disease. Int J nurse stud. 2003; 40: 873-9.
20. Fregonezi GA. Review article of pursed lip breathing. Arch bronconeumol 2004; 40: 279-282.
21. Dechman G and Wilson CR. Review of the literature for evidence underlying breathing retraining in people with stable chronic obstructive pulmonary disease. physical therapy 2004; 84: 1189-1197.
22. Hernandez MT, Rubio TM, Ruiz FO, Riera HS, Gil RS and Gomez JC. Results of a home based training program for patients with COPD. chest 2000; 118
23. Sivori M, Rhodius E, Kaplan P. Exercise training in chronic obstructive pulmonary disease, comparative study of aerobic training of lower limbs VS. combination with upper limbs. Medicina (B Aires).1998; 58: 717-27.
24. Normandin EA, MCCuskerc Connors M. An evaluation of two approaches to exercise conditioning in pulmonary rehabilitation, chest 2002; 121: 1085-91.
25. Ruiz de oa J m, Garcia de pedroj, Puente Maestul. Effects of muscle Training on breathing pattern in patients with sever chronic obstructive pulmonary disease. Doyma 2004; 40: 20-35.
26. Bingisser RM, foos L, Frubauf B. pulmonary rehabilitation in outpatient's with asthma or chronic obstructive lung disease. swiss MED wkly 2001; 131: 407-411.
27. Gilmartin M. pulmonary Rehabilitation. medical scientific update, national jewish medical and research center. 1993; 11(7). Available from URL: <http://www. national jewish. com / msu / pulmonary rehabilitation. htm> Access May 18, 2005.
28. Salman GF, Mosier MC, Beasley BW and Calkins DR. Rehabilitation for patient's with chronic obstructive pulmonary disease: meta-analysis of randomized controlled trials. Jgen Intern med 2003; 18: 213-221.