

The effects of Petroselinum crispum extract on milk production parameters in female rats

Roshankhah S¹, Jalili C², Salahshoor MR³

1. Assistant Professor of Anatomical Sciences, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

2. Professor of Anatomical Science, Medical Biology Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

3. Associated Professor, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran, (Corresponding Author) Tel: +98-831-7256181, Email: reza.salahshoor@yahoo.com

ABSTRACT

Background and Aim: Use of medicinal plants is one of the methods to increase breast milk. Petroselinum crispum is a multipurpose herb in traditional medicine which contains essential amino acids, vitamins and numerous nutrients. This study aimed to determine the effects of Petroselinum crispum extract on milk production parameters in female rats.

Material and Methods: In this experimental study, 32 Wistar female rats were randomly assigned to 4 groups; group1, control group (normal saline) and groups 2 to 4 (experimental groups). The experimental groups received various doses of Petroselinum crispum (100, 150, 200 mg/kg/day intraperitoneally) for 21 days. Petroselinum crispum extract was prepared. Prolactin hormone measurements were carried out based on RIA prolactin radio immune assay method. Using morphometrical techniques, prolactin receptor (PRLR) mRNA expression level and histological evaluation of mammary gland tissue were investigated. Data were analyzed by one way ANOVA test.

Results: Petroselinum crispum administration increased significantly all the parameters in experimental groups compared to those in the control group ($P<0.0001$).

Conclusion: Petroselinum crispum extract had positive effects on the milk production parameters in mammary glands.

Keywords: Petroselinum crispum, Milk production, Rat

Received: Dec 9, 2018

Accepted: Feb 20. 2019

How to cite the article: Roshankhah S, Jalili C, Salahshoor MR. The effects of Petroselinum crispum extract on milk production parameters in female rats. SJKU 2019; 24 (1): 11-23.

اثرات عصاره گیاه پتروسیلینوم کریپسیوم بر پارامترهای تولید شیر در موشهای صحرایی ماده

شیوا روشنخواه^۱، سیروس جلیلی^۲، محمد رضا سلحشور^۲

۱. استادیار علوم تشریح، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

۲. استاد علوم تشریح، مرکز تحقیقات بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

۳. دانشیار علوم تشریح، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، (نویسنده مسئول) تلفن ثابت: ۰۸۳۱-۷۲۵۶۱۸۱، ایمیل:

reza.salahshoor@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی یکی از روش‌های افزایش تولید شیر در پستان بوده است. پتروسیلینوم کریپسیوم گیاهی چند منظوره در طب سنتی است که شامل آمینو اسیدهای ضروری، ویتامین‌ها و مواد مغذی فراوانی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات عصاره گیاه پتروسیلینوم کریپسیوم بر روی پارامترهای تولید شیر در موش‌های صحرایی ماده می‌باشد.

روش بورسی: در این مطالعه تجربی، تعداد ۳۲ رت ماده از نژاد ویستار بطور تصادفی به ۴ گروه تقسیم شدند. گروه یک، گروه شاهد (نرمال سالین) و گروه ۲ تا ۴، گروه‌های مورد، که بصورت داخل صفاقی دوزهای متفاوت عصاره گیاه (۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم/ کیلوگرم) به مدت ۲۱ روز تجویز شد. عصاره گیری از گیاه پتروسیلینوم کریپسیوم انجام شد. هورمون پرولاکتین بر اساس روش RIA (radioimmunoassay) اندازه گیری شد. میزان بیان ژن ریپتور پرولاکتین (PRLR)، بررسی‌های بافت شناسیبر اساس تکنیکهای مورفومنتریک در نسخ غده پستان انجام شد. یافته‌ها با استفاده از روش آماری واریانس یکطرفه آنالیز شدند.

یافته‌ها: تجویز پتروسیلینوم کریپسیوم در تمام گروه‌های مورد مطالعه، موجب افزایش معنی داری در تمام پارامترهای مورد بررسی در مقایسه با گروه کنترل شد ($P < 0.0001$).

نتیجه گیری: عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم اثرات مثبت بر پارامترهای تولید شیر در غدد پستانی دارد.

کلید واژه‌ها: پتروسیلینوم کریپسیوم، تولید شیر، موش صحرایی

وصول مقاله: ۹۷/۹/۲۸ اصلاحیه نهایی: ۹۷/۱۱/۷ پذیرش: ۹۷/۱۲/۱

مقدمه

مورد استفاده قرار نمی گیرند(۸). به نظر می رسد یکی از راه های افزایش شیر مادر استفاده از داروهای گیاهی باشد. گیاه جعفری با نام علمی *Petroselinum crispum* از خانواده چتریان است که در نزدیکی مزارع رشد میکند و به عنوان یک سبزی در اکثر مناطق ایران مصرف می شود(۹). پتروسیلینوم کریپسوم خصوصیات تغذیه و فارماکولوژیکی بسیاری دارد. خواص متعددی در خصوص گیاه جعفری گزارش شده است از جمله بهبود فیروز کبدی(۱۰)، ادرار آور(۱۱)، ضد میکروب(۱۲)، ضد منوروزیا و آنتی اکسیدان قوی(۱۳). همچنین خواص دیگر پتروسیلینوم کریپسوم شامل تنظیم فشار خون، بهبود اگزما و این برند سنگهای کلیوی می باشد(۱۴). در طب سنتی از این گیاه برای افزایش شیر مادر نیز استفاده می شود(۱۵). همچنین این گیاه شامل ویتامین C، فیتواسترونول، پروتئین و مواد نشاسته ای بوده و همانند بسیاری از آنتی بیوتیک ها برای درمان زخمها پوستی استفاده میشود(۱۶). نتایج حاصل از آنالیز HPLC نشان داد که ترکیبات آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی گیاه پتروسیلینوم کریپسوم حاوی بیشترین غلظت از عصاره fumaric acid و carvacrol به ترتیب به میزان mg/kg ۱۱۹ و ۹۶۶ است(۱۷). عناصر اصلی از بخش های مختلف گیاه فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت خشی کنندگی رادیکالهای آزاد را نشان داده اند(۱۸).

نتایج مطالعه AL-Shemary و همکاران نشان داد که عصاره *Ocimum gratissimum* به دلیل وجود تانن می تواند موجب افزایش میزان پرولاکتین و متعاقباً افزایش میزان شیر دهنی شود(۱۸). نتایج مطالعه BolzAn و همکاران نشان داد که آنتی اکسیدان ها می توانند موجب افزایش میزان هورمون پرولاکتین و افزایش میزان تولید شیر شوند(۱۹). همچنین نتایج مطالعه Gass و همکاران نشان داد که ترکیبات آنتی اکسیدانی می توانند باعث افزایش بیان ژن PRLR (ژن تولید کننده پرولاکتین) شوند(۲۰). نتایج

مراقبت از فرزندان پس از تولد و تغذیه آنان از مسائلی است که اهمیت آن بر هیچ کسی پوشیده نیست در این میان تغذیه انحصاری با شیر مادر به عنوان بهترین تغذیه برای کودک تا سن ۶ ماهگی است که علاوه بر تامین نیازهای جسمی و فیزیولوژیکی، مکمل نیازهای روانی کودک و مادر می باشد(۱). شیر مادر می تواند سبب پیشگیری از برخی بیماری ها در یک سال اول زندگی شود(۲). با وجود علاقه مندی و اقدام بیشتر مادران به شیردهی از پستان، کمتر از ۵۰ درصد مادران قادر به ادامه شیردهی در طول مدت مورد نیاز برای شیرخوار هستند و در بیشتر موارد مادران با قطع زودرس شیردهی مواجه می شوند(۳). اهمیت شیر دهنی در ۲ سال اول پس از تولد نوزادان و مشکلاتی که در این زمینه برای مادران پیش می اید لزوم تحقیقات جدید را در جهت دست یابی و تولید داروهای شیرافزا نشان می دهد(۴). این در حالی است که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه ۱/۵ میلیون مورد مرگ شیرخوار به دلیل محرومیت یا عدم دریافت کافی شیر مادر اتفاق می افتد(۵).

میزان ترشح پرولاکتین به طور فیزیولوژیک در طی بارداری و پس از زایمان در دوران شیردهی افزایش می یابد به طوری که در دوران بارداری غلظت پرولاکتین تا ۲۰ برابر بیشتر از حالت عادی است(۶). نقش های متفاوت پرولاکتین همچون پایداری فعالیت ترشحی غدد پستانی، همراهی عمل آن با آنдрوروژن ها و اثر آن بر متابولیسم آندروروژن ها تا به حال شناخته شده است(۷).

جهت بهبود شیردهی و افزایش شیر مادران راه های درمانی مورد نیاز است که برطرف کردن این نقصه اغلب از طریق داروهای شیمیایی صورت می گیرد. تحقیقاتی در مورد داروهای شیمیایی به عنوان داروهای افزاینده شیر مادر انجام شده ولی این داروها به دلیل عوارض جانبی، آنچنان

حمام آب گرم (۳۶ درجه سانتی گراد) و در شرایط تاریکی قرار داده شد. در ادامه محلول از فیلتر کاغذی و پمپ خلاء عبور داده شد. جهت بدست آوردن محلول اضافی، محلول در دستگاه روتاتور قرارداده شد. مراحل جداسازی تا بدست آمدن عصاره ادامه یافت. عصاره در آب مقطر جهت بدست آوردن غلظت‌های (دوز) مورد مطالعه رفیق شد. عصاره در آب مقطر قابل حل بود (۱۵).

گروه بندی و طراحی مطالعه: موشهای صحرایی به طور تصادفی به ۴ گروه (هر گروه ۸ موش) تقسیم شدند. گروه ۱، گروه کنترل (شاهد)، در این گروه نرمال سالین برابر میزان عصاره تجویز شده در سایر گروه‌ها دریافت شد. گروه‌های ۲ تا ۴، گروه‌های مورد (گروه‌های پتروسیلینوم کریسپوم)، در این گروه‌ها حیوانات با عصاره پتروسیلینوم کریسپوم با دوزهای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم / کیلوگرم تیمار شدند. در همه گروه‌ها تجویز به صورت داخل صفاقی و محلول در نرمال سالین و روزانه به مدت ۲۱ روز متمادی انجام شد (۱۵، ۲).

روش رادیوایمونو (RIA): چند ساعت پس از انجام اخیرین تزریق حیوانات با تزریق مقدار معین ۲٪ Xylazine و کتابتین ۱۰% بیهوش شدند و از قلب آنها به وسیله سرنگ، خون‌گیری به عمل آمد. خون حیوانات در لوله‌های آزمایش به طور آهسته ریخته شد و تا هنگام تشکیل لخته در دمای آزمایشگاه نگهداری شد. سپس با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (g 1000) به مدت ۱۵ دقیقه سرم آن جدا سازی شد. سرم‌های خون، با کمک سمپلر به لوله‌های اپندورف منتقل و پس از زدن برچسب نام هر گروه، درب آن را بسته و به فریزر با دمای -۲۰- سنتی گراد منتقل شد. اندازه گیری هورمونی بر اساس روش RIA پرولاکتین انجام گرفت. کیت از آنتی بادی‌های مونوکلونال موش، بطور مستقیم بر علیه دو اپی توپ متفاوت پرولاکتین استفاده می‌کند. از این‌رو رقابتی در میان نیست. نمونه داخل لوله با اولین آنتی بادی مونوکلونال در

مطالعات فوق موید این نکته است که گیاهانی با خاصیت آنتی اکسیدانی هر یک به نحوی موجب افزایش میزان تولید شیر یا هورمونهای تولید کننده شیر شده‌اند. بنابراین با توجه به خواص آنتی اکسیدانی این گیاه وجود برخی عناصر همانند مطالعات قبلی و گیاهان مشابه با پتروسیلینوم کریسپوم در آن و اینکه تا کنون مطالعه‌ای بر روی اثرات عصاره پتروسیلینوم کریسپوم بر غدد پستانی و میزان تولید شیر به انجام نرسیده است، بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره گیاه پتروسیلینوم کریسپوم بر روی پارامترهای تولید شیر در موش‌های صحرایی ماده به انجام رسید.

روش بررسی

حیوانات آزمایشگاهی: در این مطالعه تجربی، ۳۲ موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار (۲ الی ۳ ماهه) با وزن ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم از انسستیتو رازی ایران خریداری شد. بعد از باروری موشهای ماده توسط موشهای نر و پس از سپری شدن ۲۰ روز از بارداری، به طور متوسط هر موش مادر صاحب ۱۰ نوزاد شد. از یک هفته قبل از شروع مطالعه، موشهای در لانه حیوانات دانشکده پزشکی در شرایط آزمایشگاهی، دمای 20 ± 2 درجه سانتی گراد، ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و دسترسی به آب و غذای آزاد نگهداری شدند. هر ۸ حیوان در یک قفس استاندارد قرار داده شد. تمام مراحل مطالعه بر اساس بیانیه هلسينکی، قوانین تحقیقاتی کار با حیوانات و مصوبه کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد (کد اخلاق: IR.KUMS.REC.1397.495).

تهیه عصاره گیاهی: گیاه پتروسیلینوم کریسپوم از فروشگاههای محلی خریداری و پس پاک نمودن و جدا کردن برگها و ساقه به تایید گیاه شناس رسید. برگها و ساقه گیاه به مدت ۵ روز در فضای باز و محیط سایه خشک گردیدند و توسط آسیاب برقی پودر شدند. صد گرم از پودر به اتانول ۷۰ درصد اضافه شد. محلول بدست آمده در

و بر اساس پروتکل مربوطه mini kit (Qiagen co) RNA از بافت پستان استخراج شد. با استفاده از DNase kit، از نمونه های بدست آمده ژنومیک DNA حذف شد. با استفاده از RevertAid™ First Strand RNA cDNA Synthesis Kit استخراج شده بدست آمد. میزان بیان ژن مورد نظر با استفاده از پرایمر 3-GAPDH(Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase) Maxima SYBR Green/Rox کنترل و بوسیله روش qPCR master mix (Fermentas co) تکنیک Ct (ΔΔComparative Ct) مشخص شد. توالی پرایمر های استفاده شده در جدول ۱ آمده است(۲۱، ۲۲).

حضور آنتی بادی مونوکلونال ثانویه پوشیده شد. مایع موجود در لوله ها بعد از اینکوبه شدن شستشو داده شدند و میزان رادیواکتیویته آنها سنجیده شد. میزان رادیواکتیویته متناسب با تراکم پرولاکتین در نمونه بود (۱۵).

تکنیک real-time PCR برای بدست آوردن میزان بیان ژن پرولاکتین رسپتور (PRLR) در غده پستان در گروه های مورد مطالعه، روش Real Time-PCR بکار برده شد. در آخرین روز از تیمار حیوانات (روز بیست و یکم)، حیوانات توسط کلروفورم بیهوش، کشته و تشریح شدند. غدد پستانی موشها بالافاصله خارج و در نیتروژن مایع فریز گردید و جهت مراحل بعدی در فریز -۸۰ درجه نگهداری شدند. در مرحله اول با استفاده از RNeasy

جدول ۱: توالی پرایمرهای استفاده شده

نام پرایمر ها	توالی پرایمر ها
GAPDH-F	AAGCTCATTCTGGTATG
GAPDH-R	CTGCCACAAGAACTAGAGGATAA GA
PRLR -F	TCCTATTTGAGTCTGCAGCTTCAGT AGTCA
PRLR -R	CTTCCGTGACCAGAGTCACTGTCGG GATCT

GAPDH: Glyceraldehyde3-phosphatedehydrogenase, as endogenous Control. PRLR: prolactin receptor gene

و نمونه ها با استفاده از روش هماتوکسیفیلین و اوزین رنگ آمیزی شدند. بیست برش عرضی از هر بلوک بافتی آمده شد و برشهای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ انتخاب و بصورت راندم از ۳ قسمت آنها عکسبرداری شد. برای هر آلوئول تمام قسمت های سلول اندازه گیری شد. حاشیه (Outline) هر سلول آلوئول توسط میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی ۴۰ اندازه گیری شد. بزرگترین و کوچکترین محور هر آلوئول اندازه

بررسی بافت شناسی و مورفو متیریک:

الف. اندازه گیری میانگین قطر آلوئول ها. غدد پستانی در نرمال سالین شسته و در فرمالین ۱۰ درصد فیکس شدند. عملیات آب گیری با استفاده از غلظت های صعودی الكل انجام شد. نمونه ها توسط زایلین شفاف سازی شده و در پارافین غوطه ور شدند. برشهای نازک (۴ میکرو متر) با استفاده از دستگاه میکرو توم (ساخت کشور آلمان) زده شد

آنالیز آماری. پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف تعیت از توزیع نرمال داده ها در هر گروه انجام شد (جدول شماره ۱)، که در هر چهار گروه به تفکیک متغیر های میانگین میزان پرولاکتین، میانگین قطر آلوئول ها و میانگین تعداد آلوئول ها از توزیع نرمال تعیت می کرد ($P > 0.05$). بتاباین برای تحلیل آماری از آزمون های پارامتریک استفاده شد که با توجه به تعداد گروه ها و برقرار بودن معیارهای لازم از تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد و با توجه به معنی دار ($P < 0.001$) بودن اختلاف میانگین در هر سه متغیر در بین گروه ها از آزمون تعقیبی (تمکیلی) توکی استفاده شد. عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ اجرا شد و سطح معنی داری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد

گیری شد و بر این اساس میانگین مورد نظر بدست آمد. حداقل ۵۰ آلوئول از هر ناحیه اندازه گیری شد. قطر هر آلوئول از طریق دوربین و نرم افزار موتیک (Moticam 2000, Spain) اندازه گیری شد (۲).

ب. تعداد آلوئول ها. بررسی مورفومتریک بوسیله قرار دادن eyepiece micrometer fitted میکروسکوپ نوری و با استفاده از بزرگنمایی ۴۰ برابر روی نمونه های رنگ آمیزی شده توسط روش هماتوکسیلین و ائوزین انجام شد. اندازه گیری تعداد آلوئول ها، با استفاده از نمونه های غدد پستانی، ۵ برش، ۳ فیلد و برای هر اسلاید Olympus BX-51T متعلق به دوربین ۳۲E01 با رزولوشن ۳.۳۴ DP12 با رویکار Olysys Bio-software million pixel (Olympus Optical, Tokyo, Japan) انجام شد (۲).

جدول ۱: وضعیت تعیت از توزیع نرمال متغیر های فاصله ای مورد مطالعه به تفکیک گروه های پژوهش

تعداد آلوئول ها		قطر آلوئول ها		پرولاکتین		متغیر
P value	اماره	P value	اماره	P value	اماره	گروهها
۰/۵۶۹	۰/۷۸۵	۰/۷۴۴	۰/۶۸	۰/۹۷۶	۰/۴۷۸	گروه ۱ (دوز ۱۰۰)
۰/۸۸	۱/۵۸۱	۰/۴۷۵	۰/۸۴۳	۰/۹۸۹	۰/۴۴۳	گروه ۲ (دوز ۱۵۰)
۰/۲۱۱	۱/۰۶۱	۰/۴۴۶	۰/۸۶۳	۰/۹۹۸	۰/۳۴۶	گروه ۳ (دوز ۲۰۰)
۰/۳۲۵	۰/۹۵۲	۰/۳۹۹	۰/۸۹۶	۰/۷۹۷	۰/۶۴۷	گروه کنترل

یافته ها


نتایج توصیفی و تحلیلی متغیر های مطالعه در چهار گروه به تکیک در جدول شماره ۲ آورده شده است.

جدول ۲: میانگین متغیرهای مورد مطالعه در نمونه های پژوهش

تعداد آلوئول ها		قطر آلوئول ها		پرولاکتین		متغیر
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	گروهها
۱.۳	۱۶	۴/۶۱	۱۰۷/۹۱	۱/۲۴	۱۷/۸۳	گروه ۱ (دوز ۱۰۰)
۱/۸۵	۲۰	۶/۵	۱۱۵/۰۱	۲/۱	۲۰/۰۵۳	گروه ۲ (دوز ۱۵۰)
۰/۵۴	۲۱	۵/۹۴	۱۱۸/۰۴۱	۱/۰۸	۲۰/۰۴۳	گروه ۳ (دوز ۲۰۰)
۰/۷۶	۱۰	۳/۳۹	۸۰/۸۳	۰/۶۳	۱۴/۲۳	گروه کنترل
F=۱۳۲/۸۹	P = ۰/۰۰۰۱	F=۸۲/۸۱۴	P = ۰/۰۰۰۱	F=۳۷/۳۱۶	P = ۰/۰۰۰۱	نتایج آماری


$p < 0.0001$) پس از انجام آزمون توکی تعقیبی تنها اختلاف میانگین غلظت پرولاکتین در گروه ۲ و ۳ با هم تفاوت آماری معنادار نداشت ولی در سایر حالات تفاوت آماری معنادار بود ($p < 0.0001$). (نمودار ۱).

مطالعه هورمونی. میانگین میزان هورمون پرولاکتین خون به طور معنی داری در حیوانات تیمار شده با عصاره پتروسیلینوم کریپسوم در تمام دوزهای مورد بررسی در مقایسه با گروه کنترول به طور معنی داری بیشتر بود.



نمودار ۱- اثرات پتروسیلینوم کریپسوم بر روی میزان هورمون پرولاکتین خون در موشهای صحرایی. * افزایش معنی در در تمامی گروه های پتروسیلینوم کریپسوم در مقایسه با گروه کنترل ($p < 0.0001$).

بررسی اثر عصاره پتروسیلینوم کریپسوم بر روی میزان بیان mRNA ژن PRLR در غده پستان با استفاده از تکنیک real-time PCR نشان داد که تیمار با عصاره پتروسیلینوم کریپسوم در تمام دوزهای مورد مطالعه موجب افزایش معنی داری در میزان بیان ژن PRLR نسبت به گروه کنترل می شود. ($p < 0.0001$). (نمودار ۲).




نمودار ۲- نتایج آرمون Real-time quantitative PCR بر روی میزان بیان mRNA PRLR در بافت پستان رت های تیمار شده با پتروسیلینوم کریپسوم. افزایش نسبی میزان هر ژن با استفاده از تکنیک Comparative Ct ($\Delta\Delta Ct$) بدست آمد. * افزایش معنی دار در تمامی گروه های پتروسیلینوم کریپسوم در مقایسه با گروه کنترل ($p < 0.0001$).

داری در میانگین قطر آلوئول ها نسبت به گروه کنترل می شود. ($p < 0.0001$) پس انجام آزمون توکی تعقیبی تنها اختلاف میانگین قطر آلوئول ها در گروه ۲ و ۳ با هم تفاوت

میانگین قطر آلوئول ها. نتایج بررسی میانگین قطر آلوئول ها در گروه های مورد بررسی نشان داد که عصاره پتروسیلینوم کریپسوم در تمامی دوزها موجب افزایش معنی

معنادار بود ($P < 0.0001$) (نمودار ۳).


آماری معنادار نداشت ولی در سایر حالات تفاوت آماری



نمودار ۳- اثرات پتروسیلینوم کریپسیوم بر روی میانگین قطر آلوئول ها در موش های صحرابی. * افزایش معنی در تمامی گروه های پتروسیلینوم کریپسیوم در مقایسه با گروه کنترل ($p < 0.0001$).

تعقیبی تنها اختلاف میانگین تعداد آلوئول ها در گروه ۲ و ۳ با هم تفاوت آماری معنادار نداشت ولی در سایر حالات تفاوت آماری معنادار بود ($P < 0.0001$) (نمودار ۴).

تعداد آلوئول ها. عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم در تمامی دوزهای مورد مطالعه موجب افزایش معنی داری در میانگین تعداد آلوئول ها در حیوانات تیمار شده نسبت به گروه کنترل شد. ($p < 0.0001$) پس از انجام آزمون توکی




نمودار ۴- اثرات پتروسیلینوم کریپسیوم بر روی میانگین تعداد آلوئول ها در حیوانات مورد مطالعه. * افزایش معنی در تمامی گروه های پتروسیلینوم کریپسیوم در مقایسه با گروه کنترل ($p < 0.0001$).

تیمار شده با عصاره پتروسیلینوم کریپوم افزایش در اندازه لوپول ها و تعداد آلوئولوس ها در آلوئول ها نشان داد که از میزان بافت چربی کمتری برخوردار بودند(شکل ۱).

بررسی بافت شناسی

مقاطع رنگ آمیزی شده توسط هماتوکسیلین / ائوزین در گروه کنترل میزان فراوانی از بافت چربی و لوپولهای پراکنده را در بافت پستان حیوانات نشان داد. بافت پستانی



شکل ۱. اثرات عصاره پتروسیلینوم کریپوم بر روی بافت پستان (تمامی گروه ها با رنگ آمیزی ائورین / هماتوکسیلین رنگ آمیزی شده اند و بزرگنمای ۱۰۰ می باشد). بافت غده پستان در گروه کنترل (a)، الوئول ها دیده می شوند (پیکان آبی). گروه پتروسیلینوم کریپوم (۱۰۰ میلی گرم / کیلوگرم) (b)، گروه پتروسیلینوم کریپوم (۲۰۰ میلی گرم / کیلوگرم) (c)، گروه پتروسیلینوم کریپوم (۲۰۰ میلی گرم / کیلوگرم) (d)، مشاهده می شوند. افزایش سایز لوپول ها (پیکان زرد)، افزایش میزان آلوئول ها و کاهش بافت چربی آلوئول ها (پیکان سبز) مشاهده می شود.

می تواند اثرات متفاوتی بر اعضاء مختلف بدن داشته باشند^(۳). یکی از اعضاء هدف برای عصاره های گیاهی غدد درون ریز و برون ریز بدن از جمله بخش های مختلف بافت غدد پستان هستند.

در این مطالعه ، تجویز عصاره پتروسیلینوم کریپوم باعث افزایش میزان پرولاکتین در تمامی دوزهای تجویز شده در موشهای مادر در این مطالعه شد. میزان هورمون پرولاکتین به طور فیزیولوژیک در دوران بارداری و پس از زایمان افزایش می یابد و از جمله نقش های آن پایداری فعالیت ترشحی غدد پستانی و تولید شیر می باشد. بنابراین افزایش میزان پرولاکتین میتواند با افزایش میزان تولید شیر در پستان همراه باشد^(۲۳). تاثیر عصاره پتروسیلینوم کریپوم بر افزایش میزان هورمون پرولاکتین در مطالعه حاضر می تواند

بحث

در مطالعه حاضر، اثرات عصاره پتروسیلینوم کریپوم در پارامترهای تولید شیر در بافت پستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره پتروسیلینوم کریپوم می تواند موجب افزایش بیان ژن PRLR، افزایش میزان پرولاکتین در سرم و تغییرات مثبتی در بافت غدد پستانی به نفع افزایش تولید شیر شود که در ادامه به تفصیل به بحث و بررسی ان پرداخته می شود. فرایند شیردهی، مهم ترین بخش تغذیه یک نوزاد می باشد و در برابر آن نبود تغذیه سالم و کافی برای نوزادان از مسائل مهمی است که پرداختن به آن ضروری می نماید (۲). لذا جهت بهبود شیردهی و افزایش شیر مادران راه های درمانی جدیدی مورد نیاز است. عصاره های گیاهان

نشان دهنده آن است که عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم توانسته است بر بافت پستان از لحاظ افزایش فاکتور های بافت شناسی تولید شیر (آلتوئول ها) اثرات مثبتی داشته باشد. از آنجایی که تکامل آلتوئول های لوبلوی های پستانی در زمان شیردهی با میزان پرولاکتین سرم در ارتباط است (۲). به نظر می رسد که این میزان افزایش در تعداد و قطر آلتوئول ها با افزایش در میزان پرولاکتین سرم نیز در ارتباط بوده است. با توجه به این که عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم حاوی آنتی اکسیدانت های فراوان و میزان ترکیبات فلاونوئیدی می باشد (۲۵) و از آنجایی که فلاونوئیدها جزء دسته ای از ترکیبات به نام فیتواستروژن هاستند و فیتواستروژن ها ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهانی می باشند که عملا ساختمانی مشابه استروژن دارند (۲۶) بر این اساس می توان یکی از علل افزایش قطر و تعداد آلتوئول های لوبلوی را مرتبط با مکانیسم های استروژن دانست که با افزایش میزان پرولاکتین باعث افزایش در تعداد و قطر آلتوئول های لوبلوی شده است. نتایج مطالعه جلیلی و همکاران، نشان داد که عصاره *Utrica dioica* به دلایل مختلف از جمله وجود ترکیبات فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی موجب افزایش قطر و تعداد الوئولها در بافت پستان می شود که موید نتایج مطالعه حاضر می باشد (۲). در واقع در مطالعه حاضر نقش عصاره بر روی افزایش میزان هورمون پرولاکتین به علت خواص آنتی اکسیدانی، تانن، ترکیبات فلاونوئیدی و غیره که پیشتر عنوان شد، علاوه بر تاثیر مستقیم افزایش پرولاکتین بر تولید شیر، آثار ثانویه بر بافت پستان را به صورت افزایش در تعداد و قطر الوئول ها نمایان می سازد که این دو عامل نیز دلیل دیگری بر افزایش میزان تولید شیر هستند.

نتایج حاصل از مقایسه میزان بیان mRNA بین بافت پستان حیوانات کنترل و بافت پستان رت های تیمار شده با عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم نشان داد که میزان بیان ژن PRLR در بافت پستان رت های تیمار شده با عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم به طور معنی داری افزایش یافته است.

به علت وجود مواد غذایی و معدنی فراوان و ضروری از قبیل ویتامین C، فیتواسترول، پروتئین (آمینواسیدهای ضروری) و مواد نشاسته ای باشد که از طریق این گیاه به عنوان یک سبزی به موهشهای ماده رسیده است (۲۴). همچنین با توجه به بررسی مطالعات مشابه که بر روی افزایش میزان شیر دهی با استفاده از عصاره های گیاهی انجام شده است، به نظر می رسد با توجه به اینکه این گیاه غنی از Ascorbic acid، Tanins، ساپونین ها و بسیاری از موارد آنتی اکسیدان می باشد، این ترکیبات با اثر بر روی هیپوفیز یا محور هیپوتالاموس- هیپوفیز موجب افزایش هورمون پرولاکتین شده باشند (۱۱). به عبارت دیگر وجود تانین از یک طرف و همچنین وجود موارد آنتی اکسیدان فراوان در عصاره این گیاه می توانند همانند سایر مطالعات بر روی گیاهان با خواص مشابه در این زمینه با مکانیسم فوق موجب افزایش میزان تولید شیر در مطالعه حاضر شده باشد. نتایج مطالعه AL-Shemary و همکاران نشان داد Ocimum gratissimum موجود در عصاره میزان پرولاکتین در خون شود که می تواند موجب افزایش میزان پرولاکتین در خون شود که نتایج حاصل از مطالعه حاضر را تایید می کند (۱۸). نتایج Cucurbita و همکاران، نشان داد عصاره Daniel مطالعه pepolin میزان پرولاکتین سرم را به طور معنی داری بالا میبرد که بر اثر یک گیاه دارویی بر میزان پرولاکتین تاکید دارد و با نتایج مطالعات حاضر همسو می باشد (۲۳). با توجه به نتایج مطالعه BolzÁn و همکاران که نشان داد آنتی اکسیدان ها می توانند موجب افزایش میزان هورمون پرولاکتین در خون شوند (۱۹)، بنابراین به نظر می رسد خواص آنتی اکسیدانی بالای عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم در مطالعه حاضر می تواند عامل دیگری علاوه بر وجود تانین در افزایش میزان هورمون پرولاکتین و متعاقبا افزایش میزان تولید شیر در حیوانات مورد بررسی باشد (۲۴).

تجویز عصاره پتروسیلینوم کریپسیوم باعث افزایش تعداد و قطر آلتوئول ها در گروه های مورد بررسی شد. این مساله

برای روشن تر شدن مسایل و ابهامات در این زمینه احتیاج به تحقیقات بیشتری در این زمینه وجود دارد، با این حال پژوهش حاضر شواهد جدیدی مبنی بر نقش عصاره پتروسیلینوم کریسپوم در بهبود پارامترهای شیر دهی در نسج پستان را ارائه داد و نقش عوامل ملکولی و مکانیسم های دقیقتر دخیل در این امر، نیازمند بررسی های مفصل تری در این زمینه می باشد.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر شواهد جدیدی مبنی بر نقش عصاره پتروسیلینوم کریسپوم در افزایش شیردهی را نشان داد. تجویز عصاره پتروسیلینوم کریسپوم در حیوانات مورد آزمایش در مطالعه حاضر موجب افزایش بیان ژن PRLR، افزایش میزان پرولاکتین در سرم و تغییرات مثبتی در بافت غدد پستانی به نفع افزایش تولید شیر شد. بررسی مکانیسمهای اثر بخشی عصاره این گیاه بر پارامترهای تولید شیر نیازمند آزمایشات تکمیلی مفصل تری در این زمینه می باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی به شماره ۹۷۴۹۵ استخراج شد. بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی که ما را در این طرح یاری نمودند کمال تشکر را داریم.

Reference

1. Zhou W, Yu Y, Qian Z. Challenges of breastfeeding in China under its universal two-child policy. J Matern Fetal Neonatal Med 2018;1-2.
2. Jalili C, Salahshoor M, Yousefi D, Khazaei M, Shabanizadeh Darehdori A, et al. Morphometric and hormonal study of the effect of utrica diocia extract on mammary glands in rats. Int J Morphol 2015;33:983-7.
3. Almqvist Tangen G, Bergman S, Dahlgren J, Roswall J, Alm B. Factors associated with discontinuation of breastfeeding before 1 month of age. Acta Paediatr 2012;101:55-60.
4. Taveras EM, Capra AM, Braveman PA, Jensvold NG, Escobar GJ, Lieu TA. Clinician support and psychosocial risk factors associated with breastfeeding discontinuation. Pediatrics 2003;112:108-15.

PRLR یک رپتور سیتوکینی و دومین cascades پیام رسان می باشد که در لوبوآلثولار بافت پستان دیده می شود. PRLR از طریق ژنی که بر روی کروموزوم ۵p13-14 می باشد کد می شود و با پرولاکتین بعنوان یک رپتور ترانس غشایی در ارتباط است. بنابراین شامل نواحی خارج سلولی است که با پرولاکتین باند می شود. بیان بالای PRLR موجب افزایش سطح سرمی پرولاکتین و نیز کاهش حجم بافت چربی بینایی در بافت پستان زنان شیرده می شود(۲۷). با توجه با نتایج مطالعه Gass و همکاران که ترکیبات انتی اکسیدانی می توانند باعث افزایش بیان ژن PRLR شوند و نتایج مطالعه حاضر را تایید می کند(۲۰)، به نظر می رسد عصاره پتروسیلینوم کریسپوم نیز با توجه به میزان بالای انتی اکسیدانها، از همین مکانیسم موجب افزایش میزان بیان ژن PRLR در مطالعه حاضر شده است. ساپونین می تواند موجب افزایش بیان ژن PRLR و افزایش میزان تولید شیر گردد(۲۸). با توجه به حجم بالای ساپونین در عصاره پتروسیلینوم کریسپوم به نظر می رسد یکی از دلایل افزایش میزان بیان ژن PRLR و افزایش میزان پرولاکتین در سرم خون در اثر تیمار حیوانات با عصاره پتروسیلینوم کریسپوم در مطالعه حاضر وجود ساپونین علاوه بر مواد آنتی اکسیدانی در ترکیبات عصاره این گیاه باشد(۲۹).

5. Velle-Forbord V, Underdal MO, Vanky E. Breastfeeding and future maternal health—no causal evidence. *JAMA Intern Med* 2018;178:870-1.
6. Akinloye A, Oke B. Sex hormonal pattern of the female african giant rat (*Cricetomys gambianus*, Waterhouse) at different stages of the oestrous cycle. *Nigerian Vet J* 2012;33: 586-91.
7. Knoppert DC, Page A, Warren J, Seabrook JA, Carr M, Angelini M, et al. The effect of two different domperidone doses on maternal milk production. *J Hum Lact* 2013;29:38-44.
8. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. *Pediatrics* 2001;108: 776-89..
9. Wong PY, Kitts DD. Studies on the dual antioxidant and antibacterial properties of parsley (*Petroselinum crispum*) and cilantro (*Coriandrum sativum*) extracts. *Food Chem* 2006;97:505-15.
10. Petrolini FVB, Lucarini R, Souza MGMD, Pires RH, Cunha WR, Martins CHG. Evaluation of the antibacterial potential of *Petroselinum crispum* and *Rosmarinus officinalis* against bacteria that cause urinary tract infections. *Braz J Microbiol* 2013;44:829-34.
11. Corrêa Filho LC, Martinazzo AP, de Souza Teodoro CE, Vivès L. Microbiological quality and essential oil of parsley (*Petroselinum crispum*) submitted to the hygienizing and drying process. *Ind Crops Prod* 2018;114:180-4.
12. Ghorbani R, Mokhtari T, Khazaei M, Salahshoor MR, Jalili C, Bakhtiari M. The effect of walnut on the weight, blood glucose and sex hormones of diabetic male rats. *Int J Morphol* 2014;32:833-8.
13. Jalili C, Khani F, Salahshoor MR, Roshankhah SH. Protective effect of curcumin against nicotine-induced damage on reproductive parameters in male mice. *Int J Morphol* 2014;32:844-9.
14. Nielsen S, Young JF, Daneshvar B, Lauridsen S, Knuthsen P, Sandström B, et al. Effect of parsley (*Petroselinum crispum*) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. *Br J Nutr* 1999;81:447-55.
15. Jalili C, Salahshoor MR, Naderi T. The effect of hydroalcoholic extract of *P. crispum* on sperm parameters, testis tissue and serum nitric oxide levels in mice. *Adv Biomed Res* 2015;4:40.
16. Al-Howiriny T, Al-Sohaibani M, El-Tahir K, Rafatullah S. Preliminary evaluation of the anti-inflammatory and anti-hepatotoxic activities of parsley'petroselinum crispum in rats. *J Nat Med* 2003;3:54-62.
17. Heidari T, Moazedi AA, Seyyednejad SM, Borojeni MP. The role of histaminergic H2 receptors on spasmolytic activity of hydroalcoholic extract of parsley (*Petroselinum crispum*) Seeds in Isolated Rat's Ileum. *J Nat Med* 2018;17:114-24.
18. AL-Shemary NNA, Mousa SA, Muslim ZZ. Histological and hormonal study about the effect of aqueous extract of *Ocimum gratissimum* on female reproductive system in albino mice. *J Pharm Sci Res* 2018;10:765-7.
19. BolzÁn AD, Bianchi MS, Cónsole GM, Goya RG .Relationship between pituitary hormones, antioxidant enzymes, and histopathological changes in the mammary gland of senescent rats. *Exp Gerontol* 1997;32:297-304.
20. Gass S, Harris J, Ormandy C, Brisken C. Using gene expression arrays to elucidate transcriptional profiles underlying prolactin function. *J Mammary Gland Biol Neoplasia* 2003;8:269-85.

21. Dastjerdi MN, Salahshoor M, Mardani M, Rabbani M, Hashemibeni B, Gharagozloo M, et al. The apoptotic effects of sirtuin1 inhibitor on the MCF-7 and MRC-5 cell lines. *Res Pharm Sci* 2013;8:79–89.
22. Nagano M, Kelly PA. Tissue distribution and regulation of rat prolactin receptor gene expression. Quantitative analysis by polymerase chain reaction. *J Biol Chem* 1994;269:13337-45.
23. Daniel E, Hamman W, Olorunshola K, Malgwi I. The study of effect of aqueous Cucurbita pepo linn seed extract on serum prolactine level of lactating female albinorats. *Sci J Med Sci* 2013;2:6-11.
24. Damabi NM, Moazedi A, Seyyednejad S. The role of α -and β -adrenergic receptors in the spasmolytic effects on rat ileum of Petroselinum crispum Latifolium (parsley). *Asian Pac J Trop Dis* 2010;3:866-70.
25. Rezazad M, Farokhi F. Protective effect of Petroselinum crispum extract in abortion using prostadin-induced renal dysfunction in female rats. *Avicenna J Phytomed* 2014;4:312-9.
26. Haidari F, Keshavarz SA, Shahi MM, Mahboob SA, Rashidi MR. Effects of parsley (Petroselinum crispum) and its flavonol constituents, kaempferol and quercetin, on serum uric acid levels, biomarkers of oxidative stress and liver xanthine oxidoreductase activity inoxonate-induced hyperuricemic rats. *Iran J Pharm Res* 2011;10:811-9.
27. Jalili C, Salahshoor MR, Hoseini M, Roshankhah S, Sohrabi M, Shabanizadeh A. Protective effect of thymoquinone against morphine injuries to kidneys of mice. *Iran J Kidney Dis* 2017;11:142-50.
28. Benchaar C, McAllister T, Chouinard P. Digestion, ruminal fermentation, ciliate protozoal populations, and milk production from dairy cows fed cinnamaldehyde, quebracho condensed tannin, or Yucca schidigera saponin extracts. *J Dairy Sci* 2008;91:4765-77.
29. Simon JE, Quinn J. Characterization of essential oil of parsley. *J Agric Food Chem* 1988;36:467-72.